

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educational :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Maladie :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0045443

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3105 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : Houni Ned

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 05 22 37 76 50 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Houni KHADIJA Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le / /

Signature de l'adhérent(e) :



Conditions Générales

POUR LE PRATICIEN

L'acte médical est désigné par l'une des mentions suivantes :

- Consultation au Cabinet du médecin omnipraticien
- Consultation au Cabinet par le médecin spécialiste ou qualifié (autre que le médecin neuro-psychiatre)
- Consultation au Cabinet par le neuro-psychiatre
- Visite de jour au domicile du malade par le médecin
- Visite de nuit au domicile du malade par le médecin
- Visite du dimanche par le médecin au domicile du malade
- Visite de jour au domicile du malade par un spécialiste qualifié
- Acte de pratique médicale couvrant et de petite chirurgie
- Actes de chirurgie et de spécialistes

- SF = Actes pratiqués par la sage Femme et relevant de sa compétence
- SFI = Soins infirmiers pratiqués par la sage femme
- AMM = Actes pratiqués par le masseur ou le kinsithérapeute
- AMI = Actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière
- AP = Actes pratiqués par un orthophoniste
- AMY = Actes pratiqués par un aide-orthophoniste
- R-Z = Electro - Radiologie
- B = Analyses

POUR L'ADHERENT

La mutuelle ne participe aux frais résultant de certains actes que si après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge.

Pour les actes soumis à cette formalité, le malade est tenu, avant l'exécution de ces actes adresser au service de la Mutuelle une demande d'entente préalable remplie et signée par son médecin traitant.

Le bulletin doit mentionner les raisons pour lesquelles l'application de tel acte ou tel traitement est proposé pour permettre au médecin contrôleur de donner son accord ou de présenter ses observations

Le bulletin d'entente préalable peut être demandé auprès du service Mutuelle, il sera remis sous pli confidentiel au médecin contrôleur dûment rempli par le médecin traitant.

LES ACTES SOUMIS A ACCORD PREALABLE

- HOSPITALISATION EN CLINIQUE
- HOSPITALISATION EN HOPITAL
- HOSPITALISATION EN SANATORIUM OU EVENTORIUM
- SEJOUR EN MAISON DE REPOS
- ACTES EFFECTUES EN SERIE, il s'agit d'actes répétés en plusieurs séances ou actes baux comportant un ou plusieurs échelons dans le temps.

- LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES
- L'ORTHOPEDIE
- LA REEDUCATION
- LES ACCOUCHEMENTS
- LES CURES THERMALES
- LA CIRCONCISION
- LE TRANSPORT EN AMBULANCE

EN CAS D'URGENCE

En cas d'actes d'urgence échappant à la procédure d'entente préalable, l'intéressé doit se présenter dans les 24 heures le Service Mutuelle qui donnera ou non son accord

Cette feuille complétée par le praticien, à l'occasion de chaque visite ou l'exécution de chaque ordonnance médicale ne doit être utilisée que pour un seul malade



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance et d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

DATE DE DEPOT

AEROPORT CASA ANFA
CASABLANCA
TEL : 05 22 91 26 46 / 26 48 / 26 49 / 28 57 / 28 83
FAX : 05 22 91 26 52
TELEX : 3998 MUT
E-mail : mupras@RoyalAirMaroc.co.ma

FEUILLE DE SOINS 1598648

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Nom & Prénom : HOURI Med
Matricule : 3105 Fonction : RETRAITÉ Poste :
Adresse : cité O'jannas Jannet Ave 2 n°3 Cas
Tél. : 0522 57 74 50 Signature Adhérent : [Signature]

A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

Nom & Prénom du patient : HOURI KHADIA Age
Lien de parenté avec l'adhérent : Adhérent ☐ Conjoint ☒ Enfant ☐
Date de la première visite du médecin :
Nature de la maladie : Diabète + Coeur
S'il s'agit d'un accident : causes et circonstances
A CASA le 26/09/19
Durée d'utilisation 3 mois

Docteur ABENALLA ELGHORFI Fatima
Spécialiste Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Bd Al Oudis, Rés les Rosiers, Apt 121
Ain Chock, Casablanca - Tél : 0522 870 890

VOLET ADHERENT

DECLARATION

1598648



Matricule N° :
Nom du patient :
Date de dépôt :
Montant engagé
Nombre de pièces jointes :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et Signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/09/19	a		300 PH	Docteur BENLALLA ELGHORFI Fahma Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie et Nutrition Bd Al Ouds, Rés les Rosiers, Appt 121 Ain Chock, Casablanca - Tél : 0522 870 890

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	26 09 19	1099,10 INPE: 092016013

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et Signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et Signature du praticien	Dates des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des

Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement car ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				Coefficient DES TRAVAUX														
				MONTANT DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		Coefficient DES TRAVAUX
H																		
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D	G																	
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B																		
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANT DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
				DATE DE L'EXECUTION														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition

إختصاصية في أمراض الغدد
و السكري و التغذية

Sur Rendez-Vous

بالموعد

Casablanca, le 26/09/19 الدار البيضاء في

Mme **HOURI KHADIJA**

RÉGIME SANS SUCRE ET SANS GRAS ET HYPOPROTIDIQUE

ZYLORIC 200

1 comprimé

à midi

LEVOTHYROX 100

1 comprimé

le matin

AMAREL 4

1 comprimé

le matin

GALVUS 50

1 comprimé

à midi

TRAITEMENT DE 3 MOIS

Docteur BENLALLA EL GHORFI Fatima
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Bd Al Qods, Rés. Les Rosiers, Appt 121
Ain Chock, Casablanca - Tél : 0522 870 890



MUPRAS

MUTUELLE DE PREVOYANCE &
D'ACTIONS SOCIALES DE ROYAL AIR MAROC

le 26/09/19

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE (✓)

(A adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné:
Certifie que M^{lle}, M^{me}, M: HOUARI KHADJA
Présente diabète + dyslipidémie + la Goutte
Nécessitant un traitement d'une durée de: longue durée
Dont ci-joint l'ordonnance Oui Réajustement du traitement et fait la patiente se
(A défaut noter le traitement prescrit) celle dans 30j

(✓) : valable 3 mois

Contact: 05-22-91-23-36/ 05-22-91-23-76

Docteur BENALLA ELGHORFI Fatima
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Bd Al Ouds, Rés les Rosiers, Appt 121
Ain Chock, Casablanca - Tél : 0522 870 890



Levothyrox® 100 µg.
Comprimés sécables B/30
PPV: 24,40 DH

१०७. १५. १५५५५ / १५५५५ / १५५५५

اذا كنت حاملا، اذكري

॥ अथ ॥

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

כח. כח. כח.

المشقة والغزاة الموانع الاتفاق على

قوله: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ

وَبِشْرٍ مِّنْ مَّوَدَّةِ الْإِنسَانِ

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל

1950-1951

ਭਾਗ ੧: ਪੰਨਾ ੧੦੦

17. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ

(المصنفات)،

1875. 3 11:15 11

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

١٠٥٠

||

الاستاذ المساعد الدكتور / فاضل جعفر

CC-BY-NC-ND 4.0 International license

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1. प्रश्न :

۳۰

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

الحقوقي والصنعي

ASIO!

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

[illegible]

000 5 1

କୃଷି କର୍ମକାଳୀ ପାଠ୍ୟ ୬୭ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଣ

المادة ١٤٧:

100 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000

ה'תש"ח | ח' | י"ב | י"ד | י"ו | י"ח | י"ט | כ' | כ"א | כ"ב | כ"ג | כ"ד | כ"ה | כ"ו | כ"ז | כ"ח | כ"ט | ל'

[illegible]

غير المستعجلة. هذه الأجزاء ستستحق حماية أفضل.



Levothyrox® 100 µg.
Comprimés sécables B/30
PPV: 24,40 DH

७७४ १५ ४५५४ ४५५५ ४५५६

اذا كانت حاملا، كنت يا ضعیف

॥ अथ ॥

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

المشقة والغزاة الموانع الاتفاق على

قوله: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

وَبِشْرٍ مِّنْ مَّوَدَّةِ الْإِنسَانِ

$$K^{\circ}(\mathbb{P}^1) = K^{\circ}(\mathbb{P}^1) \oplus K^{\circ}(\mathbb{P}^1) \oplus K^{\circ}(\mathbb{P}^1)$$

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(ה'תשנ"ו) יום הולדתו של

1950-1951

ਭਾਗ ੧: ਪੰਨਾ ੧੦੦

17. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ

(المصنفات)،

1875. 3 11:15 11

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

١٠٥٠

||

الاستاذ المساعد الدكتور / فاضل جعفر

CC-BY-NC-ND 4.0 International license

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1. प्रश्न :

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

الحقوقي والصديقي الشكلي

ASIO!

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

المسلمون في بلاد الهند

000 5 1

କୃଷି କର୍ମକାଳୀ ପାଠ୍ୟ ୧୭ ଖଣ୍ଡ ୩୮

المادة ١٤٧:

100 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000

ה'תש"ח | כ"ב | ח' | תמוז | ה'תש"ח

$\rho = \frac{m}{V}$

غير المستعجلة. هذه الأجزاء ستستحق حماية أفضل.

غير المستعملة. هذه الأجزاء ستسمح بحماية البيئة.

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

قائمة المواد الفعالة و السواغات
على مالاذا يحتوي ليفوتيروكس 25 ميكرو غرام ، 50 ميكرو غرام ،
المادة الفعالة هي :
ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ، قرص

ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام
50 ميكرو غرام
100 ميكرو غرام
200 ميكرو غرام
ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام

ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام ، 50 ميكرو غرام ،
المادة الفعالة هي :
ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ، قرص

ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام ، 50 ميكرو غرام ،
المادة الفعالة هي :
ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ، قرص

ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام ، 50 ميكرو غرام ،
المادة الفعالة هي :
ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ، قرص

ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام ، 50 ميكرو غرام ،
المادة الفعالة هي :
ليفوتيروكسين صودي . 25 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ، قرص

آخر تاريخ لصحة هذه النشرة : 30 أبريل 2015



Levothyrox® 100 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 24,40 DH

7862160342

فترة الحمل، تحت إشراف
المرحلة الثانية أو في

إذا كنت تعطيني أو كنت تعطيني، أسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول
أدوية الحمل أو الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة
استخدم أثناء الحمل والرضاعة

مكملات مع الصويا
يجتاج إلى تجنب جرعة من العلاج من بداية أو في نهاية

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد
الطعام والشراب

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات
عليك بالتأكد من عدم تناول أي دواء آخر في حالة ما أخذت أو تأخذون أي دواء آخر.

المواد الأخرى مثل إيثانول، سوليفيت، أورليستات،
الأدوية لعلاج الإحصاء بقرص الأبيز،

من الحمل
الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لعرض دون،

الأدوية لعلاج الحمل، (الكورونيكين / البروغونيل،
الأدوية لعلاج الحمل،

الأدوية لعلاج الحمل،
الأدوية لعلاج الحمل،

تكون الأجزاء من بعض الأدوية:
المركبات السريرية و التكرار لجرعة العلاج

عند مرض غشائي الكلى
مستقبلات، دواء يستخدم لمنع قرص في كمية كبيرة في الدم

الحمضات، (المكملات)،
الأدوية لعلاج الحمل، (الكورونيكين / البروغونيل،

الأدوية لعلاج الحمل، (الكورونيكين / البروغونيل،
الأدوية لعلاج الحمل،

الأدوية لعلاج الحمل، (الكورونيكين / البروغونيل،
الأدوية لعلاج الحمل،

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain sebaï Casablanca
Amarel 4 mg, cp b 30
P.P.V : 84,00 DH



كيف هو شكل أقراص أمارل 1 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص.
إنه قرص زهري اللون ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.15.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

كيف هو شكل أقراص أمارل 2 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص.
إنه قرص أخضر اللون ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

كيف هو شكل أقراص أمارل 3 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص.
إنه قرص أبيض باهت ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين.
يمكن قطع كل قرص إلى جرعتين متساويتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

كيف هو شكل أقراص أمارل 4 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص قابل للتقطع.
إنه قرص أزرق فاتح ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين. يمكن قطع كل قرص إلى جرعتين متساويتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

الشركة حاملة رخصة التسويق والشركة المشغلة
sanofi-aventis France
1- 13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

الشركة المصنعة
Sanofi Winthrop Industrie
30,36, avenue Gustave Eiffel - 37100 Tours - France

تاريخ الموافقة الأخيرة على هذه النشرة : آذار 2014

أصبحت بأحد هذه الموارض. أعلم الطبيب على الفور.
(أ) ومشاكل في دقات المرأة (ركود الصفراء).
الطبيب على الفور.

الطبخ والشرى وزيادة الحساسية تجاه الشمس.
كما يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو البقع وتورم الشفتين أو
أعلم الطبيب على الفور.
ويؤامد أو الأدوية ذات الصلة.
التهيجات في مستويات سكر الدم ويجب أن تتحسن

بدلي أو المعرض (د). ويتضمن هذا أي تأثيرات جانبية محتملة غير
مكتملة المساعدة على تزويد المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء

على العلية. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من

التزوية. اطلب من الصيدلي المتخصص من الأدوية التي لم تعد تستعملها.

1 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم وأكسيد

2 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم وأكسيد
يوم التيتانيوم القرمزي (إي 132).

3 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم وأكسيد

4 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم وأكسيد
يوم التيتانيوم القرمزي (إي 132).

THIS MEDICAMENT

is a product, which affects your health, and its misuse may be dangerous for you.

Follow exactly the doctor's prescriptions, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medications out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.

إن هذا الدواء

مستعمل بوضوح على صحة وسلامة خلافا للتعليمات بعرضه الخطأ.
الرجاء قراءة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتضمنة فيها والتعليمات
الصيدلانية التي مرافقها.

- الطبيب والصيدلي هما الخبراء في الدواء وفي فوائده.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تأخذ دواء دون استشارة الطبيب.
- لا تكرر التسمية في تناول الدواء.

مجلس وزراء الصحة العرب
والنهاد الصيدلانية العرب

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain sebaï Casablanca
Amarel 4 mg, cp b 30
P.P.V : 84,00 DH



كيف هو شكل أقراص أمارل 1 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص.
إنه قرص زهري اللون ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.15.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

كيف هو شكل أقراص أمارل 2 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص.
إنه قرص أخضر اللون ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

كيف هو شكل أقراص أمارل 3 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص.
إنه قرص أبيض باهت ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين.
يمكن قطع كل قرص إلى جرعتين متساويتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

كيف هو شكل أقراص أمارل 4 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص قابل للتقطع.
إنه قرص أزرق فاتح ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين. يمكن قطع كل قرص إلى جرعتين متساويتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

الشركة حاملة رخصة التسويق والشركة المشغلة
sanofi-aventis France
1- 13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

الشركة المصنعة
Sanofi Winthrop Industrie
30,36, avenue Gustave Eiffel - 37100 Tours - France

تاريخ الموافقة الأخيرة على هذه النشرة : آذار 2014

أصبحت بأحد هذه الموارض. أعلم الطبيب على الفور.
(أ) ومشاكل في دقات المرأة (ركود الصفراء).
الطبيب على الفور.

الطبخ والشرى وزيادة الحساسية تجاه الشمس.
كما يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو البقع وتورم الشفتين أو
أعلم الطبيب على الفور.
ويؤامد أو الأدوية ذات الصلة.
التهيجات في مستويات سكر الدم ويجب أن تتحسن

بدلي أو المعرض (د). ويتضمن هذا أي تأثيرات جانبية محتملة غير
مكتملة المساعدة على تزويد المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء

على العلية. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من

التزوية. اطلب من الصيدلي المتخصص من الأدوية التي لم تعد تستعملها.

1 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم وأكسيد

2 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم وأكسيد
يوم التيتانيوم القرمزي (إي 132).

3 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم وأكسيد

4 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم ولك
132.

THIS MEDICAMENT

is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

Follow exactly the doctor's prescriptions, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medications out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.

إن هذا الدواء

مستعمل بوضوح على صحة وسلامة خلافا للتعليمات بعرضه الخطأ.
الرجاء دقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتضمنة عليها والتعليمات
الصيدلانية التي مرصها لك.

- الطبيب والصيدلي هما المختصان في الدواء وفي فوائده.
- وأهمه.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر وصفة الدواء دون استشارة الطبيب.
- لا تكرر التسمية في صفات الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
والنهاد الصيدلانية العرب.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain sebaï Casablanca
Amarel 4 mg, cp b 30
P.P.V : 84,00 DH



كيف هو شكل أقراص أمارل 1 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص.
إنه قرص زهري اللون ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.15.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

كيف هو شكل أقراص أمارل 2 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص.
إنه قرص أخضر اللون ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

كيف هو شكل أقراص أمارل 3 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص.
إنه قرص أبيض باهت ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين.
يمكن قطع كل قرص إلى جرعتين متساويتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

كيف هو شكل أقراص أمارل 4 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو قرص قابل للتقطع.
إنه قرص أزرق فاتح ومستطيل الشكل مع خط للتقطع من الجهتين. يمكن قطع كل قرص إلى جرعتين متساويتين.
120.112.90.60.50.30.28.20.14
علب من 14 لا تكون أحجام العلب كلها مسوقة في بلدك.

الشركة حاملة رخصة التسويق والشركة المشغلة
sanofi-aventis France
1- 13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

الشركة المصنعة
Sanofi Winthrop Industrie
30,36, avenue Gustave Eiffel - 37100 Tours - France

تاريخ الموافقة الأخيرة على هذه النشرة : آذار 2014

أصبحت بأحد هذه الموارض. أعلم الطبيب على الفور.
(أ) ومشاكل في دقات المرأة (ركود الصفراء).
الطبيب على الفور.

الطبخ والشرى وزيادة الحساسية تجاه الشمس.
بما يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو البقع وتورم الشفتين أو
أعلم الطبيب على الفور.
ويؤامد أو الأدوية ذات الصلة.
التهيجات في مستويات سكر الدم ويجب أن تتحسن

بدلي أو المعرض (د). ويتضمن هذا أي تأثيرات جانبية محتملة غير
مكافئة المساعدة على تزويد المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء

على العلية. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من

التزوية. اطلب من الصيدلي المتخصص من الأدوية التي لم تعد تستعملها.

1 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم وأكسيد

2 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم وأكسيد
يوم التيتانيوم القرمزي (إي 132).

3 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم وأكسيد

4 ملغ في القرص.

(أ). يوفيدون 25000. سلاووز دقيق البلورية. ستيارات المغنيزيوم ولك
132.

THIS MEDICAMENT

is a product, which affects your health, and its misuse may be dangerous for you.

Follow exactly the doctor's prescriptions, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medications out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.

إن هذا الدواء

مستعمل بوضوح على صحة وسلامته خلال التفاعلات بعرضه الخطر
التي قد تكون خطيرة وطريقة استعمال المنتجين منها وتعليمات
الصيدلي التي يجب اتباعها.

- الطبيب والصيدلي هما الخبراء في الدواء وفي فوائده.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تأخذ دواء دون استشارة الطبيب.
- لا تكرر الوصفة في ذاتها الاطلاق.

مجلس وزراء الصحة العرب
وال اتحاد الصيدلانية العرب



6118001031030

Galvus® 50 mg
Boîte de 60 comprimés.

PPV : 390 DH

DE L'UTILISATEUR

ment :

Comprimé. Boîte de 60
Vildagliptine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Galvus et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Galvus ?
3. Comment prendre Galvus ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Galvus ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Galvus et dans quel cas est-il utilisé ?

Galvus est un médicament indiqué dans le traitement du diabète de type 2 (diabète sucré). Il est prescrit lorsque la maladie ne peut pas être traitée de manière suffisamment efficace par un régime seul et de l'activité physique. Il contient le principe actif vildagliptine, qui a pour propriété d'abaisser la glycémie (taux de sucre dans le sang).

Dans le diabète de type 2, votre corps ne produit pas assez d'insuline et/ou trop de glucagon. De plus, l'effet de l'insuline produite par votre organisme peut être altéré. L'insuline est une substance (sécritée par le pancréas) qui aide à abaisser le taux de sucre dans le sang – en particulier après les repas. Le glucagon est une autre substance également produite par le pancréas. Il stimule la production de sucre ce qui a pour effet d'augmenter la glycémie. Galvus stimule



6118001031030

Galvus® 50 mg
Boîte de 60 comprimés.

PPV : 390 DH

DE L'UTILISATEUR

ment :

Comprimé. Boîte de 60
Vildagliptine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Galvus et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Galvus ?
3. Comment prendre Galvus ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Galvus ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Galvus et dans quel cas est-il utilisé ?

Galvus est un médicament indiqué dans le traitement du diabète de type 2 (diabète sucré). Il est prescrit lorsque la maladie ne peut pas être traitée de manière suffisamment efficace par un régime seul et de l'activité physique. Il contient le principe actif vildagliptine, qui a pour propriété d'abaisser la glycémie (taux de sucre dans le sang).

Dans le diabète de type 2, votre corps ne produit pas assez d'insuline et/ou trop de glucagon. De plus, l'effet de l'insuline produite par votre organisme peut être altéré. L'insuline est une substance (sécritée par le pancréas) qui aide à abaisser le taux de sucre dans le sang – en particulier après les repas. Le glucagon est une autre substance également produite par le pancréas. Il stimule la production de sucre ce qui a pour effet d'augmenter la glycémie. Galvus stimule



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL

ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés
A.M.N. N° 42 040211NT
SOTHEMA BOUSKOURA Remboursable AMO



6 118000 022244

Intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

Si vous avez besoin de la relire, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre infirmier/ère. Ne le donnez pas à une personne non prescrite. Ne le donnez pas à une personne si les signes de leur maladie

ne devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

31,30

ORIC,

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés. ET DANS QUEL CAS UTILISER ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnique Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez immédiatement votre médecin.

- Si vous souffrez de calculs rénaux, leur taille peut diminuer et ils pourront passer dans les voies urinaires.

Autres médicaments et ZYLORIC, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre l'un des médicaments suivants :

- Aspirine
 - Théophylline, utilisée pour des problèmes respiratoires
 - Médicaments utilisés pour des convulsions (épilepsie), phénytoïne
 - Vidarabine (anti-viral), utilisée pour traiter l'herpès ou la varicelle
 - Didanosine, utilisée pour traiter une infection par le VIH
 - Antibiotiques (ampicilline ou amoxicilline)
 - Médicaments utilisés pour traiter les cancers
 - Médicaments utilisés pour réduire la réponse immunologique (immunosuppresseurs, par exemple azathioprine ou mercaptopurine)
 - Médicaments utilisés pour traiter le diabète
 - Médicaments pour les problèmes cardiaques ou l'hypertension artérielle comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine) ou des diurétiques (pour éliminer l'eau)
 - Médicaments utilisés pour fluidifier le sang (anticoagulants), comme la warfarine
 - Tout autre médicament utilisé pour traiter la goutte.
- Veillez avertir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris tout autre médicament, notamment des médicaments obtenus sans ordonnance, y compris des médicaments à base de plantes.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

En raison du passage de ce médicament dans le lait-maternel, il est donc conseillé de ne pas prendre ZYLORIC, comprimé au cours de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des problèmes de coordination. Si c'est le cas, ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Liste des excipients à effet notoire: Lactose.

Si votre médecin vous a dit que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau après les repas.

Posologie

La posologie recommandée est fonction des résultats du taux sanguin en acide urique.

Les posologies recommandées sont comprises entre 100 et 900 mg par jour. Vous commencerez généralement avec une faible dose, qui sera augmentée, le cas échéant.

Si vous êtes âgé(e) ou si votre fonction hépatique ou rénale est réduite, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible ou vous demander d'espacer les prises du médicament. Si vous êtes traité(e) par dialyse deux ou trois fois par semaine, votre médecin pourra vous prescrire une dose de 300 ou 400 mg qui devra être prise immédiatement après votre dialyse.

Utilisation chez les enfants (âgés de moins de 15 ans)

Les posologies habituelles sont comprises entre 100 à 400 mg par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après les repas.



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL

ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés
A.M.N. N° 42 040211NT
SOTHEMA BOUSKOURA Remboursable AMO



6 118000 022244

Intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

Si vous avez besoin de la relecture, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre infirmière. Ne le donnez pas à une autre personne. Les signes de leur maladie peuvent être graves ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

31,30

ORIC,

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés. ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/ d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnique Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez immédiatement votre médecin.

- Si vous souffrez de calculs rénaux, leur taille peut diminuer et ils pourront passer dans les voies urinaires.

Autres médicaments et ZYLORIC, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre l'un des médicaments suivants :

- Aspirine
- Théophylline, utilisée pour des problèmes respiratoires
- Médicaments utilisés pour des convulsions (épilepsie), phénytoïne
- Vidarabine (anti-viral), utilisée pour traiter l'herpès ou la varicelle
- Didanosine, utilisée pour traiter une infection par le VIH
- Antibiotiques (ampicilline ou amoxicilline)
- Médicaments utilisés pour traiter les cancers
- Médicaments utilisés pour réduire la réponse immunologique (immunosuppresseurs, par exemple azathioprine ou mercaptopurine)
- Médicaments utilisés pour traiter le diabète
- Médicaments pour les problèmes cardiaques ou l'hypertension artérielle comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine) ou des diurétiques (pour éliminer l'eau)
- Médicaments utilisés pour fluidifier le sang (anticoagulants), comme la warfarine
- Tout autre médicament utilisé pour traiter la goutte.

Veillez avertir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris tout autre médicament, notamment des médicaments obtenus sans ordonnance, y compris des médicaments à base de plantes.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

En raison du passage de ce médicament dans le lait-maternel, il est donc conseillé de ne pas prendre ZYLORIC, comprimé au cours de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des problèmes de coordination. Si c'est le cas, ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Liste des excipients à effet notoire: Lactose.

Si votre médecin vous a dit que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau après les repas.

Posologie

La posologie recommandée est fonction des résultats du taux sanguin en acide urique.

Les posologies recommandées sont comprises entre 100 et 900 mg par jour. Vous commencerez généralement avec une faible dose, qui sera augmentée, le cas échéant.

Si vous êtes âgé(e) ou si votre fonction hépatique ou rénale est réduite, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible ou vous demander d'espacer les prises du médicament. Si vous êtes traité(e) par dialyse deux ou trois fois par semaine, votre médecin pourra vous prescrire une dose de 300 ou 400 mg qui devra être prise immédiatement après votre dialyse.

Utilisation chez les enfants (âgés de moins de 15 ans)

Les posologies habituelles sont comprises entre 100 à 400 mg par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après les repas.



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL

ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés
A.M.N. N° 42 040211NT
SOTHEMA BOUSQUIRA Remboursable AMO



6 118000 022244

Intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

Si vous avez besoin de la relecture, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre infirmière. Ne le donnez pas à une personne non prescrite. Ne le donnez pas à une personne non prescrite. Ne le donnez pas à une personne non prescrite.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

l'allopurinol et contactez immédiatement votre médecin.

• Si vous souffrez de calculs rénaux, leur taille peut diminuer et ils pourront passer dans les voies urinaires.

Autres médicaments et ZYLORIC, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre l'un des médicaments suivants :

- Aspirine
 - Théophylline, utilisée pour des problèmes respiratoires
 - Médicaments utilisés pour des convulsions (épilepsie), phénytoïne
 - Vidarabine (anti-viral), utilisée pour traiter l'herpès ou la varicelle
 - Didanosine, utilisée pour traiter une infection par le VIH
 - Antibiotiques (ampicilline ou amoxicilline)
 - Médicaments utilisés pour traiter les cancers
 - Médicaments utilisés pour réduire la réponse immunologique (immunosuppresseurs, par exemple azathioprine ou mercaptopurine)
 - Médicaments utilisés pour traiter le diabète
 - Médicaments pour les problèmes cardiaques ou l'hypertension artérielle comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine) ou des diurétiques (pour éliminer l'eau)
 - Médicaments utilisés pour fluidifier le sang (anticoagulants), comme la warfarine
 - Tout autre médicament utilisé pour traiter la goutte.
- Veillez avertir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris tout autre médicament, notamment des médicaments obtenus sans ordonnance, y compris des médicaments à base de plantes.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

En raison du passage de ce médicament dans le lait-maternel, il est donc conseillé de ne pas prendre ZYLORIC, comprimé au cours de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des problèmes de coordination. Si c'est le cas, ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Liste des excipients à effet notoire: Lactose.

Si votre médecin vous a dit que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau après les repas.

Posologie

La posologie recommandée est fonction des résultats du taux sanguin en acide urique.

Les posologies recommandées sont comprises entre 100 et 900 mg par jour. Vous commencerez généralement avec une faible dose, qui sera augmentée, le cas échéant.

Si vous êtes âgé(e) ou si votre fonction hépatique ou rénale est réduite, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible ou vous demander d'espacer les prises du médicament. Si vous êtes traité(e) par dialyse deux ou trois fois par semaine, votre médecin pourra vous prescrire une dose de 300 ou 400 mg qui devra être prise immédiatement après votre dialyse.

Utilisation chez les enfants (âgés de moins de 15 ans)

Les posologies habituelles sont comprises entre 100 à 400 mg par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après les repas.