



## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/09/19	CG	1	5000,-	INP : 09 123 456 789 Dr. MARIANNE DOCTEUR EN MEDICINE SPECIALISTE EN MASSAGE 10, Bd. d'Antony 9218790 Tél. : 05 20 12 34 56

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
HARAJIE RAWYA DIKHLIFI Bachid 47 Bis Bloc E Lissasfa Casablanca Tél : 05 22 65 08 54	10.2019	1951,00

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**



## AUXILIAIRES MEDICAUX

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [ ]										
				COEFFICIENT DES TRAVAUX [ ]										
				MONTANTS DES SOINS [ ]										
				DEBUT D'EXECUTION [ ]										
				FIN D'EXECUTION [ ]										
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE													
	<p>H</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>25533412</td><td>21423552</td></tr> <tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr><td>35533411</td><td>11433553</td></tr> </table> <p>B</p>			25533412	21423552	00000000	00000000	<hr/>		00000000	00000000	35533411	11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX [ ]
25533412	21423552													
00000000	00000000													
<hr/>														
00000000	00000000													
35533411	11433553													
	<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			MONTANTS DES SOINS [ ]										
				DATE DU DEVIS [ ]										
				DATE DE L'EXECUTION [ ]										

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Docteur Marjane BENJELLOUN**

Spécialiste en Médecine Interne et en Gériatrie

Lauréate de la Faculté de Médecine de Paris V

Ex-Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris

Professeur à l'Université Internationale  
de Casablanca

Diagnostic échographique

**الدكتورة مرجان بنجلون**

أخصائية في الطب الباطني و طب المسنين

خريجة كلية الطب بباريس 5

رئيسة سابقة بمصلحة أمراض الشيخوخة

بمستشفيات باريس

أستاذة بالجامعة الدولية للدار البيضاء

التخدير بالصدى

الدار البيضاء، في :

Casablanca

LABO BENJELLOUN

Mme JABIOUI MIMOUNA

DON 01-01-1939



Dr. Marjane BENJELLOUN  
Docteur en Médecine  
Spécialiste en Gériatrie  
100, Bd. d'Anfa - Casablanca  
Tél. : 05 22 39 87 90

J. Mme JABIOUI Mimouna

Il a été patologique de fin septembre  
2019 :

1) TSH +, T<sub>3</sub> et T<sub>4</sub> -

2) NBS CRP, HbAC -

3) fer sérique, ferritin +

(cf Sat. Sidoine El Ali)

4) transaminases, calcium, albumin

إقامة أنفا 2 - 100، شارع أنفا - الدار البيضاء - الهاتف : 0522 20 87 90 - البريد الإلكتروني : marjane.benjelloun@gmail.com

Résidence Anfa 2 - 100, Bd d'Anfa - Casablanca - Tél. : 0522 20 87 90 - E-mail : marjane.benjelloun@gmail.com

# Docteur Marjane BENJELLOUN

Spécialiste en Médecine Interne et en Gériatrie

Lauréate de la Faculté de Médecine de Paris V

Ex-Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris

Professeur à l'Université Internationale  
de Casablanca

Diagnostic échographique

Casablanca, le :

Ner 1/10/14

# الدكتورة مرجان بنجلون

أخصائية في الطب الباطني و طب المسنين

خريجة كلية الطب بباريس 5

رئيسة سابقة بمصلحة أمراض الشيخوخة

مستشفيات باريس.

أستاذة بالجامعة الدولية للدار البيضاء

التشخص بالصدى

الدار البيضاء في:

F<sup>M</sup> Mme Djemaa

6,00

① Bicarbonate de Sodium: 2 grammes

le matin - 10 jours

366,00

Maphar  
Km 10, Route Côtier 111,  
Qf Zenata Ain seba Casablanca  
KAYEXALATE 454g 1F  
P.P.V : 366,00 DH  
Tél : 05 22 61 08 54  
6 118001 181476  
Bis Bl Casablanca Lissabon  
Dakar  
A

② KAYEXALATE poudre: 1 cuillère

le matin , 3 fois par semaine - 3 mois

49,60 x 4 = 198,40

③ O. CERTE FORTE 100 000 UI: lampada

le matin lors le 15 jours pendant 2 mois

puis lors des 2 mois à vis

40,00 x 2 = 80,00

④ TARDYFERON 80 mg: 2cp le soir - 1 mois

Dr. Marjane BENJELLOUN  
Docteur en Médecine  
Spécialiste en Gériatrie

100,00 Dhs

لقطة أنفاس 100,00 Dhs

شارع أنفاس 100,00 Dhs

0522 20 87 90 - الدار البيضاء - الهاتف :

Résidence Anfa 2 - 100, Bd d'Anfa - Casablanca - Tél.: 0522 20 87 90

marjane.benjelloun@gmail.com

- ⑤ PRESAR 50 mg: 1/2 cp le matin  
 pendant 15 jours puis 1 cp le matin.  
 pendant 3 mois
- $162.5 \times 2 = 325.00$
- ⑥ NÉPALETT 5 mg: 1 cp le matin  
 3 mois -
- $240.00 \times 3 = 720.00$
- ⑦ SÉROPLEX 10 mg: 1 cp le matin  
 3 mois -

**PHARMACIE RAWYA**  
 Dr. LKHLIFI Rachid  
 347 Bis Bloc E Lissasfa  
 Casablanca  
 Tél : 05 22 65 08 54

Dr. Mariane BENJELLOUN  
 Docteur en Médecine  
 Spécialiste en Génitale  
 100, Bd. d'Antoine Capablanca  
 Tél : 05 22 20 79 90

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### PRÉPARATIONS ANTIANEMIQUES

Ce médicament est un apport en fer. Il est recommandé dans l'anémie par carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

##### Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

##### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sués, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinal chez des patients

âgés souffrant d'augmentation de ces maladies.

##### Précautions d'usage

La consommation conseillée de cette boisson.

319334

6 118001 103041

# Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

PPV : 40 50 DH

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétoxydixamique.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antiacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestyramine).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de laitage, de thé, de café, de vin rouge, de légumineuses, d'oeufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

##### Grossesse, allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaite.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

##### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

#### 3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

##### Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### PRÉPARATIONS ANTIANEMIQUES

Ce médicament est un apport en fer. Il est recommandé dans l'anémie par carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

##### Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

##### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sués, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinal chez des patients

âgés souffrant d'augmentation de ces maladies.

##### Précautions d'usage

La consommation conseillée de cette boisson.

319334

6 118001 103041

# Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

PPV : 40 50 DH

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétoxydixamique.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antiacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestyramine).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de laitage, de thé, de café, de vin rouge, de légumineuses, d'oeufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

##### Grossesse, allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaite.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

##### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

#### 3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

##### Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

# PREZAR®

Losartan 50 mg

Comprimé pelliculé sécable, Boîtes de 14 et 30

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition du médicament :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE 50 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OYLS-28908 (white)

## Liste des excipients à effet notable : Lactose.

Classe pharmacothérapeutique :  
Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appétis antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

## Indications thérapeutiques :

PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie  $\geq 0,5\text{ g/jour}$  [présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines] confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC - médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque n'a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable réduit le risque d'accident vasculaire cérébral [Etude LIFE].

## Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable sans l'avvis de votre médecin.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

### Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitizones et inhibiteurs alpha glucosidases).

### Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitizones et inhibiteurs alpha glucosidases).

### Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé ou 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers les reins) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

### Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

PPV 8 4 D H 8 0  
PER 0 5 / 2 2  
LOT 111-17

## Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable et contactez votre médecin ou votre pharmacien.

\* Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement à l'œil ou au nez).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'1 patient sur 1000. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter la section "Surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation".

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 50 mg.

### Fréquents :

\* Étourdissements,

\* Boîse de la pression artérielle (particulièrement après une perfusion par des doses élevées de diurétiques),

\* Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle,

\* Faiblesse,

\* Fatigue,

\* Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

\* Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

\* Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,

\* Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

\* Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang.

### Peu fréquents :

\* Sommeil,

\* Maux de tête,

\* Troubles du sommeil,

\* Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

\* Douleur dans la poitrine (angoisse de poitrine),

\* Essoufflement (dyspnée),

\* Douleurs abdominales,

\* Constipation opiniâtre,

\* Diarrhée,

\* Nausées,

\* Vomissements,

\* Éruption (urticaire),

\* Démangeaisons (prurit),

\* Éruption cutanée,

\* Gonflement localisé (œdème),

\* Ixos,

### Rares :

\* Hypersensibilité,

\* Angio-œdème,

\* Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant purpura),

\* Engourdissement ou picotements (paresthesies),

\* Évanouissement (syncope),

\* Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

\* Atteinte cérébrale (AVC),

\* Inflammation de la peau (hépatite),

\* Élevation du taux de l'alanine amiante-transférase (ALAT), qui habite le foie,

\* Impuissance,

\* Inflammation des paranasaux (pancrérite),

\* Toux bas de sodium dans le sang (hypertonatrémie),

\* Dépression,

\* Sensation générale de malaise,

\* Tintement, boudernement, grominement ou claquement dans les oreilles,

\* Troubles du goût (dyguesie),

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés.

## Mises en garde spéciales et Précautions par

Avez-vous vu votre médecin ou votre pharmacien avant

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes susceptible d'être) enceinte. Ne prenez pas de ce produit en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte ou si vous avez l'intention de prendre ce produit au cours de la grossesse.

Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAR® 50 mg.

\* Si vous avez déjà eu un angio-œdème (gonflement du visage, des lèvres,

\* Si vous avez eu des vomissements importants ou des diarrhées, en particulier si vous avez des nausées,

\* Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent la quantité de liquide dans le corps et qui peuvent causer des

# PREZAR®

Losartan 50 mg

Comprimé pelliculé sécable, Boîtes de 14 et 30

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition du médicament :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE 50 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OYLS-28908 (white)

## Liste des excipients à effet notable : Lactose.

Classe pharmacothérapeutique :  
Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appétis antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

## Indications thérapeutiques :

PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie  $\geq 0,5\text{ g/jour}$  [présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines] confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC - médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque n'a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable réduit le risque d'accident vasculaire cérébral [Etude LIFE].

## Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable sans l'avvis de votre médecin.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

### Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitizones et inhibiteurs alpha glucosidases).

### Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitizones et inhibiteurs alpha glucosidases).

### Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé ou 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers les reins) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

### Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

PPV 8 4 D H 8 0  
PER 0 5 / 2 2  
LOT 111-17

## Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable et contactez votre médecin ou votre pharmacien.

\* Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement à l'œil ou au nez).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'1 patient sur 1000. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter la section "Surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation".

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 50 mg.

### Fréquents :

\* Étourdissements,

\* Boîse de la pression artérielle (particulièrement après une perfusion par des doses élevées de diurétiques),

\* Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle,

\* Faiblesse,

\* Fatigue,

\* Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

\* Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

\* Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,

\* Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

\* Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang.

### Peu fréquents :

\* Sommeil,

\* Maux de tête,

\* Troubles du sommeil,

\* Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

\* Douleur dans la poitrine (angoisse de poitrine),

\* Essoufflement (dyspnée),

\* Douleurs abdominales,

\* Constipation opiniâtre,

\* Diarrhée,

\* Nausées,

\* Vomissements,

\* Éruption (urticaire),

\* Démangeaisons (prurit),

\* Éruption cutanée,

\* Gonflement localisé (œdème),

\* Ixos,

### Rares :

\* Hypersensibilité,

\* Angio-œdème,

\* Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant purpura et syndrome de Raynaud),

\* Engourdissement ou picotements (paresthesies),

\* Évanouissement (syncope),

\* Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

\* Atteinte cérébrale (AVC),

\* Inflammation de la peau (hépatite),

\* Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui habite le foie,

### Fréquence indéterminée :

\* Diminution du nombre de plaquettes,

\* Migraine,

\* Anomalies de la fonction hépatique,

\* Douleurs musculaires et articulaires,

\* Syndrome pseudo-grippal,

\* Douleur dorsale et infection urinaire,

\* Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

\* Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (de la couleuvre),

\* Impuissance,

\* Inflammation du pancréas (pancréatite),

\* Toux bas de sodium dans le sang (hypertonatremie),

\* Dépression,

\* Sensation générale de malaise,

\* Tintement, boudernement, grominement ou claquement dans les oreilles,

\* Troubles du goût (dyguesie),

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés.

## Mises en garde spéciales et Précautions par

Avez-vous vu votre médecin ou votre pharmacien avant

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes suspecté d'être) enceinte ou si vous êtes enceinte. Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAR® 50 mg.

\* Si vous avez déjà eu un angio-œdème (gonflement du visage, des lèvres,

\* Si vous avez eu des vomissements importants ou des diarrhées, en particulier chez les enfants,

\* Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent la quantité de liquide dans le corps et qui peuvent causer des

# PREZAR®

Losartan 50 mg

Comprimé pelliculé sécable, Boîtes de 14 et 30

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition du médicament :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE 50 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OYLS-28908 (white)

## Liste des excipients à effet notable : Lactose.

Classe pharmacothérapeutique :  
Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appétis antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

## Indications thérapeutiques :

PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie  $\geq 0,5\text{ g/jour}$  [présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines] confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC - médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque n'a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable réduit le risque d'accident vasculaire cérébral [Etude LIFE].

## Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable sans l'avvis de votre médecin.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

### Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitizones et inhibiteurs alpha glucosidases).

### Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitizones et inhibiteurs alpha glucosidases).

### Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé ou 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers les reins) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

### Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

PPV 8 4 D H 8 0  
PER 0 5 / 2 2  
LOT 111-17

## Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable et contactez votre médecin ou votre pharmacien.

\* Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement à l'œil ou au nez).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'1 patient sur 1000. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter la section "Surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation".

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 50 mg.

### Fréquents :

\* Étourdissements,

\* Boîse de la pression artérielle (particulièrement après une perfusion par des doses élevées de diurétiques),

\* Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle,

\* Faiblesse,

\* Fatigue,

\* Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

\* Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

\* Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,

\* Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

\* Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang.

### Peu fréquents :

\* Sommeil,

\* Maux de tête,

\* Troubles du sommeil,

\* Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

\* Douleur dans la poitrine (angoisse de poitrine),

\* Essoufflement (dyspnée),

\* Douleurs abdominales,

\* Constipation opiniâtre,

\* Diarrhée,

\* Nausées,

\* Vomissements,

\* Éruption (urticaire),

\* Démangeaisons (prurit),

\* Éruption cutanée,

\* Gonflement localisé (œdème),

\* Ixos.

### Rares :

\* Hypersensibilité,

\* Angio-œdème,

\* Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant purpura),

\* Engourdissement ou picotements (paresthesies),

\* Évanouissement (syncope),

\* Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

\* Atteinte cérébrale (AVC),

\* Inflammation de la peau (hépatite),

\* Élevation du taux de l'alanine amiante-transférase (ALAT), qui habite le foie.

### Fréquence indéterminée :

\* Diminution du nombre de plaquettes,

\* Migraine,

\* Anomalies de la fonction hépatique,

\* Douleurs musculaires et articulaires,

\* Syndrome pseudo-grippal,

\* Douleur dorsale et infection urinaire,

\* Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

\* Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (de la couleuvre),

\* Impuissance,

\* Inflammation du pancréas (pancréatite),

\* Toux bas de sodium dans le sang (hypertonatremie),

\* Dépression,

\* Sensation générale de malaise,

\* Tintement, boudernement, grommement ou claquement dans les oreilles,

\* Troubles du goût (dyguesie),

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés.

## Mises en garde spéciales et Précautions par

Avez-vous vu votre médecin ou votre pharmacien avant

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes suspecté d'être) enceinte. Ce médicament doit être évité pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes enceinte, il est important d'avertir votre médecin avant de prendre PREZAR® 50 mg.

\* Si vous avez déjà eu un angio-œdème (gonflement du visage, des lèvres,

\* Si vous avez eu des vomissements importants ou des diarrhées, en particulier chez les enfants,

\* Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent la quantité de liquide dans le corps).

# NEBILET® 5 mg

NEBILET® 5mg  
28 comprimés O  
PPV 162DH60

Prenez toujours attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Si vous avez des questions sur cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable

### *La substance active est :*

Nébivolol ..... 5,00 mg  
Sous forme de chlorhydrate de nébivolol ..... 5,45 mg  
pour un comprimé quadrifiable

### *Les autres composants sont :*

Polyisobutyl 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

### *Titulaire*

BERLIN CHEMIE AG, SITE ADLERSHOF

Glienicker Weg 125 - 12489 Berlin - ALLEMAGNE

### *Fabricant*

BERLIN CHEMIE AG, SITE ADLERSHOF

Glienicker Weg 125 - 12489 Berlin - ALLEMAGNE

### **1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ?**

### **ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?**

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrifiable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ?**

#### **Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable dans les cas suivants :**

- Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.
- Insuffisance hépatique (*du foie*) ou altération de la fonction hépatique.
- Grossesse ou allaitement (cf. rubriques Grossesse et Allaitement).
- Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou décompensation de l'insuffisance cardiaque.
- Certains troubles de la conduction cardiaque (blocs auriculo-ventriculaires des 2ème et 3ème degrés sans pacemaker, bloc sino-auriculaire).
- Asthme ou problèmes respiratoires sévères (actuels ou pas nus).
- Phéochromocytome non traité (*atteinte de la glande surrenale provoquant une hypertension artérielle sévère*).
- Acidose métabolique.
- Bradycardie (rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute) ou rythme cardiaque irrégulier (mais die du si nus).
- Hypotension (pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg).
- Troubles sévères de la circulation sanguine dans les bras et dans les jambes.

#### **Précautions particulières à prendre avec NEBILET 5 mg comprimé quadrifiable :**

##### **Mises en garde**

###### *En général*

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

En l'absence de données, NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent.

### Liste des excipients à e

Lactose.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. L'association du nébivolol avec d'autres médicaments pourrait affecter son activité ou celle des autres médicaments associés : il s'agit notamment de certains médicaments pour le cœur (comme certains antagonistes calciques (vérapamil, diltiazem), ou certains anti-arythmiques de classe I (quinidine, hydroquinidine, cibenzoline, flecaïnide, disopyramide, lidocaïne, mexilétine, propafenone) ; de certains médicaments pour l'hypertension artérielle (comme certains anti-hypertenseurs d'action centrale (clonidine, guanacétine, moxonidine, méthyldopa, rilménidine). L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

### **3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ?**

#### *Hypertension*

La dose est généralement d'un comprimé par jour.

Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines.

Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

#### *Insuffisance cardiaque chronique stable*

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie sera augmentée à 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines selon la prescription de votre médecin, et enfin à 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.


#### *Voie orale.*

Les comprimés peuvent être pris pendant les repas.

L'initiation du traitement et les augmentations successives de la dose doivent être réalisées par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

Si votre médecin vous a prescrit 1/4 de comprimé ou 1/2 comprimé une fois par jour, NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable doit être cassé comme indiqué ci-après :

Pour obtenir 1/2 comprimé, tenir le comprimé - face présentant les barres de sécurité vers le haut - entre le pouce et l'index de chacune des mains, puis appliquer une pression vers le bas avec les pouces, le long d'une des barres de sécurité (voir le dessin). Pour obtenir 1/4 de comprimé, recommencer la même opération à partir d'1/2 comprimé.



NEBILET 5 mg, comprimé pelliculé doit être pris tous les jours. Il est conseillé de prendre votre traitement chaque jour au

# NEBILET® 5 mg

NEBILET® 5mg  
28 comprimés O  
PPV 162DH60

Prenez attentivement l'intégralité de cette notice  
avant d'utiliser ce médicament.

Si vous avez des questions sur cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute,  
veuillez demander plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable

### *La substance active est :*

Nébivolol ..... 5,00 mg  
Sous forme de chlorhydrate de nébivolol ..... 5,45 mg  
pour un comprimé quadrifiable

### *Les autres composants sont :*

Polyisobuté 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

### *Titulaire*

BERLIN CHEMIE AG, SITE ADLERSHOF

Glienicker Weg 125 - 12489 Berlin - ALLEMAGNE

### *Fabricant*

BERLIN CHEMIE AG, SITE ADLERSHOF

Glienicker Weg 125 - 12489 Berlin - ALLEMAGNE

### **1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ?**

### **ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?**

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrifiable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ?**

#### **Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable dans les cas suivants :**

- Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.
- Insuffisance hépatique (*du foie*) ou altération de la fonction hépatique.
- Grossesse ou allaitement (cf. rubriques Grossesse et Allaitement).
- Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou décompensation de l'insuffisance cardiaque.
- Certains troubles de la conduction cardiaque (blocs auriculoventriculaires des 2ème et 3ème degrés sans pacemaker, bloc sino-auriculaire).
- Asthme ou problèmes respiratoires sévères (actuels ou pas nus).
- Phéochromocytome non traité (*atteinte de la glande surrenale provoquant une hypertension artérielle sévère*).
- Acidose métabolique.
- Bradycardie (rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute) ou rythme cardiaque irrégulier (mais die du si nus).
- Hypotension (pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg).
- Troubles sévères de la circulation sanguine dans les bras et dans les jambes.

#### **Précautions particulières à prendre avec NEBILET 5 mg comprimé quadrifiable :**

##### *Mises en garde*

##### *En général*

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

En l'absence de données, NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent.

### **Liste des excipients à e**

Lactose.

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. L'association du nébivolol avec d'autres médicaments pourrait affecter son activité ou celle des autres médicaments associés : il s'agit notamment de certains médicaments pour le cœur (comme certains antagonistes calciques (vérapamil, diltiazem), ou certains anti-arythmiques de classe I (quinidine, hydroquinidine, cibenzoline, flecaïnide, disopyramide, lidocaïne, mexilétine, propafenone) ; de certains médicaments pour l'hypertension artérielle (comme certains anti-hypertenseurs d'action centrale (clonidine, guanacétine, moxonidine, méthyldopa, rilménidine). L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

### **3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable ?**

#### *Hypertension*

La dose est généralement d'un comprimé par jour.

Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines.

Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

#### *Insuffisance cardiaque chronique stable*

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie sera augmentée à 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines selon la prescription de votre médecin, et enfin à 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour. La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.


#### *Voie orale.*

Les comprimés peuvent être pris pendant les repas.

L'initiation du traitement et les augmentations successives de la dose doivent être réalisées par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

Si votre médecin vous a prescrit 1/4 de comprimé ou 1/2 comprimé une fois par jour, NEBILET 5 mg, comprimé quadrifiable doit être cassé comme indiqué ci-après :

Pour obtenir 1/2 comprimé, tenir le comprimé - face présentant les barres de sécurité vers le haut - entre le pouce et l'index de chacune des mains, puis appliquer une pression vers le bas avec les pouces, le long d'une des barres de sécurité (voir le dessin). Pour obtenir 1/4 de comprimé, recommencer la même opération à partir d'1/2 comprimé.



NEBILET 5 mg, comprimé pelliculé doit être pris tous les jours. Il est conseillé de prendre votre traitement chaque jour au

# Seroplex<sup>®</sup>

Maphar  
Km 10, Route Côtière 111,  
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca  
Seroplex 10mg cp sec b28  
P.P.V : 240,00 DH



6 118001 184989

Lundbeck

- من فضلك أقرأ هذه النشرة بكمالها بانتهاء قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تطهه لأحد سواك، حتى لو كانت لديك نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

**سيروبيلكس 10 ملг، قرص مغلف قابل للقطع**

- المادة الفعالة هي:

إيسينتالوبرام ..... 10,00 ملг

بشكل أوكسالات الإيسينتالوبرام ..... 12,77 ملг

لكل قرص مغلف قابل للقطع

- المكونات الأخرى هي:

النواة العارية:

ستيلوز ميكروبوليوي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروسكرميلوز صودي، ستيرارات المغنتيزيوم.

التعليم:

أوبادي أبيض OY-S-28849: هيبروميلوز، ماكروغول 400 وثاني أكسيد التيتان (E171).

صاحب الرخصة / المصنع:

H. LUNDBECK A/S, Ottlieavej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

1 - ما هو سيروبيلكس 10 ملخ، قرص مغلف قابل للقطع، وما هي حالات استعماله؟  
يصرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف قابل للقطع في عبة من 28 أو 14 قرص.

مضاد اكتئاب / كابح انتقائي / إعادة التناقل السيروتونين.

هذا الدواء هو مقاوم للأكتئاب. يوصى باستعماله في:

- علاج نوبات الاكتئاب الحادة.
- علاج الاكتئاب الهلعي مع أو دون رهاب الخلاء.
- علاج الرهاب المجتمعى.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيروبيلكس 10 ملخ، قرص مغلف قابل للقطع؟

## SEROPLEX® 10 mg comprimé pelliculé sécable

- La substance active est : Escitalopram.....10,00 mg  
Sous forme d'oxalate d'escitalopram ..... 12,77 mg  
Pour un comprimé pelliculé sécable
- Les autres composants sont :  
Noyau nu : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.  
Pelliculage :  
OPADRY blanc OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 et dioxyde de titane (E171).

### Titulaire/Fabricant :

H. LUNDBECK A/S Ottlieavej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

### QUEL EST-CE QUE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable en boîtes de 28 ou 14 comprimés.

ANTIDÉPRESSEUR/INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué dans :

- le traitement des épisodes dépressifs majeurs,
- le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie,
- le traitement de la phobie sociale.

### QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ?

Ne prenez jamais SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- allergie à l'escitalopram ou à l'un des excipients,
- associations avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Prévenez votre médecin en cas d'idées suicidaires, celles-ci pouvant persister en début de traitement de la dépression.

Ce médicament n'est pas recommandé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

### Faites attention :

- en cas de maladie du foie ou de diabète,
- en cas de trouble maniaque,
- en cas d'épilepsie ou d'antécédent de convulsions.

La survenue ou l'augmentation de la fréquence de crises convulsives.

# Seroplex<sup>®</sup>

Maphar  
Km 10, Route Côtière 111,  
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca  
Seroplex 10mg cp sec b28  
P.P.V : 240,00 DH



6 118001 184989

Lundbeck

- من فضلك أقرأ هذه النشرة بكمالها بانتهاء قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تطهه لأحد سواك، حتى لو كانت لديك نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

**سيروبيلكس 10 ملг، قرص مغلف قابل للقطع**

- المادة الفعالة هي:

إيسينتالوبرام ..... 10,00 ملг

بشكل أوكسالات الإيسينتالوبرام ..... 12,77 ملг

لكل قرص مغلف قابل للقطع

- المكونات الأخرى هي:
- النواة العارية:

ستيلوز ميكروبوليوي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروسكرميلوز صودي، ستيرارات المغنتيزيوم.

التعليم:

أوبادي أبيض (E171): هيبروميلوز، ماكروغول 400 وثاني أكسيد التيتان (OY-S-28849).

صاحب الرخصة / المصنع:

H. LUNDBECK A/S, Otiliaeje, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

1 - ما هو سيروبيلكس 10 ملخ، قرص مغلف قابل للقطع، وما هي حالات استعماله؟  
يصرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف قابل للقطع في عبة من 28 أو 14 قرص.

مضاد اكتئاب / كابح انتقائي / إعادة التناقل السيروتونين.

هذا الدواء هو مقاوم للأكتئاب، يوصى باستعماله في:

- علاج نوبات الاكتئاب الحادة.
- علاج الاكتئاب الهلعي مع أو دون رهاب الخلاء.
- علاج الرهاب المجتمعى.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيروبيلكس 10 ملخ، قرص مغلف قابل للقطع؟

## SEROPLEX® 10 mg comprimé pelliculé sécable

- La substance active est : Escitalopram.....10,00 mg  
Sous forme d'oxalate d'escitalopram ..... 12,77 mg  
Pour un comprimé pelliculé sécable
- Les autres composants sont :  
Noyau nu : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.  
Pelliculage :  
OPADRY blanc OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 et dioxyde de titane (E171).

### Titulaire/Fabricant :

H. LUNDBECK A/S Otiliaeje, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

### QUEL EST-CE QUE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS

#### EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable en boîtes de 28 ou 14 comprimés.

**ANTIDÉPRESSEUR/INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE**

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué dans :

- le traitement des épisodes dépressifs majeurs,
- le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie,
- le traitement de la phobie sociale.

### QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ?

**Ne prenez jamais SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :**

- allergie à l'escitalopram ou à l'un des excipients,
- associations avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Prévenez votre médecin en cas d'idées suicidaires, celles-ci pouvant persister en début de traitement de la dépression.

Ce médicament n'est pas recommandé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

### Faites attention :

- en cas de maladie du foie ou de diabète,
- en cas de trouble maniaque,
- en cas d'épilepsie ou d'antécédent de convulsions.

La survenue ou l'augmentation de la fréquence de crises convulsives.

# Seroplex<sup>®</sup>

Maphar  
Km 10, Route Côtière 111,  
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca  
Seroplex 10mg cp sec b28  
P.P.V : 240,00 DH



6 118001 184989

Lundbeck

- من فضلك أقرأ هذه النشرة بكمالها بانتهاء قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تطهه لأحد سواك، حتى لو كانت لديك نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

**سيروبيلكس 10 ملг، قرص مغلف قابل للقطع**

- المادة الفعالة هي:

إيسينتالوبرام ..... 10,00 ملг

بشكل أوكسالات الإيسينتالوبرام ..... 12,77 ملг

لكل قرص مغلف قابل للقطع

- المكونات الأخرى هي:
- النواة العارية:

ستيلوز ميكروبوليوي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروسكرميلوز صودي، ستيرارات المغنتيزيوم.

التعليم:

أوبادي أبيض (E171): هيبروميلوز، ماكروغول 400 وثاني أكسيد التيتان (OY-S-28849).

صاحب الرخصة / المصنع:

H. LUNDBECK A/S, Otiliaeje, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

1 - ما هو سيروبيلكس 10 ملخ، قرص مغلف قابل للقطع، وما هي حالات استعماله؟  
يصرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف قابل للقطع في عبة من 28 أو 14 قرص.

مضاد اكتئاب / كابح انتقائي / إعادة التناقل السيروتونين.

هذا الدواء هو مقاوم للأكتئاب، يوصى باستعماله في:

- علاج نوبات الاكتئاب الحادة.
- علاج الاكتئاب الهلعي مع أو دون رهاب الخلاء.
- علاج الرهاب المجتمعى.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيروبيلكس 10 ملخ، قرص مغلف قابل للقطع؟

## SEROPLEX® 10 mg comprimé pelliculé sécable

- La substance active est : Escitalopram.....10,00 mg  
Sous forme d'oxalate d'escitalopram ..... 12,77 mg  
Pour un comprimé pelliculé sécable
- Les autres composants sont :  
Noyau nu : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.  
Pelliculage :  
OPADRY blanc OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 et dioxyde de titane (E171).

### Titulaire/Fabricant :

H. LUNDBECK A/S Otiliaeje, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

### QUEL EST-CE QUE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS

#### EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable en boîtes de 28 ou 14 comprimés.

**ANTIDÉPRESSEUR/INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE**

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué dans :

- le traitement des épisodes dépressifs majeurs,
- le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie,
- le traitement de la phobie sociale.

### QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ?

**Ne prenez jamais SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :**

- allergie à l'escitalopram ou à l'un des excipients,
- associations avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Prévenez votre médecin en cas d'idées suicidaires, celles-ci pouvant persister en début de traitement de la dépression.

Ce médicament n'est pas recommandé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

### Faites attention :

- en cas de maladie du foie ou de diabète,
- en cas de trouble maniaque,
- en cas d'épilepsie ou d'antécédent de convulsions.

La survenue ou l'augmentation de la fréquence de crises convulsives.

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,  
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**2. COMPOSITION DU MÉDICAMENT :**

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

**Principe actif :** Cholécalciférol 100.000 U.I.

**Excipients :**

Acétate d'alpha-Tocophérol - Essence d'écorce d'orange douce - Oléate de Polyglycérol (E475) - Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

**3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :**

Vitamines.

**4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :**

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

**5. POSOLOGIE :**

**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

**Fréquence d'administration-durée du traitement :**

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

Le dosage doit être déterminé au cas par cas par le médecin traitant. S'il ne vous a pas été prescrit, il est recommandé de prendre une dose unique ou une dose cumulée de 100.000 UI sur 1 semaine.

Il est possible d'administrer 1 ampoule de D-CURE FORTE 100 000 U.I. en une seule dose ou 4 ampoules de D-CURE 25.000 U.I. par semaine. (100.000 U.I.).

**6. CONTRE INDICATION :**

**N'utilisez pas D-CURE FORTE :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE.
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
- si vous souffrez d'hypercalcicurié (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,  
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**2. COMPOSITION DU MÉDICAMENT :**

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

**Principe actif :** Cholécalciférol 100.000 U.I.

**Excipients :**

Acétate d'alpha-Tocophérol - Essence d'écorce d'orange douce - Oléate de Polyglycérol (E475) - Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

**3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :**

Vitamines.

**4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :**

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

**5. POSOLOGIE :**

**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

**Fréquence d'administration-durée du traitement :**

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

Le dosage doit être déterminé au cas par cas par le médecin traitant. S'il ne vous a pas été prescrit, il est recommandé de prendre une dose unique ou une dose cumulée de 100.000 UI sur 1 semaine.

Il est possible d'administrer 1 ampoule de D-CURE FORTE 100 000 U.I. en une seule dose ou 4 ampoules de D-CURE 25.000 U.I. par semaine. (100.000 U.I.).

**6. CONTRE INDICATION :**

**N'utilisez pas D-CURE FORTE :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE.
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
- si vous souffrez d'hypercalcicurié (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,  
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**2. COMPOSITION DU MÉDICAMENT :**

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

**Principe actif :** Cholécalciférol 100.000 U.I.

**Excipients :**

Acétate d'alpha-Tocophérol - Essence d'écorce d'orange douce - Oléate de Polyglycérol (E475) - Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

**3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :**

Vitamines.

**4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :**

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

**5. POSOLOGIE :**

**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

**Fréquence d'administration-durée du traitement :**

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

Le dosage doit être déterminé au cas par cas par le médecin traitant. S'il ne vous a pas été prescrit, il est recommandé de prendre une dose unique ou une dose cumulée de 100.000 UI sur 1 semaine.

Il est possible d'administrer 1 ampoule de D-CURE FORTE 100 000 U.I. en une seule dose ou 4 ampoules de D-CURE 25.000 U.I. par semaine. (100.000 U.I.).

**6. CONTRE INDICATION :**

**N'utilisez pas D-CURE FORTE :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE.
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
- si vous souffrez d'hypercalcicurié (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,  
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**2. COMPOSITION DU MÉDICAMENT :**

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

**Principe actif :** Cholécalciférol 100.000 U.I.

**Excipients :**

Acétate d'alpha-Tocophérol - Essence d'écorce d'orange douce - Oléate de Polyglycérol (E475) - Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

**3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :**

Vitamines.

**4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :**

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

**5. POSOLOGIE :**

**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

**Fréquence d'administration-durée du traitement :**

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

Le dosage doit être déterminé au cas par cas par le médecin traitant. S'il ne vous a pas été prescrit, il est recommandé de prendre une dose unique ou une dose cumulée de 100.000 UI sur 1 semaine.

Il est possible d'administrer 1 ampoule de D-CURE FORTE 100 000 U.I. en une seule dose ou 4 ampoules de D-CURE 25.000 U.I. par semaine. (100.000 U.I.).

**6. CONTRE INDICATION :**

**N'utilisez pas D-CURE FORTE :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE.
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
- si vous souffrez d'hypercalcicurié (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.

Montant total de la facture: 2595.12 DH

**Arrêtée la présente facture à la somme de: deux mille cinq cent quatre-vingt-quinze dirhams douze centimes.**

مختار بني خالد الحبيب المصيحة  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 060 2 503.40 - 0522.39.32.84/53  
0522.39.32.66

# LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khyam (En face du CAFC) - Beauséjour 20200 CASABLANCA  
Tel: 05 22 39 32 84/53 Fax: 05 22 39 33 65 Web: www.labobenjelloun.ma

## Dr Najib BENJELLOUN

-Médecin Biogiste-  
Ancien interne des Hôpitaux de Lyon


Mme JABIOUI MIMOUNA

Demande N°: 1909302043



FACTURE N°: 190901127

Date de la facture: 30-09-2019




## Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	B5	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
9005	Forfait de prise en charge pré-analytique du patient	B13	B
PS	Prélèvement Sanguin	E25	E
	Albumine	B60	B
0154	Ferritine	B250	B
0161	Thyroxine libre: T4 libre	B200	B
0163	TSH	B250	B
0165	Triiodothyronine libre :T3L	B300	B
0216	Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes)	B80	B
	Calcium (1er jour)	B30	B
	Chlore	B30	B
	Créatinine	B30	B
	Fer sérique	B60	B
0370	C R P (Protéine C réactive)	B100	B
0373	Transferrine	B150	B
	Potassium	B30	B
	Sodium	B30	B
	Protéines totales	B30	B
	Bicarbonates (Réserve Alcaline)	B40	B
	Coef. de saturation de la transferrine	B100	B
	Urée	B30	B

Total des B : 1918

مختبر بنجلون لتحليلات المرضى  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tel: 05 22 39 32 84/53

CNSS: 644 1 662 IF: 5110 2718 PATENTE: 3482 3087 ICE: 001636316 00 000 7 INP: 093001360



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour  
BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste  
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR MARJANE BENJELLOUN**

Date de l'examen: 30-09-2019

**Mme JABIOUT MIMOUNA**

Date de naissance: 01-01-1939

Dossier N° : 1909302043



### HEMATOCYTOLOGIE

#### NUMERATION FORMULE SANGUINE

(Automates PENTRA 80 XL (ABX) et SYSMEX KX21)

22-07-2019

<b>GLOBULES ROUGES (Erythrocytes)</b>		<u>3,61</u>	M/ $\mu$ l	(4,00-5,20)	3,27
Hémoglobine		<u>10,1</u>	g/dL	(12,5-15,5)	9,5
Hématocrite		<u>32,7</u>	%	(37,0-47,0)	29,1
VGM (Volume globulaire moyen)		<u>91,0</u>	fL	(80,0-97,0)	89,0
TCMH		<u>28,0</u>	pg	(27,0-32,0)	27,4
CCMH		<u>30,9</u>	g/dL	(32,0-36,0)	30,7
<b>GLOBULES BLANCS (Leucocytes)</b>		6 900/mm <sup>3</sup>			7500
1-Polynucléaires Neutrophiles	59,8%	Soit	4 126/mm <sup>3</sup>	(1 500-7 000)	3608
2-Polynucléaires Eosinophiles	3,3%	Soit	228/mm <sup>3</sup>	(80-400)	180
3-Polynucléaires Basophiles	0,9%	Soit	62/mm <sup>3</sup>	(0-100)	53
4-Lymphocytes	30,8%	Soit	2 125/mm <sup>3</sup>	(1 500-4 000)	3240
5-Monocytes	5,2%	Soit	359/mm <sup>3</sup>	(200-1 000)	420
<b>PLAQUETTES</b>		246 000/mm <sup>3</sup>		(150 000-450 000)	195000

CCMH= Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine

TCMH= Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine

Remarque: Chez la femme enceinte, une chute progressive de l'hémoglobine à 11-12 g/dl dès la 10ème Semaine d'Aménorrhée.


مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.402.401 / 0622.39.32.34/53  
Fax : 0622.39.32.45

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Bd. Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

Tel: 05 22 39 32 53 / 0622 39 32 34 DATENTE : 34823087 ICF : 001686316000007 INP : 93001360



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste  
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR MARJANE BENJELLOUN**

Date de l'examen: 30-09-2019

**Mme JABIOUT MIMOUNA**

Date de naissance: 01-01-1939

Dossier N° : 1909302043



### BIOCHIMIE SANGUINE COBAS C311 (ROCHE), KONELAB 20 (THERMO)

22-07-2019

**Hémoglobine glyquée (HbA1c)**

Technique chromatographie haute pression (Biorad D10)

5,90 %

(4,00-6,00)


6,10

#### Interprétation:

% HbA1c	contrôle du taux de Glucose
4-6	Intervalle non-diabétique
6,5-7	Excellent équilibre glycémique
8-9	Assez bon équilibre glycémique
9-10	Équilibre glycémique médiocre (Action corrective sugerée*)
> 10	Mauvais équilibre glycémique (Action corrective nécessaire*)

\* Risque élevé de développer des complications cardiovasculaires à long terme comme des retinopathies, néphropathies, neuropathies et cardiopathies.

Conclusion Bilan glycémique normal.




مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tel : 06 008 302 40 / 06 22 39 32 34 / 06  
Fax : 06 22 39 33 62

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Bd. Omar Al Khayam - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53 / 06 000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

© 2019 LABORATOIRE BENJELLOUN DATENTRE : 24823087 ICP : 001686316000007 INP : 93001360



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Mme JABIOUT MIMOUNA

Date de naissance: 01-01-1939

Dossier N° : 1909302043



Dr. Najib BENJELLOUN

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

DR MARJANE BENJELLOUN

Date de l'examen: 30-09-2019

### BILAN RENAL

22-07-2019

Urée

(Technique enzymatique à l'uréase UV)

0,65 g/L  
10,82 mmol/L

(0,16-0,48)  
(2,66-7,99)

0,73


Créatinine

(Technique cinétique selon la méthode de Jaffé.)

9,70 mg/L  
85,8 µmol/L

(5,00-9,00)  
(44,3-79,7)

10,60



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 05 22 39 32 53 / 05 22 39 32 84/85  
Fax : 05 22 39 33 46

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Bd. Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

CINSS . 6441662 TF . 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 001686316000007 INP : 93001360





# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Mme JABIoui MIMOUNA

Date de naissance: 01-01-1939

Dossier N° : 1909302043



**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR MARJANE BENJELLOUN**

Date de l'examen: 30-09-2019

### IONOGRAMME SANGUIN

			22-07-2019
<b>Sodium (Na)</b> (Electrode sélective d'ions )	136,0 136,00	mEq/L mmol/L	(136,0-145,0) (136,00-145,00)
<b>Potassium (K) (RC)</b> (Electrode sélective d'ions )	<u>5,42</u> <u>5,42</u>	mEq/L mmol/L	(3,50-5,10) (3,50-5,10)
Commentaire			Prélèvement réalisé avec garrot
<b>Chlore (Cl)</b> (Electrode sélective d'ions )	108,70 108,7	mEq/L mmol/L	(95,00-110,00) (95,0-110,0)
<b>Bicarbonates (Réserve Alcaline) (CO2)</b> (Dosage enzymatique (PEPC))	22,0	mmol/L	(22,0-29,0)
<b>Protéines totales</b> (Technique de Biuret)	67,10	g/L	(64,00-83,00)
<b>Calcium (Ca)</b> (Méthode NM-BAPTA.)	<u>73,30</u> <u>1,8</u>	mg/L mmol/L	(88,00-102,00) (2,2-2,6)
<b>Albumine</b> (Technique colorimétrique au vert bromocrésol)	36,8 533,6	g/L μmol/L	(35,0-52,0) (507,5-754,0)
<b>Fer sérique</b> (Dosage colorimétrique)	70,3 12,0	μg/100ml μmol/L	(33,0-193,0) (5,6-32,8)
<b>Transferrine</b> (Technique immunoturbidimétrique.)	2,09	g/L	(2,00-3,60)
<b>Capacité totale de fixation du fer (CTF)</b> (Technique immunoturbidimétrique)	159,40 28,53	μg/100mL μmol/l	(120,00-470,00) (21,48-84,13)
<b>Coefficient de saturation de la transferrine</b> (Formule de calcul CS = Fer Sérique/ CTF)	<u>44</u>	%	(20-40)
			25-07-2019
			201,90
			16
			25-07-2019
			1,95
			25-07-2019
			201,90
			25-07-2019
			16
			25-07-2019

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 0523 39 33 65 / 0523 39 32 53 / 0523 40 34 54 / 0523 39 33 66  
Fax : 0523 39 33 66

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Bd. Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 23 39 33 65

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

CNSS : 6441662 IF : 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 001686316000007 INP : 93001360




# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE



**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon

Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR MARJANE BENJELLOUN**

Date de l'examen: 30-09-2019

**Mme JABIOUI MIMOUNA**

Date de naissance: 01-01-1939

Dossier N° : 1909302043



**Protéine C-réactive (CRP)**

(Technique Immunoturbidimétrique)

0,4 mg/L

(<5,0)

23,1

### BIOCHIMIE SPECIALISEE

25-07-2019

**Ferritine**

(Electrochimiluminescence Cobas Roche)

100,80 ng/mL

(13,00-150,00)

74,66

### BILAN ENDOCRINIEN Cobas E411(ROCHE)-AIA 360(TOSOH)

22-07-2019

**Thyréostimuline ultrasensible (TSHus)**

(Electrochimiluminescence Cobas Roche)

0,266 µUI/mL

0,266 mU/l

(0,270-4,200)


(0,270-4,200)

0,134

La TSH est l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien.

Une variation minimale de la T4L provoque une réponse très amplifiée de la TSH.

Cependant, la TSH répond aux variations de la T4L avec un temps de latence important, au moins 8 semaines pour une réponse complète.



**Tri-iodothyronine libre (T3L)**

(Electrochimiluminescence Cobas Roche)

4,01 pmol/L

(3,10-6,80)

**Thyroxine libre (T4L)**

(Electrochimiluminescence Cobas Roche)

14,06 pmol/L

1,09 ng/dl

(12,00-22,00)

(0,93-1,71)

(RC) : Résultat contrôlé

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 05008.403.42 / 0622.33.30.34/53  
Fax : 0522.39.33.65

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50



109, Bd. Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax: 05 22 39 33 65

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

CNSS : 6441662 IF : 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 001686316000007 INP : 93001360