

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage - Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (csg) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-409108

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2538 Société : RAM
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : KACHANI MUSTAPHA
 Date de naissance : 01/01/1951
 Adresse : Cité Djennat JAMILA 5 Rue 187 N° 29 CASA04
 Tél : 06 67 02 88 96 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr BOUZOUBAA Mohamed
 Médecine Générale-Médecine du Travail
 97, Avenue Oued Eddahab Jamila 5
 C.D. CASABLANCA
 Tél.: 06 62 08 12 70
 Cachet du médecin :
 Date de consultation : 03/10/2019
 Nom et prénom du malade : ME KACHANI Mustapha Age :
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Diabète / HTA
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 03 OCT 2019 Le : 03 / 10 / 2019
 Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

ACCUEIL

ACCUEIL

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature attestant le Paiement
03/10/19	C		109,00	INP : 09103

INP : 09103

Dr BOUZOUBAË Mohamed
Médecine Générale-Médecine du Travail
97, Avenue Oued Eddahab Jamila 5
G.D. CASABLANCA
Tél : 06 62 08 12 70

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

Date

03/10/19

301, 20 DH

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du
Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des
Coefficients

Montant
des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature
du Particien

Date des
Soins

Nombre

AM

PC


IM

IV


Montant détaillé
des Honoraires

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F
PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE

H		G	
25533412	21433552		
00000000	00000000		
00000000	00000000		
35533411	11433553		

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel Thérapeutique, nécessaire à la profession.

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur BOUZOUBAA Mohammed
Médecine Générale Médecine du Travail
Expert Assermenté près les Tribunaux de Casablanca

الدكتور بوزوبع محمد
الطب العام طب الشغل
خبير محلف لدى المحاكم بالدار البيضاء

Casablanca le 03 - 10 - 2019 في الدار البيضاء

O R D O N N A N C E

M^r KACHANI Mustapha

4520

2. Glucophage 850



1 cp 2x / 1 hr

7870

2. Diamium 60



1 cp 1x le matin

5910 x3

3. Limlo 104

(868)



1 cp 1x le matin

T : 30120

Dr BOUZOUBAA Mohamed
Médecine Générale-Médecine du Travail
97, Avenue Oued Eddahab Jamila 5
C.D. CASABLANCA
Tél.: 06 62 05 12 70

PHARMACIE AL AHRAH
106, Bd. Mandad lala
H. El houda Cité Djemaa
Casa - Tél.: 05 21 51 00 98

97 شارع واد الذهب جميلة 5 قرية الجماعة السباتة الهاتف : 06 62 08 12 70
97, Avenue Oued Eddahab Jamila 5 Cité Djemaa Sbata Tel : 0662 081 270 Casablanca

بيملو[®]

أملوديين

مستعملي الآلات بسبب احتمال الإحساس بالدوار

التأثيرات الغير مرغوب فيها :

- التأثيرات الجانبية الأكثر حدوثا بسبب توسع الأوعية الدموية : صداع، إحمرار، إحساس بارتفاع حرارة الوجه
- تظهر هذه الأعراض عادة في بداية العلاج و تتراجع من بعد.
- مثل الأنواع الأخرى من الديهيدروبيردين يمكن ظهور تورم القدمين و أو الوجه تظهر هذه العلامات غالبا عند أخذ جرعات قوية .

نادرا تلاحظ : إرتفاع في نبضات القلب، خفقان، غيبوبة .

- تأثيرات جلدية: صلح، تعرق، حوادث جلدية، حكة، طفح جلدي، أودمة وعائية

- تأثيرات على الجهاز الهضمي: آلام في البطن، عسر الهضم ، خلل في الذوق، فقدان الشهية، غثيان، إسهال، إمساك ،

إحتفاف القدم

- تأثيرات على العضلات و الأعصاب: تشنج عضلي، ألم عضلي ألم مفصلي ،

- تأثيرات على الكبد: التهاب الكبد، يرقان، نادرا إرتفاع

- انزيمات الكبد(بعلاقة مع الركود الصفراوي) تتراجع حين التوقف عن العلاج

- تأثيرات على الجهاز التنفسي: ضيق التنفس

- تأثيرات على الجهاز البولي و التناسلي: كثرة التبول، عدم

- القدرة على الإنجاب، إنتفاخ الثدي عند الرجال.

- تأثيرات عصبية: عياء، إحساس بالدوخة، إضطراب النوم،

- تتمل إرتعاش، إضطراب الرؤية، إكتئاب و عصبية

- تأثيرات عامة: إحساس بعدم الارتياح .

- تأثيرات دموية: إنخفاض عدد الصفائح الدموية.

- تأثيرات وسامة : التهاب وعائي.

- مثل جميع متبطات الكالسيوم نادرا يمكن ظهور العلامات

- التالية : آلام الذبحة الصدرية ، إختناق عضل القلب، عدم

- إنتظام نبضات القلب .

المقادير:

حسب وصفة الطبيب المعالج.

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال

لا يستعمل هذا الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية الموجود

على العبلة

الشكل و التقديم:

بيملو 5 مغ : عبلة من 14 و 28 قرصا

بيملو 10 مغ : عبلة من 14 و 28 و 56 قرصا

التركيب:

بيملو 5 مغ :

أملوديين 5مغ

سواغ كمية كافية ل..... 1 قرص

بيملو 10مغ :

أملوديين 10مغ

سواغ كمية كافية ل..... 1 قرص

الخصائص:

مشبط إنتقائي لقنوات الكالسيوم مشتق من

الديهيدروبيردين .

دواعي الاستعمال :

- للوقاية من الذبحة الصدرية

- لعلاج إرتفاع ضغط الدم

موانع الاستعمال:

- حساسية مفرطة لديدهيدروبيردين

- المرأة الحامل أو المحتمل أن تكون حامل .

- المرأة المرضعة

- مع أدوية الدنتولين

تحذيرات وإحتياطات الإستعمال:

تحذيرات :

لا توجد أي دراسة لفعالية وقابلية الأملوديين عند الطفل

لذا لا ينصح باستعمال هذا الدواء بالنسبة للأطفال .

في حالة ظهور علامات كلينيكية (عياء، فقدان الشهية،

غثيان بصفة مستمرة) ينصح بإجراء تحاليل لأنزيمات الكبد

في حال إرتفاع أنزيمات الكبد أو ظهور يرقان يجب التوقف

عن العلاج.

- إحتياطات الإستعمال:

في حالة القصور الكبدي يجب أخذ الإحتياط عند هؤلاء

المرضى.

التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى:

لتجنب التفاعلات الدوائية يجب إخبار الطبيب أو

الصيدلاني إذا كنتم تأخذون أدوية أخرى و خصوصا إذا

كنتم تأخذون أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم .

السائقون و مستعملي الآلات:

يتمتع السائقون و مستعملي الآلات

Pimlo 10 mg.

Boîte de 28 comprimés



محرات الصيدلة فارما 5

بنة البروق - الدار البيضاء

LOT : 6094

UT. AV : 06-20

P.P.V : 59 DH 10

بيملو[®]

أملوديين

مستعملي الآلات بسبب احتمال الإحساس بالدوار

التأثيرات الغير مرغوب فيها :

- التأثيرات الجانبية الأكثر حدوثا بسبب توسع الأوعية الدموية : صداع، إحمرار، إحساس بارتفاع حرارة الوجه
- تظهر هذه الأعراض عادة في بداية العلاج و تتراجع من بعد.
- مثل الأنواع الأخرى من الديهيدروبيردين يمكن ظهور تورم القدمين و أو الوجه تظهر هذه العلامات غالبا عند أخذ جرعات قوية .

نادرا تلاحظ : إرتفاع في نبضات القلب، خفقان، غيبوبة .

- تأثيرات جلدية: صلح، تعرق، حوادث جلدية، حكة، طفح جلدي، أودمة وعائية

- تأثيرات على الجهاز الهضمي: آلام في البطن، عسر الهضم ، خلل في الذوق، فقدان الشهية، غثيان، إسهال، إمساك ،

إحتفاف القدم

- تأثيرات على العضلات و الأعصاب: تشنج عضلي، ألم عضلي ألم مفصلي ،

- تأثيرات على الكبد: التهاب الكبد، يرقان، نادرا إرتفاع

- انزيمات الكبد(بعلاقة مع الركود الصفراوي) تتراجع حين التوقف عن العلاج

- تأثيرات على الجهاز التنفسي: ضيق التنفس

- تأثيرات على الجهاز البولي و التناسلي: كثرة التبول، عدم

- القدرة على الإنجاب، إنتفاخ الثدي عند الرجال.

- تأثيرات عصبية: عياء، إحساس بالدوخة، إضطراب النوم،

- تتمل إرتعاش، إضطراب الرؤية، إكتئاب و عصبية

- تأثيرات عامة: إحساس بعدم الارتياح .

- تأثيرات دموية: إنخفاض عدد الصفائح الدموية.

- تأثيرات وسامة: التهاب وعائي.

- مثل جميع متبطات الكالسيوم نادرا يمكن ظهور العلامات

- التالية : آلام الذبحة الصدرية ، إختناق عضل القلب، عدم

- إنتظام نبضات القلب .

المقادير:

حسب وصفة الطبيب المعالج.

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال

لا يستعمل هذا الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية الموجود

على العبلة

الشكل و التقديم:

بيملو 5 مغ : عبلة من 14 و 28 قرصا

بيملو 10 مغ : عبلة من 14 و 28 و 56 قرصا

التركيب:

بيملو 5 مغ :

أملوديين 5مغ

سواغ كمية كافية ل..... 1 قرص

بيملو 10مغ :

أملوديين 10مغ

سواغ كمية كافية ل..... 1 قرص

الخصائص:

مشبط إنتقائي لقنوات الكالسيوم مشتق من

الديهيدروبيردين .

دواعي الاستعمال :

- للوقاية من الذبحة الصدرية

- لعلاج إرتفاع ضغط الدم

موانع الاستعمال:

- حساسية مفرطة لديدهيدروبيردين

- المرأة الحامل أو المحتمل أن تكون حامل .

- المرأة المرضعة

- مع أدوية الدنتولين

تحذيرات وإحتياطات الإستعمال:

تحذيرات :

لا توجد أي دراسة لفعالية وقابلية الأملوديين عند الطفل

لذا لا ينصح باستعمال هذا الدواء بالنسبة للأطفال .

في حالة ظهور علامات كلينيكية (عياء، فقدان الشهية،

غثيان بصفة مستمرة) ينصح بإجراء تحاليل لأنزيمات الكبد

في حال إرتفاع أنزيمات الكبد أو ظهور يرقان يجب التوقف

عن العلاج.

- إحتياطات الإستعمال:

في حالة القصور الكبدي يجب أخذ الإحتياط عند هؤلاء

المرضى.

التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى:

لتجنب التفاعلات الدوائية يجب إخبار الطبيب أو

الصيدلاني إذا كنتم تأخذون أدوية أخرى و خصوصا إذا

كنتم تأخذون أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم .

السائقون و مستعملي الآلات:

تتمتع المركبات

بالمركبات

Pimlo 10 mg.

Boîte de 28 comprimés



مدرات الصيدلة فارما 5

بناية البروق - الدار البيضاء

LOT : 6094

UT. AV : 06-20

P.P.V : 59 DH 10

بيملو[®]

أملوديين

مستعملي الآلات بسبب احتمال الإحساس بالدوار

التأثيرات الغير مرغوب فيها :

- التأثيرات الجانبية الأكثر حدوثا بسبب توسع الأوعية الدموية : صداع، إحمرار، إحساس بارتفاع حرارة الوجه
- تظهر هذه الأعراض عادة في بداية العلاج و تتراجع من بعد.
- مثل الأنواع الأخرى من الديهيدروبيردين يمكن ظهور تورم القدمين و أو الوجه تظهر هذه العلامات غالبا عند أخذ جرعات قوية .

نادرا تلاحظ : إرتفاع في نبضات القلب، خفقان، غيبوبة .

- تأثيرات جلدية: صلح، تعرق، حوادث جلدية، حكة، طفح جلدي، أودمة وعائية

- تأثيرات على الجهاز الهضمي: آلام في البطن، عسر الهضم ، خلل في الذوق، فقدان الشهية، غثيان، إسهال، إمساك ،

إحتفاف الفم

- تأثيرات على العضلات و الأعصاب: تشنج عضلي، ألم عضلي ألم مفصلي ،

- تأثيرات على الكبد: التهاب الكبد، يرقان، نادرا إرتفاع

انزيمات الكبد (بعلاقة مع الركود الصفراوي) تتراجع حين التوقف عن العلاج

- تأثيرات على الجهاز التنفسي: ضيق التنفس

- تأثيرات على الجهاز البولي و التناسلي: كثرة التبول، عدم القدرة على الإنجاب، إنتفاخ الثدي عند الرجال.

- تأثيرات عصبية: عياء، إحساس بالدوخة، إضطراب النوم،

تتمل إرتعاش، إضطراب الرؤية، إكتئاب و عصبية

- تأثيرات عامة: إحساس بعدم الارتياح .

- تأثيرات دموية: إنخفاض عدد الصفائح الدموية.

- تأثيرات وسامة: التهاب وعائي.

- مثل جميع متبطات الكالسيوم نادرا يمكن ظهور العلامات التالية : آلام الذبحة الصدرية ، إختناق عضل القلب، عدم إنتظام نبضات القلب .

المقادير:

حسب وصفة الطبيب المعالج.

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال

لا يستعمل هذا الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية الموجود

على العبلة

الشكل و التقديم:

بيملو 5 مغ : عبلة من 14 و 28 قرصا

بيملو 10 مغ : عبلة من 14 و 28 و 56 قرصا

التركيب:

بيملو 5 مغ :

أملوديين 5مغ

سواغ كمية كافية ل..... 1 قرص

بيملو 10مغ :

أملوديين 10مغ

سواغ كمية كافية ل..... 1 قرص

الخصائص:

مشبط إنتقائي لقنوات الكالسيوم مشتق من

الديهيدروبيردين .

دواعي الاستعمال :

- للوقاية من الذبحة الصدرية

- لعلاج إرتفاع ضغط الدم

موانع الاستعمال:

- حساسية مفرطة لديدهيدروبيردين

- المرأة الحامل أو المحتمل أن تكون حامل .

- المرأة المرضعة

- مع أدوية الدنتولين

تحذيرات وإحتياطات الإستعمال:

تحذيرات :

لا توجد أي دراسة لفعالية وقابلية الأملوديين عند الطفل

لذا لا ينصح باستعمال هذا الدواء بالنسبة للأطفال .

في حالة ظهور علامات كلينيكية (عياء، فقدان الشهية،

غثيان بصفة مستمرة) ينصح بإجراء تحاليل لأنزيمات الكبد

في حال إرتفاع أنزيمات الكبد أو ظهور يرقان يجب التوقف

عن العلاج.

- إحتياطات الإستعمال:

في حالة القصور الكبدي يجب أخذ الإحتياط عند هؤلاء

المرضى.

التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى:

لتجنب التفاعلات الدوائية يجب إخبار الطبيب أو

الصيدلاني إذا كنتم تأخذون أدوية أخرى و خصوصا إذا

كنتم تأخذون أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم .

السائقون و مستعملي الآلات:

تتمتع المركبات و

Pimlo 10 mg.

Boîte de 28 comprimés



مخبرات الصيدلة فارما 5
مخبرات البروق - الدار البيضاء

LOT : 6094
UT. AV : 06-20
P.P.V : 59 DH 10

