

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **Informations générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **Pharmacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **Biologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **Optique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **Education :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **Dentaire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## **Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



## **Déclaration de Maladie**

N° P19- 0043752

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### **Cadre réservé à l'adhérent (e)**

Matricule : 972 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Naïma Nazih Zahra

Date de naissance :

Aïn Chock, Rabat, Khairia, Rue 29

Adresse :

n° 23

Tél. :

Total des frais engagés : \_\_\_\_\_ Dhs

### **Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :



Date de consultation : 01/10/2019

Nom et prénom du malade : NAZIH ZAHRA Bouiba Age: \_\_\_\_\_

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

AFFECTION CANALAIRES

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA

Le : 01/10/2019

Signature de l'adhérent(e) :

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01 10 2019			3000 H	<i>Dr. Y. BOUZOUKIAN Neurochirurgien - Etablissement Anould 18, Rue Léonard de Vinci Casablanca - Tel: 05 22 86 28 22</i>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>P.H.U.Y. Dr. Y. BOUZOUKIAN Richard Hicham Docteur en Médecine 125 Bis Av les Platanes Casablanca - Tel: 05 22 86 28 22</i>	01.10.19	4199,00

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>P.H.U.Y. Dr. Y. BOUZOUKIAN Richard Hicham Docteur en Médecine 125 Bis Av les Platanes Casablanca - Tel: 05 22 86 28 22</i>			

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX	
					
				MONTANTS DES SOINS	
				DEBUT D'EXECUTION	
				J	
				FIN D'EXECUTION	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412 00000000 35533411	G	21433552 00000000 11433553	
D	00000000	B	00000000		MONTANTS DES SOINS
					DATE DU DEVIS
					DATE DE L'EXECUTION

B

Y

**Dr. Youssef BOUZOUBAA**

Neurochirurgien (Adulte - Enfant)


Spécialiste des Maladies du Système Nerveux  
et de la Colonne Vertébrale

Neurochirurgie à Crâne fermé : STEREOTAXIE  
Electroencephalographie

Ex. Enseignant du C.H.U. Averroés  
Expert Assermenté près des Tribunaux

12, Rue Zakieddine Attaoussi - Casablanca

Sur Rendez-vous



**الدكتور يوسف بوزوبع**

إختصاصي في مراقبة أمراض  
الدماغ والأعصاب والعمود الفقري  
اللبار والأطفال

التقطيط الهربائي للدماغ

مدرس سابق بالمستشفى الجامعي ابن رشد  
فيبر مخلف لدى المعالم

12، زنقة زكي الدين الطاوي - الدار البيضاء


بالبيضاء

Casablanca, le .. 01.10.2019 ..... الدار البيضاء في

$$24,40 \times 3 = 73,20$$

6,80 - LEVOTHYROX 125

1-0-0



$$\underline{118,50} \times 2 = \underline{237}$$

ixor

1-0-0



$$\underline{113,30} \times 3 = \underline{339,90}$$

- Depakine CHRONO 500

1-0-0



$$\underline{349,50} \times 3 = \underline{2792}$$

- LOVENOX 0,4 mg

1-0-1



$$\underline{24,60} \times 5 = \underline{123}$$

- Potassium

1-1-1



$$\underline{34,60} \times 4 = \underline{138,40}$$

- LaziLix


1-0-1



$$\underline{35,70} \times 2 = \underline{71,40}$$

- KARDECIC 160 mg


0-1-0



$$\underline{53,00} \times 4 = \underline{212,00}$$

- DAKTARIN

3 fois par Jour.



89,70 Fait à l'urgence collection clinique ANOUAL - Tel: 0522 86 02 07 / 08 / 09 / 10 - Fax : 0522 86 02 11

**Dr. Y. BOUZOUBAA**  
Neurochirurgien - Expert Assermenté  
18, Rue Léon ou Maâdi - Casablanca - Tel: 0522 86 28 22

14, Rue Zakieddine Attaoussi (derrière Lycée Charles de Foucauld) à côté du Bd. Anoual (Ex Félix Faure) - Casablanca

E-mail : anoual-bouz@hotmail.com - Site Web : www.clinique-anoual.com

215,60

Y199,00

# NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

## LEVOthyrox®

Levothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ces informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### **1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?**

#### Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est une hormone thyroïdienne.

#### Indications thérapeutiques

Il est préconisé dans les situations suivantes :

L'association de Lévothyrox à des antithyroïdiens dans le traitement de l'hyperthyroïdie n'est pas indiquée au cours de la grossesse. En effet, Lévothyrox passe très peu la barrière placentaire, alors que les antithyroïdiens passent facilement celle-ci. Il en résulterait un risque d'hypothyroïdie chez le fœtus.

L'allaitement est possible pendant le traitement.

L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie sont susceptibles d'altérer la fertilité. Le traitement d'une hypothyroïdie par Lévothyrox doit donc être adapté sur la base d'une surveillance biologique car un sous-dosage est susceptible de ne pas améliorer l'hypothyroïdie et un surdosage peut entraîner une hyperthyroïdie.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines Sans objet.

### **3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?**

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement



# NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

## LEVOthyrox®

Levothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ces informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### **1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?**

#### Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est une hormone thyroïdienne.

#### Indications thérapeutiques

Il est préconisé dans les situations suivantes :

L'association de Lévothyrox à des antithyroïdiens dans le traitement de l'hyperthyroïdie n'est pas indiquée au cours de la grossesse. En effet, Lévothyrox passe très peu la barrière placentaire, alors que les antithyroïdiens passent facilement celle-ci. Il en résulterait un risque d'hypothyroïdie chez le fœtus.

L'allaitement est possible pendant le traitement.

L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie sont susceptibles d'altérer la fertilité. Le traitement d'une hypothyroïdie par Lévothyrox doit donc être adapté sur la base d'une surveillance biologique car un sous-dosage est susceptible de ne pas améliorer l'hypothyroïdie et un surdosage peut entraîner une hyperthyroïdie.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines Sans objet.

### **3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?**

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement



# NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

## LEVOthyrox®

Levothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ces informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### **1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?**

#### Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est une hormone thyroïdienne.

#### Indications thérapeutiques

Il est préconisé dans les situations suivantes :

L'association de Lévothyrox à des antithyroïdiens dans le traitement de l'hyperthyroïdie n'est pas indiquée au cours de la grossesse. En effet, Lévothyrox passe très peu la barrière placentaire, alors que les antithyroïdiens passent facilement celle-ci. Il en résulterait un risque d'hypothyroïdie chez le fœtus.

L'allaitement est possible pendant le traitement.

L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie sont susceptibles d'altérer la fertilité. Le traitement d'une hypothyroïdie par Lévothyrox doit donc être adapté sur la base d'une surveillance biologique car un sous-dosage est susceptible de ne pas améliorer l'hypothyroïdie et un surdosage peut entraîner une hyperthyroïdie.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines Sans objet.

### **3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?**

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement



# NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

MERCK

## LEVOTHYROX® comprimé sécable

### Lévothyroxine sodium

Veuillez lire attentivement les informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin lorsque vous consulterez votre médecin ou votre pharmacien.
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser des questions à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.



endre ce médicament car elle contient des informations

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

L'association de Lévothyrox à des antithyroïdiens dans le traitement de l'hyperthyroïdie n'est pas indiquée au cours de la grossesse. En effet, Lévothyrox passe très peu la barrière placentaire, alors que les antithyroïdiens passent facilement celle-ci. Il en résulterait un risque d'hypothyroïdie chez le fœtus.

L'allaitement est possible pendant le traitement.

L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie sont susceptibles d'altérer la fertilité. Le traitement d'une hypothyroïdie par Lévothyrox doit donc être adapté sur la base d'une surveillance biologique car un sous-dosage est susceptible de ne pas améliorer l'hypothyroïdie et un surdosage peut entraîner une hyperthyroïdie.

### Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

### 3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

#### Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est une hormone thyroïdienne.

#### Indications thérapeutiques

Il est préconisé dans les situations suivantes :

# Cordarone® 200 mg

Chlorhydrate d'amiodarone



Comprimé sécable

SANOFI

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.**

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### ANTIARYTHMIQUE CLASSE III

Ce médicament est indiqué dans la prévention et le traitement de certains troubles du rythme cardiaque.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a déjà dit que vous présentiez une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais CORDARONE 200 mg, comprimé**

#### sécable :

- Si vous êtes allergique à l'iode.
- Si vous êtes allergique l'amiodarone (la substance active) ou à l'un des autres composants contenus dans Cordarone. Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.
- Si vous souffrez d'hyperthyroïdie (maladie de la glande thyroïde).
- Si vous présentez certains troubles du rythme et/ou de la conduction cardiaque.
  - Si votre rythme cardiaque est trop lent.
  - Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois.
  - Si vous allaitez.
  - Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec Cordarone n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe « Prise d'autres médicaments »).

#### Faites attention avec COR

mg, comprimé

8930

l'avis de votre

ent ne sont pas

cardiaque  
jaque

in son bon  
ses après le  
ute modification



#### Pendant le traitement :

##### Prévenez votre médecin :

- Si votre rythme cardiaque est à nouveau trop rapide ou anormalement lent,
- Si vous vous sentez anormalement essoufflé,
- Si vous avez des difficultés à respirer,
- Si vous présentez une toux sèche, isolée ou associée à une altération de votre état de santé,
- Si vous avez de la fièvre, ou êtes fatigué, de façon inexpliquée, ou prolongée,
- Si vous avez la diarrhée,

# TORVA®

## Atorvastatine

### FORMES ET PRÉSENTATION:

TORVA 10, comprimés enrobés dosés à 10 mg, boîtes de 15 et de 30.

TORVA 20, comprimés enrobés dosés à 20 mg, boîtes de 15 et de 30.

### COMPOSITION:

- TORVA 10  
Atorvastatine (sous  
Excipients q.s.p .....
- TORVA 20  
Atorvastatine (sous  
Excipients q.s.p .....

LOT : 1083  
PER : 07/21  
PPV : 57,80 DH

**TORVA 10 10 mg**

30 Comprimés Enrobés



6 118000 140702

..... 10 mg  
..... 1 cp

..... 20 mg  
..... 1 cp

cardiovasculaire).

### CLASSE PHARMACO-1

Hypocholestérolémiant e

### INDICATIONS :

Ce médicament est prescrit pour les hypercholestérolémies lorsque les activités physiques, la perte de poids et le régime alimentaire n'ont pas suffisamment abaissé le taux de cholestérol dans le sang.  
Il est préconisé également dans certaines formes d'hypercholestérolémies familiales lorsqu'un régime alimentaire s'est avéré insuffisant.  
L'utilisation de ce médicament doit être accompagnée avec un régime alimentaire assidu.

### CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants,
- Maladies du foie,
- Femme enceinte ou qui allait (cf. Grossesse/Allaitement).
- En cas d'association avec, Itraconazole, kétoconazole, antiprotéases (cf Interactions).
- Sauf avis contraire de votre médecin : en cas d'association avec les fibrates (cf Interactions).

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

#### *Mises en garde :*

Dans le traitement des hypercholestérolémies, respecter scrupuleusement le régime prescrit par votre médecin,

Un bilan hépatique doit être effectué avant et pendant le traitement.

En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin,

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

#### *Précautions d'emploi :*

Prévenez votre médecin en cas de :

Consommation d'alcool,

Antécédents hépatiques,

Désir de grossesse ou d'allaitement.

En cas de grossesse ou d'allaitement.

# TORVA®

## Atorvastatine

### FORMES ET PRÉSENTATION:

TORVA 10, comprimés enrobés dosés à 10 mg, boîtes de 15 et de 30.

TORVA 20, comprimés enrobés dosés à 20 mg, boîtes de 15 et de 30.

### COMPOSITION:

- TORVA 10  
Atorvastatine (sous  
Excipients q.s.p .....
- TORVA 20  
Atorvastatine (sous  
Excipients q.s.p .....

LOT : 1083  
PER : 07/21  
PPV : 57,80 DH

**TORVA 10 10 mg**

30 Comprimés Enrobés



6 118000 140702

..... 10 mg

1 cp

..... 20 mg

1 cp

cardiovasculaire).

### CLASSE PHARMACO-1

Hypocholestérolémiant e

### INDICATIONS :

Ce médicament est prescrit pour les hypercholestérolémies lorsque les activités physiques, la perte de poids et le régime alimentaire n'ont pas suffisamment abaissé le taux de cholestérol dans le sang.  
Il est préconisé également dans certaines formes d'hypercholestérolémies familiales lorsqu'un régime alimentaire s'est avéré insuffisant.  
L'utilisation de ce médicament doit être accompagnée avec un régime alimentaire assidu.

### CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants,
- Maladies du foie,
- Femme enceinte ou qui allait (cf. Grossesse/Allaitement).
- En cas d'association avec, Itraconazole, kétoconazole, antiprotéases (cf Interactions).
- Sauf avis contraire de votre médecin : en cas d'association avec les fibrates (cf Interactions).

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

#### *Mises en garde :*

Dans le traitement des hypercholestérolémies, respecter scrupuleusement le régime prescrit par votre médecin,

Un bilan hépatique doit être effectué avant et pendant le traitement.

En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin,

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

#### *Précautions d'emploi :*

Prévenez votre médecin en cas de :

Consommation d'alcool,

Antécédents hépatiques,

Désir de grossesse ou d'allaitement.

En cas de grossesse ou d'allaitement.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATION

**Daktarin® 2 %, gel buccal**  
Miconazole

Veuillez lire attentivement de prendre cette notice des informations.

Gardez cette notice pour la relire.

Si vous avez acheté votre médicament à ce magasin prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur entraîner de leur maladie si elles ont une maladie similaire.

Si vous ressentez un effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Cela peut être un effet indésirable que vous n'avez pas dans cette notice. Veuillez lire la notice.

**Daktarin® 2 %  
gel buccal**

Maphar  
Km 13, Route Côtière 111,  
Ql Zenata Ain seba Casablanca  
Daktarin gel buccal t40g  
P.P.V : 53,00 DH

6 118001 180745

**Que contient cette notice ?**

- Qu'est-ce que DAKTARIN 2 %, gel buccal et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le gel buccal ?

**Enfants âgés de plus de 2 ans**

3. Utilisez le dispositif de mesure fourni avec le tube pour mesurer la dose prescrite. Remplissez le dispositif de mesure jusqu'à la graduation 2,5 ml (trait supérieur).



Le gel ne doit pas être administré directement dans la bouche avec le dispositif de mesure.



- Prélevez une petite portion du gel dans le dispositif de mesure à l'aide de votre doigt propre.

Appliquez le gel sur les lésions à traiter avec le bout du doigt conformément aux conseils de votre médecin.

ou dans la bouche aussi

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATION

**Daktarin® 2 %, gel buccal**  
Miconazole

Veuillez lire attentivement de prendre cette notice des informations.

Gardez cette notice pour la relire.

Si vous avez acheté votre médicament à ce magasin prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur entraîner de leur maladie si elles ont

Si vous ressentez un effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Cela peut être un effet indésirable que dans cette notice. Veuillez lire la notice.



## Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que DAKTARIN 2 %, gel buccal et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le gel buccal ?

## Enfants âgés de plus de 2 ans

3. Utilisez le dispositif de mesure fourni avec le tube pour mesurer la dose prescrite. Remplissez le dispositif de mesure jusqu'à la graduation 2,5 ml (trait supérieur).



Le gel ne doit pas être administré directement dans la bouche avec le dispositif de mesure.



- Prélevez une petite portion du gel dans le dispositif de mesure à l'aide de votre doigt propre.

Appliquez le gel sur les lésions à traiter avec le bout du doigt conformément aux conseils de votre médecin.

La bouche aussi

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATION

**Daktarin® 2 %, gel buccal**  
Miconazole

Veuillez lire attentivement de prendre cette notice des informations.

Gardez cette notice pour la relire.

Si vous avez acheté votre médicament à ce magasin prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur entraîner de leur maladie si elles ont

Si vous ressentez un effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Cela peut être un effet indésirable que dans cette notice. Veuillez lire la notice.



## Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que DAKTARIN 2 %, gel buccal et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le gel buccal ?

## Enfants âgés de plus de 2 ans

3. Utilisez le dispositif de mesure fourni avec le tube pour mesurer la dose prescrite. Remplissez le dispositif de mesure jusqu'à la graduation 2,5 ml (trait supérieur).



Le gel ne doit pas être administré directement dans la bouche avec le dispositif de mesure.



- Prélevez une petite portion du gel dans le dispositif de mesure à l'aide de votre doigt propre.

Appliquez le gel sur les lésions à traiter avec le bout du doigt conformément aux conseils de votre médecin.

La bouche aussi

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATION

**Daktarin® 2 %, gel buccal**  
Miconazole

Veuillez lire attentivement de prendre cette notice des informations.

Gardez cette notice pour la relire.

Si vous avez acheté votre médicament à ce magasin prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur entraîner de leur maladie si elles ont

Si vous ressentez un effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Cela peut être un effet indésirable que dans cette notice. Veuillez lire la notice.



## Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que DAKTARIN 2 %, gel buccal et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le gel buccal ?

## Enfants âgés de plus de 2 ans

3. Utilisez le dispositif de mesure fourni avec le tube pour mesurer la dose prescrite. Remplissez le dispositif de mesure jusqu'à la graduation 2,5 ml (trait supérieur).



Le gel ne doit pas être administré directement dans la bouche avec le dispositif de mesure.



- Prélevez une petite portion du gel dans le dispositif de mesure à l'aide de votre doigt propre.

Appliquez le gel sur les lésions à traiter avec le bout du doigt conformément aux conseils de votre médecin.

La bouche aussi

## Lovenox® 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie

## Lovenox® 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie énoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement médicament.

- Gardez cette notice, vous p
- Si vous avez toute autre d'informations à votre mè
- Ce médicament vous a été quelqu'un d'autre, même être nocif.
- Si l'un des effets indésirab indésirable non mentionné votre pharmacien.

quel/

m

Sanofi Aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Lovenox 4000unitixia inj b6  
P.P.V : 349,00 DH



6 118001 080465

7 P

18

2021

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Lovenox et dans
- Quelles sont les informations
- Comment utiliser Lovenox
- Quels sont les effets indésirables
- Comment conserver Lovenox
- Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE LOVENOX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

#### ANTI-THROMBOTIQUES.

Ce médicament est un anticoagulant de la famille des héparines dites de « bas poids moléculaire ». Il prévient la formation d'une thrombose (*caillot dans une veine ou une artère*) et évite la récidive.

Une héparine de bas poids moléculaire peut être prescrite :

- en traitement préventif, pour éviter une thrombose,
- en traitement curatif, dans le cas d'une thrombose déjà existante.

Ce médicament est utilisé dans certains cas en chirurgie (pour LOVENOX 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml et 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml) ou en médecine (pour LOVENOX 4000 UI Anti-

Prévention des thromboses des veines chez les patients alités pour une affection médicale aiguë (pour LOVENOX 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml uniquement) :

Dans le cas d'une infection aiguë ou d'une maladie rhumatologique aiguë, le traitement n'est justifié que si l'un des critères suivants est présent : âge > 75 ans, tumeur, antécédents de maladie veineuse, obésité, un traitement par les hormones, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique.

Ce médicament n'est habituellement pas recommandé chez l'enfant.

lisation de ce médicament dans la prévention des accidents thrombo-emboliques n'est pas recommandée chez les patients, notamment les femmes enceintes, porteurs de prothèses valvulaires cardiaques mécaniques.

**PAS INJECTER PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE.** Les modalités d'injection doivent être précisément respectées.

#### Précautions d'emploi

me avec tous les anticoagulants, des saignements peuvent se produire. En cas de saignements, l'origine de cette hémorragie devra être recherchée, et un traitement adéquat devra être mis en place.

certains cas, notamment lors d'un traitement curatif, il peut exister un risque de saignement :

r les patients âgés, r les patients de moins de 65 ans de poids inférieur à 40 kg,

ris d'insuffisance rénale,

ris de traitement prolongé au-delà de la durée habituelle de 10 jours,

ris d'association à certains médicaments (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »),

en cas d'association à des médicaments majorant le risque hémorragique (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

Ces situations peuvent nécessiter une surveillance particulière : examens médicaux et prises de sang éventuelles.

Une anesthésie péridurale, une rachianesthésie ou une ponction lombaire n'est pas contre-indiquée en cas de traitement préventif par ce médicament. Cependant, certaines précautions devront être respectées : délai entre l'injection et l'anesthésie, surveillance particulière. Malgré ces précautions, la survenue d'un hématome au niveau de la colonne vertébrale est toujours possible.

Si vous avez ou si vous avez eu une maladie hépatique ou rénale, un ulcère ou une autre lésion susceptible de saigner, prévenez votre médecin.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

En raison de la survenue possible de saignement, prévenez systématiquement votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de l'aspirine,

## Lovenox® 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie

## Lovenox® 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie énoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement médicament.

- Gardez cette notice, vous p
- Si vous avez toute autre d'informations à votre mè
- Ce médicament vous a été quelqu'un d'autre, même être nocif.
- Si l'un des effets indésirab indésirable non mentionné votre pharmacien.

quel/

m

Sanofi Aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Lovenox 4000unitixia inj b6  
P.P.V : 349,00 DH



6 118001 080465

7 P

18

2021

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Lovenox et dans
- Quelles sont les informations
- Comment utiliser Lovenox
- Quels sont les effets indésirables
- Comment conserver Lovenox
- Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE LOVENOX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

#### ANTI-THROMBOTIQUES.

Ce médicament est un anticoagulant de la famille des héparines dites de « bas poids moléculaire ». Il prévient la formation d'une thrombose (*caillot dans une veine ou une artère*) et évite la récidive.

Une héparine de bas poids moléculaire peut être prescrite :

- en traitement préventif, pour éviter une thrombose,
- en traitement curatif, dans le cas d'une thrombose déjà existante.

Ce médicament est utilisé dans certains cas en chirurgie (pour LOVENOX 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml et 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml) ou en médecine (pour LOVENOX 4000 UI Anti-

Prévention des thromboses des veines chez les patients alités pour une affection médicale aiguë (pour LOVENOX 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml uniquement) :

Dans le cas d'une infection aiguë ou d'une maladie rhumatologique aiguë, le traitement n'est justifié que si l'un des critères suivants est présent : âge > 75 ans, tumeur, antécédents de maladie veineuse, obésité, un traitement par les hormones, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique.

Ce médicament n'est habituellement pas recommandé chez l'enfant.

lisation de ce médicament dans la prévention des accidents thrombo-emboliques n'est pas recommandée chez les patients, notamment les femmes enceintes, porteurs de prothèses valvulaires cardiaques mécaniques.

**PAS INJECTER PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE.** Les modalités d'injection doivent être précisément respectées.

#### Précautions d'emploi

me avec tous les anticoagulants, des saignements peuvent se produire. En cas de saignements, l'origine de cette hémorragie devra être recherchée, et un traitement adéquat devra être mis en place.

certains cas, notamment lors d'un traitement curatif, il peut exister un risque de saignement :

r les patients âgés, r les patients de moins de 65 ans de poids inférieur à 40 kg,

ris d'insuffisance rénale,

ris de traitement prolongé au-delà de la durée habituelle de 10 jours,

ris d'association à certains médicaments (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »),

en cas d'association à des médicaments majorant le risque hémorragique (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

Ces situations peuvent nécessiter une surveillance particulière : examens médicaux et prises de sang éventuelles.

Une anesthésie péridurale, une rachianesthésie ou une ponction lombaire n'est pas contre-indiquée en cas de traitement préventif par ce médicament. Cependant, certaines précautions devront être respectées : délai entre l'injection et l'anesthésie, surveillance particulière. Malgré ces précautions, la survenue d'un hématome au niveau de la colonne vertébrale est toujours possible.

Si vous avez ou si vous avez eu une maladie hépatique ou rénale, un ulcère ou une autre lésion susceptible de saigner, prévenez votre médecin.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

En raison de la survenue possible de saignement, prévenez systématiquement votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de l'aspirine,

## Lovenox® 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie

## Lovenox® 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie énoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement médicament.

- Gardez cette notice, vous p
- Si vous avez toute autre d'informations à votre mè
- Ce médicament vous a été quelqu'un d'autre, même être nocif.
- Si l'un des effets indésirab indésirable non mentionné votre pharmacien.

quel/

m

Sanofi Aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Lovenox 4000unitixia inj b6  
P.P.V : 349,00 DH



6 118001 080465

7 P

18

2021

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Lovenox et dans
- Quelles sont les informations
- Comment utiliser Lovenox
- Quels sont les effets indésirables
- Comment conserver Lovenox
- Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE LOVENOX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

#### ANTI-THROMBOTIQUES.

Ce médicament est un anticoagulant de la famille des héparines dites de « bas poids moléculaire ». Il prévient la formation d'une thrombose (*caillot dans une veine ou une artère*) et évite la récidive.

Une héparine de bas poids moléculaire peut être prescrite :

- en traitement préventif, pour éviter une thrombose,
- en traitement curatif, dans le cas d'une thrombose déjà existante.

Ce médicament est utilisé dans certains cas en chirurgie (pour LOVENOX 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml et 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml) ou en médecine (pour LOVENOX 4000 UI Anti-

Prévention des thromboses des veines chez les patients alités pour une affection médicale aiguë (pour LOVENOX 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml uniquement) :

Dans le cas d'une infection aiguë ou d'une maladie rhumatologique aiguë, le traitement n'est justifié que si l'un des critères suivants est présent : âge > 75 ans, tumeur, antécédents de maladie veineuse, obésité, un traitement par les hormones, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique.

Ce médicament n'est habituellement pas recommandé chez l'enfant.

lisation de ce médicament dans la prévention des accidents thrombo-emboliques n'est pas recommandée chez les patients, notamment les femmes enceintes, porteurs de prothèses valvulaires cardiaques mécaniques.

**PAS INJECTER PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE.** Les modalités d'injection doivent être précisément respectées.

#### Précautions d'emploi

me avec tous les anticoagulants, des saignements peuvent se produire. En cas de saignements, l'origine de cette hémorragie devra être recherchée, et un traitement adéquat devra être mis en place.

certains cas, notamment lors d'un traitement curatif, il peut exister un risque de saignement :

r les patients âgés, r les patients de moins de 65 ans de poids inférieur à 40 kg,

ris d'insuffisance rénale,

ris de traitement prolongé au-delà de la durée habituelle de 10 jours,

ris d'association à certains médicaments (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »),

en cas d'association à des médicaments majorant le risque hémorragique (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

Ces situations peuvent nécessiter une surveillance particulière : examens médicaux et prises de sang éventuelles.

Une anesthésie péridurale, une rachianesthésie ou une ponction lombaire n'est pas contre-indiquée en cas de traitement préventif par ce médicament. Cependant, certaines précautions devront être respectées : délai entre l'injection et l'anesthésie, surveillance particulière. Malgré ces précautions, la survenue d'un hématome au niveau de la colonne vertébrale est toujours possible.

Si vous avez ou si vous avez eu une maladie hépatique ou rénale, un ulcère ou une autre lésion susceptible de saigner, prévenez votre médecin.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

En raison de la survenue possible de saignement, prévenez systématiquement votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de l'aspirine,

## Lovenox® 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie

## Lovenox® 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie énoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement médicament.

- Gardez cette notice, vous p
- Si vous avez toute autre d'informations à votre mè
- Ce médicament vous a été quelqu'un d'autre, même être nocif.
- Si l'un des effets indésirab indésirable non mentionné votre pharmacien.

quel/

m

Sanofi Aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Lovenox 4000unitixia inj b6  
P.P.V : 349,00 DH



6 118001 080465

7 P

18

2021

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Lovenox et dans
- Quelles sont les informations
- Comment utiliser Lovenox
- Quels sont les effets indésirables
- Comment conserver Lovenox
- Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE LOVENOX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

#### ANTI-THROMBOTIQUES.

Ce médicament est un anticoagulant de la famille des héparines dites de « bas poids moléculaire ». Il prévient la formation d'une thrombose (*caillot dans une veine ou une artère*) et évite la récidive.

Une héparine de bas poids moléculaire peut être prescrite :

- en traitement préventif, pour éviter une thrombose,
- en traitement curatif, dans le cas d'une thrombose déjà existante.

Ce médicament est utilisé dans certains cas en chirurgie (pour LOVENOX 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml et 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml) ou en médecine (pour LOVENOX 4000 UI Anti-

Prévention des thromboses des veines chez les patients alités pour une affection médicale aiguë (pour LOVENOX 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml uniquement) :

Dans le cas d'une infection aiguë ou d'une maladie rhumatologique aiguë, le traitement n'est justifié que si l'un des critères suivants est présent : âge > 75 ans, tumeur, antécédents de maladie veineuse, obésité, un traitement par les hormones, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique.

Ce médicament n'est habituellement pas recommandé chez l'enfant.

lisation de ce médicament dans la prévention des accidents thrombo-emboliques n'est pas recommandée chez les patients, notamment les femmes enceintes, porteurs de prothèses valvulaires cardiaques mécaniques.

**PAS INJECTER PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE.** Les modalités d'injection doivent être précisément respectées.

#### Précautions d'emploi

me avec tous les anticoagulants, des saignements peuvent se produire. En cas de saignements, l'origine de cette hémorragie devra être recherchée, et un traitement adéquat devra être mis en place.

certains cas, notamment lors d'un traitement curatif, il peut exister un risque de saignement :

r les patients âgés, r les patients de moins de 65 ans de poids inférieur à 40 kg,

ris d'insuffisance rénale,

ris de traitement prolongé au-delà de la durée habituelle de 10 jours,

ris d'association à certains médicaments (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »),

en cas d'association à des médicaments majorant le risque hémorragique (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

Ces situations peuvent nécessiter une surveillance particulière : examens médicaux et prises de sang éventuelles.

Une anesthésie péridurale, une rachianesthésie ou une ponction lombaire n'est pas contre-indiquée en cas de traitement préventif par ce médicament. Cependant, certaines précautions devront être respectées : délai entre l'injection et l'anesthésie, surveillance particulière. Malgré ces précautions, la survenue d'un hématome au niveau de la colonne vertébrale est toujours possible.

Si vous avez ou si vous avez eu une maladie hépatique ou rénale, un ulcère ou une autre lésion susceptible de saigner, prévenez votre médecin.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

En raison de la survenue possible de saignement, prévenez systématiquement votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de l'aspirine,

## Lovenox® 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie

## Lovenox® 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie énoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement médicament.

- Gardez cette notice, vous p
- Si vous avez toute autre d'informations à votre mè
- Ce médicament vous a été quelqu'un d'autre, même être nocif.
- Si l'un des effets indésirab indésirable non mentionné votre pharmacien.

quel/

m

Sanofi Aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Lovenox 4000unitixia inj b6  
P.P.V : 349,00 DH



6 118001 080465

7 P

18

2021

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Lovenox et dans
- Quelles sont les informations
- Comment utiliser Lovenox
- Quels sont les effets indésirables
- Comment conserver Lovenox
- Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE LOVENOX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

#### ANTI-THROMBOTIQUES.

Ce médicament est un anticoagulant de la famille des héparines dites de « bas poids moléculaire ». Il prévient la formation d'une thrombose (*caillot dans une veine ou une artère*) et évite la récidive.

Une héparine de bas poids moléculaire peut être prescrite :

- en traitement préventif, pour éviter une thrombose,
- en traitement curatif, dans le cas d'une thrombose déjà existante.

Ce médicament est utilisé dans certains cas en chirurgie (pour LOVENOX 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml et 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml) ou en médecine (pour LOVENOX 4000 UI Anti-

Prévention des thromboses des veines chez les patients alités pour une affection médicale aiguë (pour LOVENOX 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml uniquement) :

Dans le cas d'une infection aiguë ou d'une maladie rhumatologique aiguë, le traitement n'est justifié que si l'un des critères suivants est présent : âge > 75 ans, tumeur, antécédents de maladie veineuse, obésité, un traitement par les hormones, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique.

Ce médicament n'est habituellement pas recommandé chez l'enfant.

lisation de ce médicament dans la prévention des accidents thrombo-emboliques n'est pas recommandée chez les patients, notamment les femmes enceintes, porteurs de prothèses valvulaires cardiaques mécaniques.

**PAS INJECTER PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE.** Les modalités d'injection doivent être précisément respectées.

#### Précautions d'emploi

me avec tous les anticoagulants, des saignements peuvent se produire. En cas de saignements, l'origine de cette hémorragie devra être recherchée, et un traitement adéquat devra être mis en place.

certains cas, notamment lors d'un traitement curatif, il peut exister un risque de saignement :

r les patients âgés, r les patients de moins de 65 ans de poids inférieur à 40 kg,

ris d'insuffisance rénale,

ris de traitement prolongé au-delà de la durée habituelle de 10 jours,

ris d'association à certains médicaments (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »),

en cas d'association à des médicaments majorant le risque hémorragique (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

Ces situations peuvent nécessiter une surveillance particulière : examens médicaux et prises de sang éventuelles.

Une anesthésie péridurale, une rachianesthésie ou une ponction lombaire n'est pas contre-indiquée en cas de traitement préventif par ce médicament. Cependant, certaines précautions devront être respectées : délai entre l'injection et l'anesthésie, surveillance particulière. Malgré ces précautions, la survenue d'un hématome au niveau de la colonne vertébrale est toujours possible.

Si vous avez ou si vous avez eu une maladie hépatique ou rénale, un ulcère ou une autre lésion susceptible de saigner, prévenez votre médecin.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

En raison de la survenue possible de saignement, prévenez systématiquement votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de l'aspirine,

## Lovenox® 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie

## Lovenox® 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie énoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement médicament.

- Gardez cette notice, vous p
- Si vous avez toute autre d'informations à votre mè
- Ce médicament vous a été quelqu'un d'autre, même être nocif.
- Si l'un des effets indésirab indésirable non mentionné votre pharmacien.

quel/

m

Sanofi Aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Lovenox 4000unitixia inj b6  
P.P.V : 349,00 DH



6 118001 080465

7 P

18

2021

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Lovenox et dans
- Quelles sont les informations
- Comment utiliser Lovenox
- Quels sont les effets indésirables
- Comment conserver Lovenox
- Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE LOVENOX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

#### ANTI-THROMBOTIQUES.

Ce médicament est un anticoagulant de la famille des héparines dites de « bas poids moléculaire ». Il prévient la formation d'une thrombose (*caillot dans une veine ou une artère*) et évite la récidive.

Une héparine de bas poids moléculaire peut être prescrite :

- en traitement préventif, pour éviter une thrombose,
- en traitement curatif, dans le cas d'une thrombose déjà existante.

Ce médicament est utilisé dans certains cas en chirurgie (pour LOVENOX 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml et 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml) ou en médecine (pour LOVENOX 4000 UI Anti-

Prévention des thromboses des veines chez les patients alités pour une affection médicale aiguë (pour LOVENOX 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml uniquement) :

Dans le cas d'une infection aiguë ou d'une maladie rhumatologique aiguë, le traitement n'est justifié que si l'un des critères suivants est présent : âge > 75 ans, tumeur, antécédents de maladie veineuse, obésité, un traitement par les hormones, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique.

Ce médicament n'est habituellement pas recommandé chez l'enfant.

lisation de ce médicament dans la prévention des accidents thrombo-emboliques n'est pas recommandée chez les patients, notamment les femmes enceintes, porteurs de prothèses valvulaires cardiaques mécaniques.

**PAS INJECTER PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE.** Les modalités d'injection doivent être précisément respectées.

#### Précautions d'emploi

me avec tous les anticoagulants, des saignements peuvent se produire. En cas de saignements, l'origine de cette hémorragie devra être recherchée, et un traitement adéquat devra être mis en place.

certains cas, notamment lors d'un traitement curatif, il peut exister un risque de saignement :

r les patients âgés, r les patients de moins de 65 ans de poids inférieur à 40 kg,

ris d'insuffisance rénale,

ris de traitement prolongé au-delà de la durée habituelle de 10 jours,

ris d'association à certains médicaments (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »),

en cas d'association à des médicaments majorant le risque hémorragique (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

Ces situations peuvent nécessiter une surveillance particulière : examens médicaux et prises de sang éventuelles.

Une anesthésie péridurale, une rachianesthésie ou une ponction lombaire n'est pas contre-indiquée en cas de traitement préventif par ce médicament. Cependant, certaines précautions devront être respectées : délai entre l'injection et l'anesthésie, surveillance particulière. Malgré ces précautions, la survenue d'un hématome au niveau de la colonne vertébrale est toujours possible.

Si vous avez ou si vous avez eu une maladie hépatique ou rénale, un ulcère ou une autre lésion susceptible de saigner, prévenez votre médecin.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

En raison de la survenue possible de saignement, prévenez systématiquement votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de l'aspirine,

## Lovenox® 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie

## Lovenox® 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie énoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement médicament.

- Gardez cette notice, vous p
- Si vous avez toute autre d'informations à votre mè
- Ce médicament vous a été quelqu'un d'autre, même être nocif.
- Si l'un des effets indésirab indésirable non mentionné votre pharmacien.

quel/

m

Sanofi Aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Lovenox 4000unitixia inj b6  
P.P.V : 349,00 DH



6 118001 080465

7 P

18

2021

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Lovenox et dans
- Quelles sont les informations
- Comment utiliser Lovenox
- Quels sont les effets indésirables
- Comment conserver Lovenox
- Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE LOVENOX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

#### ANTI-THROMBOTIQUES.

Ce médicament est un anticoagulant de la famille des héparines dites de « bas poids moléculaire ». Il prévient la formation d'une thrombose (*caillot dans une veine ou une artère*) et évite la récidive.

Une héparine de bas poids moléculaire peut être prescrite :

- en traitement préventif, pour éviter une thrombose,
- en traitement curatif, dans le cas d'une thrombose déjà existante.

Ce médicament est utilisé dans certains cas en chirurgie (pour LOVENOX 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml et 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml) ou en médecine (pour LOVENOX 4000 UI Anti-

Prévention des thromboses des veines chez les patients alités pour une affection médicale aiguë (pour LOVENOX 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml uniquement) :

Dans le cas d'une infection aiguë ou d'une maladie rhumatologique aiguë, le traitement n'est justifié que si l'un des critères suivants est présent : âge > 75 ans, tumeur, antécédents de maladie veineuse, obésité, un traitement par les hormones, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique.

Ce médicament n'est habituellement pas recommandé chez l'enfant.

lisation de ce médicament dans la prévention des accidents thrombo-emboliques n'est pas recommandée chez les patients, notamment les femmes enceintes, porteurs de prothèses valvulaires cardiaques mécaniques.

**PAS INJECTER PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE.** Les modalités d'injection doivent être précisément respectées.

#### Précautions d'emploi

me avec tous les anticoagulants, des saignements peuvent se produire. En cas de saignements, l'origine de cette hémorragie devra être recherchée, et un traitement adéquat devra être mis en place.

certains cas, notamment lors d'un traitement curatif, il peut exister un risque de saignement :

r les patients âgés, r les patients de moins de 65 ans de poids inférieur à 40 kg,

ris d'insuffisance rénale,

ris de traitement prolongé au-delà de la durée habituelle de 10 jours,

ris d'association à certains médicaments (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »),

en cas d'association à des médicaments majorant le risque hémorragique (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

Ces situations peuvent nécessiter une surveillance particulière : examens médicaux et prises de sang éventuelles.

Une anesthésie péridurale, une rachianesthésie ou une ponction lombaire n'est pas contre-indiquée en cas de traitement préventif par ce médicament. Cependant, certaines précautions devront être respectées : délai entre l'injection et l'anesthésie, surveillance particulière. Malgré ces précautions, la survenue d'un hématome au niveau de la colonne vertébrale est toujours possible.

Si vous avez ou si vous avez eu une maladie hépatique ou rénale, un ulcère ou une autre lésion susceptible de saigner, prévenez votre médecin.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

En raison de la survenue possible de saignement, prévenez systématiquement votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de l'aspirine,

## Lovenox® 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie

## Lovenox® 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie énoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement médicament.

- Gardez cette notice, vous p
- Si vous avez toute autre d'informations à votre mè
- Ce médicament vous a été quelqu'un d'autre, même être nocif.
- Si l'un des effets indésirab indésirable non mentionné votre pharmacien.

quel/

m

Sanofi Aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Lovenox 4000unitixia inj b6  
P.P.V : 349,00 DH



6 118001 080465

7 P

18

2021

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Lovenox et dans
- Quelles sont les informations
- Comment utiliser Lovenox
- Quels sont les effets indésirables
- Comment conserver Lovenox
- Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE LOVENOX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

#### ANTI-THROMBOTIQUES.

Ce médicament est un anticoagulant de la famille des héparines dites de « bas poids moléculaire ». Il prévient la formation d'une thrombose (*caillot dans une veine ou une artère*) et évite la récidive.

Une héparine de bas poids moléculaire peut être prescrite :

- en traitement préventif, pour éviter une thrombose,
- en traitement curatif, dans le cas d'une thrombose déjà existante.

Ce médicament est utilisé dans certains cas en chirurgie (pour LOVENOX 2000 UI Anti-Xa/0,2 ml et 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml) ou en médecine (pour LOVENOX 4000 UI Anti-

Prévention des thromboses des veines chez les patients alités pour une affection médicale aiguë (pour LOVENOX 4000 UI Anti-Xa/0,4 ml uniquement) :

Dans le cas d'une infection aiguë ou d'une maladie rhumatologique aiguë, le traitement n'est justifié que si l'un des critères suivants est présent : âge > 75 ans, tumeur, antécédents de maladie veineuse, obésité, un traitement par les hormones, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique.

Ce médicament n'est habituellement pas recommandé chez l'enfant.

lisation de ce médicament dans la prévention des accidents thrombo-emboliques n'est pas recommandée chez les patients, notamment les femmes enceintes, porteurs de prothèses valvulaires cardiaques mécaniques.

**PAS INJECTER PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE.** Les modalités d'injection doivent être précisément respectées.

#### Précautions d'emploi

me avec tous les anticoagulants, des saignements peuvent se produire. En cas de saignements, l'origine de cette hémorragie devra être recherchée, et un traitement adéquat devra être mis en place.

certains cas, notamment lors d'un traitement curatif, il peut exister un risque de saignement :

r les patients âgés, r les patients de moins de 65 ans de poids inférieur à 40 kg,

ris d'insuffisance rénale,

ris de traitement prolongé au-delà de la durée habituelle de 10 jours,

ris d'association à certains médicaments (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »),

en cas d'association à des médicaments majorant le risque hémorragique (voir « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

Ces situations peuvent nécessiter une surveillance particulière : examens médicaux et prises de sang éventuelles.

Une anesthésie péridurale, une rachianesthésie ou une ponction lombaire n'est pas contre-indiquée en cas de traitement préventif par ce médicament. Cependant, certaines précautions devront être respectées : délai entre l'injection et l'anesthésie, surveillance particulière. Malgré ces précautions, la survenue d'un hématome au niveau de la colonne vertébrale est toujours possible.

Si vous avez ou si vous avez eu une maladie hépatique ou rénale, un ulcère ou une autre lésion susceptible de saigner, prévenez votre médecin.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

En raison de la survenue possible de saignement, prévenez systématiquement votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de l'aspirine,

# IXOR® (Oméprazole)

## FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

- Comprimés effervescents dosés à 20 mg en boîte de 7, 14 et 28
- Comprimés effervescents dosés à 10 mg en boîte de 7, 14 et 28

## COMPOSITION QUALITATIVE

Comprimé effervescent à 20 mg

Oméprazole

Excipient : aspartame

Comprimé effervescent à 10 mg

Oméprazole

Excipient : glucose

## CLASSE PHARMACOLOGIQUE

Inhibiteur de l'acide

## DANS QUEL CAS

Adultes :

- Ulcère duodénal
- Ulcère gastrique
- Eradication de l'Helicobacter pylori
- Gastro-duodénal
- Traitement d'ulcères duodénaux H. pylori négatifs ou si l'éradication n'a pas été possible
- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien
- Oesophagite érosive par reflux gastro-œsophagien
- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien
- Syndrome de Zollinger-Ellison
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les AINS
- Prévention des lésions gastroduodénales lors des traitements par AINS chez les patients à risque pour lesquels le traitement anti-inflammatoire est indispensable.

Enfant à partir de 1 an :

Oesophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-œsophagien

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'ulcère gastrique, il est recommandé de vérifier la bénignité de la lésion avant traitement.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Kétoconazole, Itraconazole : diminution de l'absorption de l'azolé antifongique par augmentation du pH intragastrique par l'Oméprazole.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

- Grossesse : l'utilisation de l'oméprazole ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

- Allaitement : en raison du passage de l'oméprazole dans le lait maternel, l'allaitement est à éviter.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

## LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

- Aspartam

- Sodium : en cas de régime désodé ou hyposodé, tenir compte de la teneur en sodium :

• IXOR® 20 mg : environ 765,73 mg de sodium par comprimé effervescent

• IXOR® 10 mg : environ 768,61 mg de sodium par comprimé effervescent

## POSÉOLOGIE USUELLE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Adulte :

### 1 - Posologie :

- Eradication de l'Helicobacter pylori : 1 comprimé effervescent à 20 mg matin et soir associé à une bithérapie antibiotique pendant 7 jours. Cette trithérapie sera suivie par 1 comprimé effervescent à 20 mg/j pendant 3 semaines supplémentaires en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 3 à 5 semaines supplémentaires en cas d'ulcère gastrique évolutif.

- Ulcère duodénal évolutif : 1 comprimé effervescent à 20 mg/jour pendant 4 semaines.

- Ulcère gastrique évolutif : 1 comprimé effervescent à 20 mg/jour pendant 4 à 6 semaines.



# IXOR® (Oméprazole)

## FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

- Comprimés effervescents dosés à 20 mg en boîte de 7, 14 et 28
- Comprimés effervescents dosés à 10 mg en boîte de 7, 14 et 28

## COMPOSITION QUALITATIVE

Comprimé effervescent à 20 mg

Oméprazole

Excipient : aspartame

Comprimé effervescent à 10 mg

Oméprazole

Excipient : glucose

## CLASSE PHARMACOLOGIQUE

Inhibiteur de l'acide

## DANS QUEL CAS

Adultes :

- Ulcère duodénal
- Ulcère gastrique
- Eradication de l'Helicobacter pylori
- Gastro-duodénal
- Traitement d'ulcères duodénaux H. pylori négatifs ou si l'éradication n'a pas été possible
- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien
- Oesophagite érosive par reflux gastro-œsophagien
- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien
- Syndrome de Zollinger-Ellison
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les AINS
- Prévention des lésions gastroduodénales lors des traitements par AINS chez les patients à risque pour lesquels le traitement anti-inflammatoire est indispensable.

Enfant à partir de 1 an :

Oesophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-œsophagien

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'ulcère gastrique, il est recommandé de vérifier la bénignité de la lésion avant traitement.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Kétoconazole, Itraconazole : diminution de l'absorption de l'azolé antifongique par augmentation du pH intragastrique par l'Oméprazole.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

- Grossesse : l'utilisation de l'oméprazole ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

- Allaitement : en raison du passage de l'oméprazole dans le lait maternel, l'allaitement est à éviter.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

## LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

- Aspartam

- Sodium : en cas de régime désodé ou hyposodé, tenir compte de la teneur en sodium :

• IXOR® 20 mg : environ 765,73 mg de sodium par comprimé effervescent

• IXOR® 10 mg : environ 768,61 mg de sodium par comprimé effervescent

## POSÉOLOGIE USUELLE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Adulte :

### 1 - Posologie :

- Eradication de l'Helicobacter pylori : 1 comprimé effervescent à 20 mg matin et soir associé à une bithérapie antibiotique pendant 7 jours. Cette trithérapie sera suivie par 1 comprimé effervescent à 20 mg/j pendant 3 semaines supplémentaires en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 3 à 5 semaines supplémentaires en cas d'ulcère gastrique évolutif.

- Ulcère duodénal évolutif : 1 comprimé effervescent à 20 mg/jour pendant 4 semaines.

- Ulcère gastrique évolutif : 1 comprimé effervescent à 20 mg/jour pendant 4 à 6 semaines.



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# DEPAKINE CHRONO® 500 mg

comprimé pelliculé sécable à libération prolongée

acide valproate de sodium

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observerez. Voir en fin de notice comment déclarer les effets secondaires.

SANOFI

MISE EN GARDE

Les enfants exposés *in utero* aux valproates

graves du développement (un  
40 % des cas) et/ou de malformations

Si vous êtes une fille, une ado  
enceinte, votre médecin spécialiste  
d'inéfficacité ou d'intolérance

Si vous êtes une femme en âge de procréer pendant votre traitement. Si vous prenez votre traitement sans en avoir parlé, si cela est possible.

Votre médecin discutera de cela avec vous.

Contactez immédiatement votre médecin si vous pouvez l'être.

Veuillez lire attentivement cette notice pour connaître les informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourrez y faire référence.
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé. Il pourra leur être donné à vos enfants.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Dépakine Chrono et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dépakine Chrono
3. Comment prendre Dépakine Chrono
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Dépakine Chrono
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKINE CHRONO ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Dépakine Chrono appartient à une famille de médicaments appelés antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement des différentes formes d'épilepsie chez l'adulte et l'enfant âgé de plus de 6 ans et pesant plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DEPAKINE CHRONO

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakine Chrono :

## Autres médicaments et Dépakine Chrono

Vous ne devez jamais prendre ce médicament si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de la méfloquine (médicament pour traiter le paludisme),
- du millepertuis (médicament à base de plante servant à traiter la dépression).

Vous devez prévenir votre médecin si vous prenez de la lamotrigine (autre médicament utilisé pour traiter des crises d'épilepsie) et des pénems (antibiotiques pour traiter les infections bactériennes).

Chez l'enfant spécifiquement de moins de 3 ans, vous devez éviter de donner des médicaments contenant de l'aspirine au cours du traitement.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

## Dépakine Chrono avec de l'alcool

La prise de boissons alcoolisées est déconseillée pendant la durée du traitement par Dépakine Chrono.

## Grossesse

### Conseil important à l'attention des femmes

Si vous êtes une femme en âge de procréer, votre médecin ne pourra vous prescrire le valproate qu'en cas d'échec des autres traitements. Le valproate est dangereux pour l'enfant à naître s'il est pris pendant la grossesse.

Le valproate expose à un risque s'il est pris pendant la grossesse. Plus la dose est élevée, plus les risques sont importants ; toutefois, toutes les doses exposent à ce risque.

**Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent des risques élevés de malformations graves et de troubles du développement (intellectuel et moteur) et du comportement.** Les malformations rapportées incluent le *spina bifida* (malformation osseuse de la colonne vertébrale), des malformations de la face, de la tête supérieure et des paupières, du crâne, du cœur, des reins, des voies urinaires et des organes génitaux ainsi que des membres.

Si vous prenez du valproate pendant la grossesse, vous avez un risque plus élevé que les autres femmes d'avoir un enfant atteint de malformations nécessitant un traitement médical. Le valproate étant utilisé depuis de nombreuses années, il est établi que près de 10 % des enfants nés de mères sous valproate présentent des malformations, contre 2 à 3 % des enfants dans la population générale.

On estime que jusqu'à 30 à 40 % des enfants d'âge préscolaire dont les mères ont pris du valproate pendant la grossesse présentent des problèmes de développement dans leur petite enfance. Les enfants concernés marchent plus tardivement et/ou parlent plus tardivement, et/ou ont des capacités intellectuelles plus faibles que les autres enfants et/ou ont des difficultés de langage et/ou de mémoire.

**Les troubles du spectre autistique sont plus souvent diagnostiqués chez les enfants exposés au valproate.**

Des données limitées à ce jour indiquent que les enfants sont plus susceptibles de développer les symptômes du trouble de déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH).

Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin spécialiste devra vous avoir expliqué les risques possibles pour votre enfant en cas de grossesse pendant la prise de valproate. Si par la suite vous envisagez une grossesse, vous ne devez pas interrompre votre traitement sans en avoir parlé avec votre médecin et convenu d'un autre traitement si cela est possible.

Si vous essayez d'avoir un enfant, interrogez votre médecin spécialiste sur la prise d'acide folique. Une supplémentation en acide folique avant la grossesse pourrait diminuer le risque d'anomalies de fermeture du tube neural et de fausse couche précoce inhérent à toute grossesse. Cependant, la prévention par l'acide folique des malformations liées au valproate n'est pas prouvée à ce jour.

## PREMIÈRE PRÉSCRIPTION

Si l'efficacité de votre première prescription de valproate, votre médecin spécialiste devra vous

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# DEPAKINE CHRONO® 500 mg

comprimé pelliculé sécable à libération prolongée

acide valproate de sodium

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observerez. Voir en fin de notice comment déclarer les effets secondaires.

SANOFI

MISE EN GARDE

Les enfants exposés *in utero* aux valproates

graves du développement (un  
40 % des cas) et/ou de malformations

Si vous êtes une fille, une ado  
enceinte, votre médecin spécialiste  
d'inéfficacité ou d'intolérance

Si vous êtes une femme en âge de procréer pendant votre traitement. Si vous prenez votre traitement sans en avoir parlé, si cela est possible.

Votre médecin discutera de cela avec vous.

Contactez immédiatement votre médecin si vous pouvez l'être.

Veuillez lire attentivement cette notice pour connaître les informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourrez y faire référence.
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé. Il pourra leur être donné à vos enfants.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Dépakine Chrono et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dépakine Chrono
3. Comment prendre Dépakine Chrono
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Dépakine Chrono
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKINE CHRONO ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Dépakine Chrono appartient à une famille de médicaments appelés antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement des différentes formes d'épilepsie chez l'adulte et l'enfant âgé de plus de 6 ans et pesant plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DEPAKINE CHRONO

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakine Chrono :

## Autres médicaments et Dépakine Chrono

Vous ne devez jamais prendre ce médicament si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de la méfloquine (médicament pour traiter le paludisme),
- du millepertuis (médicament à base de plante servant à traiter la dépression).

Vous devez prévenir votre médecin si vous prenez de la lamotrigine (autre médicament utilisé pour traiter des crises d'épilepsie) et des pénems (antibiotiques pour traiter les infections bactériennes).

Chez l'enfant spécifiquement de moins de 3 ans, vous devez éviter de donner des médicaments contenant de l'aspirine au cours du traitement.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

## Dépakine Chrono avec de l'alcool

La prise de boissons alcoolisées est déconseillée pendant la durée du traitement par Dépakine Chrono.

## Grossesse

### Conseil important à l'attention des femmes

Si vous êtes une femme en âge de procréer, votre médecin ne pourra vous prescrire le valproate qu'en cas d'échec des autres traitements. Le valproate est dangereux pour l'enfant à naître s'il est pris pendant la grossesse.

Le valproate expose à un risque s'il est pris pendant la grossesse. Plus la dose est élevée, plus les risques sont importants ; toutefois, toutes les doses exposent à ce risque.

**Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent des risques élevés de malformations graves et de troubles du développement (intellectuel et moteur) et du comportement.** Les malformations rapportées incluent le *spina bifida* (malformation osseuse de la colonne vertébrale), des malformations de la face, de la tête supérieure et des paupières, du crâne, du cœur, des reins, des voies urinaires et des organes génitaux ainsi que des membres.

Si vous prenez du valproate pendant la grossesse, vous avez un risque plus élevé que les autres femmes d'avoir un enfant atteint de malformations nécessitant un traitement médical. Le valproate étant utilisé depuis de nombreuses années, il est établi que près de 10 % des enfants nés de mères sous valproate présentent des malformations, contre 2 à 3 % des enfants dans la population générale.

On estime que jusqu'à 30 à 40 % des enfants d'âge préscolaire dont les mères ont pris du valproate pendant la grossesse présentent des problèmes de développement dans leur petite enfance. Les enfants concernés marchent plus tardivement et/ou parlent plus tardivement, et/ou ont des capacités intellectuelles plus faibles que les autres enfants et/ou ont des difficultés de langage et/ou de mémoire.

**Les troubles du spectre autistique sont plus souvent diagnostiqués chez les enfants exposés au valproate.**

Des données limitées à ce jour indiquent que les enfants sont plus susceptibles de développer les symptômes du trouble de déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH).

Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin spécialiste devra vous avoir expliqué les risques possibles pour votre enfant en cas de grossesse pendant la prise de valproate. Si par la suite vous envisagez une grossesse, vous ne devez pas interrompre votre traitement sans en avoir parlé avec votre médecin et convenu d'un autre traitement si cela est possible.

Si vous essayez d'avoir un enfant, interrogez votre médecin spécialiste sur la prise d'acide folique. Une supplémentation en acide folique avant la grossesse pourrait diminuer le risque d'anomalies de fermeture du tube neural et de fausse couche précoce inhérent à toute grossesse. Cependant, la prévention par l'acide folique des malformations liées au valproate n'est pas prouvée à ce jour.

## PREMIÈRE PRÉSCRIPTION

Si l'efficacité de votre première prescription de valproate, votre médecin spécialiste devra vous

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# DEPAKINE CHRONO® 500 mg

comprimé pelliculé sécable à libération prolongée

acide valproate de sodium

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observerez. Voir en fin de notice comment déclarer les effets secondaires.

SANOFI

MISE EN GARDE

Les enfants exposés *in utero* aux valproates

graves du développement (un sur 40 % des cas) et/ou de malformations

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme enceinte, votre médecin spécialiste d'inéfficacité ou d'intolérance

Si vous êtes une femme en âge de procréer pendant votre traitement. Si vous prenez ce traitement sans en avoir parlé avec votre médecin, il est possible.

Votre médecin discutera de cela avec vous.

Contactez immédiatement votre médecin si vous pouvez l'être.

Veuillez lire attentivement cette notice pour connaître les informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourrez y faire référence.
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé. Il pourra leur être donné à vos enfants.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Dépakine Chrono et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dépakine Chrono
3. Comment prendre Dépakine Chrono
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Dépakine Chrono
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKINE CHRONO ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Dépakine Chrono appartient à une famille de médicaments appelés antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement des différentes formes d'épilepsie chez l'adulte et l'enfant âgé de plus de 6 ans et pesant plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DEPAKINE CHRONO

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakine Chrono :

Autres médicaments et Dépakine Chrono

Vous ne devez jamais prendre ce médicament si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- de la melfloquine (médicament pour traiter le paludisme),
- du millepertuis (médicament à base de plante servant à traiter la dépression).

Vous devez prévenir votre médecin si vous prenez de la lamotrigine (autre médicament utilisé pour traiter des crises d'épilepsie) et des pénems (antibiotiques pour traiter les infections bactériennes).

Chez l'enfant spécifiquement de moins de 3 ans, vous devez éviter de donner des médicaments contenant de l'aspirine au cours du traitement.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

## Dépakine Chrono avec de l'alcool

La prise de boissons alcoolisées est déconseillée pendant la durée du traitement par Dépakine Chrono.

## Grossesse

### Conseil important à l'attention des femmes

Si vous êtes une femme en âge de procréer, votre médecin ne pourra vous prescrire le valproate qu'en cas d'échec des autres traitements. Le valproate est dangereux pour l'enfant à naître s'il est pris pendant la grossesse.

Le valproate expose à un risque s'il est pris pendant la grossesse. Plus la dose est élevée, plus les risques sont importants ; toutefois, toutes les doses exposent à ce risque.

**Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent des risques élevés de malformations graves et de troubles du développement (intellectuel et moteur) et du comportement.** Les malformations rapportées incluent le *spina bifida* (malformation osseuse de la colonne vertébrale), des malformations de la face, de la tête supérieure et des paupières, du crâne, du cœur, des reins, des voies urinaires et des organes génitaux ainsi que des membres.

Si vous prenez du valproate pendant la grossesse, vous avez un risque plus élevé que les autres femmes d'avoir un enfant atteint de malformations nécessitant un traitement médical. Le valproate étant utilisé depuis de nombreuses années, il est établi que près de 10 % des enfants nés de mères sous valproate présentent des malformations, contre 2 à 3 % des enfants dans la population générale.

On estime que jusqu'à 30 à 40 % des enfants d'âge préscolaire dont les mères ont pris du valproate pendant la grossesse présentent des problèmes de développement dans leur petite enfance. Les enfants concernés marchent plus tardivement et/ou parlent plus tardivement, et/ou ont des capacités intellectuelles plus faibles que les autres enfants et/ou ont des difficultés de langage et/ou de mémoire.

**Les troubles du spectre autistique sont plus souvent diagnostiqués chez les enfants exposés au valproate.**

Des données limitées à ce jour indiquent que les enfants sont plus susceptibles de développer les symptômes du trouble de déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH). Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin spécialiste devra vous avoir expliqué les risques possibles pour votre enfant en cas de grossesse pendant la prise de valproate. Si par la suite vous envisagez une grossesse, vous ne devez pas interrompre votre traitement sans en avoir parlé avec votre médecin et convenu d'un autre traitement si cela est possible.

Si vous essayez d'avoir un enfant, interrogez votre médecin spécialiste sur la prise d'acide folique. Une supplémentation en acide folique avant la grossesse pourrait diminuer le risque d'anomalies de fermeture du tube neural et de fausse couche précoce inhérent à toute grossesse. Cependant, la prévention par l'acide folique des malformations liées au valproate n'est pas prouvée à ce jour.

## PREMIÈRE PRÉSCRIPTION

Si l'efficacité de votre première prescription de valproate, votre médecin spécialiste devra vous

# KARDEGIC® 160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine  
poudre pour solution buvable en sachet-dose

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) DENOMINATION

KARDEGIC 160

### b) COMPOSITION

ACETYL SALICYLATE

correspondante e

Excipients : Glycoco

d'ammonium.

### c) FORME PHARMACEUTIQUE

Poudre pour solution buvable; sachet-dose ; boîte de 30.

### d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI-THROMBOTIQUE/INHIBITEURS DE L'AGREGATION

PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

## 3. ATTENTION

### a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

#### (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires (éruption cutanée ou asthme), • En cas de maladie rénale, • En cas de traitement concomitant ou par les anticoagulants oraux (lorsque prescrite à des doses >3g/j), • En dehors

d'utilisation extrêmement limitées, et qui justifient une spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est PROHIBÉ à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. aitement).

CE MEDICAMENT NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé sauf re de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou gynécologiques anormaux, - traitement

s anticoagulants oraux (notamment lorsque ite à faibles doses) ou par l'héparine, les autres anti-inflammatoires (notamment prescrite à des doses > 3g/j) (cf. rubrique medicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

### b) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet.

L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

### c) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

#### INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou un traitement par l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3g/j).

# KARDEGIC® 160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine  
poudre pour solution buvable en sachet-dose

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) DENOMINATION

KARDEGIC 160

### b) COMPOSITION

ACETYL SALICYLATE

correspondante e

Excipients : Glycoco

d'ammonium.

### c) FORME PHARMACEUTIQUE

Poudre pour solution buvable; sachet-dose ; boîte de 30.

### d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI-THROMBOTIQUE/INHIBITEURS DE L'AGREGATION

PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

## 3. ATTENTION

### a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

#### (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires (éruption cutanée ou asthme), • En cas de maladie rénale, • En cas de traitement concomitant ou par les anticoagulants oraux (lorsque prescrite à des doses >3g/j), • En dehors

d'utilisation extrêmement limitées, et qui justifient une spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est PROHIBÉ à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. aitement).

CE MEDICAMENT NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé sauf re de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou gynécologiques anormaux, - traitement

s anticoagulants oraux (notamment lorsque ite à faibles doses) ou par l'héparine, les autres anti-inflammatoires (notamment prescrite à des doses > 3g/j) (cf. rubrique medicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

### b) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet.

L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

### c) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

#### INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou un traitement par l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3g/j).



# LasiliX® 40 mg

# LasiliX® 20 mg/2 ml

Furosémide

SANOFI

## Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.  
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire à nouveau.

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### Composition

#### LASILI 40 mg comprimés :

Furosémide

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale,

#### LASILI 20 mg/2 ml :

Furosémide

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium

1 comprimé.

2/2 ml.

P.E.R. : 101  
01/07/2022  
2202 90

LasiliX 40mg  
20 Cp séc  
P.P.V. : 34DH60



118000 060468

sur de

O

/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

# LasiliX® 40 mg

# LasiliX® 20 mg/2 ml

Furosémide

SANOFI

## Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.  
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire à nouveau.

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### Composition

#### LASILI 40 mg comprimés :

Furosémide .....

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale,

#### LASILI 20 mg/2ml :

Furosémide .....

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium

1 comprimé.

2/2 ml.

P.E.R. : 101  
01/07/2022

LasiliX 40mg  
20 Cp séc  
P.P.V. : 34DH60



118000 060468

sur de

### Formes pharmaceutiques et présentations

LASILI 40 mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; b

LASILI 20 mg/2 ml : solution injectable,

ampoule de 2 ml ; boîte de 1.

### DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

#### Voie orale :

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- des œdèmes d'origine cardiaque ou rénale,
- des œdèmes d'origine hépatique, le plus souvent en a potassium,
- de l'hypertension artérielle.

#### Voie injectable :

Cette forme est indiquée dans les cas suivants :

- urgences cardiaques : œdème aigu du poumon, a... « cruaque »
- poussées hypertensives sévères (élevation importante de la tension artérielle),
- rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (rétenzione de sel),
- radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILI,
- peut être utilisé en réanimation pédiatrique.

## ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

# LasiliX® 40 mg

# LasiliX® 20 mg/2 ml

Furosémide

SANOFI

## Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.  
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire à nouveau.

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### Composition

#### LASILI 40 mg comprimés :

Furosémide

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale,

#### LASILI 20 mg/2 ml :

Furosémide

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium

1 comprimé.

2/2 ml.

P.E.R. : 101  
01/07/2022  
2202 90

LasiliX 40mg  
20 Cp séc  
P.P.V. : 34DH60



118000 060468

### Formes pharmaceutiques et présentations

LASILI 40 mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; b

LASILI 20 mg/2 ml : solution injectable,

ampoule de 2 ml ; boîte de 1.

## DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

### Voie orale :

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- des œdèmes d'origine cardiaque ou rénale,
- des œdèmes d'origine hépatique, le plus souvent en a potassium,
- de l'hypertension artérielle.

### Voie injectable :

Cette forme est indiquée dans les cas suivants :

- urgences cardiaques : œdème aigu du poumon, a... « cruaque »,
- poussées hypertensives sévères (élevation importante de la tension artérielle),
- rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (rétenzione de sel),
- radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILI,
- peut être utilisé en réanimation pédiatrique.

## ATTENTION ! Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

፳፻፭፻፷፻

JL 125



# ଶକ୍ତିରେ

PPV 24DH60

EXP 04/2022

[0] 93042 2

# POTASSIUM

# Sirop

**125 ml**

፳፻፭፻፷፪

JL 125



A decorative element consisting of stylized black leaves and flowers on a light blue background.

# ମହାକାଳ

PPV 24DH60

EXP 04/2022  
LOT 93042-2

201-20092-2

# POTASSIUM

# Sirop

**125 ml**

JL 125



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ମାତ୍ରାବିଦୀ

PPV 24DH60

EXP 04/2022  
LOT 93042-2

卷之二

# POTASSIUM

# Sirop

**125 ml**

፳፻፭፻፷፻

125



# ମନ୍ଦିର

PPG 24DH60

EXP 04/2022  
LOT 03042-2

L01 93042

# POTASSIUM

# Sirop

**125 mL**

፲፻፭፻፷፻

JL 125



፳፻፲፭ | የግብር

# ଶ୍ରୀ କମଳାଚାର୍

PPG 24DH60

EXP 04/2022

Lot 93042 2

# POTASSIUM

# Sirop

**125 mL**