

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Déclaration de Maladie

N° W19-466300

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ A

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9555 Société : RAM

☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : RAS MOHAMED

Nom & Prénom : RAS MOHAMED

Date de naissance : 03-12-1969

Adresse : HAY MASTO RUE 18 N°62 CASABLANCA

Tél. : 0667077325 Total des frais engagés : 1215,41

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : 

Date de consultation : 11/10/19

Nom et prénom du malade : RAS MOHAMED Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Dysurie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'att. médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je
avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 11/10/19

Signature de l'adhérent(e) : 



عيادة طب وجراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية

CABINET D'UROLOGIE

Docteur FAÏK Hassan
Ancien médecin des Forces
armées royales
Chirurgien Urologue



الدكتور فائق حسن
طبيب سابق بالقوة المسلحة الملكية
اختصاصي في أمراض وجراحة الكلي
والمسالك البولية والتناسلية

الدار البيضاء، في 11/10/16 Casablanca, le

فحص وجراحة الكلي والمسالك
البولية عبر المنظار

جراحة البروستات والمثانة عبر
المنظار

جراحة الفتق والخصيتين

تفتيت حصي الكليتين
والمسالك البولية بأشعة الليزر

العقم والعجز الجنسي
عند الرجال

الأمراض التناسلية المعدية

الختان والتبول اللاإرادي
عند الأطفال

الفحص بالصدى

Chirurgie et endoscopie
des reins et des voies
genito-urinaires

Echographie urologique
Lithotripte Extracorporelle

Stérilité masculine
impuissance sexuelle

Maladies sexuellement
transmissibles

Circoncision,
enuresie chez l'enfant

Raji Mohamed

10970

1 + 1

Am h / 10/10/16

PHARMACIE BELALAMI
Hay El Masjidi, Rue 23 N° 70
CASABLANCA
Tel: 06 62 80 79 47

(عند التورم)

20/10/16

21
30/10

19/10/16

192. شارع أبا شعيب الدكالي حي الفرح - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 82 10 22 - المحمول : 06 61 71 34 20



31 UNIVERSITY

62/10

Mr + 81 x 7

20 2,20



P: ARMACIE BELALAMI -
Rue 23 N° 70
Hay El Masjed,
CASABLANCA
Tél. : 05 22 80 79 47

CONTIFLO®

Gélules à libération prolongée (Chlorhydrate de tamsulosine)

Veillez lire attentivement l'intégralité de la notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la consulter.

Si vous avez toute autre question, si vous avez besoin de plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CONTIFLO® OD

PPV: 109DH70

30 Gélules
à libération prolongée

Voie orale

0.4 mg



Mises en garde spéciales et précautions

1. Dénomination du médicament

CONTIFLO® OD 0,4mg

Ce médicament contenant du chlorhydrate de tamsulosine, se présente sous forme de gélules à libération prolongée en boîtes de 10, 30 et 60.

2. Composition du médicament

- Substance active : Chlorhydrate de tamsulosine 0,4mg
- Excipients en q.s.p. une gélule à libération prolongée : cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, copolymère d'acide méthacrylique-acrylate d'éthyle, hydroxyde de sodium, triacétine, talc, dioxyde de titane, eau purifiée
- Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, bleu brillant FCF, rouge cochenille A, jaune de quinoléine, jaune orangé S, dioxyde de titane (E171), azorubine, oxyde de fer jaune (E172).
- Liste des excipients à effet notoire : rouge cochenille A, jaune orangé S, azorubine.

libération prolongée. Ce médicament contient des agents colorants azoïques : Jaune orangé S (E110), rouge cochenille A (E124), azorubine (E122), qui peuvent provoquer des réactions allergiques.

Précautions d'emploi

La prudence s'impose chez les sujets traités par des médicaments antihypertenseurs, chez l'insuffisant rénal chronique, chez le sujet âgé de plus de 65 ans et chez le patient coronarien.

Hygiène de vie : il est recommandé de vous astreindre à une certaine hygiène de vie durant ce traitement et notamment : au maintien d'une activité physique, à la surveillance d'un régime alimentaire (éviter les repas riches, trop épicés, trop alcoolisés); ne pas trop boire le soir, maintenir un transit intestinal régulier.

9. Interactions

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment si vous êtes déjà traité par un antihypertenseur alpha-bloquant, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

URISPAS®



LOT 191281
EXP 05 2022
PPV 62.50

Veuillez lire attentivement
avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions,
demandez conseil à votre
pharmacien.
Gardez cette notice.
Vous aurez besoin de la lire
à nouveau.

DENOMINATION
URISPAS®

COMPOSITION
QUANTITATIVE

Flavoxate chlorhydrate (DCI)....200 mg
Excipients....q.s.p un comprimé pelliculé

FORME PHARMACEUTIQUE
Comprimé pelliculé, Boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antispasmodique urinaire.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Vessie irritable (incontinence d'urgence, dysurie, ténésme vésical, douleurs suprapubiennes, pollakiurie et nycturie) dans le cas de :

- cystite, urétrite, urétrocystite, trigonite et prostatite,
- hyperplasie bénigne de la prostate,
- lithotripsie extracorporelle,
- cathétérisme ou cystoscopie,
- intervention chirurgicale sur les voies urinaires inférieures.

ATTENTION !
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT
EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

- Hypersensibilité au produit;
- Lésions obstructives pyloriques



Il convient d'éviter l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse. L'administration de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

A utiliser avec précautions chez les personnes utilisant des machines ou conduisant un véhicule à moteur car le flavoxate peut provoquer fatigues, vertige, et troubles visuels.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Le lactose est un excipient à effet notoire, contre-indiqué chez les personnes souffrant d'une galactosémie ou de syndrome de malabsorption du glucose/galactose ou déficit en lactase.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT
POSOLOGIE

Pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans : en principe, 1 comprimé 3 fois par jour jusqu'à disparition des symptômes.

Kalest 20 mg

COMPOSITION

Oméprazole

Excipients...

Excipients...

LOT 180656

EXP 12/2020

PPV 30.00DH

Veillez lire

- Gardez ce médicament à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Classe pharmacothérapeutique

KALEST 20 mg, microgranules gastro-résistants gélule contient une substance appelée oméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

1. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué :

Chez l'adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastro-duodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif
- Oesophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-oesophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par *Helicobacter pylori* ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison,
- Traitement des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastro-duodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

Chez l'enfant à partir de 2 ans :

- Oesophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-oesophagien.
- Dans le traitement symptomatique des brûlures et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE KALEST® 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

- en cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- en association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux)

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Docteur FAÏK Hassan

Chirurgien Urologue

Chirurgie et Endoscopie des reins
et des voies Génito - Urinaires
Maladies sexuellement transmissibles
Lithotription des calculs urinaires
Impuissance - Stérilité Masculine
Circoncision



الدكتور فائق حسن

اختصاصي في أمراض وجراحة الكلي
و المسالك البولية و التناسلية
الفحص الداخلي و الجراحة عبر المتظار
تفتيت الحصى بدون جراحة
العقم عند الرجال و ضعف قوة الجماع
ختانة الأطفال

Casablanca, le : 20/10/15 في الدار البيضاء،

Patient

Rajji Nohamed

Echographie des voies uro-génitales faite.

Montant des honoraires payés :

Echographie = 150 dh

Totale : cent cinquante dirhams

[Signature]

عيادة طب وجراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية

CABINET D'UROLOGIE

Docteur FAÏK Hassan
Ancien médecin des Forces
armées royales
Chirurgien Urologue



الدكتور فائق حسن
طبيب سابق بالقوة المسلحة الملكية
اختصاصي في أمراض وجراحة الكلي
والمسالك البولية والتناسلية

Casablanca, le 11/10/2019 في الدار البيضاء

فحص وجراحة الكلي والمسالك
البولية عبر المنظار

جراحة البروستات والمثانة عبر
المنظار

جراحة الفتق والخصيتين

تفتيت حصي الكليتين
والمسالك البولية بأشعة الليزر

العقم والعجز الجنسي
عند الرجال

الأمراض التناسلية المعدية

الختان والتبول اللاإرادي
عند الأطفال

الفحص بالصدى

Chirurgie et endoscopie
des reins et des voies
genito-urinaires

Echographie urologique
Lithotripte Extracorporelle

Stérilité masculine
impuissance sexuelle

Maladies sexuellement
transmissibles

Circuncision,
enuresie chez l'enfant

Raj Mohamed

1) PSA

2) ech

3) gyneco



192. شارع أبا شبيب الدكالي حي الفرح - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 82 10 22 - المحمول : 06 61 71 34 20



Dr. Hasnaa TANINE
Médecin biologiste
Prélèvement à domicile

INPE laboratoire : 093061364
INPE DR H, Tanine : 097163695

Casablanca le 12 octobre 2019
MUT

Monsieur RAJI MOHAMED

| | |
|------------|------|
| FACTURE N° | 1740 |
|------------|------|

Analyses :

| | | | |
|------------------------------------|---|-----|---------------|
| Glycémie (à jeûn) ----- | B | 30 | Total : B 480 |
| Cytobactériologie des urines ----- | B | 150 | |
| PSA totale ----- | B | 300 | |

Prélèvements :

| | | |
|-----------|----|-----|
| Sang----- | Pc | 1,5 |
|-----------|----|-----|

| | |
|----------------------|------------------|
| TOTAL DOSSIER | 663,21 DH |
|----------------------|------------------|

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Six Cent Soixante Trois Dirhams et Vingt et Un Centimes





**Dr. Hasnaa TANINE
Médecin biologiste**

Prélèvement à domicile

Dossier ouvert le : 12/10/19

Monsieur RAJI MOHAMED

Réf. : 19J201

Edition du : 14/10/19

Page : 3/3

Compte Rendud'Analyses

MARQUEURS

Normales

ANTIGENE SPECIFIQUE DE LA PROSTATE

P.S.A. Total -----: 0,44 ng/ml

(Méthode E.L.F.A.)

Interpretation:

- < 40 ans : 0,21-1,72 ng/ml,
- 40-49 ans : 0,27-2,19 ng/ml,
- 50-59 ans : 0,27-3,42 ng/ml,
- 60-69 ans : 0,22-6,16 ng/ml,
- > 69 ans : 0,21-6,77 ng/ml.

Remarque:

Le toucher rectal, le massage prostatique, une cytoscopie, une échographie transrectale, une biopsie, augmentent transitoirement le taux de PSA.





Dr. Hasnaa TANINE
Médecin biologiste

Prélèvement à domicile

Dossier ouvert le : 12/10/19

Edition du : 14/10/19

Monsieur RAJI MOHAMED

Réf. : 19J201

Compte Rendud'Analyses

Page : 2/3

EXAMENS MICROBIOLOGIQUES

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

Conditions de recueil ----- : Urines mi-jet.

EXAMEN MACROSCOPIQUE

Aspect ----- : Limpide.
Couleur ----- : Jaunâtre
Culot ----- : 1,030

EXAMEN CHIMIQUE

PH ----- : 6
Glucose ----- : Négatif.
Protéines ----- : Négatif.
Corps cétoniques ----- : Négatif.
Urobilinogène ----- : Négatif.
Bilirubine ----- : Négatif.
Nitrites ----- : Négatif.
Sang ----- : Négatif.

EXAMEN CYTOLOGIQUE


Cellules épithéliales ----- : Absence.
Hématies ----- : < 1000 /ml
leucocytes ----- : < 1000 /ml
Cristaux ----- : Absence.
Cylindres ----- : Absence.

BACTERIOLOGIE

Examen direct ----- : Négatif.
Numération des germes ----- : < 1000 UFC
Culture sur milieux sélectives ----- : Stérile.

MYCOLOGIE

Levures ----- : Absence.
Filaments mycéliens ----- : Absence.
Cultures ----- : Stérile.





Dr. Hasnaa TANINE
Médecin biologiste
Prélèvement à domicile

Dossier ouvert le : 12/10/19

Edition du : 14/10/19

Monsieur RAJI MOHAMED

Réf. : 19J201

Compte Rendud'Analyses

Page : 1/3

BIOCHIMIE

Glycémie a jeun ----- : 1,01 g/l
(Méthode enzymatique à l'héxokinase sur COBAS C111) Soit : 6 mmol/l

Normales

0,7 - 1,1

Consensus:

0,6 à 1,0 g/l : Glycémie à jeûn.
1,00 à 1,26 g/l : Diminution de la tolérance au glucose.
> 1,26 g/l : Diabète; (observé sur deux prélèvements distincts).



Docteur FAÏK Hassan

Chirurgien Urologue

Chirurgien et Endoscopie des reins
et des voies Génito - Urinaires
Maladies sexuellement transmissibles
Lithotription des calculs urinaires
Impuissance - Stérilité Masculine
Circoncision

الدكتور فائق حسن

اختصاصي في أمراض وجراحة الكلي
والمسالك البولية التناسلية
الفحص الداخلي والجراحة عبر المنظار
تفتيت الحصى بدون جراحة
العقم عند الرجال وضعف قوة الجماع
ختانة الأطفال

Casablanca, le 11/10/19 في الدار البيضاء

Compte - Rendu Echographique

Mr raji mohamed

Le rein droit : est de taille normale, des contours réguliers, sans dilatation des cavités pyélocalicielles .bonne differentiation cortico-sinusale

Le rein gauche : est de taille normale, des contours réguliers, sans dilatation des cavités pyélocalicielles . bonne differentiation cortico-sinusale

La vessie : pleine, à paroi fine ; à contenu transonore et sans anomalie endo-luminale.

Prostate :echostructure homogene ,contours reguliers ;taille normale.

Conclusion :echographie vesico-prostatique et renale sans anomalie dans les limites de cet examen.



