

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Alial Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Alial Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° W19-466626

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11463

Société : Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : DAHBI KAHAL

Date de naissance : 11/12/1925

Adresse : 11, rue Ibn Rousan Farah 1, Sétif

Tél. : 0661766475

Total des frais engagés : 471,70

Dhs

Cadre réservé au Médecin

111: 0522326460  
Chirurgie Générale Faciale  
Spécialiste ORL  
Dr. Al-Hassan Ben BOUABD

Cachet du médecin :

Date de consultation : 09/11/2019

Nom et prénom du malade : Kasini Siham

Age : 36 ans

Lien de parenté :

Le même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Angiome

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Nador

Le : 11/11/2019

Signature de l'adhérent(e) :



ACCUEIL

### VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie

N° W19-466626

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.

Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 11463

Nom de l'adhérent(e) : DAHBI KAHAL

Total des frais engagés : 471,70

Date de dépôt : 11/11/2019

#### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/05/2015	Chirurgie Génito-Faciale	200 DH	200 DH	INP : 1490 22326460 Spécialiste ORL Dr. Abdellah Krim Boulabd

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ASMOU Docteur LAM-HAY Aïnoudé Rue ASS BERRECHID 05 22 32 84 94	09/10/19	271,70

## ANALYSES - RADIOPHARMACIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT



\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

#### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>							
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>							
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>							
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>							
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>							
	<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>										
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> </table>				H		D	G	B		
	H										
	D	G									
	B										
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21432552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> </table>				25533412	21432552	00000000	00000000	00000000	00000000	35533411
25533412	21432552										
00000000	00000000										
00000000	00000000										
35533411	11433553										
<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/>											
<b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>											
<b>DATE DU DEVIS</b> <input type="text"/>											
<b>DATE DE L'EXECUTION</b> <input type="text"/>											
<b>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</b>											
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>							
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>							
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>							
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>							
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession										
	<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>										
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> </table>				H		D	G	B		
	H										
	D	G									
	B										
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21432552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> </table>				25533412	21432552	00000000	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553
25533412	21432552										
00000000	00000000										
00000000	00000000										
35533411	11433553										
<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/>											
<b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>											

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

- Spécialiste en ORL et Chirurgie :
- Cervico - Maxillo - Faciale
- Exploration Endoscopique
- Exploration Vertige et Surdité




061126140

Berrechid le : ١١/١١/١٩

53, ٠٠ Karmi Silam  
 ١١٥, ٩٠ سبب الوجه سبب ١٥-  
 ٤٨, ٥٠ Escalier (S.V) ٢١٠ ١٥-  
 + Case pres (S.V) ٣٤١ ٥٥  
 ٢٢, ٧٠ (allatoxine)  
 ٢٧, ١٨٠ Escalier (S.V) ٣١٣ ٥٩  
 + Diphtherie ٢٥٠ ٣٧٠ ٤٧  
 ٢٧١, ٧٠

Dr. Abdelhakim BOUABID  
 Spécialiste ORL  
 Chirurgie Cervico Facial  
 Tél: 05 22 32 64 60



# IPP®

## 20 mg Gélules

Oméprazole

Boîtes de 7, 14, 28 et 56 gélules

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que IPP® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IPP® ?
3. Comment prendre IPP® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IPP® ?
6. Informations supplémentaires

### 1. Qu'est ce que IPP® et dans quel cas est-il utilisé ?

IPP® est un inhibiteur spécifique de la pompe à protons H+/K+ ATPase de la cellule pariétale gastrique. Il diminue la sécrétion d'acide dans l'estomac, quelque soit la nature de la stimulation.

#### IPP® 20 mg gélules est indiqué dans :

##### Adultes :

- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux.
- Prévention des récidives d'ulcères gastriques et duodénaux.
- En association à des antibiotiques appropriés, éradication de *Helicobacter pylori* dans la maladie ulcérante gastroduodénale.
- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
- Prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients à risque.

• Traitement de l'œsophagite par reflux.

- Traitement d'entretien des patients après cicatrisation d'une œsophagite par reflux.
- Traitement du reflux gastro-œsophagien symptomatique.

• Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

##### Population pédiatrique :

##### Enfants à partir d'un an et > à 10 kg :

- Traitement de l'œsophagite par reflux
- Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-œsophagien.

##### Enfants de plus de 4 ans et adolescents :

- En association à des antibiotiques, traitement de l'ulcère duodénal consécutif à une infection par *H. pylori*.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IPP® ?

##### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais IPP® en cas de :

- Hypersensibilité connue à l'Oméprazole ou à l'un des composants.
- Hypersensibilité à un autre inhibiteur de la pompe à protons.

- Co-administration avec nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

##### Mises en garde :

IPP® 20 mg peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commenciez à prendre IPP® 20 mg ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit :

- Vous perdez du poids sans raison ou si vous avez des problèmes à avaler.
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.

• Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

- Vous avez des selles noires (teintées de sang).
- Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'Oméprazole a été associé à une faible

augmentation de diarrhées infectieuses.

• Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

IPP® peut entraîner le développement de bactéries et d'acides dans l'estomac. La prise d'un médicament comme IPP® 20 mg peut entraîner une augmentation de la sécrétion d'acide dans l'estomac, ce qui augmente le risque de fractures vertébrales et de fractures de l'os. Les corticoïdes (comme l'acide aspartique) peuvent augmenter l'ostéoporose. Précautions d'emploi :

- Sujet âgé : pas nécessaire.

- Insuffisance rénale ou hépatique : l'adaptation de la posologie n'est pas nécessaire.

- En cas d'ulcère gastrique il est recommandé de vérifier la benignité de la lésion avant traitement. En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**IPP® est un médicament, ne pas le laisser à la portée des enfants.**

Interactions avec d'autres médicaments :

Contre-indications : nelfinavir

Nécessitant des précautions d'emploi : Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants : antimycosiques pyrazolés, digoxine, diazépam, phénytoïne, anticoagulants, anti-vitamines K, rifampicine, atazanavir, tacrolimus, méthotrexate, clopidogrel, millepertuis, saquinavir, erlotinib, warfarine, cilostazol.

Interactions avec les aliments et les boissons : Les gélules peuvent être prises avec de la nourriture ou à jeun.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives : Sans objet

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

- L'utilisation de l'oméprazole ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

- L'oméprazole est excrétée dans le lait maternel, mais n'a probablement pas d'influence sur l'enfant s'il est utilisé à doses thérapeutiques.

Sportifs : sans objet

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

IPP® 20 mg n'est pas susceptible d'entraîner des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. En cas d'effets secondaires tels qu'étourdissements et troubles visuels, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

Ce médicament contient du saccharose, son indication est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase isomaltase (maladies héréditaires).

Ce médicament contient du mannitol et peut provoquer des troubles digestifs (diarrhée).

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate et peut provoquer des réactions allergiques.

### 3. Comment prendre IPP® ?

Respecter strictement la posologie prescrite par le médecin.

IPP® 20 mg est administré par voie orale.

Il est recommandé de prendre les gélules d'IPP® le matin, et de les avaler en entier avec un demi-verre d'eau. Les gélules ne doivent être ni mordues ni croquées.

##### Posologie :

##### Adultes :

- Ulcère gastrique ou duodénal et reflux gastro-œsophagien : 20 mg soit 1 gélule / jour pendant 4 à 6 semaines.

- œsophagites par reflux gastro-œsophagien : 20 mg soit 1 gélule / jour pendant 4 semaines à prolonger en fonction des résultats obtenus.

- Prévention et traitement des lésions dues aux traitements par AINS : 20 mg soit 1 gélule / jour pendant 4 à 8 semaines selon la sévérité et les résultats obtenus.

- Syndrome Zollinger-Ellison : 60 mg / jour soit 3 gélules / jour, cette posologie doit être ajustée individuellement et la durée du traitement sera en fonction des résultats cliniques.

- Traitement séquentiel de l'éradication de *H. pylori* : la dose recommandée est de 20 mg de IPP® 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.

Votre médecin va vous prescrire en même temps deux antibiotiques parmi l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole.

##### Enfants :

- Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitations acides.

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 10 kg peuvent prendre IPP® 20 mg. La

IPP®

Oméprazole 20 mg

Boîte de 14 gélules

PPV : 53,00 DH

6 118000 190547

# ECOCLAV® 1 g/125 mg

# ECOCLAV® 500 mg/62,5 mg

## Poudre pour suspension buvable en sachet-dose Amoxicilline/Acide clavulanique

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

Dénomination :

ECOCLAV® 1 g/125 mg poudre pour suspension buvable en sachet-dose

ECOCLAV® 500 mg/62,5 mg poudre pour suspension buvable en sachet-dose

Composition :

Amoxicilline (DCI) ..... 1000mg

Sous forme d'amoxicilline trihydratée

Acide clavulanique (DCI) ..... 125mg

Sous forme de clavulanate de potassium syloïd (1:1)

Pour un sachet-dose.

Amoxicilline (DCI) ..... 500mg

Sous forme d'amoxicilline trihydratée

Acide clavulanique (DCI) ..... 62,5mg

Sous forme de clavulanate de potassium syloïd (1:1)

Pour un sachet-dose.

Excipients : crospovidone, Aspartam, Arome fraise, Silice précipitée hydratée.

Forme pharmaceutique :

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour suspension buvable en sachets-doses. Boîtes de 12 ou 16 sachets-doses.

2. QU'EST-CE QUE ECOCLAV® poudre pour suspension buvable en sachet-dose ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmaco thérapeutique :

Il s'agit d'un antibiotique de la famille des bêta-lactamines associant l'amoxicilline et l'acide clavulanique.

Indications

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (ECOCLAV® 1 g/125 mg) et chez l'enfant de plus de 30 mois (ECOCLAV® 500 mg/62,5 mg) dans le traitement des infections dues aux germes sensibles et/ou après un traitement par ce même médicament administré par voie injectable (ECOCLAV® 1g/125 mg), notamment dans certaines situations où les espèces bactériennes responsables de l'infection peuvent être multiples et/ou résistantes aux antibiotiques actuellement disponibles.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ECOCLAV® poudre pour suspension buvable en sachet-dose?

Ne prenez jamais ce médicament dans les cas suivants :

- allergie aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (pénicillines, céphalosporines) : tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques du groupe des céphalosporines,

- allergie connue à l'un des composants du médicament (voir Que contient ECOCLAV® poudre pour suspension buvable en sachet-dose?),

- antécédent d'atteinte hépatique liée à l'association amoxicilline/acide clavulanique,

- phénylkétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (E951).

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ETRE UTILISÉ en association avec le méthotrexate (voir Prise ou utilisation d'autres médicaments).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ECOCLAV® poudre pour suspension buvable en sachet-dose :

Mises en garde spéciales :

La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement

et la mise en place d'un traitement adapté.

Avant de prendre ce médicament (d'antibiotique),  
éruptions cutanées d'origine inconnue, et/ou  
coups de feu, et/ou  
coups de poignard, et/ou  
coups de poing, et/ou  
coups de poing, et/ou

LOT 18024 PER 07/20  
PPU 115DH90

ion  
ille  
res  
du  
il le  
cte  
sée  
otre  
tion

seul ou  
dive.  
ins sucre,  
résence de

les sujets

doit pas

autre pour

isant rénal

ECOCLAV 1 g / 125 mg®  
Amoxicilline et Acide clavulanique

16 sachets

PROMOPHARM S.A.



6 118000 242277

contre-indiquer toute nouvelle ou  
associée dans un même médicament.  
Si votre médecin vous a  
contactez-le avant de prendre  
maltodextrose (glucose).  
Contient une source de phénol  
équivalents de phénylekétoneurie.  
La survenue de symptômes  
dans les 24 heures suivant le traitement  
peut être liée à l'administration de ce médicament.  
Prendre des précautions :  
suspension buvable en sachet-dose.  
L'administration de fortes doses  
ou chez les patients ayant  
dans le passé, par exemple des  
convulsions antérieurement, une épilepsie traitée ou des atteintes ménégées, peut  
exceptionnellement entraîner des convulsions.  
Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION en cas de :  
\* d'insuffisance rénale,  
\* d'atteinte hépatique.  
Boire abondamment pendant la durée du traitement.

ECOCLAV® 1 g/125 mg contient 24,54 mg (0,63 mmol) de potassium par sachet-dose : tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en potassium.  
Ce médicament peut fausser certains résultats d'analyse biologique : test de Coombs, glycémie, protides totaux sériques, recherche de glucose dans les urines. Prévenez votre médecin de la prise de l'association amoxicilline/acide clavulanique, si ces examens vous sont prescrits.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.  
Prise ou utilisation d'autres médicaments  
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment du méthotrexate, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interaction avec les aliments et les boissons  
Sans objet.  
Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives  
Sans objet.  
Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement  
Grossesse  
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.  
Chez des femmes ayant un risque d'accouchement imminent et recevant l'association amoxicilline-acide clavulanique, il a été observé une augmentation du risque d'inflammation de l'intestin (entérocolite) chez les nouveau-nés.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.  
Allaitement  
L'allaitement est possible avec la prise de ce médicament. Si le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhée, éruptions sur la peau, candidose (infection due à certains champignons microscopiques), avisez immédiatement votre médecin qui vous conseillera sur la concorde à tenir car ces effets sur votre enfant peuvent être dus à ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.  
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER

# Cotipred® 20 mg

Prednisolone

## COMPOSITION :

Prednisolone (Sous forme métasulfobenzoate sodique) exprimé  
Excipient q.s.p.....  
Excipients à effet notoire : lactose, sorbitol (contenu dans l'arôme)

## PRESENTATION :

Boîte de 20 comprimés solubles effervescents avec b.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies où il est utilisé po

## CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les c

- la plupart des infections, - certaines maladies virales varicelle, zona), - certains troubles mentaux non traités, - allergie à l'un des constituants.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin, en association avec des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions)

**EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## MISES EN GARDE SPECIALES :

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

## AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladie du côlon, d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment antécédents de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire). Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison de maladies parasitaires.

## PENDANT LE TRAITEMENT :

Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

**En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.**

Sous traitement et au cours de l'année suivant l'arrêt du traitement, prévenir le médecin de la prise de corticoïde, en cas d'intervention chirurgicale ou de situation de stress (fièvre, maladie).

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Pendant le traitement, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel. Tenir compte de la teneur en sodium (51 mg par comprimé).

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN et notamment des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque : astémizole, bépridil, erythromycine en injection intra-veineuse, halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, sultopride, vincamine.

## GROSSESSE - ALLAITEMENT :

**GROSSESSE :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

**ALLAITEMENT :** L'allaitement est à éviter pendant le traitement en raison du passage dans le lait maternel.

PPV : 48DH50

PER : 07-22

LOT : I1629

**Cotipred® 20 mg**

prednisolone

20 comprimés effervescents sécables



6 118000 041016 pès,

# Eludril

## COLLUTOIRE

Digluconate de chlorhexidine  
chlorhydrate de tétracaïne



LOT: G00020  
FAB: 08/2018  
EXP: 08/2020

ELUDRIL COLLUTOIRE 55ML

MAPHAR

P.P.V.: 22,70 DH

### Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre, car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ELUDRIL, collutoire et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ELUDRIL, collutoire ?
3. Comment prendre ELUDRIL, collutoire ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ELUDRIL, collutoire ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE ELUDRIL, collutoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - ANTISEPTIQUE LOCAL ANESTHÉSIQUE LOCAL - Code ATC: R02AA05

Ce médicament contient un antiseptique local agissant contre les germes et un anesthésique local pour réduire la douleur.

Ce médicament est préconisé en cas :

- de mal de gorge peu intense et sans fièvre,
- d'aphètes et de petites plaies de la bouche.

Ce médicament est destiné aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans. Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

jée par  
peut favoriser les fausses  
impression « d'avaler de trav  
Vous ne devez pas utiliser ce  
la prise de boisson.

Mal de gorge :

En cas de survenue :

- de fièvre,
- d'expectoration (crachat),
- d'une gêne à la déglutition de

Aphtes, petites plaies dans

En cas de lésions étendues  
fièvre, consultez immédiatement

Coloration brune de la langue  
l'arrêt du traitement.

Coloration brunes des dents  
plombage : cette coloration  
évitée par un brossage quotidien.  
Adressez-vous à votre médecin.

ELUDRIL, collutoire.  
L'usage prolongé (plus de 10 jours) est  
souhaitable car il est susceptible de provoquer une

naturelle de la gorge.  
Cette spécialité ne doit pas être

introduite dans le nez ni dans la bouche.

### Autres médicaments et ELUDRIL

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez récemment pris ou pourriez prendre d'autres médicaments.  
Ne pas utiliser en même temps qu'un autre médicament.

### ELUDRIL, collutoire avec ELUDRIL

Le collutoire ne doit pas être dilué dans de l'eau ou de la boisson car la tétracaïne pourrait entraîner un étouffement.

## COMPOSITION

Paracétamol

Excipients : acide citrique, mannitol, saccharine sodique, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydride effervescent.

## FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé effervescent - boîte de 16.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE / ANTIPYRÉTIQUE (N, Système nerveux central)

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

**Cette présentation est réservée à l'adulte et à (soit environ à partir de 8 ans)** Lire attentivement la rubrique

Pour les enfants pesant moins de 27 kg, il existe des formes de paracétamol : demandez conseil à votre médecin.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie.

**EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre Posologie).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.

**EN CAS DE DOUCE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

**AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.**

## GROSSESSE - ALLAITEMENT

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

**D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.**

## EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :

Doliprane  
500 mg  
PARACETAMOL

15,80

PPVT 5 D H 8 0  
PER 0 1 / 2 2  
LOT 1 1 5 4

Doliprane 500 mg  
PARACETAMOL

16 comprimés effervescents



6 118000 040354



## COMPOSITION

Paracétamol

Excipients : acide citrique, mannitol, saccharine sodique, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydride effervescent.

## FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé effervescent - boîte de 16.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE / ANTIPYRÉTIQUE (N, Système nerveux central)

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

**Cette présentation est réservée à l'adulte et à (soit environ à partir de 8 ans)** Lire attentivement la rubrique

Pour les enfants pesant moins de 27 kg, il existe des formes de paracétamol : demandez conseil à votre médecin

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie.

**EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre Posologie).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.

**EN CAS DE DOUCE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

**AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.**

## GROSSESSE - ALLAITEMENT

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

**D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.**

## EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :

Doliprane  
500 mg  
PARACETAMOL

15,80

PPVT 5 D H 8 0  
PER 0 1 / 2 2  
LOT 1 1 5 4

Doliprane 500 mg  
PARACETAMOL

16 comprimés effervescents



6 118000 040354

