

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0048227

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 282

Société :

Royalair Maroc
R'ehaite

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HADDOUD Abdellah

Date de naissance : 1934

Adresse : RUE 1 N°52 Hay Hassani Hay Nador

Tél. : 06.63.66.07.30


Total des frais engagés :

5.60.80

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 01/11/2019

Nom et prénom du malade : HADDOUD

Lien de parenté :

Lui-même

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 01/11/2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24/11/13	C	2	150	<p>Dr. Iata BEN NOUNA Médecine Gén. Echographie 7, RDC Rue 11 Mly. Thami Marola Casablanca - Tél.: 05 22 93 51 72</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE POLYCLINIQUE DR TIR Abdellaziz 68, Rue Mly. Thami Marola Casablanca Tél: 022 90.21.81 - CASA	4-11-13	430.80

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
DEBUT D'EXECUTION				MONTANTS DES SOINS
FIN D'EXECUTION				
CCEFFICIENT DES TRAVAUX				
DATE DU DEVIS				
DATE DE L'EXECUTION				
DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE				
H	25533412	21433552		
	00000000	00000000		
D	00000000	00000000		
	35533411	11433553		
G				
B				
(Création, remont, adjonction)				
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION				



Casablanca le : 06/11/19 الدار البيضاء في:

M^{me} HADDOU D

KHATEJA.

2080 K3

1) Glucophag.

42.00 K3

2) Glucovance

77.00 K3

3) Antigluc. very.

44.20 K3

12 fal. no 8 sp

12 fal. el

430.80

BS 4

tratekne b3b3m

PHARMACIE POLYTECHNIQUE
DR TIR ADDIBLAZIZ
68, Rue. Mokhtar Hay Hassan
Tél: 022.90.21.67 - CASA

Dr. Laila BENNOUNA
Médecine Gé. Echographie

Nutrition
7, RDE Rue 11 Mly. Thami Mzola
Casablanca - Tél.: 05 22 93 72

MERCK

GLUCOVANCE® 500mg/2,5mg
30 comprimés pelliculés

PPV : 42DH00



6 118 001 121373
réalisé sous licence par LAPROPHAN S.A.



- si vous êtes déshydraté(e) (par exemple, en raison de diarrhées persistantes ou graves, de vomissements récurrents).
- si vous prenez un traitement pour des problèmes cardiaques, si vous avez récemment eu une attaque cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine ou si vous avez des difficultés respiratoires
- si vous souffrez de porphirie (maladie héréditaire rare due à un déficit enzymatique amenant l'organisme à produire et excréter de la porphyrine en trop grande quantité, celle-ci servant à produire la partie du pigment sanguin qui transporte l'oxygène)
- si vous prenez du miconazole (médicament destiné au traitement de certaines mycoses), même de façon locale
- si votre consommation d'alcool est excessive (que ce soit tous les jours ou de temps en temps);
- si vous allaitez

Demandez conseil à votre médecin si:

MERCK

GLUCOVANCE® 500mg/2,5mg
30 comprimés pelliculés

PPV : 42DH00



6 118 001 121373
réalisé sous licence par LAPROPHAN S.A.



- si vous êtes déshydraté(e) (par exemple, en raison de diarrhées persistantes ou graves, de vomissements récurrents).
- si vous prenez un traitement pour des problèmes cardiaques, si vous avez récemment eu une attaque cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine ou si vous avez des difficultés respiratoires
- si vous souffrez de porphirie (maladie héréditaire rare due à un déficit enzymatique amenant l'organisme à produire et excréter de la porphyrine en trop grande quantité, celle-ci servant à produire la partie du pigment sanguin qui transporte l'oxygène)
- si vous prenez du miconazole (médicament destiné au traitement de certaines mycoses), même de façon locale
- si votre consommation d'alcool est excessive (que ce soit tous les jours ou de temps en temps);
- si vous allaitez

Demandez conseil à votre médecin si:

MERCK

GLUCOVANCE® 500mg/2,5mg
30 comprimés pelliculés

PPV : 42DH00



6 118 001 121373
réalisé sous licence par LAPROPHAN S.A.



- si vous êtes déshydraté(e) (par exemple, en raison de diarrhées persistantes ou graves, de vomissements récurrents).
- si vous prenez un traitement pour des problèmes cardiaques, si vous avez récemment eu une attaque cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine ou si vous avez des difficultés respiratoires
- si vous souffrez de porphirie (maladie héréditaire rare due à un déficit enzymatique amenant l'organisme à produire et excréter de la porphyrine en trop grande quantité, celle-ci servant à produire la partie du pigment sanguin qui transporte l'oxygène)
- si vous prenez du miconazole (médicament destiné au traitement de certaines mycoses), même de façon locale
- si votre consommation d'alcool est excessive (que ce soit tous les jours ou de temps en temps);
- si vous allaitez

Demandez conseil à votre médecin si:

DIFAL®Diclofénac sodique 50 mg
Boîte de 30 comprimés

e sodium

P.P.V. : 44,20 DH

Form**ion****Présentation**DIFAL® 25 mg
DIFAL® 50 mg
Comprimés gastro-résistants

mg

colloïdale, lactose,
stéarate demag...sium, dioxyde de silice colloidal qsp 1 comprimé GR.
Excipients à effet notoire : lactose – colorant jaune orangé S

Boîte de 30

DIFAL® 25 mg / 100 mg
SuppositoiresDiclofénac sodique 25 mg / 100 mg
lactose, aérosol, glycérides hémisynthétiques qsp 1
suppositoire.

Boîte de 10

DIFAL® 75 mg Injectable
Solution injectable
IM 75 mg / 3 mlDiclofénac sodique 75 mg
Excipients qsp 1 ampoule injectable IM de 3 ml
Excipients à effets notoire : sodium métabisulfite – propylène
glycol, alcool benzyllique.Boîtes de 2/5
ampoules de 3 ml**PROPRIETES :**

Le diclofénac est un composé non stéroïdien possédant des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et antipyrétiques, agissant par inhibition de la synthèse des prostaglandines.

INDICATIONS :

Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du diclofénac, de l'importance des manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans l'éventail des produits anti-inflammatoires actuellement disponibles.

Elles sont limitées au traitement symptomatique des affections suivantes :

- **Rhumatismes inflammatoires chez les enfants** : suppositoire à 25 mg (enfant > 16 kg, soit environ 4 ans), comprimé à 25 mg (enfant ≥ 6 ans) et comprimé à 50 mg (enfant à partir de 35 kg, soit environ 12 ans).

Pour les adultes et enfants à partir de 15 ans (comprimés à 25 mg et à 50 mg, suppositoire à 100 mg) :

- **Traitements symptomatiques au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques et de certaines arthroses douloureuses et invalidantes** : notamment polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou syndromes apparentés, tels que le syndrome de Fießinger-Leroy-Reiter, et rhumatisme psoriasique.

- **Traitements symptomatiques de courte durée des poussées aiguës des rhumatismes abarticulaires** (épaules douloureuses aiguës, tendinites, bursites), arthrites microcristallines, arthroses, lombalgie, radiculalgie sévères.

- **Traitements des dysménorrhées essentielles, après bilan étiologique.**

- **Solution injectable à 75 mg/3 ml** : traitement symptomatique de courte durée des rhumatismes inflammatoires en poussée, lombalgie aiguë, radiculalgie, crises de coliques néphritiques.

CONTRE-INDICATIONS :

- DIFAL® (toutes formes) est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 12 mois ;
- Enfants de moins de 6 ans pour les formes : comprimé 25 mg, 50 mg, suppositoire 100 mg et injectable 75 mg ;
- Enfant de moins de 16 kg : suppositoire à 25 mg, en raison du dosage inadapté ;
- Enfant de moins de 35 kg : comprimé à 50 mg, en raison du dosage inadapté ;
- Enfants de moins de 15 ans : suppositoire 100 mg et injectable 75 mg ;
- Antécédents d'hémorragie ou de perforation digestive au cours d'un précédent traitement par AINS ;
- Hypersensibilité au diclofénac ou à l'un des composants ;
- Grossesse : dès le 5ème mois ;
- Insuffisance hépatocellulaire sévère ;
- Insuffisance rénale sévère ;
- Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée ;
- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif ;
- Antécédent d'asthme ou d'urticaire suite à la prise d'acide acétylsalicylique ou d'autres médicaments anti-inflammatoires ;
- Antécédents récents de rectites ou de rectorragies (pour les suppositoires à 25 mg et à 100 mg) ;
- Contre-indication liée à la voie intramusculaire solution injectable à 75 mg/3 ml : troubles de l'hémostase ou traitement anticoagulant en cours.
- Chez les prématurés et nouveau-nés à terme, en raison de la présence d'acide benzyllique.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

Respecter la prescription médicale.

ENFANT à partir de 12 mois : 2 à 3 mg/kg/jour, à répartir en 2 ou 3 prises, soit à titre indicatif

DIFAL® 25 mg suppositoire : enfant de 16 à 35 kg : 1 suppositoire à 25 mg, 2 à 3 fois par jour.

DIFAL®Diclofénac sodique 50 mg
Boîte de 30 comprimés

e sodium

P.P.V. : 44,20 DH

Form**ion****Présentation**DIFAL® 25 mg
DIFAL® 50 mg
Comprimés gastro-résistants

mg

colloïdale, lactose,
stéarate de sodium, lactosérum, dioxyde de silice colloïdal qsp 1 comprimé GR.
Excipients à effet notoire : lactose – colorant jaune orangé S

Boîte de 30

DIFAL® 25 mg / 100 mg
SuppositoiresDiclofénac sodique 25 mg / 100 mg
lactose, aérosol, glycérides hémisynthétiques qsp 1
suppositoire.

Boîte de 10

DIFAL® 75 mg Injectable
Solution injectable
IM 75 mg / 3 mlDiclofénac sodique 75 mg
Excipients qsp 1 ampoule injectable IM de 3 ml
Excipients à effets notoire : sodium métabisulfite – propylène
glycol, alcool benzylique.Boîtes de 2/5
ampoules de 3 ml**PROPRIETES :**

Le diclofénac est un composé non stéroïdien possédant des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et antipyrétiques, agissant par inhibition de la synthèse des prostaglandines.

INDICATIONS :

Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du diclofénac, de l'importance des manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans l'éventail des produits anti-inflammatoires actuellement disponibles.

Elles sont limitées au traitement symptomatique des affections suivantes :

- **Rhumatismes inflammatoires chez les enfants** : suppositoire à 25 mg (enfant > 16 kg, soit environ 4 ans), comprimé à 25 mg (enfant ≥ 6 ans) et comprimé à 50 mg (enfant à partir de 35 kg, soit environ 12 ans).

Pour les adultes et enfants à partir de 15 ans (comprimés à 25 mg et à 50 mg, suppositoire à 100 mg) :

- **Traitements symptomatiques au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques et de certaines arthroses douloureuses et invalidantes** : notamment polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou syndromes apparentés, tels que le syndrome de Fießinger-Leroy-Reiter, et rhumatisme psoriasique.

- **Traitements symptomatiques de courte durée des poussées aiguës des rhumatismes abarticulaires** (épaules douloureuses aiguës, tendinites, bursites), arthrites microcristallines, arthroses, lombalgies, radiculalgies sévères.

- **Traitements des dysménorrhées essentielles, après bilan étiologique.**

- **Solution injectable à 75 mg/3 ml** : traitement symptomatique de courte durée des rhumatismes inflammatoires en poussée, lombalgies aiguës, radiculalgies, crises de coliques néphritiques.

CONTRE-INDICATIONS :

- DIFAL® (toutes formes) est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 12 mois ;
- Enfants de moins de 6 ans pour les formes : comprimé 25 mg, 50 mg, suppositoire 100 mg et injectable 75 mg ;
- Enfant de moins de 16 kg : suppositoire à 25 mg, en raison du dosage inadapté ;
- Enfant de moins de 35 kg : comprimé à 50 mg, en raison du dosage inadapté ;
- Enfants de moins de 15 ans : suppositoire 100 mg et injectable 75 mg ;
- Antécédents d'hémorragie ou de perforation digestive au cours d'un précédent traitement par AINS ;
- Hypersensibilité au diclofénac ou à l'un des composants ;
- Grossesse : dès le 5ème mois ;
- Insuffisance hépatocellulaire sévère ;
- Insuffisance rénale sévère ;
- Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée ;
- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif ;
- Antécédent d'asthme ou d'urticaire suite à la prise d'acide acétylsalicylique ou d'autres médicaments anti-inflammatoires ;
- Antécédents récents de rectites ou de rectorragies (pour les suppositoires à 25 mg et à 100 mg) ;
- Contre-indication liée à la voie intramusculaire solution injectable à 75 mg/3 ml : troubles de l'hémostase ou traitement anticoagulant en cours.

- Chez les prématurés et nouveau-nés à terme, en raison de la présence d'acide benzylique.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Respecter la prescription médicale.

ENFANT à partir de 12 mois : 2 à 3 mg/kg/jour, à répartir en 2 ou 3 prises, soit à titre indicatif

DIFAL® 25 mg suppositoire : enfant de 16 à 35 kg : 1 suppositoire à 25 mg, 2 à 3 fois par jour.

ANGI OR®

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice. Gardez cette notice, vous pourrez la consulter à tout moment. Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à la présenter à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit pour des symptômes identiques, cela signifie qu'il peut également être utilisé pour d'autres symptômes. Si l'un des effets indésirables décrits dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

1. Composition du médicament :

ANGI OR® 5 mg

• Composition qualitative et quantitative.

Amlodipine Besilate

Quantité correspondant à amlodipine

ANGI OR® 10 mg

• Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :

Amlodipine Besilate

Quantité correspondant à amlodipine

• Composition qualitative en excipients :

Cellulose microcristalline, calcium hydrogen phosphate anhydre, amidon de maïs desséché type A, Stéarate de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANGI OR® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe de médicaments appelés inhibiteurs calciques.

3. Indications thérapeutiques :

ANGI OR® est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle (hypertension), ou un certain type de douleur thoracique dénommée angor, dont une forme rare est l'angor de Prinzmetal.

Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, ANGLO OR® agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat pour une douleur thoracique.

PPV 77DH00
PER 04/21
LOT 11089



5 mg

5 mg

13.870 mg

10 mg

le 30 comprimés

votre médecin ou
autre, même en cas
n mentionné dans

- Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique.
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.
- Gonflement de la langue et de la gorge entraînant une difficultés de吞咽 (swallowing).
- Réactions cutanées sévères, notamment éruption l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparaissant, inflammation des muqueuses (syndrome de Stevens Johnson).
- Crise cardiaque, battements cardiaques anormaux.
- Inflammation du pancréas pouvant entraîner une crise de douleur.

Les effets indésirables très fréquents suivants ont été observés d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

Effets indésirables très fréquents : pouvant affecter jusqu'à 10% des patients.

- Gonflement (œdème) des chevilles.

Les effets indésirables fréquents suivants ont été observés d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

Effets indésirables fréquents : pouvant affecter jusqu'à 10% des patients.

- Maux de tête, sensations vertigineuses, somnolence.
- Palpitations (conscience de vos battements cardiaques).
- Douleur abdominale, nausées.
- Perturbation du transit abdominal, diarrhée, constipation.
- Fatigue, faiblesse.
- Troubles visuels, vision double.
- Crampes musculaires.

D'autres effets indésirables figurant sur la liste suivante sont mentionnés comme grave ou si vous présentez des symptômes, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables peu fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1% des patients.

- Changement de l'humeur, anxiété, dépression, insomnie.
- Tremblements, anomalies du goût, perte de conscience.
- Sensations d'engourdissement ou de fourmillement.
- Tintements dans les oreilles.
- Diminution de la pression artérielle.
- Éternuements et écoulement nasal provoqués par un rhume.
- Toux.
- Bouche sèche, vomissements (nausées).
- Chute des cheveux, augmentation de la transpiration, changement de coloration de la peau.
- Difficultés pour uriner, augmentation des envies d'uriner.
- Incapacité d'obtenir une érection, gêne ou augmentation de la taille.
- Douleur, malaise.
- Douleurs articulaires ou musculaires, douleurs dorsales.
- Augmentation ou diminution du poids.

Effets indésirables rares : pouvant affecter jusqu'à 1/100 des patients.

- Confusion.

Effets indésirables très rares : pouvant affecter jusqu'à 1/1000 des patients.

- Diminution du nombre des globules blancs, diminution anormale d'hématomes ou des saignements.
- Augmentation du sucre dans le sang (hyperglycémie).
- Troubles de la fonction rénale.

ANGI OR®

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice. Gardez cette notice, vous pourrez la consulter à tout moment. Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à la présenter à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit pour des symptômes identiques, cela signifie qu'il peut également être utilisé pour d'autres symptômes. Si l'un des effets indésirables décrits dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

1. Composition du médicament :

ANGI OR® 5 mg

• Composition qualitative et quantitative.

Amlodipine Besilate

Quantité correspondant à amlodipine

ANGI OR® 10 mg

• Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :

Amlodipine Besilate

Quantité correspondant à amlodipine

• Composition qualitative en excipients :

Cellulose microcristalline, calcium hydrogen phosphate anhydre, amidon de maïs desséché type A, Stéarate de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANGI OR® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe de médicaments appelés inhibiteurs calciques.

3. Indications thérapeutiques :

ANGI OR® est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle (hypertension), ou un certain type de douleur thoracique dénommée angor, dont une forme rare est l'angor de Prinzmetal.

Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, ANGLO OR® agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat pour la douleur thoracique.

PPV 77DH00
PER 04/21
LOT 11089



5 mg

5 mg

13.870 mg

10 mg

le 30 comprimés

votre médecin ou
autre, même en cas
n mentionné dans

- Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique.
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.
- Gonflement de la langue et de la gorge entraînant une difficultés de吞咽 (swallowing).
- Réactions cutanées sévères, notamment éruption l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparaissant, inflammation des muqueuses (syndrome de Stevens Johnson).
- Crise cardiaque, battements cardiaques anormaux.
- Inflammation du pancréas pouvant entraîner une crise de douleur.

Les effets indésirables très fréquents suivants ont été observés d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

Effets indésirables très fréquents : pouvant affecter jusqu'à 10% des patients.

- Gonflement (œdème) des chevilles.

Les effets indésirables fréquents suivants ont été observés d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

Effets indésirables fréquents : pouvant affecter jusqu'à 10% des patients.

- Maux de tête, sensations vertigineuses, somnolence.
- Palpitations (conscience de vos battements cardiaques).
- Douleur abdominale, nausées.
- Perturbation du transit abdominal, diarrhée, constipation.
- Fatigue, faiblesse.
- Troubles visuels, vision double.
- Crampes musculaires.

D'autres effets indésirables figurant sur la liste suivante sont mentionnés comme grave ou si vous présentez des symptômes, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables peu fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1% des patients.

- Changement de l'humeur, anxiété, dépression, insomnie.
- Tremblements, anomalies du goût, perte de conscience.
- Sensations d'engourdissement ou de fourmillement.
- Tintements dans les oreilles.
- Diminution de la pression artérielle.
- Éternuements et écoulement nasal provoqués par un rhume.
- Toux.
- Bouche sèche, vomissements (nausées).
- Chute des cheveux, augmentation de la transpiration, changement de coloration de la peau.
- Difficultés pour uriner, augmentation des envies d'uriner.
- Incapacité d'obtenir une érection, gêne ou augmentation de la taille.
- Douleur, malaise.
- Douleurs articulaires ou musculaires, douleurs dorsales.
- Augmentation ou diminution du poids.

Effets indésirables rares : pouvant affecter jusqu'à 1/100 des patients.

- Confusion.

Effets indésirables très rares : pouvant affecter jusqu'à 1/1000 des patients.

- Diminution du nombre des globules blancs, diminution anormale d'hématomes ou des saignements.
- Augmentation du sucre dans le sang (hyperglycémie).
- Troubles de la fonction rénale.

٤- **باب في الحالتين التاليتين :**
الشخص لفحس بالتصوير الشعاعي أو السكانير
ن مادة مبادنة تحتوي على اليود في دورك المدورة.
الشخص لعملية جراحية كبيرة.
سيفرجك فاجع بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات
من المهم أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب.
وكفاج

قد يظهر المخاض بشكل حاد يفتك كما أن الأعراض قد لا تكون مميزة مثل التقييد والآلام البطن مع شعورات عضلية وإحساس بالانزعاج والإعياء الشديد، وصعوبة في التنفس. ومن بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض درجة حرارة الجسم ونبض القلب. إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، قد تكون بحاجة إلى دخول المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم لأن المخاض النبوي التي تؤدي إلى السبات. توقف حالاً عن تناول كلوكوفاغ، ثم قم باتخاذ الطبيب أو المستشفى الأقرب على الفور.

لكلوكوفاوج وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت كلوكوفاوج في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل السلفاميدين المخضّة لمعدل السكر في الدم، الأنسولين، الفيليتينيدات)، هناك خطير انخفاض معدل السكر في الدم، إذا أنتست بارتفاع انخفاض ~~معدل السكر في الدم~~ السكر في الدم، مثل الشعور بالتوهين، الدوخة، زيادة تصبّب العرق، تسارع نظم القلب، ضغطوطيرات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما ينتهي على سكر، يجب أن تساعدك أن تنشر يانك أفضل.

تناول أو استعمال أدوية أخرى
إذا كنت قدما على حقن وعاء من مادة معاينة تحتوى على المدف

يجب قراءة هذه النشرة بمباوكها
وخاصية المعلومات حول الحمام
تحذيرات واحتياطات الاستعمال
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءة
- إذا كانت لديك أية أستلة أخرى، لا
العلومات بمطبل أو المصبى.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا ت
لدي نفس الاعراض التي لديك، لأن تنا
- إذا كنت تواجه الآثار الجانبية، تحد
أيضاً على أي من الآثار الجانبية الم
انتظر الفقرة 4.

في هذه الفترة

- 1- ما هو كوكو فاج 500 مغ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
 - 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كلوكوفاج 500 مغ، قرص مغلف؟
 - 3- ما هي طريقة تناول كلوكوفاج 500 مغ، قرص مغلف؟
 - 4- ما هي التشتتات غير المرغوبة المحتملة؟
 - 5- ما هي طريقة حفظ كلوكوفاج 500 مغ، قرص مغلف؟
 - 6- معلومات إضافية.

١- ماهو **ڭۈوكۈفاج** 500 مغ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كلوكوفاج؟
الإنسونين مرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز
(السكر) المتواجد في الدم، يستخدم الجسم الغلوكوز لإنتاج الطاقة أو
يختزن لاستخدامه لاحقاً.
عندما تكون مريضاً بالسكرى، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية
كافية أو جسمك ليس قادرًا على استخدام الإنسونين الذي ينتجه بشكل
صحيح ~~ويكتفى~~ إلىارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كلوكوفاج
على تخفيض معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن
من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كلوشكاج على المدى الطويل بالمساعدة على الحد من آخطار المضاعفات المصاحبة للكسر، شاركواكم في الآراء في المذكرة المتفقون قليلاً من العذر

ثلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف كلوريدرات الماء مع قصبة

كلوريدرات الماء

- يجب قراءة هذه النشرة بكافولها
و وخاصة المعلومات حول الحفاظ
تحذيرات واحتياطات الاستعمال
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءة
- إذا كانت لديك أي أسلطة أخرى، لا
المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا ت
لديه نفس الأعراض التي لديك، لأنها
- إذا كنت تواجه الآثار الجانبية، تحدده
أيضاً على أي من الآثار الجانبية الم
انظر الفقرة 4.

في هذه النشرة

- 1- ما هو ثلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول ثلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول ثلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف؟
- 4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ ثلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف؟
- 6- معلومات إضافية.

1- ما هو ثلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصنف الدوائي العلاجي
يحتوي ثلووكوفاج على مكونين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري.
يتنبأ إلى هذه الأدوية المسماة بـ «غير الموصى بها».

ما هي الحالات التي يستعمل فيها ثلووكوفاج؟

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز
(السكر) المتواجد في الدم، يستخدم الجسم الغلوكوز لإنقاص الطاقة أو
يخرجه لاستخدامه لاحقاً.
عندما تكون مريضاً بـ «السكري»، لا ينتفع البنكرياس لديك بالإنسولين بكفاءة
كافية أو جسمك ليس قادرًا على ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد ثلووكوفاج
على تخفيف معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن
من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح بذلك تناول ثلووكوفاج على
الذى يتواجد بالجسم من الأخطار المضاعفات المصاحبة
لـ «السكري»، مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم، فتجنب كل من المذكور.

20,80

إذا كنت تتناول علاجاً ضد القصور القلبي، أو إذا عانيت من وقت قريب

كنت تعاني من مشاكل حادة في ماء، مثل ارتفاع

قص في إمداد الأنسجة بالاكسجين مما يعرضك

(انظر ي يجب الانتباه مع غلووكوفاج «أنتها»).

ثرة المشروبات الكحولية.

دى هذه الحالات أنتها، عليك مراجعة الطبيب قبل

الذهاب في الحالتين التاليتين:

الشخص لشخص بالتصوير الشعاعي أو السكانتر

ن مادة ميابانة تحتوي على الاليود في دوريك الدموية.

الشخص لعملية جراحية كبيرة.

ثلووكوفاج يضر الوقت قبل وبعد هذه العمليات.

سيفر الطبيب إذا كنت بحاجة لا إلى علاج

من المهم أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب.

وكوفاج

يللي لا يهم بين حاصل لخطر الحفاظ اللبني التالي:

قد يتسبب ثلووكوفاج في تعقيد نادر جداً ولكن حمله جداً يسمى

الحفاظ اللبني، وخاصة إذا كنت تعاني من مشكل في وظيفة الكليتين.

ويزيد احتمال تطور الحفاظ اللبني أيضاً في حالة داء السكري الخارج

عن السيطرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول، أو فقدان السوائل

العصبية (الحفاف) الناجمة عن إسهال حاد أو التقيؤ، أو مشاكل في

وظيفة الكبد أو إصواتات طبلة تسبب في حرمان جزء من الجسم من

الاكتسجين (مثل أمراض القلب الحادة الخطيرة)، ومن المهم احترام تناول

الملاج وقواعد الحمية الغذائية وممارسة نشاط بدني منتظم لأن هذا قد

يقلل احتمال حدوث حفاظ لبني.

قد يظهر الحفاظ بشكل دقيق، كما أن الأعراض قد لا تكون مميزة مثل

النقيء والألم البطن مع مشتقات عضلية وحساس بالانزعاج والإعماق

الشديد وصعوبة في التنفس، ومن الأعراض الأخرى، هناك انخفاض

درجة حرارة الجسم ونبض القلب، إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، قد

تكون بحاجة إلى دخول المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم لأن

الحفاظ اللبني قد يؤدي إلى السبابات. توقف حالاً عن تناول ثلووكوفاج

وقم بزيارة الطبيب أو المستشفى الأقرب على الفور.

ثلووكوفاج وجده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت

ثلووكوفاج في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي

إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل سلفاميدات المضخة لعدل

السكر في الدم، إذا أحسست بـ «أعراض انخفاض معدل السكر» في الدم،

مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب،

اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فلن شرب أو أكل شيء» ما

يسمى على سكر، يجب أن تساعدك أن تشعر بذلك أفال.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت تلقيها على حفظ ماء، مثل ماء ميابانة تحتوى على الماء

كلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف.. حادة معقد.. حادة كلوريدرات الماء

يجب قراءة هذه النشرة بكافولها
و وخاصة المعلومات حول الحفاظ
ـ تحذيرات واحتياطات الاستعمال
ـ احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءة
ـ إذا كانت لديك أي أسلطة أخرى، لا
ـ المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.
ـ وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا ت
ـ لديه نفس الأعراض التي لديك، لأنها
ـ إذا كنت تواجه الآثار الجانبية، تحدده
ـ أيضاً على أي من الآثار الجانبية الم
ـ انتظر الفقرة 4.

في هذه النشرة

- ـ ما هو كلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- ـ ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف؟
- ـ ما هي طريقة تناول كلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف؟
- ـ ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
- ـ ما هي طريقة حفظ كلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف؟
- ـ معلومات إضافية.

1- ما هو كلووكوفاج 500 ملغم، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصنف الدوائي العلاجي
يحتوي كلووكوفاج على مكونين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري.
يتنبأ إلى هذه الأدوية المسماة بـ «بيغافين».

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كلووكوفاج؟

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز (السكر) المتواجد في الدم، يستخدم الجسم الغلوكوز لإنقاص الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً.
عندما تكون مريضاً بـ «سكري»، لا ينتفع البنكرياس لديك بالإنسولين بكفاءة أو جسمك بذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كلووكوفاج على تخفيف معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كلووكوفاج على الذي يتواجد في الدم من آثار المضاعفات المصاحبة

20,80

ـ إذا كنت تتناول علاجاً ضد القصور القلبي، أو إذا عانيت من وقت قريب

ـ كثت تعانى من مشاكل حادة في ما يليه، ازدحام

ـ قص في إمداد الأنسجة بالاكسجين مما يعرضك

ـ (انظر يرجى الانتباه مع غلووكوفاج «أنتها»).

ـ قرحة المشروبات الكحولية.

ـ دى هذه الحالات أنتها، عليك مراجعة الطبيب قبل

ـ «بيب في الحالتين التاليتين»:

ـ الشخص لفهش بالتصوير الشعاعي أو السكانتر

ـ ن مادة ميابنة تحتوى على اليد في دورتك الدموية.

ـ الشخص لعملية جراحية كبيرة.

ـ كلووكوفاج يضر الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات.

ـ سيفر الطبيب إذا كنت بحاجة لا إلى علاج

ـ من المهم أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب.

ـ وكوفاج

ـ تليت «أنتها» بين حاص لخطر الحفاظ اللبني التالي:

ـ قد يتسبب كلووكوفاج في تعقيد نادر جداً ولكن حظير جداً يسمى

ـ الحفاظ اللبني، وخاصية إذا كنت تعانى من مشكل في وظيفة الكليتين.

ـ ويزيد احتمال تطور المضاعف الشعاعي أيضاً في حالة داء السكري الخارج

ـ عن السيطرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول، أو فقدان السوائل

ـ العضوية (الحفاف) الناجمة عن إسهال حاد أو التقيؤ، أو مشاكل في

ـ وظيفة الكبد أو إصابة طبلة تسبب في حرمان جزء من الجسم من

ـ الأكسجين (مثل أمراض القلب الحادة الخطيرة)، ومن المهم احترام تناول

ـ الملاج وقواعد الحمية الغذائية وممارسة نشاط بدني منتظم لأن هذا قد

ـ يقلل احتمال حدوث حفاظ لبني.

ـ قد يظهر الحفاظ بشكل دقيق، كما أن الأعراض قد لا تكون مميزة مثل

ـ التقيؤ والألم البطن مع مشتقات عضلية وحساس بالانزعاج والإيماء

ـ الشديد وصعوبة في التنفس، ومن بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض

ـ درجة حرارة الجسم ونبض القلب، إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، قد

ـ تكون بحاجة إلى دخول المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم لأن

ـ الحفاظ اللبني قد يؤدي إلى السباب، توقف حالاً عن تناول كلووكوفاج

ـ وقم بـ «مراجعة الطبيب أو المستشفى الأقرب على الفور».

ـ كلووكوفاج وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت

ـ كلووكوفاج في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي

ـ إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل سلفاميدات المضافة لـ «مدل

ـ السكر» في الدم، إذا أحسست بـ «أعراض انخفاض معدل السكر» في الدم،

ـ مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب،

ـ اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فلن شرب أو أكل شيء» ما

ـ يترافق على سكر، يجب أن تساعدك أن تشعر بذلك أنت أفضل.

ـ تناول أو استعمال أدوية أخرى

ـ إذا كنت تلقيها على حفف، عادة تجدها تحتوى على المهدئ