

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

caire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

die et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Déclaration de Maladie : № S19-0018401

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 07716 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : T.R.A.K.I. Houssayni Ned Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0661.45.9859 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : T.R.A.K.I. Houssayni Ned Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



Conditions Générales

POUR LE PRATICIEN

L'acte médical est désigné par l'une des mentions suivantes :

C	= Consultation au Cabinet du médecin omnipraticien
CS	= Consultation au Cabinet par le médecin spécialiste ou qualifié (autre que le médecin neuro-psychiatre)
CNPSPY	= Consultation au Cabinet par le neuro-psychiatre
V	= Visite de jour au domicile du malade par le médecin
VN	= Visite de nuit au domicile du malade par le médecin
VD	= Visite du dimanche par le médecin au domicile du malade
VD	= Visite de jour au domicile du malade par un spécialiste qualifié
PC	= Acte de pratique médicale courant et de petite chirurgie
k	= Actes de chirurgie et de spécialistes

SF	= Actes pratiqués par la sage femme et relevant de sa compétence
SFI	= Soins infirmiers pratiqués par la sage femme
AMM	= Actes pratiqués par le masseur ou le kinesithérapeute
AMI	= Actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière
AP	= Actes pratiqués par un orthophoniste
AMY	= Actes pratiqués par un aide-orthophoniste
R-Z	= Electro-Radiologie
B	= Analyses

POUR L'ADHERENT

La mutuelle ne participe aux frais résultant de certains actes que si après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge.

Pour les actes soumis à cette formalité, le malade est tenu, avant l'exécution de ces actes d'adresser au service de la mutuelle une demande d'entente préalable remplie et signée par son médecin traitant.

Ce bulletin doit mentionner les raisons pour lesquelles l'application de tel acte ou tel traitement est proposé pour permettre au médecin contrôleur de donner son accord au de présenter ses observations.

Le bulletin d'entente préalable peut être demandé auprès du service Mutuelle, il sera remis sous pli confidentiel au médecin contrôleur dûment rempli par le médecin traitant.

LES ACTES SOUMIS A ACCORD PREALABLE

- L'HOSPITALISATION EN CLINIQUE
- L'HOSPITALISATION EN HOPITAL
- L'HOSPITALISATION EN SANATORIUM OU PREVENTORIUM
- SEJOUR EN MAISON DE REPOS
- LES ACTES EFFECTUÉS EN SERIE, il s'agit d'actes répétés en plusieurs séances ou actes globeaux comportant un ou plusieurs échelonnements dans le temps .

- LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES
- L'ORTHOPEDIE
- LA REEDUCATION
- LES ACCOUCHEMENTS
- LES CURES THERMALES
- LA CIRCONCISION
- LE TRANSPORT EN AMBULANCE

EN CAS D'URGENCE

Les actes d'urgence échappant à la procédure d'entente préalable, l'intéressé doit prévenir dans les 24 heures le Service Mutuelle qui donnera ou non son accord

Cette feuille complétée par le praticien, à l'occasion de chaque visite ou l'exécution de chaque ordonnance médicale ne doit être utilisée que pour un seul malade



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance et d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

AEROPORT CASA ANFA
CASABLANCA
TEL : 05 22 91 26 46 / 2648 / 2857 / 2883
FAX / 05 22 91 26 52
TELEX : 3998 MUT
E-mail : mupras@RoyalAirMaroc

FEUILLE DE SOINS

N° 854553

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Nom & Prénom : TAKI Housseyni Mohamed
 Matricule : 07716 Fonction : Retraité Poste :
 Adresse : 629 Rue Goulaoui - Casab
 Tél. : 0661 459 859 Signature Adhérent : Sgt

A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

Nom & Prénom du patient : _____ Age _____
 Lien de parenté avec l'adhérent : Adhérent Conjoint Enfant
 Date de la première visite du médecin : TRAKİ Housseyni Ned
 Nature de la maladie : alexopela Prostate
 S'il s'agit d'un accident : causes et circonstances :
 A _____, le _____ Durée d'utilisation 3 mois _____
 Signature et cachet du médecin : Dr SAADALLAH KHA
 (Dr SAADALLAH KHA Chirurgien Urologue et Andrologue Tel: 05 22 86 33 90)

VOLET ADHERENT

DECLARATION N° 854553
 Matricule N° : 07716
 Nom du patient : TAKI Housseyni M
 Date de dépôt : _____
 Montant engagé : _____
 Nombre de pièces jointes : _____



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et Signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/10/19			200 DH	ADALLA Chirurgie Bd Abdou Casablanca 05 22 86 35 00
30/10/19 Th.o			500 DH	ADALLA Chirurgie Urologue Bd Abdou Casablanca 05 22 86 35 00

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Distributeur	Date	Montant de la Facture
Sté.PHARMACIE LOUBILA Dr G Benani Ep Alami 16 Rue 15 Quartier Loubila Casablanca Tel: 05 22 26 00 14	30/10/19	1737,63
Sté.PHARMACIE LOUBILA Dr G Benani Ep Alami 16 Rue 15 Quartier Loubila Casablanca Tel: 05 22 26 00 14	30/10/19	3340,00

ANALYSES - RADIographies

Cachet et Signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Centre de Diagnostics et de Radiologie	21.10.19	B300	417,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et Signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFICIENT DES TRAVAUX
H				
D				
G				
B				
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFICIENT DES TRAVAUX
H	25533412 00000000	21433552 00000000	G	MONTANT DES SOINS
D	00000000	00000000	B	DATE DU DEVIS
G	35533411	11433553		DATE DE L'EXECUTION
B				
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS
				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Chirurgien Urologue

Coeliochirurgie urologique

Chirurgie urologique adulte et enfant

Cancerologie urologique

Chirurgie de l'incontinence urinaire

Traitemet de la prostate par laser green light

Traitemet des calculs urinaires au laser holmium

Enuresie chez l'enfant

Circoncision

Sterilité masculine - AMP

Impuissance sexuelle

Chirurgie des hernies chez l'adulte et l'enfant

عضو الجمعية الاوروبية و الفرنسية لجراحة الكلى
فحص و جراحة الكلى و المسالك البولية بالمنظار
عند الكبار و الأطفال

تفتيت حصي الكلى و المسالك البولية
بأشعة الميموم ليزر

جراحة البروستات باشعة غرين لايت
علاج العقم و العجز الجنسي عند الرجال

علاج الأمراض التناسلية
علاج التبول الإلارادي عند الأطفال
جراحة الفتق عند الكبار والأطفال

Casablanca, le : 30 OCT. 2019

Mr. I RAKI . + ou sseyni . 30s .

Sté.PHARMACIE LOUBILA
Dr G Benani Ep Alami
16, Rue 15 Quartier Loubila
Casablanca - Tél: 05 22 26 00 14

Dr SAADALLAH Khalid
Chirurgien Urologue
101, Angle Bd. Abdelmoumen
et Bd Anoual - Casablanca
Tél.: 05 22 86 33 99

449 mg
X 3 0 Rotafax 10 mg.
149/j po 3m/s.

130.20

3 ② Tre 20 mg

1737.60

1 i po 3m/s

Dr SAADALLAH Khalid
Chirurgien Urologue
101, Angle Bd. Abdelmoumen
et Bd Anoual - Casablanca
Tél.: 05 22 86 33 99

452، زاوية شارع عبد المؤمن و شارع أنوال عماره عبد المؤمن سانتر فوق مقهى سيزان الطابق الأول رقم 101- الدار

Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual - Res. Abdelmoumen centre au dessus du café seazen,
101 - Casablanca Tél. : 05 22 86 33 99 - 05 22 86 59 91 - Urgence : 06 62 33 64 36 - 06 61 80 87 64

Dr SAADALLAH Khalid
Chirurgien Urologue

Coeliochirurgie urologique

Chirurgie urologique adulte et enfant

Cancerologie urologique

Chirurgie de l'incontinence urinaire

Traitemet de la prostate par laser green light

Traitemet des calculs urinaires au laser holmium

Enuresie chez l'enfant

Circoncision

Sterilité masculine - AMP

Impuissance sexuelle

Chirurgie des hernies chez l'adulte et l'enfant

الدكتور سعد الله خالد

جراحة الكلى

و المسالك البولية و التناسلية

عضو الجمعية الاوروبية و الفرنسية لجراحة الكلى

فحص و جراحة الكلى و المسالك البولية بالمنظار

عند الكبار والأطفال

تفتيت حصى الكلى و المسالك البولية

بأشعة الميوم ليزر

جراحة البروستات بأشعة غرين لايت

علاج العقم و العجز الجنسي عند الرجال

علاج الأمراض التناسلية

علاج التبول الإرادي عند الأطفال

جراحة الفتق عند الكبار والأطفال

Casablanca, le : 30/10/19

Dr SAADALLAH Khalid, Housseyni 9^e

33400 Casablanca, Bd Abdellatif Loubila 10, 8^e



Sté.PHARMACIE LOUBILA
 Dr G. Benani Ep. Alami
 16, Rue 15 Quartier Loubila
 Casablanca - Tél: 05 22 26 00 14

15 | II mis

Dr SAADALLAH Khalid
 Chirurgien Urologue
 101, Angle Bd. Abdelmoumen
 et Bd. Anoual - Casablanca
 Tél: 05 22 86 33 99

452 زاوية شارع عبد المؤمن و شارع أنوال عماره عبد المؤمن سانتر فوق مقهى سيزان الطابق الأول رقم 101 . الدار البيضاء

452 Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual - Res. Abdelmoumen centre au dessus du café seazen,
 1^{er} étage N° 101 - Casablanca Tél : 05 22 86 33 99 - 05 22 86 59 91 - Urgence : 06 62 33 64 36 - 06 61 80 87 64

ZOLADEX® 10,8 mg, implant en seringue préremplie pour voie sous-cutanée

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Acétate de goséroline

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca
Zoladex 10.8mg implant inj
P.P.V : 3340,00 DH



E 118001 182534

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

Durée du traitement

La durée du traitement est adaptée selon les cas.

Suivre la prescription médicale. Ne pas arrêter la prise de Zoladex sans l'accord de votre médecin.

Si vous oubliez d'utiliser Zoladex 10, 8 mg, implant en seringue préremplie pour voie sous-cutanée: Prévenez immédiatement votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde :

- Il est possible d'observer en début de traitement, une accentuation des troubles qui l'ont motivé: troubles urinaires, douleurs. Ces phénomènes peuvent également être liés à d'autres causes.

TRE-ZEN®

Chic-~~andante~~ do noronátilo

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, consultez votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit en cas de symptômes identiques, car cela pourrait Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de

COMPOSITION :

CONTENUE :
Comprimé pelliculé sécable : la substance active est
Paroxétine base 20,00 mg
sous forme de chlorhydrate de paroxétine anhydre
pour un comprimé pelliculé sécable.

Les autres composants sont : mannitol, cellulose microcristalline, sodique (type A), silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium. Pelliculage : hypromellose, talc, dioxyde de titane (E 171).

Excipient à effet notoire : mannitol

1. QU'EST CE QUE TRE-ZEN® 20 mg, comprimé pelliculé se

UTILISÉ ?

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE : Antidépresseur / inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la norepinephrine. Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Existe en boîte de 15 et de 30 comprimés.

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- Des épisodes dépressifs majeurs, c'est-à-dire caractérisés.
 - De la prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie.
 - Des troubles obsessionnels compulsifs.
 - Du trouble de l'anxiété sociale caractérisé «phobies sociales» lorsqu'il perturbe de manière importante les activités professionnelles ou sociales.
 - Du stress post-traumatique
 - De l'anxiété généralisée, évoluant depuis au moins 6 mois.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE TRE-ZEN® 20 mg, comprimé pelliculé sécable:

Ne pas prendre TRE-ZEN® comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- Allergie connue à la paroxétine ou à l'un des excipients,
 - Enfants de moins de 15 ans,
 - Association avec certains médicaments antidépresseurs de type IMAO (nialamide, iproniazide, moclémide, toloxatone).

Toutefois, si votre médecin juge indispensable de vous prescrire l'association de la paroxétine avec la toloxatone ou le moclobémide, (IMAO A), vous devez être hospitalisé pour une surveillance de quelques jours.

- En cas d'allaitement sauf avis contraire de votre médecin.
 - Prendre des précautions particulières avec TRE-ZEN® 20mg, comprimé pelliculé sécable :

Mises en garde:

Comme avec tous les antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin.

Dans certains cas, une accentuation de l'anxiété ou une angoisse peuvent survenir. Il faut consulter immédiatement votre médecin.

L'absorption d'alcool ou de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.
La prise concomitante de millepertuis nécessite une surveillance clinique régulière, les effets

Le trouble anxiété sociale «phobies sociales» n'est pas une timidité excessive, mais un trouble caractérisé notamment par l'évitement ou la peur perturbant de manière importante les activités courantes ou normales entraînant une souffrance majeure.

professionnelles ou sociales.

Précautions d'emploi :
Revenez votre médecin en cas de :

- Prévenez votre médecin en cas de :

 - Insomnie ou nervosité en début de traitement,
 - Insuffisance rénale ou insuffisance hépatique grave,
 - Epilepsie ou antécédent d'épilepsie, la survenue de crises convulsives, impose l'arrêt du traitement,
 - Glaucome,
 - Antécédent d'anomalies de la coagulation ou traitement par des médicaments pouvant augmenter le risque de saignement (anticoagulant, certains anti-inflammatoires, aspirine...).

Grossesse :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement :

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement. En cas d'absence d'autre solution thérapeutique, il convient de suspendre le traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Digitized by srujanika@gmail.com

TRE-ZEN®

Chlorhydrate de paroxétine

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute ou si vous avez des symptômes identiques, contactez votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit pour traiter les symptômes suivants :

en cas de symptômes identiques, car cela pourrait être une réaction indésirable.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la consulter à l'avenir.

COMPOSITION :

Comprimé pelliculé sécable : la substance active est la paroxétine base.....20,00 mg sous forme de chlorhydrate de paroxétine anhydre pour un comprimé pelliculé sécable.

Les autres composants sont : mannitol, cellulose microcristalline, croscarmellose sodium (type A), silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Pelliculage : hyproméllose, talc, dioxyde de titane (E 171).

Excipient à effet notable : mannitol.

1. QU'EST CE QUE TRE-ZEN® 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE : Antidépresseur / inhibiteur de la recapture de la sérotonine.

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable.

Existe en boîte de 15 et de 30 comprimés.

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- Des épisodes dépressifs majeurs, c'est-à-dire caractérisés par une perte de plaisir.

- De la prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie.

- Des troubles obsessionnels compulsifs.

- Du trouble de l'anxiété sociale caractérisé «phobies sociales» lorsqu'il perturbe de manière importante les activités professionnelles ou sociales.

- Du stress post-traumatique.

- De l'anxiété généralisée, évoluant depuis au moins 6 mois.

2. INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE TRE-ZEN® 20 mg, comprimé pelliculé sécable :

Ne pas prendre TRE-ZEN® comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- Allergie connue à la paroxétine ou à l'un des excipients,

- Enfants de moins de 15 ans,

- Association avec certains médicaments antidépresseurs de type IMAO (nialamide, iproniazide, moclobémide, toloxatone).

Toutefois, si votre médecin juge indispensable de vous prescrire l'association de la paroxétine avec la toloxatone ou le moclobémide, (IMAO A), vous devez être hospitalisé pour une surveillance de quelques jours.

- En cas d'allaitement sauf avis contraire de votre médecin.

• Prendre des précautions particulières avec TRE-ZEN® 20mg, comprimé pelliculé sécable :

Mises en garde :

Comme avec tous les antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin.

Dans certains cas, une accentuation de l'anxiété ou une angoisse peuvent survenir. Il faut consulter immédiatement votre médecin.

L'absorption d'alcool ou de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

La prise concomitante de millepertuis nécessite une surveillance clinique régulière, les effets indésirables de la paroxétine pouvant être plus fréquents.

Le trouble anxiété sociale «phobies sociales» n'est pas une timidité excessive, mais un trouble caractérisé notamment par l'évitement ou la peur perturbant de manière importante les activités professionnelles ou sociales entraînant une souffrance marquée.

Précautions d'emploi :

Prévenez votre médecin en cas de :

- Insomnie ou nervosité en début de traitement,

- Insuffisance rénale ou insuffisance hépatique grave,

- Épilepsie ou antécédent d'épilepsie, la survenue de crises convulsives, impose l'arrêt du traitement,

- Glaucome,

- Antécédent d'anomalies de la coagulation ou traitement par des médicaments pouvant augmenter le risque de saignement (anticoagulant, certains anti-inflammatoires, aspirine...).

Grossesse :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement :

Le traitement par la paroxétine est déconseillé pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMBINAISON MEDICAMENTEUSE :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

4. EFFETS INDÉSIRABLES :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

5. FORME STATIONNAIRE :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

6. CONSERVATION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

7. RÉALISATION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

8. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

9. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

10. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

11. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

12. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

13. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

14. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

15. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

16. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

17. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

18. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

19. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

20. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

21. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

22. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

23. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

24. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

25. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

26. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

27. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

28. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

29. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

30. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

31. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

32. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

33. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

34. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

35. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

36. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

37. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

38. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

39. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

40. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

41. EXPÉDITION :

Il n'existe pas de recommandation officielle concernant l'utilisation de ce médicament en combinaison avec d'autres médicaments.

Si vous prenez d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Protadex®

Bicalutam

Protadex® 50 mg
28 comprimés pelliculés



0001041138

N° du Lot

Date Per.

P.P.V.:

183602

08/2021

449 DH 00



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour votre sécurité.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que PROTADEX® 50 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PROTADEX® 50 mg ?
3. Comment Prendre PROTADEX® 50 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PROTADEX® 50 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE PROTADEX® 50 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

PROTADEX® 50 mg, comprimé pelliculé est un anti-androgène.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est recommandé dans le traitement de certaines affections de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER PROTADEX® 50 MG ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Ne prenez jamais PROTADEX® 50 MG

- Si vous êtes une femme ou un enfant.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bicalutamide ou à l'un des autres composants de ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6 « Que contient PROTADEX® 50 mg »).

Avertissements et précautions

- Si vous avez des problèmes hépatiques (foie). Votre médecin peut demander la réalisation de tests sanguins avant et pendant votre traitement par PROTADEX®.
- Veillez prévenir votre médecin si vous avez une maladie cardiaque ou des problèmes de vaisseaux sanguins y compris des troubles du rythme cardiaque (arythmie) ou vous êtes traité avec des médicaments pour ces pathologies. Le risque de troubles du rythme cardiaque peut être augmenté avec l'utilisation de PROTADEX®.

Faites attention avec PROTADEX® 50 MG, comprimé pelliculé.

Prise d'autres médicaments

Autres médicaments et PROTADEX® 50 MG

Autres médicaments et PROTADEX® 50 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris un médicament obtenu sans ordonnance ou l'un

Protadex®

Bicalutam

Protadex® 50 mg
28 comprimés pelliculés



0001041138

N° du Lot

Date Per.

P.P.V.:

183602

08/2021

449 DH 00



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour votre sécurité.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que PROTADEX® 50 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PROTADEX® 50 mg ?
3. Comment Prendre PROTADEX® 50 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PROTADEX® 50 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE PROTADEX® 50 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

PROTADEX® 50 mg, comprimé pelliculé est un anti-androgène.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est recommandé dans le traitement de certaines affections de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER PROTADEX® 50 MG ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Ne prenez jamais PROTADEX® 50 MG

- Si vous êtes une femme ou un enfant.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bicalutamide ou à l'un des autres composants de ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6 « Que contient PROTADEX® 50 mg »).

Avertissements et précautions

- Si vous avez des problèmes hépatiques (foie). Votre médecin peut demander la réalisation de tests sanguins avant et pendant votre traitement par PROTADEX®.
- Veillez prévenir votre médecin si vous avez une maladie cardiaque ou des problèmes de vaisseaux sanguins y compris des troubles du rythme cardiaque (arythmie) ou vous êtes traité avec des médicaments pour ces pathologies. Le risque de troubles du rythme cardiaque peut être augmenté avec l'utilisation de PROTADEX®.

Faites attention avec PROTADEX® 50 MG, comprimé pelliculé.

Prise d'autres médicaments

Autres médicaments et PROTADEX® 50 MG

Autres médicaments et PROTADEX® 50 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris un médicament obtenu sans ordonnance ou l'un

Protadex®

Bicalutam

Protadex® 50 mg
28 comprimés pelliculés



0001041138

N° du Lot

Date Per.

P.P.V.:

183602

08/2021

449 DH 00



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour votre sécurité.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que PROTADEX® 50 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PROTADEX® 50 mg ?
- Comment Prendre PROTADEX® 50 mg ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver PROTADEX® 50 mg ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE PROTADEX® 50 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

PROTADEX® 50 mg, comprimé pelliculé est un anti-androgène.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est recommandé dans le traitement de certaines affections de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER PROTADEX® 50 MG ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Ne prenez jamais PROTADEX® 50 MG

- Si vous êtes une femme ou un enfant.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bicalutamide ou à l'un des autres composants de ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6 « Que contient PROTADEX® 50 mg »).

Avertissements et précautions

- Si vous avez des problèmes hépatiques (foie). Votre médecin peut demander la réalisation de tests sanguins avant et pendant votre traitement par PROTADEX®.
- Veillez prévenir votre médecin si vous avez une maladie cardiaque ou des problèmes de vaisseaux sanguins y compris des troubles du rythme cardiaque (arythmie) ou vous êtes traité avec des médicaments pour ces pathologies. Le risque de troubles du rythme cardiaque peut être augmenté avec l'utilisation de PROTADEX®.

Faites attention avec PROTADEX® 50 MG, comprimé pelliculé.

Prise d'autres médicaments

Autres médicaments et PROTADEX® 50 MG

Autres médicaments et PROTADEX® 50 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris un médicament obtenu sans ordonnance ou l'un

Coeliochirurgie urologique

Chirurgie urologique adulte et enfant

Cancerologie urologique

Chirurgie de l'incontinence urinaire

Traitemet de la prostate par laser green light

Traitemet des calculs urinaires au laser holmium

Enuresie chez l'enfant

Circoncision

Sterilité masculine - AMP

Impuissance sexuelle

Chirurgie des hernies chez l'adulte et l'enfant

عضو الجمعية الاوروبية و الفرنسية لجراحة الكلى

فحص و جراحة الكلى و المسالك البولية بالمنظار

عند الكبار و الأطفال

تفتيت حصى الكلى و المسالك البولية

بأشعة الميوم ليزر

جراحة البروستات بأشعة غرين لايت

علاج العقم و العجز الجنسي عند الرجال

علاج الأمراض التناسلية

علاج التبول الارادي عند الأطفال

جراحة الفتقة عند الكبار والأطفال

Casablanca, le :

NFS - Plaquettes

Unée - Crétinine

Glycémie à jeûn

HbA1c

TP - TCK

Groupage ABO/Rhesus

Cholesterol Total + HDL - LDL

Triglycerides

Transaminases SGOT/SGPT

Acide Urique

Ionogramme Sanguin

Feritine

Vit D

TSH - T3 - T4

CRP

VS

Serologie Hepatite C / B

Micro Albuminurie

UBC

PSA total PSA libre

Rapport

Testosterone totale

Testosterone biodisponible

Testosterone libre

FSH LH

ECBU - ATB eventuel

P. Urethral + ATB eventuel

Spermogramme

Spermoculture

Spermocytogramme

Prélèvement Vaginal

Troponine

Dr. SAADALLAH Khalid
Chirurgien Urologue
101, Angle Bd Abdelmoumen
et Bd Anoual - Casablanca
Tél : 05 22 86 33 99 - 05 22 86 59 91 - Urgence : 06 62 33 64 36 - 06 61 80 87 64

Chirurgien Urologue

Coeliochirurgie urologique

Chirurgie urologique adulte et enfant

Cancerologie urologique

Chirurgie de l'incontinence urinaire

Traitemet de la prostate par laser green light

Traitemet des calculs urinaires au laser holmium

Enuresie chez l'enfant

Circoncision

Sterilité masculine - AMP

Impuissance sexuelle

Chirurgie des hernies chez l'adulte et l'enfant

عضو الجمعية الاوروبية و الفرنسية لجراحة الكلي

فحص و جراحة الكلي و المسالك البولية بالمنظار

عند الكبار والأطفال

تفتيت حصى الكلي و المسالك البولية

بأشعة الليزر

جراحة البروستات بأشعة غرين لait

علاج العقم و العجز الجنسي عند الرجال

علاج الأمراض التناسلية

علاج التبول الإلارادي عند الأطفال

جراحة الفتق عند الكبار والأطفال

Casablanca, le :

30 Oct. 2013

Mr iraqi housseyni med

Compte rendu d'échographie

Rein droit : De taille normale, contour régulier

Bonne différenciation cortico-sinusale pas

De dilatation des CPC ni de lithiase

Rein gauche : de taille normale, contour régulier

Bonne différenciation cortico-sinusale pas

De dilatation des CPC ni de lithiase

Vessie : paroi non épaisse, contenu transsonore.



Dr. SAADALLAH Khalid
Chirurgien Urologue
101, Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual - Casablanca
Tél.: 05 22 86 33 99

Dr SAADALLAH Khalid

الدكتور سعد الله خالد

Chirurgien Urologue

جراحة الكلى

و المسالك البولية و التناسلية

Coeliochirurgie urologique

عضو الجمعية الاوربية و الفرنسية لجراحة الكلى

Chirurgie urologique adulte et enfant

فحص و جراحة الكلى و المسالك البولية بالمنظار

Cancerologie urologique

عند الكبار والأطفال

Chirurgie de l'incontinence urinaire

تفتيت حصى الكلى و المسالك البولية

Traitemet de la prostate par laser green light

بأشعة الليزر

Traitemet des calculs urinaires au laser holmium

جراحة البروستات بأشعة غرين لايت

Enuresie chez l'enfant

علاج العقم و العجز الجنسي عند الرجال

Circoncision

علاج الأمراض التناسلية

Sterilité masculine - AMP

علاج التبول الإلارادي عند الأطفال

Impuissance sexuelle

جراحة الفتق عند الكبار والأطفال

Chirurgie des hernies chez l'adulte et l'enfant

Casablanca, le :

30 OCT. 2019

FACTURE

Nom : iraqi housseyni med

CONSULTATION :200DH

ECHOGRAPHIE:500DH

Dr SAADALLAH Khalid
Chirurgien Urologue
101, Angle Bd Abdelmoumen
et Bd Anoual - Casablanca
Tel.: 05 22 86 33 99

زاوية شارع عبد العؤمن و شارع أنوال عماره عبد العؤمن سانتر فوق مقهي سيزان الطابق الأول رقم 101 - الدار البيضا.

452 Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual - Res. Abdelmoumen centre au dessus du café seazen,
1^{er} étage N° 101 - Casablanca Tél . : 05 22 86 33 99 - 05 22 86 59 91 - Urgence : 06 62 33 64 36 - 06 61 80 87 64



CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA

مختبر التحاليل الطبية

Laboratoire de Biologie Médicale

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - P.M.A.



د. هشام الوزاني التهامي

Dr. Hicham OUAZZANI TOUHAMI

Pharmacien Biologiste

Ancien interne et Attaché au C.H.U. de Montpellier
D.U. de Fertilité Humaine de la Faculté de Médecine
de Montpellier - D.U. d'Assurance Qualité de la Faculté
de Pharmacie Paris V

Dossier ouvert le : 21-10-2019

Prélevé le : 21-10-2019

Édité le : 21-10-2019



ACCREDITATION N° 8-4177
Portées disponibles
sur www.cofrac.fr

Seuls les résultats identifiés
par le symbole [AC] sont couverts
par l'accréditation

Mr IRAKI Housseyni Mohamed

Réf dossier: 19102376

DR Khalid SAADALLAH
AG BD ABDELMOUHEN ET BD ANOUAL
CASABLANCA

Page N° : 1 / 1

	Valeurs références	Antériorités
MARQUEURS Echantillon sérique		
PSA total (Technique chimiluminescence)	05-08-2019 0.010 ng/mL (0.000-4.000)	0.032

PSA total

Date	Value (ng/mL)
06-08-18	0.15
12-11-18	0.09
11-02-19	0.09
02-05-19	0.06
05-08-19	0.03
21-10-19	0.01

Prélèvement à domicile sur rendez-vous

394, Bd. Zerkouni - Resd. Le Casablanca - Bourgogne - 20040 Casablanca Tél.: 05 22.27.48.96 / 05 22.47.29.46 / 06 61.79.86.18 - Fax : 05 22.27.49.13
E-mail : labocbc@gmail.com - Site web : www.laboratoirecbc.com - INP : 093001006 - Patente : 35405458 - C.N.S.S. : 6368949 - IF: 40110273 - ICE: 001699292000019

CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA
Dr. Hicham OUAZZANI TOUHAMI
394, Bd. Zerkouni - Resd. Le Casablanca
Tél: 05 22 27 45 95 - Fax: 05 22 27 49 13

Dr. Ouazzani