

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-416890

par post

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) 4184 Matricule : 4184 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre : HASSOUNI Khamar

Nom & Prénom : HASSOUNI Khamar Date de naissance : 24/05/1936

Adresse : 25 Rue de l'Orangerie Agadir Tél. : 0661178010 Total des frais engagés : 130000

Cadre réservé au Médecin **Dr. EL BAROUDI Saad**
 Cachet du médecin :

Date de consultation : _____ Nom et prénom du malade : _____ Age : _____

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Opération chirurgicale

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : _____

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Agadir Le : 17/10/11

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie

N° W19-416890

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 4184

Nom de l'adhérent(e) : Hassouni

Total des frais engagés : _____

Date de dépôt : _____

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXÉCUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p>CHLYAH SIDI PHARMACIE MUSLIM (PP) R. LAMMOURI EL ROUAI 33 SASSI MARRAKECH Tél : 0524 32 11 11 PC : 98881 - Pacifi : 23099037</p> <p>683</p>	17/10/19	410,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Prénom et Nom du patient	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. AGUILERA M. M. - 20, Rue Turgot - 75003 Paris	18.10.19	Fr. 650	600,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. EL BAROUDI Saad

Chirurgien Urologue

■ Spécialiste en Andrologie

■ Ancien Chef de Clinique Hôpital Necker Paris.

Spécialiste en Chirurgie :des Reins,
Vessie, Prostate (Laser).

Sterilité du Couple - Impuissance Sexuelle

PRP (plasma riche en plaquettes)



الدكتور سعد البارودي

■ اختصاصي في جراحة و أمراض الكلى
و المساك البولية.

■ خريج كلية الطب ديكارت باريس

اختصاصي في علاج الضعف
الجنسى و العقم.

الجراحة بالمنظار و الليزر

العلاج بالصفائح الدموية (PRP)

Agadir Le : ٢٢ / ١٥ / ١٩.

نر ٤٨ Ichamou, Hassan.

١٥٩١٣٦ ⑥ Floral ١٥ - ٦

٨٧٦٦٣٣٣٣٣٣٣

٩٥١٣ ⑦ Ag. Hmz ٦٦١٦١٦٣

٨٩١٥٥ ⑧ Dr. El Baroudi Saad
Dr. EL BAROUDI Saad
CHIRURGIEN
Ag. ٢٩ Février Talborjt AGADIR
Tél. ٠٥ ٢٨ ٨٢ ٧٤ ٧٤

٨١١٥٥ ⑨ Dr. El Baroudi Saad
Dr. EL BAROUDI Saad
CHIRURGIEN
Ag. ٢٩ Février Talborjt AGADIR
Tél. ٠٥ ٢٨ ٨٢ ٧٤ ٧٤

33 Bis Rue de l'entraide Nationale (Près Agadir Bureau) -Talborjt Agadir

33 مكرر زنقة التعاون الوطني قرب أكادير مكتب - تالبورجت أكادير

06 66 01 80 86 05 28 82 02 89 baroudi.saad@gmail.com

CONSUMMÉ

REF. 317MA

pré 18341 1020

PER

LOT

Prix

89,50



TYARA® 20 mg

Comprimé pelliculé
Boîte de 1 et de 4
Tadalafil

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela peut nocir.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez quelque chose de suspect, contactez votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Tadalafil (DCI) Q.S.P. 1 Comp
Excipients 6 118000 121213

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE

Lactose

Classe pharmaco-thérapeutique

Urologiques, médicaments utilisés dans la dysfonction érectile.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

TYARA® est un traitement pour les hommes adultes souffrant de dysfonction érectile ; c'est-à-dire quand un homme ne peut atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle. Il a été montré que TYARA® améliorait significativement la capacité à obtenir une érection ferme du pénis nécessaire à une activité sexuelle. TYARA® contient une substance active, le Tadalafil, qui appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs sélectifs de la phosphodiésterase type 5 (PDE5). Ces stimulants sexuels TYARA® agit en aidant la relaxation des vaisseaux sanguins de votre pénis, favorisant ainsi l'afflux sanguin. Il en résulte une amélioration de l'érection. TYARA® ne vous aidera pas si vous n'avez pas de problème d'érection. Il est important de savoir que TYARA® n'agit pas s'il n'y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour votre problème d'érection.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Les comprimés de TYARA® sont destinés à être utilisés par voie orale chez les hommes uniquement. Avez-vous le comprimé en état d'érection ? Les doses recommandées sont d'un comprimé à 10 mg et d'un comprimé à 20 mg pour l'activité sexuelle. Toutefois, votre médecin vous prescrira une dose de 20 mg après avoir décidé que l'effet de la dose recommandée de 10 mg était trop faible dans votre cas. Vous pouvez prendre un comprimé de TYARA® au moins 30 minutes avant l'activité sexuelle. TYARA® peut rester efficace jusqu'à 36 heures après la prise du comprimé. Ne prenez pas TYARA® plus d'une fois par jour. La prise de TYARA® 10 mg ou 20 mg se fait avant l'activité sexuelle. L'utilisation quotidienne prolongée de TYARA® 10 mg et 20 mg est déconseillée. Il est important de savoir que TYARA® n'agit pas s'il n'y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour les troubles de l'érection. La prise d'alcool peut affecter votre capacité à obtenir une érection et diminuer temporairement votre pression artérielle. Si vous avez pris ou si vous envisagez de prendre TYARA®, évitez de boire de l'alcool de façon excessive (concentration alcoolique sanguine de 0,08 % ou plus), ceci pouvant augmenter le risque de sensations de vertiges lors du passage à la position debout.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie orale

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne prenez jamais TYARA® si vous :

- Êtes allergique au Tadalafil ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Prenez des médicaments qui contiennent comme substances des dérivés nitrés ou des donneurs de monoxyde d'azote comme le nitrite d'amyle sous quelque forme que ce soit. Ce groupe de médicaments (« les dérivés nitrés ») est utilisé



». Il a été
prenez des
prévenez
ardiaque au
ix derniers
blée.
le optique
« accidents

en artérielle
les artères
ue (HTCP)
as due à la
bours des
édicament
médicin.
DE VOTRE

culés EST
URANT LA
prendre le

- un grave problème de reins.
- L'efficacité de TYARA® n'est pas connue chez les patients ayant subi :
 - une intervention chirurgicale pélvienne.
 - une ablation partielle ou totale de la prostate avec section des bandelettes nerveuses de la prostate (prostatectomie radicale sans conservation des bandelettes nerveuses).
- En cas de diminution ou de perte soudaine de la vision, vous devez arrêter votre traitement par TYARA® et contacter immédiatement votre médecin.
- TYARA® n'est pas indiqué chez les femmes.

Enfants et adolescents

TYARA® n'est pas prescrit chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. EN CAS DE DÉTOURNEMENT NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ne prenez pas TYARA® si vous prenez un traitement à base de dérivés nitrés. L'activité de certains médicaments peut être altérée par TYARA®. Ces médicaments peuvent altérer l'efficacité de TYARA®. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes déjà traité par :

- un alpha-bloquant (médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle ou les symptômes urinaires associés à une hypertrrophie bénigne de la prostate).
- d'autres médicaments pour traiter l'hypertension artérielle.
- du ricinolat.
- un inhibiteur de la 5-alpha réductase (utilisé pour traiter l'hypertrrophie bénigne de la prostate).
- d'autres médicaments tels que le kétocozaole en comprimés (pour traiter les mycoses) et des inhibiteurs de protéases pour le traitement du SIDA ou du VIH.
- du phénobarbital, de la phényletoïne et de la carbamazépine (médicaments anticonvulsivants).
- de la rifampicine, de l'érythromycine, de la clarithromycine ou de l'itraconazole.
- d'autres traitements de la dysfonction érectile.

TYARA® avec boissons et de l'alcool

Les informations sur les effets de l'alcool sont rapportées ci-dessus. Le jus de pamplemousse peut altérer l'efficacité de TYARA® et donc être pris avec précaution. Si vous souhaitez plus d'informations, parlez-en avec votre médecin.

GROSSESSE – ALLAITEMENT

Ce médicament n'a pas d'indication chez la femme.

Une diminution de la production de sperme a été observée chez des chiens traités. Cette diminution a été observée chez certains hommes. Il est peu probable que ces effets entraînent une baisse de la fertilité.

EFFECTS SUR LA CAPACITE DE CONDUIRE DES VEHICULES OU D'UTILISER DES MACHINES

Des sensations vertigineuses ont été rapportées au cours des études cliniques chez des hommes prenant TYARA®. Vérifiez attentivement la façon dont vous réagissez sous TYARA® avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de TYARA®, comprime enrobé que vous n'auriez dû : Aucune conséquence grave n'a été rapportée après la prise d'un trop grand nombre de comprimés de TYARA®, comprime enrobé.

Des sujets sains ont reçu des doses uniques allant jusqu'à 500 mg et des patients atteints de dysfonction érectile ont reçu des doses multiples allant jusqu'à 100 mg par jour. Les effets indésirables ont été similaires à ceux observés avec des doses plus faibles.

En cas de surdosage, les mesures habituelles de traitement symptomatique doivent être entreprises en fonction de l'état clinique. L'élimination du Tadalafil par l'urématose est très faible.

CONDUITE A TENIR AU CAS QU'L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE

Sans Objet.

Liste I

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à 30 °C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Etablissement Pharmaceutique Industriel titulaire de l'AMM au maroc et fabricant :

APOLYMÉDIC

Rue Amyot Inville, Quartier Arsalane
Casablanca-Maroc

Dr. M. HOUABCHI - Pharmacien Responsable

DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE : Décembre 2017

système genito-urinaire et hormones sexuelles.

FLOTRAL® est indiqué dans le :

- Traitement des symptômes fonctionnels de l'hypertrophie bénigne de la prostate.
- Traitement adjuvant au sondage vésical dans la rétention aiguë d'urine liée à l'hypertrophie bénigne de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée?

Si vous avez pris plus de FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

En cas de surdosage, le malade sera hospitalisé et maintenu en position allongée. Un traitement classique de l'hypotension sera institué.

Du fait de sa fixation protéique élevée, l'alfuzosine est difficilement dialysable.

Si vous oubliez de prendre FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée :

FLOTRAL®
Alfuzosine

30 Comprimés à
Libération Prolongée

10 mg

FLOTRAL® 10 mg
30 comprimés à
libération Prolongée
Voie orale



6 118 001 300 150

FLOTRAL®
Alfuzosine

10 mg

30 Comprimés à
Libération Prolongée
Voie orale

AZITHRIX 500 mg, comprimé

DCI : azit

Veuillez lire attentivement l'intégralité du médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avis si vous avez toute autre question, si d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien vous a été personnellement donné. Ce médicament vous a été donné à quelqu'un d'autre, même en cas de lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez le faire savoir à votre pharmacien.

1. Composition du médicament :

Composition qualitative et quantif de prise :

Azithromycine : 500 mg par comprimé dihydraté.

Composition qualitative en excipients

Phosphate de calcium anhydre dibasic, amidon glycolaté de sodium, stéarate o. blanc.

Excipients à effet notoire :

Sans objet.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Ce médicament est un antibiotique antibactérien de la famille des macrolides.

3. Indications thérapeutiques :

Il est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles.

4. Posologie :

Mode d'administration :

Voie orale.

Prendre le comprimé avec un verre d'eau.

Les comprimés peuvent être pris pendant ou en dehors des repas, en une seule prise par jour.

Durée du traitement :

La durée du traitement est de :

- 3 jours pour le traitement de certaines angines et des infections bucco-dentaires,
- 5 jours pour le traitement des bronchites.

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé. La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri.

L'éventuelle impression de fatigue, n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison. Fréquence d'administration :

Suivez ces instructions à moins que votre médecin ne vous ait donné d'autres indications. Pensez à ne pas oublier de prendre votre médicament. Votre médecin vous indiquera la durée du traitement de Azithrix 500 mg, comprimé pelliculé.

Ne suspendez pas le traitement avant son terme puisqu'il existe un risque de rechute de la maladie.

5. Contre-indications :

Ne prenez jamais Azithrix 500 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à ce médicament, à l'érythromycine, à tout autre antibiotique macrolide, au kétolide ou à tout excipient mentionné dans la composition,
- en cas d'association avec la dihydroergotamine et l'ergotamine (médicaments antimigraineux),
- en cas d'association avec la cimétidine (médicament contre les reflux).

TECNIMEDA GROUP

AZITHRIX® 500 mg

3 comprimés pelliculés



et précautions particulières d'emploi :

• 500 mg, comprimé pelliculé :

lent du visage ou du cou (œdème) ou une impénétration de cloques sur la peau, l'irritation des yeux, VOUS DEVEZ ARRÉTER D'ACTER VOTRE MEDECIN IMMÉDIATEMENT si votre vie en danger ou entraîner le décès.

tre peau un symptôme correspondant à une autre effet associé, une coloration jaune des urines, une tendance aux saignements, une perte de conscience ou de votre comportement, la vérité, de myasthénie (maladie auto-immune principalement par une faiblesse musculaire) ou que, prévenez votre médecin immédiatement, si vous arrêtez votre traitement et le remplacer

ant, prévenez votre médecin si à l'occasion d'une de vos symptômes, vous avez présenté une urticaire ou autres angoisse, œdème de Quincke (brusque et éphémère, d'origine allergique).

ment, prévenez votre médecin en cas de :

re, l'intervalle QT (anomalie observée, sur une autre, mais pas nécessairement la cause),

- hypokaliémie, hypomagnésémie (baisse du potassium ou du magnésium dans le sang),
- bradycardie, arythmie cardiaque, insuffisance cardiaque grave,
- traitement concomitant avec des traitements allongeant l'intervalle QT, notamment certains médicaments antiarythmiques (ex : quinidine, amiodarone, sotalol), les antipsychotiques (ex : phénothiazines, pimozide), les antidépresseurs tricycliques (ex : citalopram) ou encore d'autres antibiotiques (ex : moxifloxacine, lénofloxacine).

8. Interactions :

Interactions avec d'autres médicaments :

Ce médicament est contre-indiqué en association avec la dihydroergotamine, l'ergotamine, le cisapride et la colchicine (voir « Contra-indication »).

Afin d'éviter d'éventuelles interactions avec plusieurs médicaments, et notamment la bromocriptine (médicament contre la montée de lait, contre la maladie de Parkinson), la cabergoline (médicament contre l'excès de prolactine-hormone provoquant la lactation), le pergolide (médicament indiqué dans le traitement de la maladie de Parkinson), le lisuride (médicament utilisé dans la maladie de Parkinson ou contre l'excès de prolactine-hormone provoquant la lactation), l'atorvastatine et la simvastatine (médicaments pour baisser le taux de cholestérol), la clofibrate (médicament immunosuppresseur), la digoxine (médicament utilisé dans certains troubles du cœur), les médicaments pouvant provoquer des torsades de pointe (trouble du rythme cardiaque) et les antivitamines K (médicament empêchant la coagulation du sang), il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

9. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant les trois premiers mois de la grossesse. A partir du début du 4^{ème} mois de la grossesse, ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.



CLINIQUE
Éditha

Le Docteur Saad Bazzouqi
Prie M. El K. Prince Bassam

D'accepter l'expression de ses sentiments
Distingués, et lui présente suivant l'usage,
sa note d'honoraires pour :

affection urologique

S'élevant à la somme de ... 300,00 Dhs

...AGADIR Le 17.10.2019

Réf :

~~Dr. EL BAROUDI Saad
CHIRURGIEN
1, Av du 29 Février Talborjt AGADIR
Tél 05 28 82 74 74~~

Dr. EL BAROUDI Saad

Chirurgien Urologue

■ Spécialiste en Andrologie

■ Ancien Chef de Clinique Hôpital Necker Paris.

Spécialiste en Chirurgie : des Reins, Vessie, Prostate (Laser).

Sterilité du Couple - Impuissance Sexuelle

PRP (plasma riche en plaquettes)

Dr. EL BAROUDI Saad
CHIRURGIEN
1. Av du 29 Février Talborj AGADIR
Tel 05 28 82 74 74



الدكتور سعد البارودي

■ اختصاصي في جراحة و امراض الكلية و المسالك البولية.

■ خريج كلية الطب ديكارت باريس

اختصاصي في علاج الضعف الجنسي و العقم.

الجراحة بالمنظار و الليزر

العلاج بالصفائح الدموية (PRP)

Agadir Le : 17/05/19

A° El Ichoumar Itanoum

diagnose : Prostatism

échographie : 2 reins normaux

de taille et de structure

= Normal

vescicule prosstigminale
normale et sans endommagement

Prostate : 90g

lésions : 50g

end : Echo B12 et endoscopy

33 Bis Rue de l'entraide Nationale (Près Agadir) Bureau Talborj Agadir
التعاون الوطني قرب أكادير مكتب - تالبورجت أكادير
06 66 01 80 86 05 28 82 02 89 batoudi.saad@gmail.com

Dr. EL BAROUDI Saad
CHIRURGIEN
1. Av du 29 Février Talborj AGADIR
Tel 05 28 82 74 74

Dr. EL BAROUDI Saad

Chirurgien Urologie

- **Spécialiste en Andrologie**
 - **Ancien Chef de Clinique Hôpital Necker Paris.**
 - **Spécialiste en Chirurgie :des Reins, Vessie,Prostate (Laser).**
 - **Sterilité du Couple - Impuissance Sexuelle**
 - **PRP (plasma riche en plaquettes)**



الدكتور سعد البارودي

- اختصاصي في جراحة و أمراض الكلى
 - و المسالك البولية.
 - خريج كلية الطب ديكارت باريس
 - اختصاصي في علاج الضعف الجنسي و العقم.
 - الجراحة بالمنظار و الليزر
 - العلاج بالصفائح الدموية (PRP)

Agadir Le : 17-10-19

Dr. EL BAROUDI Saad
CHIRURGIEN
1. AV du 29 Février Talborjt AGADIR
Tél 05 28 82 74 74

33 Bis Rue de l'entraide Nationale (Près Agadir Bureau) -Talborjt Agadir

33 مكرر زنقة التعاون الوطني قرب أكادير مكتب - تالبورجت أكادير

06 66 01 80 86 05 28 82 02 89 baroudi.saad@gmail.com

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES RIFKOUN

Tél : 028-84-48-84 - Fax : 028-84-48-89

ICE : 00153339000029 IF : 75744470 INP : 043001189

Agadir le 18 Octobre 2019

HASSOUNI KHAMMAR

FACTURE N° 05451019

Analyses :

Cotation en B

B 690

Prélèvements :

Sang

Pc 1,1

TOTAL DOSSIERS

600,00 DH

Dr. Abdellmjid RIFKOUN
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
20, Rue Tarabouliou (Q1) AGADIR
Tél: 05 28 84 48 84/05 28 84 48 89

مختبر التحاليل الطبية ريفكون

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES RIFKOUN

Dr. RIFKOUN Abdelmjid
Pharmacien Biogiste

Diplômé de la faculté de médecine et
pharmacie de Marseille
Ancien interne et attaché des hôpitaux et
des cliniques du sud de la France
Spécialisé en : Bactériologie, Biochimie, Hématologie, Parasitologie,
Mycologie, Virologie, Immunologie et Toxicologie

Dossier N° : 19J105B

Prélèvement effectué à 08:09

Docteur SAAD EL BAROUDI

CLINIQUE RAHMA - TALBORJT

AGADIR

Compte Rendu d'Analyses



الدكتور ريفكون عبد المجيد
صيدلي إحياءي

خريج جامعة الطب والصيدلة بمرسيليا
داخلي وملحق سابقا بمستشفيات جنوب فرنسا
إخلاصي في علم الدم ، الكيماء الإحيائية
البكتيريات الفروسات ، الطفيلييات والمناعة

Du : 18/10/19 - Edité le : 18/10/19

Monsieur HASSOUNI KHAMMAR

DDN : 1936

Page : 3/3



MARQUEURS TUMORAUX

Normales

ANTIGENE SPECIFIQUE DE LA PROSTATE (PSA totale)

(Technique ECL / COBAS 6000)

RESULTAT : 1,24 ng/ml

Interprétation

< 40 ans	: 0,21 - 1,72
40 à 49 ans	: 0,27 - 2,19
50 à 59 ans	: 0,27 - 3,42
60 à 69 ans	: 0,22 - 6,16
> 69 ans	: 0,21 - 6,77

LE LABORATOIRE EST OUVERT DE 7 H 30 À 19 H - PRELEVEMENT AU LABORATOIRE ET A DOMICILE
LABORATOIRE D'ANALYSE MÉDICALE
RIFKOUN
Dr. Abdellatif RIFKOUN
20, Rue Taraboulous (Q. I.) AGADIR
Tél. 05.28.84.48.84 / 05.28.84.48.89



Le Système de Management Qualité du
laboratoire d'analyses médicales RIFKOUN est désormais certifié



مختبر التحاليل الطبية ريفكون LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES RIFKOUN

Dr. RIFKOUN Abdelmjid
Pharmacien Biologiste

Diplômé de la faculté de médecine et
pharmacie de Marseille
Ancien interne et attaché des hôpitaux et
des cliniques du sud de la France
Spécialisé en : Bactériologie, Biochimie, Hématologie, Parasitologie,
Mycologie, Virologie, Immunologie et Toxicologie

Dossier N° : 19J105B

Prélèvement effectué à 08:09

Docteur SAAD EL BAROUDI

CLINIQUE RAHMA - TALBORJT

AGADIR



الدكتور ريفقون عبد المجيد
صيدلي إحياءي

خريج جامعة الطب والصيدلة بمرسيليا
داخلي وملحق سابقاً بمستشفيات جنوب فرنسا
اختصاصي في علم الدم ، الكيما ، الاحيائية
البكترات الفيروسات ، التفibrيلات والمناعة

Du : 18/10/19 - Edité le : 18/10/19

Monsieur HASSOUNI KHAMMAR

DDN: 1936



Page : 2/3

Compte Rendu d'Analyses

Normales

HEMOGLOBINE GLYQUEE (HB A1C)

(Technique : Chromatographie liquide haute performance (CLHP))

RESULTAT : **6,20** %

Interprétation

- Equilibre glycémique excellent
- Equilibre glycémique moyen
- Equilibre glycémique mauvais

UREE SANGUINE	:	0,41	g/l	0,1 - 0,5
	Soit :	6,80	mmol/l	1,7 - 8,3
CREATININE SANGUINE	:	8,0	mg/l	6 - 14
	Soit :	71	μmol/l	53 - 124
ACIDE URIQUE SANGUIN	:	83,0	* mg/l	25 - 70
	Soit :	494	μmol/l	149 - 417
CHOLESTEROL TOTAL	:	1,31	* g/l	1,5 - 2,2
	Soit :	3,38	mmol/l	3,86 - 5,67
TRIGLYCERIDES	:	2,30	* g/l	0,5 - 1,5
	Soit :	2,63	mmol/l	0,57 - 1,71

LABORATOIRE D'ANALYSE MÉDICALE
RIFKOUN
Dr. Abdelmajid RIFKOUN
20, Rue Tarabulus (Q. I.) AGADIR
Tel: 05.28.86.66.84 / 05.28.84.42.89



Le Système de Management Qualité du laboratoire d'analyses médicales **RIFKOUN** est désormais certifié

مختبر التحاليل الطبية ريفكون

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES RIFKOUN

Dr. RIFKOUN Abdelmajid
Pharmacien Biogiste

Diplômé de la faculté de médecine et
pharmacie de Marseille
Ancien interne et attaché des hôpitaux et
des cliniques du sud de la France
Spécialisé en : Bactériologie, Biochimie, Hématologie, Parasitologie,
Mycologie, Virologie, Immunologie et Toxicologie



الدكتور ريفكون عبد المجيد
صيدلي إحيائي

خريج جامعة الطب والصيدلة بمارسيليا
داخلي وملحق سابقا بمستشفيات جنوب فرنسا
إخصاصي في علم الدم ، الكيماء الإحيائية
البكتيريات الفروسات ، الطفيلييات والمناعة

Dossier N° : 19J105B

Prélèvement effectué à 08:09

Docteur SAAD EL BAROUDI

CLINIQUE RAHMA - TALBORJT

AGADIR

Du : 18/10/19 - Edité le : 18/10/19

Monsieur HASSOUNI KHAMMAR

DDN : 1936

Page : 1/3



Compte Rendu d'Analyses

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE

NUMERATION GLOBULAIRE

					Normales
GLOBULES BLANCS	:	7 720	/mm ³		4000 - 10000
GLOBULES ROUGES	:	4,99	10 ⁶ /mm ³		4,5 - 5,8
HEMOGLOBINE	:	15,20	g/100 ml		13 - 17
HEMATOCRITE	:	44,40	%		40 - 53
- VGM	:	89,00	μ ³		80 - 100
- TGMH	:	30,50	pg		27 - 32
- CCMH	:	34,20	%		32 - 36

FORMULE LEUCOCYTAIRE

POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES	:	58,2	%	4 493	/mm ³	1500 - 7000 /mm ³
POLYNUCLEAIRES EOSINOPHILES	:	2,6	%	201	/mm ³	100 - 400 /mm ³
POLYNUCLEAIRES BASOPHILES	:	0,4	%	31	/mm ³	< 100 /mm ³
LYMPHOCYTES	:	28,4	%	2 192	/mm ³	1000 - 4000 /mm ³
MONOCYTES	:	10,4	*	803	/mm ³	200 - 1000 /mm ³

NUMERATION DES PLAQUETTES

PLAQUETTES	:	149 000	*	/mm ³	
					150000 - 400000

BIOCHIMIE

				Normales
GLYCEMIE A JEUN	:	1,43	*	g/l
Soit :		7,90		mmol/l

0,7 - 1,1

3,9 - 6,1



Le Système de Management Qualité du
laboratoire d'analyses médicales RIFKOUN est désormais certifié





El Khamar Hassouni

