

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

A

Matricule : **4527**

Société : **RAM**

Actif Pensionné(e)

Autre : **Retraité**

Nom & Prénom : **HAFIDI**

Abdellatif

Date de naissance :

19/07/56

Adresse :

**39 LOT AIN DIAB II ANFA
CASABLANCA**

Tél. :

0661.194676 Total des frais engagés : **1213,9 DHS**

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je
avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
Fait à : **CASABLANCA** Le : **15/11/19**

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29 OCT 2019	Erg	1	25000	INP : <input type="text"/> Docteur NAHALI Aissa Spécialiste Pédiatre Bab Saba à BANDAR Littoral Casablanca 0522851111

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
HARMACIE CHAMA Dr. KHARBOUCH Malika 92, Rue Al Iddarissa Casablanca Maroc Tél: 05 22 70 36 59	29-10-19	143,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE BERRADA Angle de la rue Hassan II et Route d'Almouzine - CASABLANCA Tel: 02.90.00.77 - Fax: 02.90.09.77	30/10/2019	B. N. M. P. A. S. H.	120.00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)



ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

Docteur NAHA Lahsen

Spécialiste Pédiatre

Diplômé d'assistant étranger des maladies neurologiques

et électro-encéphalographie de l'Université de Paris

Membre de la société Française de neurologie pédiatrique

Membre de la ligue Française contre l'épilepsie

Sur Rendez-vous

الدكتور النها لحسن

إختصاصي في أمراض الأطفال والرضيع

حائز على دبلوم أمراض الأعصاب

و تخطيط الدماغ من جامعة باريس

عضو بالمنظمة الفرنسية لعلاج أمراض الصرع

بالموعد

Casablanca, le :

28/11/18

HAFSI Mame

(1) Hafsi Bz 1720
64,10 Mar 5w / X
Amin Sx
19,10 APR 2018
A.S.

(2) Hafsi Bz 1720
64,10 Mar 5w / X
Amin Sx
19,10 APR 2018
A.S.

(3) Hafsi Bz 1720
64,10 Mar 5w / X
Amin Sx
19,10 APR 2018
A.S.

(4) Hafsi Bz 1720
64,10 Mar 5w / X
Amin Sx
19,10 APR 2018
A.S.

PHARMACIE CHAMAH
SIDI MOUENNA AL Adarousa
Casablanca
Tél. : 05 22 70 36 00

Docteur NAHA Lahsen
Spécialiste Pédiatre
111, Rue Sebta R-BANDAR
Q. des Hôpitaux Casablanca
Tél. : 0522864626 / 0522861111

111, Rue Sebta Résidence «BANDAR» Quartier des Hôpitaux - Casablanca

Tél. : 05 22 86 46 26 / 05 22 86 11 11

Maxilase®

MAUX DE GORGE

ADULTE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP

comprimé enrobé

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent, au delà de 5 jours, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avise de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé
3. Comment prendre MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé
6. Informations complémentaires

1. QU'EST-CE QUE MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe Pharmacothérapeutique

ENZYMES A VISEE ANTI-INFLAMMATOIRE.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé dans le cas suivant :

- Antécédents d'allergie à l'alpha-amylase ou à l'un des composants du comprimé.

Faites attention avec MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé :

Mises en garde spéciales

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares). L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110, jaune orangé 5) et peut provoquer des réactions allergiques.

Précautions d'emploi

Il existe une forme sirop plus adaptée à l'enfant.

En cas de survenue de signes généraux d'infection comme : fièvre élevée (> 38,5°) et persistante (plus de 3 jours), apparition d'autres symptômes comme : maux de gorge ou de tête importants, nausées, vomissements, douleurs ou écoulement de l'oreille, douleur de la face,

- persistance des symptômes sans amélioration au delà de 5 jours.

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN

EN CAS D'DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de la poursuite.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Liste des excipients à effet notable : jaune orangé S (E110), saccharose, lactose.

3. COMMENT PRENDRE MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé

Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

1 comprimé 3 fois par jour au cours des repas.

Mode d'administration

Vole orale.

Avaler le comprimé, sans le croquer, avec un verre d'eau.

Durée de traitement

Ne prolongez pas le traitement au-delà de 5 jours sans avis médical.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- En raison de la présence d'alpha-amylase, rares réactions d'allure allergique, généralement cutanées, en particulier urticaire et œdème de Quincke, dans ces cas, arrêtez le traitement.

• Possibilité de survenue d'une gêne respiratoire (bronchospasme).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure à 25°C. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé ?

La substance active est :

Alpha-amylase 3000 U. CEIP*

Pour un comprimé enrobé.

*Soft 2143 Unités Pharmaceutiques Européenne par comprimé. Une unité CEIP correspond à la quantité d'enzyme en mg qui catalyse l'hydrolyse de 1 mg d'amidon en 10 secondes dans les conditions du dosage.

Les autres composants sont :

Carmellose calcaire, povidone, acide stéarique, silice colloïdale anhydre, lactoglobuline lactose, gomme laque dédiée blanche, gomme arabique, saccharose, talc, dioxyde de titane (E171), jaune orangé S (E110), cire d'abeille blanche.

Qu'est-ce que MAXILASE MAUX DE GORGE ALPHA-AMYLASE 3000 U. CEIP, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur ?

MAXILASE se présente sous forme de comprimés enrobés (boîte de 24 comprimés sous plaquettes thermoforées).

Titulaire et exploitant

sanoft-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland

75104 Paris - France

Fabricant

Sanofi Winthrop Industrie

1, Rue de la Vierge,

Ambarès et Lagrave

33565 Carbon Blanc - France

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Novembre 2010.

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE :

En raison de l'origine principalement virale des pathologies pouvant engendrer des maux de gorge peu intenses et sans fièvre, des gestes simples sont à respecter, pour éviter de contaminer votre entourage, notamment :

- se laver les mains fréquemment
- se tenir à l'écart des personnes âgées et jeunes enfants (le port de masque est recommandé)
- éviter de fumer
- boire suffisamment
- se mouiller souvent avec des mouchoirs jetables
- humidifier la muqueuse nasale avec des solutions de lavage adaptées
- vivre dans des pièces dont l'atmosphère est humide (utilisation d'un humidificateur au besoin)
- aérer régulièrement la pièce

VOtre PHARMA

Bi

N'HESITEZ PAS

NE LAISSEZ JA

Distribué sous licence
par LAPROPHAN
21, rue des Oudaya
CASABLANCA - Maroc

580735

PPV:
60DH10

AXIMYCINE®

(Amoxicilline)

FORMES ET PRÉSENTATIONS

Comprimés dispersibles à 1 g	: Boîtes de 14 et 24 comprimés
Comprimés dispersibles à 500 mg	: Boîtes de 16 et 24 comprimés
Comprimés dispersibles à 250 mg	: Boîtes de 12 et 20 comprimés
Gélules à 500 mg	: Boîtes de 16 et 24 gélules
Granulés à 250 mg	: Boîte de 16 sachets
Poudre pour suspension à 250 mg et 500 mg	: Flacons de 12 doses et de 20 doses
Injectable à 250 mg, 500 mg	: Boîte unitaire
Injectable à 1 g	: Boîte unitaire et Boîte de 6

COMPOSITION

Comprimés dispersibles à 1 g

Amoxicilline 1,000 g (sous forme de trihydrate)
Excipient q.s.p 1 comprimé

Comprimés dispersibles à 500 mg

Amoxicilline 500 mg (sous forme de trihydrate)
Excipient q.s.p 1 comprimé

Comprimés dispersibles à 250 mg

Amoxicilline 250 mg (sous forme de trihydrate)
Excipient q.s.p 1 comprimé

Gélules

Amoxicilline 500 mg (sous forme de trihydrate)
Excipient q.s.p 1 gélule

Granulé

Amoxicilline 250 mg (sous forme de trihydrate)
Excipient q.s.p 1 sachet

Poudre pour suspension à 250 mg / 5 ml sans sucre

Amoxicilline 250 mg (sous forme de trihydrate)
Excipient q.s.p une cuillère-mesure de 5 ml de suspension reconstituée

Poudre pour suspension à 500 mg / 5 ml sans sucre

Amoxicilline 500 mg (sous forme de trihydrate)
Excipient q.s.p une cuillère-mesure de 5 ml de suspension reconstituée

Injectable

Amoxicilline (sous forme de sel de sodium) :

- Flacon de poudre dosé à 1000 mg + ampoule de 5 ml de solvant I.M. à base d'alcool benzyllique 3%
- Flacon de poudre dosé à 500 mg + ampoule de 5 ml de solvant I.M. à base d'alcool benzyllique 3%
- Flacon de poudre dosé à 250 mg + ampoule de solvant eau pp 3 ml

PHARMACODYNAMIE

L'amoxicilline est un antibiotique de la famille des bétalactamines du groupe des aminopénicillines (Pénicilline A). Sa stabilité en milieu acide et son absorption digestive rapide et complète rendent son administration orale plus avantageuse par rapport aux ampicillines. L'amoxicilline présente en plus du spectre de la pénicilline G, une activité propre vis-à-vis de la meilleure pénétration. Elle a un effet bactéricide.

- Pneumocoques, clostridium, listeria monocytogenes, streptocoques, entérocoques
- Meningocoques, gonocoques, colibacilles, protéus mirabilis, salmonelles, Helicobacter haemophilus influenzae, E. coli, shigelles

PHARMACOCINÉTIQUE

- Les concentrations sériques sont variables selon la voie d'administration.

L'amoxicilline a une meilleure résorption que l'ampicilline.

Le coefficient d'absorption digestive est de 90%. Son absorption au niveau du duodénum est atteint en 1h30 à 2h : pour une dose orale de 500 mg, il est de 7 à 10.

Le pic sérique est plus précoce par voie I.M. puisqu'on l'atteint en 30 mn à 1h.

- La demi-vie sérique d'élimination

- La liaison aux protéines sériques

- L'amoxicilline diffuse dans tous les tissus

L'amoxicilline est présente aux tissus conjonctifs, la sueur, le tissu amygdalien.

L'amoxicilline traverse la barrière placentaire.

- Excrétion : l'élimination se fait essentiellement par le foie.

L'élimination biliaire est de 5 à 10 %.

La fraction non absorbée est éliminée par l'urine.

INDICATIONS

Elles procèdent de l'activité antibactérienne.

- En traitement initial des infections bactériennes.

- Pneumopathies aiguës.

- Surinfections de bronchites aiguës.

- Infections ORL (otite, sinusite, angine).

AXIMYCINE® 1g

14 comprimés dispersibles



6 118000 031161

AXIMYCINE®

14 comprimés dispersibles

PPV 64DH10

LOT 85005 6

EXP 08/2020

APAZIDE®

Nifuroxazide

FORMES et PRESENTATIONS :

Gélule à 200 mg (jaune) : Boîte de 16 gélules sous plaquette thermoformée.

Suspension buvable à 4% : flacon de 100 ml.

COMPOSITION :

Nifuroxazide (DCI)	p.gélule 200 mg	p.boîte 3,2 g
--------------------	--------------------	------------------

Excipient à effet notoire : saccharose

Nifuroxazide (DCI)	p.c. à c. 220 mg	p.flacon 4,4 g
--------------------	---------------------	-------------------

INDICATIONS :

Diarrhée aiguë présumée d'origine bactérienne en l'absence de suspicion de phénomènes invasifs (altération de l'état général, fièvre, signes toxi-infectieux...).

Le traitement ne dispense pas de mesure diététique et d'une réhydratation si elle est nécessaire. L'importance de la réhydratation et sa voie d'administration (PER OS ou IV) doivent être adaptées en fonction de l'intensité de la diarrhée, de l'âge et des particularités du patient (maladies associées...).

POSOLOGIE et MODE D'EMPLOI :

Voie orale.

Gélule :

Réservee à l'adulte et à l'enfant à partir de 6 ans.

Adulte : 4 gélules (800 mg) par jour en 2 à 4 prises.

Enfant à partir de 6 ans : 3 à 4 gélules (600 à 800 mg) par jour en 2 à 4 prises.

La durée du traitement est limitée à 7 jours.

Suspension buvable :

Enfant de plus de 2 ans : 660 mg par jour, soit 3 cuillères à café par jour en 3 prises.

Le traitement ne doit pas excéder 7 jours.

CONTRE-INDICATIONS :

- Tout antécédent de réaction allergique aux dérivés du nitrofurane ou à l'un des autres constituants.
- Prématuré, nouveau-né (0 à 1 mois) et nourrisson de moins de 2 ans.

MISES EN GARDE et PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

• En cas de diarrhée infectieuse avec des manifestations cliniques suggérant un phénomène invasif, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée.

• La prise de la gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans, car elle peut entraîner une fausse-route.

• La réhydratation peut être l'élément essentiel du traitement des diarrhées aigües de l'enfant. ~~Il devra être systématiquement envisagée.~~

Précautions d'emploi :

Devant une diarrhée chez l'enfant, il convient de donner de la solution de saccharose, avant de prescrire un médicament contre la diarrhée.

TABLEAU C (LISTE II)



PPV 15/6/70
PER 10/5/80
LOT 12259

19,70



82, Allée des Casas
S. Bachouchi -

Docteur NAHA Lahsen

Spécialiste Pédiatre

Diplômé d'assistant étranger des maladies neurologiques

et électro-encéphalographie de l'Université de Paris

Membre de la société Française de neurologie pédiatrique

Membre de la ligue Française contre l'épilepsie

Sur Rendez-vous

الدكتور النها لحسن

اختصاصي في أمراض الأطفال والرضيع

حاائز على دبلوم أمراض الأعصاب

و تحظيط الدماغ من جامعة باريس

عضو بالمنظمة الفرنسية لعلاج أمراض الصرع

بالموعد

Casablanca, le : 13 OCT 2019

MAFIJI MARIA



Dr NAHA Lahsen
Spécialiste Pédiatre
111, Rue Sebta à BANDAR
Q. des Hôpitaux Casablanca
Tél: 0522864626 / 0522861111

Docteur NAHA Lahsen

Spécialiste Pédiatre

Diplômé d'assistant étranger des maladies neurologiques

et électro-encéphalographie de l'Université de Paris

Membre de la société Française de neurologie pédiatrique

Membre de la ligue Française contre l'épilepsie

Sur Rendez-vous

الدكتور النها لحسن

إختصاصي في أمراض الأطفال والرضيع

حاائز على دبلوم أمراض الأعصاب

و تخطيط الدماغ من جامعة باريس

عضو بالمنظمة الفرنسية لعلاج أمراض الصرع

بالموعد

Casablanca, le : 28/10/19

Je déclare, certifie que le p.
HAFID MARRA à présenté
le petit SEBTA BENTEL
n'a pas fait un bilan biologique
et neuro-radiologique

Docteur NAHA Lahsen
Spécialiste Pédiatre
111, Rue Sebta R. BANDAR
Q. des Hôpitaux-Casablanca
Tél: 0522864525 / 0522861111

Docteur NAHA Lahcen
Neuro-Pédiatre
111, rue de Sebta - Casablanca
Télé: 05 22 86 11 11 - Fax : 05 22 86 46 27

Rapport EEG :

Nom : **HAFIDI, MARIA** Date enreg. : **31/10/2019**
Né le : **07/08/2002** Médecin : **DR.NAHA**

Type d'examen : </EEG/VEILLE

Info clinique : **PERTE DE CONNAISSANCE**

• **VEILLE** :

Rythme de fond alpha 10 cycles/sec, postérieur symétrique, réactif à l'ouverture des yeux.

Pas de pointes ,ni de pointes ondes ,ondes lentes, artefacts musculaires
Pas d'éléments périodiques.

• **HYPERPNEE**:

Ralentissement du traçè , p&as de pointes ondes.

• **S.L.I**:

Sans effet.

• **CONCLUSIONS**:

Tracè bien structuré , sans activité épiléptique.

*Docteur NAHA Lahcen
Spécialiste Pédiatre
111, Rue Sebta R. BANDAR
Q. des Hippocrates-Casablanca
Tél: 05 22 86 46 26 / 05 22 86 11 11*

Docteur NAHA Lahsen

Spécialiste Pédiatre

Diplômé d'assistant étranger des maladies neurologiques

et électro-encéphalographie de l'Université de Paris

Membre de la société Française de neurologie pédiatrique

Membre de la ligue Française contre l'épilepsie

Sur Rendez-vous

الدكتور النها لحسن

إختصاصي في أمراض الأطفال والرضيع

حائز على دبلوم أمراض الأعصاب

و تخطيط الدماغ من جامعة باريس

عضو بالمنظمة الفرنسية لعلاج أمراض الصرع

بالموعد

Casablanca, le : 29 OCT 2019

HAFSI MARIA

(+) glycémie à jeun
(+) Na Fosf.

LABORATOIRE REGRAGUI
Angle Bd. Sidi Abderrahmane
et Route d'Azemmour - CASABLANCA
Tél : 022.90.09.67 - Fax : 022.90.09.27

Docteur NAHA Lahsen
Spécialiste Pédiatre
111, Rue Sebta R BANDAR
Q. des Hôpitaux-Casablanca
Tél : 0522864626 / 0522861111



مختبر التحاليل الطبية الرگراچي

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES REGRAGUI

S. MESTASSI

Biologiste Diplômé de la Faculté
de Médecine et de Pharmacie
de Clermont Ferrand



093002863

Né (e) le: 07-08-2002, âgé (e) de : 17 ans
Enregistré le: 30-10-2019 à 10:31
Édité le: 30-10-2019 à 12:48
Prélèvement : au labo
Le : 30-10-2019 à 10:22

Mme Maria HAFIDI

Référence : 1910302024

Prescrit par : Dr NAHA LAHSEN

HEMATOCYTOLOGIE

Numération formule sanguine

(Cytométrie en flux et Impédance Beckman Coulter)

Numération

Hématies	4.97	$10^6/\text{mm}^3$	(4.50-5.30)
Hémoglobine	14.2	g/dl	(12.0-16.0)
Hématocrite	43.0	%	(37.0-49.0)
- VGM	87	fL	(78-98)
- TCMH	29	pg	(25-33)
- CCMH	33	g/dl	(30-36)
Leucocytes	7 600	/mm ³	(4 000-10 000)

Formule leucocytaire

Polynucléaires Neutrophiles	63.2	%	
	4 803	mm^3	(1 800-8 000)
Polynucléaires Eosinophiles	1.8	%	
	137	mm^3	(0-700)
Polynucléaires Basophiles	0.4	%	
	30	mm^3	(<200)
Lymphocytes	26.8	%	
	2 037	mm^3	(1 000-5 200)
Monocytes	7.8	%	
	593	mm^3	(100-1 100)
Plaquettes	240	$10^3/\text{mm}^3$	(150-500)
VPM	9.5	fl	(6.0-12.0)

LABORATOIRE REGRAGUI
Angle Bd Sidi Abderrahmane et
Route d'Assane - Casablanca
Tél. 0522 90 09 67 - Fax 0522 90 09 27

T. SVP

Enregistré le: 30-10-2019 à 10:31
Edité le: 30-10-2019 à 12:48
Prescrit par : Dr NAHA LAHSEN

Mme Maria HAFIDI

Né (e) le : 07-08-2002, âgé (e) de : 17 ans
Référence : 1910302024

BIOCHIMIE SANGUINE (Cobas c311/Roche)

Aspect du sérum Limpide

Glycémie à jeûn 0.88 g/l (0.70-1.10)
4.9 mmol/l (3.9-6.1)

LABORATOIRE REGAGUI
Angle Bd Sidi Abderrahmane et
Route d'Assane Sarr - Casablanca
0522 90 09 07 - fax 0522 90 09 08



مختبر التحاليل الطبية الرگراي LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES REGAGUI

S. MESTASSI

Biologiste Diplomé de la Faculté
de Médecine et de Pharmacie
de Clermont Ferrand

FACTURE N° : 1910302024

Casablanca le 30-10-2019

Mme Maria HAFIDI

Date de l'examen : 30-10-2019
Caisse : **MUPRAS**

INPE :



Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E11.5	E
0118	Glycémie	B30	B
0216	Numération formule	B80	B

TOTAL DOSSIER : 120 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : cent vingt dirhams

LABORATOIRE REGAGUI
Angle Bd. Sidi Abderrahmane
et Route d'Agadir - CASABLANCA
Tél : 022.90.09.67 - Fax : 022.90.09.27