

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3188

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Retraite

MOHAMED

Nom & Prénom : AZENNOUR MOHAMED

Date de naissance : 01/01/1951

Adresse : SALMIA X-AV. EL JOLANE 22007

Tél. : 0669-33-27-36

Total des frais : 1000 Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**DR. Fadil MILOUDI**  
Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue

Résidence Al Hannasi A10, Rue Rahal

El Maskini Appt. 3 Avenue des FARÈSES

Tél. 05 35 65 07 97 • I.N.P. 141113475

ICE 001649658000082

Date de consultation : 12 NOV 2019

Nom et prénom du malade : Azennour Moh

Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : ostéop

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le :

12 NOV 2019

Mohamed

DRAS

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12 NOV 2019	COUPE	9	600	 Dr. Farid 10/11/2019 farid.farid@hotmail.fr

## EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	12/11/2019	281, 20

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

## [Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

# Dr. Fadil MILOUDI

Spécialiste en chirurgie orthopédique  
et Traumatologique (Adultes et enfants)

Diplômé de la Faculté de Médecine de Toulouse (France)

\* Chirurgie de la Main (Montpellier) et micro-chirurgie

\* Chirurgie des Rhumatismes

\* Chirurgie de la colonne vertébrale

\* Podologie

\* Traumatologie du sports

\* Chirurgie Arthroscopique

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



# الدكتور فاضل ميلودي

اختصاصي في جراحة العظام

والمفاصل (كبار وصغار)

خريج كلية الطب بتولوز (فرنسا)

\* جراحة اليد (مونبولي) + جراحة بالمجهر

\* جراحة أمراض الروماتيزم

\* جراحة العمود الفقري

\* تقويم أمراض الركبتين

\* الطب الرياضي

\* الكشف بالكاميرا للمفاصل

Fès, le ..... 12 NOV 2019 ... فاس، في ..

Alhannasi 2019

84,80

21 Médecin 20 S.V.



13,20 2019 21 Algérie S.V.



116,00 2019 21 2019 S.V.



67,20 2019 S.V.



مستعجلات العيادة 06.61.10.11.81

هاتف وفاكس العيادة 05.35.65.07.97

إقامة العناسي 10 زنقة رحال السكيني شقة 3، شارع الجيش الملكي (وراء محطة ستام سابقا) فاس

Résidence AlHannasi A 10 Rue Rahal ElMaskini Appt3 Av. Des F.A.R. - Fès (derrière Ancien CTM)

ICE : 001649658000082 - INP : 141113175 - E-mail : drfadil@hotmail.fr



1 g/125 mg,  
Poudre pour suspension  
buvable en sachet

Boîte de 12, 16 et 24 sachets

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce paquet et ce médicament. Si vous avez un doute, parlez-en à votre pharmacien. Si vous avez toute autre question, veuillez contacter votre pharmacien. Si ce médicament a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques. Si le médicament lui est nocif ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION : Poudre pour suspension buvable, boîte de 12, 16 et 24 sachets.

**COMPOSITION :** Principes actifs : amoxicilline (amoxicilline trihydrate que) et pénicillines (pénicilline que) empêche cette

amoxicilline... et chez l'enfant pour traiter les clavulanique. Clavulanique et des personnes atteintes de poches de sinus, et des sinus, CLAS urinaires, CLAS urinaires, et des tissus mous, incluant les

des os et des articulations. Ne prenez jamais ZAMOX 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet : Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ZAMOX.

Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.

Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un idéogramme (érosion de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

**Ne prenez pas ZAMOX si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.**  
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien ou votre pharmacien avant de prendre ZAMOX.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Faites attention au foie. 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet : Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ZAMOX.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous : - souffrez de mononucléose infectieuse, - êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins, - n'urez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien ou votre pharmacien avant de prendre ZAMOX. Dans certains cas, votre pharmacien pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection.

Selon les résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent de ZAMOX ou un autre médicament.

**Ne prenez pas ZAMOX sans une attention particulière.** ZAMOX peut provoquer certaines réactions ou engendrer des effets indésirables graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous prenez ZAMOX, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière dans les effets non souhaités et gênants ». Tests sanguins et urinaires Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules

PPV: 116DH00  
PER: 03-22  
LOT: 1692

certaines  
poudre pour  
éez chez le  
s'agit d'effets  
en compte  
les patients

chez les patients insuffisants rénalytiques en sodium,  
certaines personnes (malades renalytiques)

Ce médicament contient du potassium. Prenez en compte  
chez les patients insuffisants rénalytiques en sodium.

Ce médicament contient également un autre médicament,

chez les patients insuffisants rénalytiques en sodium.

INTERACTIONS : les sels d'ordonnance, et aussi les

FORMES D'ADMINISTRATION : Prise au risque de réaction cutanée allergique est plus

élevée. Si vous avez une réaction cutanée allergique, le

docteur peut décider d'ajuster votre dose de ZAMOX.

ces médicaments destinés à empêcher la coagulation du

sang (comme la warfarine) sont pris avec ZAMOX, des

des analyses supplémentaires peuvent être requises.

amoxicilline peut influer sur l'action du méthotrexate (un

rhumatismes).

ZAMOX peut influer sur l'action du mycophénolate mofétil (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS : Sans objet

INTERACTIONS AVEC LES PRODUITS DE PHYSIOTHERAPIE OU

Sportifs : Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser

des machines : ZAMOX peut provoquer des effets indésirables susceptibles

de réduire la capacité à conduire.

**DOSESSE ET ALLAITEMENT :** Si vous êtes enceinte, il est possible que vous le soyiez, ou si vous allaitez, vous devez en informer votre pharmacien ou votre pharmacien.

Demandez conseil à votre pharmacien ou votre pharmacien avant de prendre un quelconque médicament.

**COMMENT PRENDRE ZAMOX 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet ?**

Instructions pour un bon usage : Prenez toujours la posologie indiquée par votre pharmacien. En cas de doute, consultez votre pharmacien ou votre pharmacien.

**Posologie, Mode et/ou Voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Posologie : Adultes et enfants de 40 kg et plus

- Dose initiale : 1 sachet trois fois par jour

- Dose inférieure : 1 sachet deux fois par jour

Enfants pesant moins de 40 kg

Les sachets ZAMOX 1 g/125 mg ne sont pas recommandés.

- Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

- En cas de problèmes rénaux, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. Votre pharmacien ou votre pharmacien pourra prescrire un dosage

différent ou un autre médicament.

- En cas de problèmes au foie, des analyses de sang plus

fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le

fonctionnement de votre foie.

**Comment administrer ZAMOX ?**

- Juste avant la prise de ZAMOX, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans de l'eau versée dans un verre.

- Remuez le contenu au moins 10 fois et reposez un peu au repos.

- Répétez les prises de manière régulière au cours de la

journée, elles doivent être espacées d'au moins 4 heures. Ne prenez pas 2 doses en 1 heure.

- Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

- Ne prenez pas ZAMOX pendant plus de 2 semaines. Si vous prenez plus de 2 semaines, consultez un pharmacien.

**Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Si vous avez pris plus de ZAMOX 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet que vous n'auriez dû :

La prise d'une quantité excessive de ZAMOX peut entraîner des maux de ventre (nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en à votre pharmacien le plus tôt

possible. Montrez la boîte de médicament au médecin. **Instruction en cas d'omission d'une ou plusieurs doses :** Si vous oubliez de prendre ZAMOX 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet : Si vous avez oublié une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Attendez ensuite environ 4 heures avant de prendre la dose suivante.

**Risque de syndrome de sevrage** Si vous devez prendre ZAMOX 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet : Pour continuer de prendre ZAMOX jusqu'à la fin du traitement, même si vous vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines personnes devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou votre pharmacien.

**EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS :**

De nombreux effets indésirables peuvent survenir avec tous les médicaments, ZAMOX peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous le monde. Ce médicament peut entraîner les effets indésirables mentionnés ci-dessous.

**Réactions nécessitant une attention particulière**

**Réactions allergiques :** - éruption cutanée

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculaire) pouvant apparaître sous la forme de taches rouges ou violettes sur la peau, mais pouvant également toucher d'autres parties du corps.

- fièvre, douleurs articulaires, ganglions dans le cou, l'aisselle et laine.

- gonflement, parfois du visage ou de la bouche (angoisse-dédoublement), entraînant des difficultés respiratoires, malaise brutal avec chute de la pression artérielle.

Si vous présentez un ou ces symptômes, contactez un pharmacien immédiatement. Arrêtez l'administration de ZAMOX.

**Inflammation du gros intestin :** - inflammation du gros intestin, entraînant une diarrhée aiguë avec une量 de sang et du mucus, des douleurs gastriques et/ou fièvre.

Si vous présentez ces symptômes, demandez conseil le plus tôt possible à votre pharmacien.

**Effets indésirables très fréquents**

Ils peuvent survenir chez une personne sur 10 : - malaise (chez les personnes qui ont pris ZAMOX).

Effets indésirables fréquents : Ils peuvent affecter moins de 1 personne sur 10 :

- muguet (affection due à un champignon, le candida, qui se développe dans le vagin, la bouche ou les plis cutanés), - nausées, en particulier aux doses élevées.

Si vous ou votre enfant présentez ces effets indésirables, administrerez ZAMOX avant les repas.

- vomissements,

- diarrhée (chez les enfants).

**Effets indésirables peu fréquents** Ils peuvent affecter moins de 1 personne sur 100 :

- éruption cutanée, démagéane (urticaire), - indigestion, étourdissements, maux de tête.

**Effets indésirables peu fréquents pouvant être mis en évidence par les analyses de sang :** - augmentation de certaines substances (enzymes) produites par le foie.

Ils peuvent affecter moins de 1 personne sur 1000 :

- éruption cutanée, pouvant former des cloques et ressembler à de petites taches (points noirs centraux et/ou d'une couleur plus pâle, avec un anneau sombre tout autour - amythème polymorphe).

Si vous remarquez l'un de ces symptômes, contactez un pharmacien en urgence.

**Effets indésirables rares pouvant être mis en évidence par les analyses de sang :**

- faible nombre de cellules participant à la coagulation sanguine (plaquettes), - éruption cutanée avec cloques et des cloques blanches.

Autres effets indésirables : D'autres effets indésirables ont été observés chez un très petit nombre de personnes, mais leur fréquence exacte est inconnue :

- réactions allergiques (voir ci-dessus), - inflammation du gros intestin (voir ci-dessus),

- inflammation de la membrane protectrice entourant le cerveau (ménigité aseptique), - réactions cutanées graves,

- éruption étendue avec cloques et des cloques blanches sur la peau, en particulier autour de la bouche, du nez, des yeux et dans la région génitale (syndrome de Stevens-Johnson), et une forme

plus grave, responsable d'un décollement cutané important (plus de 30 % de la surface corporelle : syndrome de Lyell) - éruption cutanée rouge étendue avec petites cloques contenant du pus (dermatite bulleuse ou exfoliative), - éruption squameuse rouge avec masses sous la peau et des cloques dans les yeux.

Si vous présentez l'un de ces symptômes, contactez un pharmacien immédiatement.

• inflammation du foie (hépatite),

• ictere, provoqué par une augmentation du taux sanguin de bilirubine (une substance produite dans le foie), qui donne une coloration jaune à la peau et au blanc des yeux,

• inflammation des reins,

• hyperactivité du temps de coagulation du sang,

• convulsions (chez les personnes prenant des doses élevées de ZAMOX, ou ayant des problèmes rénaux),

• langue noire pâle (glossophytie),

• coloration des dents (chez les enfants), généralement éliminée au brossage.

**Effets indésirables pouvant être mis en évidence par les analyses de sang et/ou urines :**

• diminution temporaire du nombre de globules blancs,

• faible nombre de globules rouges (anémie hémolytique),

• cristaux dans les urines.

**Si vous présentez l'un des effets indésirables**

Si tous les effets indésirables deviennent grave ou gênant, ou si vous présentez un effet indésirable mentionné dans cette notice, contactez un pharmacien ou votre pharmacien.

**Déclaration des effets secondaires** La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque des médicaments.

**CONDITIONS DE CONSERVATION**

Ce médicament doit être conservé à l'abri de l'humidité et à une température inférieure à 25 °C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

**CONSEILS/EDUCATION SANITAIRES** Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues à des bactéries. Ils ne sont pas efficaces sur les infections dues à des virus.

Parfois, une infection due à une bactérie ne répond pas à un traitement antibiotique. L'une des raisons les plus fréquentes, est que la bactérie à l'origine de l'infection est résistante à l'antibiotique. Cela signifie que les bactéries peuvent survivre et même se multiplier dans l'antibiotique.

Les bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques pour plusieurs raisons. L'utilisation prudente des antibiotiques peut permettre de réduire le risque que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques.

Quand votre pharmacien vous prescrit un traitement antibiotique, cela a pour but de traiter votre maladie actuelle. Faire attention aux conseils suivants permettra de prévenir l'émersion de bactéries résistantes qui pourraient stopper l'efficacité de l'antibiotique.

1. Il est très important de respecter la dose d'antibiotique, le moment de la prise et la durée du traitement. Lire les instructions sur l'étiquetage et si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à votre pharmacien ou à votre pharmacien de vous expliquer.

2. Vous ne devez pas prendre un antibiotique à moins qu'il vous ait été spécifiquement prescrit et vous devez l'utiliser uniquement pour traiter l'infection pour laquelle il vous a été prescrit.

3. Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques qui ont été prescrits à d'autres personnes même si elles ont une infection apparemment similaire à la vôtre.

4. Vous ne devez pas donner d'antibiotiques qui vous ont été prescrits, à d'autres personnes.

5. Si vous restez des antibiotiques à la fin de votre traitement prescrit par votre pharmacien, vous devez les rapporter à votre pharmacien pour destruction appropriée.

# ALGIK®

## Paracétamol + C Comprimé

13,20

### COMPOSITION

	par comprimé	par étui
• Paracétamol (DCI) .....	500 mg	8,0 g
• Caféine .....	50 mg	0,8 g

*Excipients : q.s.*

### FORME ET PRÉSENTATION

*Comprimés* : Etui de 16 comprimés

### CLASSE PHARMACO - THERAPEUTIQUE

- Paracétamol : antalgique et antipyrrétique.
- Caféine : stimulant du système central.

### NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

*Laboratoires AFRIC - PHAR*

Route régionale Casablanca / Mohammedia n° 322  
Km 12.400 - Ain Harrouda 28630 Casablanca - Maroc

### INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Traitement symptomatique des :

- affections douloureuses : céphalées, migraines, douleurs dentaires, névralgies, douleurs musculaires, douleurs postopératoires et traumatiques, dysménorrhée.
- états fébriles (en cas de grippe).

### CONTRE - INDICATIONS

*Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :*

- Hypersensibilité au paracétamol.
- Insuffisance hépatocellulaire grave.

*En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*

### MISES EN GARDE

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (Caféine) pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopage.

Cependant, la dose de caféine reconnue comme dopante de 12 µg/ml d'urine, ne peut être atteinte par la prise d'ALGIK 500 mg aux posologies recommandées.

Seule, l'absorption simultanée de médicaments ou de boissons (café, thé, en quantités relativement importantes) contenant également de la caféine, pourrait induire un test positif.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

*Utiliser ce médicament avec précaution en cas de :*

- Insuffisance hépatique légère, d'alcoolisme chronique.
- Administration concomitante de médicaments hépatotoxiques.
- Atteinte rénale sévère (risques d'effets secondaires rénaux lors de l'usage chronique de doses élevées).

*En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

*Lié au paracétamol*

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode de l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose-oxydase-peroxydase.

*Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.*

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

- Grossesse :

*Chez l'animal : Il n'existe pas d'étude de tératogénèse.*

*Chez la femme :*

- premier trimestre : une étude épidémiologique prospective, portant sur quelques centaines de femmes n'a pas mis en évidence d'effet tératogène.

# Omiz®

Oméprazole

## Microgranules gastrorésistants en gélules

81,40

### PRESENTATIONS :

- OMIZ® 20 mg : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules
- OMIZ® 10 mg : Boîte de 7 gélules  
Boîte de 14 gélules  
Boîte de 28 gélules

### COMPOSITION :

#### OMIZ® 20mg

Oméprazole..... 20 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### COMPOSITION :

#### OMIZ® 10mg

Oméprazole..... 10 mg  
Excipients q.s.p..... 1 gélule  
Excipient à effet notoire : saccharose

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Inhibiteur de la pompe à protons (appareil digestif et métabolisme). Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

### INDICATIONS :

#### - Chez l'adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale,
- Ulcère duodénal évolutif,
- Ulcère gastrique évolutif,
- Oesophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-cesophagien,
- Traitement symptomatique du reflux gastro-cesophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour,
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible,
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-cesophagien,
- Syndrome de Zollinger-Ellison,
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable,
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risques (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

#### - Chez l'enfant à partir d'un an : Oesophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-cesophagien.

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

#### Mises en garde :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

#### Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament avec précaution en cas d'affections chroniques du foie.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS :

Avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

# BREXIN®

Piroxicam R&B

Comprimés

20 mg

1 comprimé  
Lactose

1 suppositoire

Aspartame  
Sorbitol

8480

## Composition :

Piroxicam  
(équivalent à 191,20 mg de piroxicam  
β-cyclodextrine)  
Excipients q.s.p.  
Excipients à effet notoire

## Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien du groupe des oxicams.

## Indications :

- Traitement des états douloureux aigus.
- Traitement des rhumatismes inflammatoires aigus et chroniques.

## Contre-indications :

- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de piroxicam, de substances d'activité proche telles que autres AINS ou l'Aspirine.
- Hypersensibilité à l'un des constituants.
- Ulcère gastroduodénal en évolution, insuffisance hépatocellulaire sévère ou insuffisance rénale sévère.
- Enfants de moins de 15 ans.
- Phénylcétoneur du fait de la présence de l'Aspartam dans les sachets.
- Association avec les anticoagulants oraux, autres AINS, héparine, lithium, méthotrexate et clopidogrel.
- En cas de grossesse et d'allaitement.

## Effets indésirables :

Effets gastro-intestinaux : anorexie, pesanteurs épigastriques, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, flatulences, diarrhées, ulcères.

Réactions d'hypersensibilité : dermatologiques, respiratoires et générales.

Effets sur le système nerveux central : céphalées, somnolences et vertiges.

## Précautions d'emploi :

En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'une manifestation cutanée ou muqueuse, interrompre immédiatement le traitement et consulter votre médecin.

Ce médicament sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les malades ayant des antécédents digestifs.

L'attention doit être attirée chez les conducteurs et utilisateurs de machines sur la possibilité de vertiges et de somnolence.

## Mode d'emploi et posologie :

Se conformer à la prescription médicale.

La posologie usuelle est de 20 mg par jour en une seule prise jusqu'à disparition des symptômes.

## Formes et autres présentations :

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 et 20 comprimés effervescents

BREXIN® 20 mg - Boîte de 20 comprimés sécables

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 suppositoires

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 sachets

## Liste I (Tableau A)