

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº P19- 0043746

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9800 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

KARKAR

Mohamed

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0672946218 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Ahmed EL GHISASSI
Dermatologie Vénéréologie
53, Résidence le Minaret
Rue Aman, 5ème Etage - Rabat
Tel.: 05 37 72 20 32 / 72 82 68

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


28 NOV 2010

MUPRAS
ACCUEIL

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



الرباط في : 13/10/2019

SHAMPOO A LA HYDROXYF115,00

② Myrrh oil 100 (24%)
 $\frac{75,40 \times 2}{=}$

150,80

Shampoo oil x 2ml x 100 ml
 $\times 4 \text{ ml} =$

③ Betadine solution

192,00

$\frac{1115 \times 3}{= 64,00 \times 3}$

④ CANTSTEN Emulsion

457,80

Milidex 1% x 4L

④ onyk lein Système "n'h"

+ Dr. Zouhair X. H.

Dr. Ahmed El GHISSASSI
Dermatologie - Vénéréologie
53 Résidence le Minaret
Rue Aman, 5^{ème} Etage - Rabat
Tél.: 05 37 72 20 32 / 72 82 68

Canesten® Extra



Bifonazole

Crème 1%

Forme et Présentation Pharmaceutiques

Canesten® Extra Crème : tube de 15 g de crème pour application locale.

Composition :

Principe actif : Bifonazole

1 g de crème contient 0,01 g de bifonazole.

Excipients : alcool benzyllique, polysorbate 60, eau purifiée, mono-

Propriétés :

Le bifonazole est un antifongique imidazolé.

Son spectre d'action comprend l'activité également actif sur d'autres champignons.

Corynebacterium minutissimum.

Le bifonazole agit en inhibant la synthèse de l'ergostérol à deux niveaux, ce qui le distingue des autres dérivés azolés qui n'agissent qu'à un seul niveau. Cette inhibition conduit à des altérations structurelles et fonctionnelles de la membrane cytoplasmique.

Indications :

Dermatophytoses :

- Traitement des dermatophytoses de la peau glabre : herpès circiné;
- Traitement des intertrigos des grands plis : eczéma marginé de Hébra, intertrigos génitaux et cruraux ;
- Traitement des intertrigos des orteils : pied d'athlète ;
- Traitement d'appoint d'onyxys dermatophytique : un traitement antifongique est alors nécessaire.

Candidoses :

Les candidoses rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une indication.

- Traitement des intertrigos des grands plis : génitaux, cruraux, interfessiers, axillaire et sous-mammaires;
- Traitement des intertrigos des petits plis : interdigitaux, interorteils;
- Traitement des perlèches, vulvites et anites;
- Traitement d'appoint d'onyxys ou périonyxys. Un traitement systémique antifongique peut être discuté.

Dans certains cas, et en particulier dans les mycoses de la sphère péri-buccale et péri-anogénitale, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.

- pityriasis versicolor.

Contre-indications :

Le traitement par Canesten® Extra Crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au bifonazole.
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylique ou à l'un des autres constituants.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Aucune étude approfondie n'a été réalisée chez l'enfant.

Les données cliniques recueillies ne laissent présager aucun effet nocif chez l'enfant.

Toutefois, le bifonazole ne doit être utilisé chez le nourrisson que sous surveillance médicale.

Eviter le contact avec les yeux.

LOT : CT002E
PER : 04 2024
PPV : 64 00

itate, octyldodécanol,

partenant aux dérivés

les moisissures. Il est
et des bactéries tel que

Canesten® Extra



Bifonazole

Crème 1%

Forme et Présentation Pharmaceutiques

Canesten® Extra Crème : tube de 15 g de crème pour application locale.

Composition :

Principe actif : Bifonazole

1 g de crème contient 0,01 g de bifonazole

Excipients : alcool benzylique, polysorbate 60, eau purifiée, m

Propriétés :

Le bifonazole est un antifongique imidazolé.

Son spectre d'action comprend également actif sur d'autres cha

Corynebacterium minutissimum

Le bifonazole agit en inhibant la

des autres dérivés azolés qui n'agissent qu'à un seul niveau. Cette inhibition conduit à des altérations structurelles et fonctionnelles de la membrane cytoplasmique.

LOT : CTO07E

PER : 07 2024

PPV : 64 00

palmitate, octyldodécanol,

appartenant aux dérivés

et les moisissures. Il est

pour et des bactéries tel que

niveaux, ce qui le distingue

Indications :

Dermatophytoses :

- Traitement des dermatophytoses de la peau glabre : herpès circiné;
- Traitement des intertrigos des grands plis : eczéma marginé de Hébra, intertrigos génitaux et cruraux ;
- Traitement des intertrigos des orteils : pied d'athlète ;
- Traitement d'appoint d'onyxis dermatophytique : un traitement antifongique est alors nécessaire.

Candidoses :

Les candidoses rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une indication.

- Traitement des intertrigos des grands plis : génitaux, cruraux, interfessiers, axillaire et sous-mammaires;
- Traitement des intertrigos des petits plis : interdigitaux, interorteils;
- Traitement des perlèches, vulvites et anites;
- Traitement d'appoint d'onyxis ou périonyxie. Un traitement systémique antifongique peut être discuté.

Dans certains cas, et en particulier dans les mycoses de la sphère péri-buccale et péri-anogénitale, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.

- pityriasis versicolor.

Contre-indications :

Le traitement par Canesten® Extra Crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au bifonazole.
- Hypersensibilité à l'alcool céstostéarylique ou à l'un des autres constituants.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Aucune étude approfondie n'a été réalisée chez l'enfant.

Les données cliniques recueillies ne laissent présager aucun effet nocif chez l'enfant.

Toutefois, le bifonazole ne doit être utilisé chez le nourrisson que sous surveillance médicale.

Eviter le contact avec les yeux.

Canesten® Extra



Bifonazole

Crème 1%

Forme et Présentation Pharmaceutiques

Canesten® Extra Crème : tube de 15 g de crème pour application locale.

Composition :

Principe actif : Bifonazole

1 g de crème contient 0,01 g de bifonazole.

Excipients : alcool benzyllique, alcool cétostéarylque, cétylpalmitate, octyldodécanol, polysorbate 60, eau purifiée, monostéarate de sorbitan.

Propriétés :

Le bifonazole est un imidazolé.

Son spectre d'action également actif sur d'*a* Corynebacterium mini

Le bifonazole agit en i des autres dérivés azo

altérations structurelles et fonctionnelles de la membrane cytoplasmique.

LOT :

CT007E

'action, appartenant aux dérivés

PER :

07 2024

levures et les moisissures. Il est

PPV :

64 00

sezia furfur et des bactéries tel que

à deux niveaux, ce qui le distingue eau. Cette inhibition conduit à des

Indications :

Dermatophytoses :

- Traitement des dermatophytoses de la peau glabre : herpès circiné;
- Traitement des intertrigos des grands plis : eczéma marginé de Hébra, intertrigos génitaux et cruraux ;
- Traitement des intertrigos des orteils : pied d'athlète ;
- Traitement d'appoint d'onyxis dermatophytique : un traitement antifongique est alors nécessaire.

Candidoses :

Les candidoses rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à *Candida albicans*. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une indication.

- Traitement des intertrigos des grands plis : génitaux, cruraux, interfessiers, axillaire et sous-mammaires;
- Traitement des intertrigos des petits plis : interdigitaux, interorteils;
- Traitement des perlèches, vulvites et anites;
- Traitement d'appoint d'onyxis ou périonyxis. Un traitement systémique antifongique peut être discuté.

Dans certains cas, et en particulier dans les mycoses de la sphère péri-buccale et péri-anogénitale, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.

- pityriasis versicolor.

Contre-indications :

Le traitement par Canesten® Extra Crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au bifonazole.
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylque ou à l'un des autres constituants.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Aucune étude approfondie n'a été réalisée chez l'enfant.

Les données cliniques recueillies ne laissent présager aucun effet nocif chez l'enfant.

Toutefois, le bifonazole ne doit être utilisé chez le nourrisson que sous surveillance médicale.

Eviter le contact avec les yeux.

MYNAZOL® 150 mg

boîte de 1, 4 et 8 gélules

Fluconazole

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devenu grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

MYNAZOL 150 mg, boîte de 1, 4 et 8 gélules

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Fluconazole (DCl)

Excipients : Lactose monohydraté, amidon pré magnésium, silice colloïdale anhydre.

Excipients à effet notable : Lactose monohydraté

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Classe pharmaco-thérapeutique - code ATC J02AC01

Mynazol fait partie d'un groupe de médicaments appelés « antifongiques ». La substance active est le fluconazole.

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

Adultes

Tout médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les infections fongiques suivantes :

- Ménigrité à cryptococcose : infection fongique du cerveau,
- Coccidioidomycose : une maladie du système bronchopulmonaire,
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Mycose de la muqueuse : infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une prothèse dentaire,
- Mycose génitale : infection du vagin ou du pénis,
- Infections cutanées : ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczème marginé de Hebra, infection des ongles.

Vous pourrez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Éviter la récidive d'une ménigrité à cryptococcose,
- Éviter la récidive de la mycose de la muqueuse,
- Diminuer le risque de récidive de mycose vaginale,
- Eviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement).

Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Tout médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Mycose de la muqueuse : infection de la muqueuse buccale, de la gorge,
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (p.ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Ménigrité à cryptococcose : infection fongique du cerveau.

Vous pourrez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Vous empêcher de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement),
- Eviter la récidive d'une ménigrité à cryptococcose.

5. POSOLOGIE :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les gélules ne sont pas indiquées chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique.

Avez la gélule entière avec un verre d'eau. Il est préférable de prendre les gélules à la même heure chaque jour.

Adultes

Affection	Dose
Pour traiter une ménigrité à cryptococcose	400 mg le premier jour, puis 200 à 400 mg une fois par jour pendant 6 à 8 semaines ou plus si nécessaire. Les doses sont parfois augmentées jusqu'à 800 mg
Pour éviter la récidive d'une ménigrité à cryptococcose	200 mg une fois par jour jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter
Pour traiter une coccidioidomycose	200 à 400 mg une fois par jour pour une durée de 11 mois à 24 mois ou plus si nécessaire. Les doses sont parfois augmentées jusqu'à 800 mg
Autres	<p>autre une infection fongique due à Candida</p> <p>autre une infection de la muqueuse buccale, de la gorge ou nasale dues à une prothèse dentaire</p> <p>autre une mycose de la muqueuse buccale et de la gorge</p> <p>autre une infection de la peau et des ongles</p>
Pour éviter une infection de la muqueuse buccale et de la gorge	800 mg le premier jour, puis 400 mg une fois par jour jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter
Pour traiter une mycose génitale	200 mg à 400 mg une fois par jour pendant 7 à 30 jours jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter
Pour diminuer le risque de récidive de mycose vaginale	100 mg à 200 mg une fois par jour ou 200 mg 3 fois par semaine tant que vous présentez un risque de développer une infection
Pour traiter une infection fongique de la peau et des ongles	150 mg en dose unique
Pour éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)	150 mg tous les 3 jours à raison de 3 doses au total (Jour 1, Jour 4 et Jour 7), puis une fois par semaine pendant 6 mois tant que vous présentez un risque de développer une infection
Pour éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)	50 à 400 mg une fois par jour pendant 7 à 30 jours jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter
Pour éviter une infection de la muqueuse buccale et de la gorge	100 mg à 200 mg une fois par jour ou 200 mg 3 fois par semaine tant que vous présentez un risque de développer une infection
Pour éviter une infection de la peau et des ongles	800 mg la première fois, puis 400 mg une fois par jour pendant 6 à 8 semaines jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter
Pour éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)	100 mg une fois par jour pendant 7 à 30 jours jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter

Adolescents âgés de 12 à 17 ans

Respectez la posologie indiquée par votre médecin (soit la posologie de l'adulte soit la posologie de l'enfant).

Enfants jusqu'à 11 ans

La posologie maximale chez l'enfant est de 400 mg par jour.

La posologie sera basée sur le poids de l'enfant en kilogrammes.

Affection	Dose quotidienne
Mycose de la muqueuse et infections de la gorge dues à Candida – la dose et la durée dépendent de la sévérité de l'infection et de sa localisation	3 mg par kg de poids corporel (une dose de 6 mg par kg de poids corporel peut être utilisée le premier jour)
Ménigrité à cryptococcose ou infections fongiques internes dues à Candida	6 mg à 12 mg par kg de poids corporel
Pour empêcher les enfants de développer une infection à Candida (si leur système immunitaire ne fonctionne pas correctement)	3 mg à 12 mg par kg de poids corporel

Enfants âgés de 3 à 4 semaines

Enfants âgés de 3 à 4 semaines

Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 2 jours seulement. La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 48 heures.

Enfants âgés de moins de 2 semaines :

Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 3 jours seulement. La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 72 heures.

Patients âgés

La dose usuelle adulte devrait être administrée.

Patients avec des problèmes rénaux

Votre médecin pourra modifier votre dose en fonction de la fonction rénale.

Si vous avez pris plus de 6 Mynazol 150 mg,

Si vous prenez trop de gélules en une seule prise, il peut y avoir des effets indésirables.

Une prise en chapeau (avant un traitement nécessaire) peut être nécessaire.

Si vous oubliez de prendre Mynazol 150 mg, ne prenez pas de dose double pour compenser.

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure de votre suivante, ne prenez pas deux doses.

Si vous arrêtez de prendre Mynazol 150 mg, sans objets.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, à votre pharmacien.

6. contre-indICATIONS

Ne prenez jamais Mynazol 150 mg, gélule

Si vous êtes allergique (hypersensible) au fluconazole ou à toute autre substance contenue dans ce médicament, mentionnée dans la rubrique « démarquage ».

Si vous prenez de l'astémizole, de la terfenadine ou de la tétrétidazine.

Si vous prenez de la quinidine (utilisée pour les maladies cardiaques).

Si vous prenez de la quinidinacarboximide (utilisée pour les maladies cardiaques).

Si vous prenez de la erythromycine (antibiotique).

Chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de graves réactions indésirables.

7. EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut entraîner des effets indésirables.

Il n'y a pas de moyen sûr de savoir si ces effets indésirables surviennent.

Quelques personnes développent des réactions graves lors de l'utilisation.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à effet indésirable que vous n'avez pas mentionné dans cette notice.

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, contactez votre pharmacien :

- Sifflement respiratoire soudain, difficultés à respirer.

- Gonflement des paupières, du visage ou des yeux.

- Rougeur de la peau ou démangeaisons sur la peau.

- Eruption cutanée.

- Réactions cutanées sévères telles qu'une éruption cutanée importante.

Mynazol 150 mg peut affecter votre foie.

- De la fatigue.

- Une perte d'appétit.

- Des vomissements.

- Un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux.

Si l'un de ces signes survient, arrêtez de prendre ce médicament et contactez votre pharmacien.

Ce médicament peut provoquer des effets indésirables.

Si ailleurs, si vous ressentez un des effets indésirables mentionnés dans ce document, contactez votre pharmacien.

Les effets indésirables fréquents (pouvant survenir dans plus de 1 personne sur 10)

- Maux de tête.

- Maux d'estomac, diarrhée, nausées, vomissements.

- Augmentations des tests sanguins liés au foie.

- Eruption.

Les effets indésirables peu fréquents (pouvant survenir dans moins de 1 personne sur 10)

- Réduction du nombre de globules rouges pouvant provoquer une faiblesse ou un essoufflement.

- Diminution de l'appétit.

- Impossibilité de dormir, sensation de sommeil.

MYNAZOL® 150 mg

boîte de 1, 4 et 8 gélules
Fluconazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

MYNAZOL 150 mg, boîte de 1, 4 et 8 gélules

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Fluconazole (DCI) 150 mg pour une gélule

Excipients : Lactose monohydrate, amidon prégalatinisé, laurilsulfate de sodium, stéarate de magnésium, silice colloïdale amydra.

Excipients à effet notable : Lactose monohydraté

3. CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : J02AC01

Mynazol fait partie d'un groupe de médicaments appelés « antifongiques ». La substance active est le fluconazole.

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

Adultes

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les infections fongiques suivantes :

- Ménigrite à cryptocques- infection fongique du cerveau,
- Coccidioidomycose- une maladie du système bronchopulmonaire,
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une orthèse dentaire,
- Mycose pénitale - infection du vagin ou du pénis,
- Infections cutanées - ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczéma marginé de Hebra, infection des ongles.

Vous pourrez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Eviter la récidive d'une ménigrite à cryptocques,
- Eviter la récidive d'une mycose de la muqueuse,
- Diminuer le risque de récidive de mycose vaginale,
- Eviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement).

Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge,
 - Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (p.ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
 - Ménigrite à cryptocques- infection fongique du cerveau.
- Vous pourrez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :
- Vous empêcher de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement),
 - Eviter la récidive d'une ménigrite à cryptocques.

5. POSOLOGIE :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les gélules ne sont pas indiquées chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique.

Avelez la gélule entière avec un verre d'eau. Il est préférable de prendre les gélules à la même heure chaque jour.

Adultes

Affection

Pour traiter une ménigrite à cryptocques

Dose

400 mg le premier jour; puis 200 à 400 mg une fois par jour pendant 6 à 8 semaines ou plus si nécessaire. Les doses sont parfois augmentées jusqu'à 800 mg

Pour éviter la récidive d'une ménigrite à cryptocques

200 mg une fois par jour jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter.

Pour traiter une coccidioidomycose

200 à 400 mg une fois par jour pendant 11 mois à 24 mois ou plus si nécessaire. Les doses sont parfois augmentées jusqu'à 800 mg

Pour traiter une infection fongique interne due à Candida

800 mg le premier jour; puis 400 mg une fois par jour jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter.

Pour traiter une infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une orthèse dentaire

200 mg à 400 mg le premier jour; puis 200 mg à 200 mg jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter.

Pour traiter une mycose de la muqueuse - la dose dépendant de la localisation

50 à 200 mg une fois par jour pendant 7 à 30 jours jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter.

Pour éviter une infection fongique de la peau et des ongles

1 mg à 200 mg une fois par jour ou 200 mg par semaine tant que vous présentez un risque de développer une infection

1 fois tous les 3 jours à raison de 3 doses au total, 1 jour et 4 jour et 7 jour, puis une fois par semaine pendant 6 mois tant que vous présentez un risque de développer une infection

Pour éviter une infection fongique de la peau et des ongles

Selon le site de l'infection, 50 mg une fois par jour, 150 mg une fois par semaine, 300 mg à 400 mg une fois par semaine pendant 1 à 4 semaines (jusqu'à 8 semaines pour le pied d'athlète ; pour le traitement des infections des ongles, traitement jusqu'au remplacement de l'ongle infecté)

Pour éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)

200 à 400 mg une fois par jour tant que vous présentez un risque de développer une infection

Adolescents âgés de 12 à 17 ans

Respectez la posologie indiquée par votre médecin (soit la posologie de l'adulte soit la posologie de l'enfant).

Enfants jusqu'à 11 ans

La posologie maximale chez l'enfant est de 400 mg par jour.

La posologie sera basée sur le poids de l'enfant en kilogrammes.

Affection

Mycose de la muqueuse et infections de la gorge due à Candida - la dose et la durée dépendent de la sévérité de l'infection et de sa localisation

Dose quotidienne

3 mg par kg de poids corporel (une dose de 6 mg par kg de poids corporel peut être utilisée le premier jour)

Ménigrite à cryptocques ou infections fongiques internes dues à Candida

6 mg à 12 mg par kg de poids corporel

Pour empêcher les enfants de développer une infection à Candida (si leur système immunitaire ne fonctionne pas correctement)

3 mg à 12 mg par kg de poids corporel

Enfants âgés de 0 à 4 semaines

Enfants âgés de 3 à 4 mois

Ménigrite à cryptocques - dessous mais à une fréquence de tous les 2 jours seulement. La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 48 heures.

Enfants âgés de moins de 2 semaines

Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 3 jours seulement.

La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 72 heures.

Patients âgés

La dose usuelle adulte devrait être administrée.

Patients avec des problèmes rénaux

Votre médecin pourra modifier votre dose en fonction de la fonction rénale.

Si vous avez pris plus de Mynazol 150 mg :

Si vous prenez trop de gélules en une seule prise, immédiatement votre médecin ou le service des urgences d'un éventuel surdosage peuvent prendre des mesures pour les rééquilibrer.

Une prise en charge (avec un traitement nécessaire) peut être nécessaire.

Si vous oubliez de prendre Mynazol 150 mg :

Ne prenez pas de dose double pour compenser. Vous oubliez de prendre une dose, prenez la prochaine à l'heure de votre dose suivante, ne prenez pas de dose supplémentaire.

Si vous arrêtez de prendre Mynazol 150 mg :

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, à votre pharmacien.

6. contre-indICATIONS

Ne prenez jamais Mynazol 150 mg, géline :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) au fluconazole ou à tout autre antifongique, ou avec pris pour traiter des infections fongiques dans le système respiratoire, dans la peau ou les démagéances, rougeur de la peau ou diff.

• Si vous prenez de l'asténozide, de la terfénadine pour traiter les symptômes de la grippe.

• Si vous prenez du ciprofloxacine (utilisée pour les infections bactériennes).

• Si vous prenez de la quinidine (utilisée pour les maladies cardiaques).

• Si vous prenez de l'érythromycine (antibiotique).

• Enfant de moins de 6 ans, en raison de réactions graves.

7. EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut causer des effets indésirables. Cependant, il n'est pas systématiquement chez tous les patients.

Quelques personnes développent des réactions graves, rares.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à toute autre personne qui a pris ce médicament.

• Sifflement respiratoire soudain, difficultés à respirer.

• Gonflement des paupières, du visage.

• Réaction de la peau avec démagéances de taches brunes.

• Eruption cutanée.

• Réactions cutanées sévères telles qu'une éruption cutanée.

Mynazol 150 mg peut affecter votre foie.

• De la fatigue,

• Une perte d'appétit,

• Des vomissements,

• Un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux.

Si l'un de ces signes survient, arrêtez de prendre ce médicament et immédiatement votre médecin.

Autres effets indésirables :

Parfois, il arrive que vous ressentez un des effets indésirables mentionnés dans ce document mais qui n'apparaissent pas dans la liste des effets indésirables.

Les effets indésirables fréquents (pouvant arriver à plus de 1 patient sur 10)

• Maux de tête,

• Mal d'estomac, diarrhée, nausées, vomissements,

• Augmentations des tests sanguins liés au foie.

• Erption.

Les effets indésirables peu fréquents (pouvant arriver à moins de 1 patient sur 10)

• Réduction du nombre de globules rouges provoquant une faiblesse ou un essoufflement.

• Diminution de l'appétit,

• Impossibilité de dormir, sensation de sommeil.

MYNAZOL® 150 mg

boîte de 1, 4 et 8 gélules

Fluconazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

MYNAZOL 150 mg, boîte de 1, 4 et 8 gélules

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Fluconazole (DCI) 150 mg pour une gélule

Excipients : Lactose monohydraté, amidon prégalatinisé, levulysulfate de sodium, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre.

Excipients à effet notoire : Lactose monohydraté

3. CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : J02AC01

Mynazol fait partie du groupe de médicaments appellés « antifongiques ». La substance active est le fluconazole.

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections tongiques est une levure appelée Candida.

4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

MyNazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections tongiques est une levure appelée Candida.

Adultes : Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les infections tongiques suivantes :

- Ménigrite à cryptococcie - infection tongique du cerveau,
- Coccidioidomycose - une maladie du système bronchopulmonaire,
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Mycosse de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à la chirurgie dentaire,
- Mycosse génitale - infection du vagin ou du pénis,
- Infections cutanées - ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczème marginé de Hebra, infection des ongles.

Vous pourrez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Eviter la récidive d'une ménigrite à cryptococcie,
- Eviter la récidive d'une mycosse de la muqueuse,
- Diminuer le risque de récidive de mycosse vaginale,
- Eviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement).

Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections :

- Mycosse de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge,
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (p.ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Ménigrite à cryptococcie - infection tongique du cerveau.

Vous pourrez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Vous empêcher de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement),
- Eviter la récidive d'une ménigrite à cryptococcie.

5. POSOLOGIE :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les gélules ne sont pas indiquées chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique.

Avez la gélule entière avec un verre d'eau. Il est préférable de prendre les gélules à la même heure chaque jour.

Adultes

Affection	Dose
Pour traiter une ménigrite à cryptococcie	400 mg le premier jour, puis 200 à 400 mg une fois par jour pendant 6 à 8 semaines ou plus si nécessaire. Les doses sont parfois augmentées jusqu'à 800 mg
Pour éviter la récidive d'une ménigrite à cryptococcie	200 mg une fois par jour jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter
Pour traiter une mycosse de la muqueuse – la dose dépendant de la localisation de l'infection	50 à 400 mg une fois par jour pendant 7 à 30 jours jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter
Pour éviter une infection de la muqueuse buccale et de la gorge	100 mg à 200 mg une fois par jour ou 200 mg 3 fois par semaine tant que vous présentez un risque de développer une infection
Pour traiter une mycosse génitale	150 mg en dose unique
Pour diminuer le risque de récidive de mycosse vaginale	150 mg tous les 3 jours à raison de 3 doses au total (Jour 1, Jour 4 et Jour 7), puis une fois par semaine pendant 6 mois tant que vous présentez un risque de développer une infection
Pour traiter une infection tongique de la peau et des ongles	Selon le site de l'infection, 50 mg une fois par jour, 150 mg une fois par semaine, 300 mg à 400 mg une fois par semaine pendant 1 à 4 semaines (jusqu'à 6 semaines pour le pied d'athlète ; pour le traitement des infections des ongles, traitement jusqu'au remplacement de l'ongle infecté)
Pour éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)	200 à 400 mg une fois par jour tant que vous présentez un risque de développer une infection

Adolescents âgés de 12 à 17 ans

Respectez la posologie indiquée par votre médecin (soit la posologie de l'adulte soit la posologie de l'enfant).

Enfants jusqu'à 11 ans

La posologie maximale chez l'enfant est de 400 mg par jour.

La posologie sera basée sur le poids de l'enfant en kilogrammes.

Affection	Dose quotidienne
Mycose de la muqueuse et infections de la gorge dues à Candida – la dose et la durée dépendent de la sévérité de l'infection et de sa localisation	3 mg par kg de poids corporel (une dose de 6 mg par kg de poids corporel peut être utilisée le premier jour)
Ménigrite à cryptococcie ou infections tongiques internes dues à Candida	6 mg à 12 mg par kg de poids corporel
Pour empêcher les enfants de développer une infection à Candida (si leur système immunitaire ne fonctionne pas correctement)	3 mg à 12 mg par kg de poids corporel

Enfants âgés de 0 à 4 semaines

Enfants âgés de 0 à 3 mois

Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 2 jours seulement. La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 48 heures.

Enfants âgés de moins de 2 semaines

Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 3 jours seulement.

La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 72 heures.

Patients âgés

La dose usuelle adulte devrait être administrée.

Patients avec des problèmes rénaux

Votre médecin pourra modifier votre dose en fonction de la fonction rénale.

Si vous avez pris plus de Mynazol 150 mg,

Si vous prenez trop de gélules en une seule fois, il est recommandé de consulter votre médecin ou le service des urgences d'un établissement hospitalier pour empêcher des choses qui ne sont pas réalisées. Une prise en charge (avec un traitement nécessaire) peut être nécessaire.

Si vous oubliez de prendre Mynazol 150 mg, ne prenez pas de dose double pour compenser.

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez la prochaine à l'heure de votre dose suivante, ne prenez pas deux doses.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, à votre pharmacien.

6. CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais Mynazol 150 mg, gélate

Si vous êtes allergique (hypersensible) au fluconazole ou à tout autre antifongique ou à l'azolé, avec pris pour traiter des infections tongiques dans ce médicament, mentionnez dans la rubrique « Antécédents » de votre feuille d'information.

Si vous prenez de l'azotérolide, de la terfénadine ou de la mizolastine (pour traiter les allergies).

Si vous prenez du cisapiride (utilisé pour les nausées et vomissements),

Si vous prenez du pimozide (utilisé pour traiter les crises de l'épilepsie),

Si vous prenez de la quinidine (antibiotique pour le paludisme),

Si vous prenez de l'érythromycine (antibiotique pour les infections bactériennes),

Chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de réactions graves.

7. EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut causer des effets indésirables. Ils ne surviennent pas systématiquement chez toutes les personnes. Certaines personnes développent des réactions graves, rares.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. C'est applicable aussi à toute autre personne qui a reçu cette notice. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, contactez votre pharmacien.

Si vous ressentez une douleur thoracique, difficultés à respirer, crise d'asthme, toux, gonflement des paupières, de l'œil, rougeur de la peau avec démangeaisons, sensation de taches rouges,

Éruption cutanée,

Réactions cutanées sévères telles qu'une éruption (pouvant toucher la bouche et la langue), Mynazol 150 mg peut affecter votre foie.

De la fatigue,

Une perte d'appétit,

Des vomissements,

Un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux.

Si l'un de ces signes survient, arrêtez de prendre ce médicament et contactez votre pharmacien.

Autres effets indésirables :

Par ailleurs, si vous ressentez un des effets indésirables suivants, arrêtez de prendre ce médicament et contactez votre pharmacien.

Les effets indésirables fréquents (pouvant survenir dans plus de 10 % des cas)

Maux de tête,

Maux d'estomac, diarrhée, nausées, vomissions,

Augmentations des tests sanguins liés au foie,

Éruption.

Les effets indésirables peu fréquents (pouvant survenir dans moins de 10 % des cas)

Réduction du nombre de globules rouges pouvant provoquer une faiblesse ou un essoufflement,

Diminution de l'appétit,

Impossibilité de dormir, sensation de sommeil.