



مصحّه الزركوني لجراحه العظام والمعاصل

CLINIQUE ZERKTOUNI D'ORTHOPÉDIE - TRAUMATOLOGIE

CHIRURGIE RÉPARATRICE DES OS ET DES ARTICULATIONS
ORTHOPÉDIE PÉDIATRIQUE - CHIRURGIE DES RHUMATISMES - CHIRURGIE VERTÉBRALE
ARTHROSCOPIE - CHIRURGIE PLASTIQUE ET DE LA MAIN - MÉDECINE DU SPORT

Casablanca, le :

Patiene : EL MANOUNI KHADIJA

le 06/07/2022

SCANNER DE L'ÉPAULE

TECHNIQUE :

Examen réalisé en mode hélicoïdale avec reformatage MPR et 3D.

RESULTATS :

- Fracture articulaire complexe céphalo-tubérositaire responsable d'une luxation postérieure
- Il s'y associe la présence d'une fracture comminutive et déplacée à trois fragment de du tiers proximale de la diaphyse humérale
- Hémarthrose de moyenne abondance
- Epaisissement et infiltration œdémateuse des parties molles en regard sans collection notable
- Absence de fracture de la clavicule.
- Absence de luxation acromio-claviculaire.

CONCLUSION :

Fracas de l'extrémité supérieur de l'humérus associé à une luxation postérieure de l'épaule

Infiltration œdémateuse des parties molles péri-fracturaires avec hémarthrose de moyenne abondance

Merci de votre confiance
Dr Chaouachi