

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0008811

19969

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 560 Société : R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom

MR ABAKIL

HAFED

Date de naissance :

1-07-1943

Adresse :

LOT BNI-YAKHLEF N° 49
Rue ALGHOFRAINE MD hammedi

Tél. : 1011111111

Total des frais engagés : 454,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Farid ZEGHARI

5, AV. de la Marche Verte

Ben Yakhlef - Mohammedia

Tél : 05 23 33 54 44

INPE : 091166009

Cachet du médecin :

Date de consultation : 04/03/2024

Nom et prénom du malade : Bousaid Fatiha Age : 71 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

HTA - Diabète - HTN - RTV

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Mohammedia

Le : 10/03/2024

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04/03/2014	6	1	150	Dr. Farid Z. Nabil 5 AV de la Marche Verte Bkhier - Mohammed V 523 33 54 44

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	24/03/24	304,40

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

A diagram of a dental arch (maxilla) with 28 numbered teeth. The teeth are arranged in four quadrants: upper right (1-12), upper left (13-24), lower left (25-36), and lower right (37-48). A coordinate system is overlaid on the arch, with the vertical axis labeled 'H' at the top and 'P' at the bottom. The horizontal axis is labeled 'D' on the left and 'G' on the right. The teeth are represented by circles with numbers, and the arch is shown in a perspective view.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Farid ZEGHARI

Médecine Générale
Echographie

الدكتور فريدي الزغاري

الطب العام
فحص بالأمواج

Ben Yakhlef, le 4.3.2024 بنى يخلف، في

Mr. Bouzid Fatma -

~~2x 19,5~~ Glycan 500 

~~46,00~~ 0 - 1 - 0 x 03 min
Vomriene 82/75 

~~2x 65,40~~ 1 - 0 - 1
TENORETIC 50/12,5 (n°2)

~~2x 29,20~~ 1 - 0 - 0
ZYCORIC 200 (n°2)

~~304,40~~ - 0 - 1.



Dr. Farid ZEGHARI
5, AV. de la Marche Verte
Ben Yakhlef - Mohammedia
Tél : 05 23 33 54 44

5, Avenue de la marche verte (ex RT 101)

Ben Yakhlef - Mohammedia

Tél. : 05 23 33 54 44

5، شارع المسيرة الخضراء (سابقا طريق 101)

بني يخلف - المحمدية

الهاتف : 05 23 33 54 44

GLYCAN®

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 500 mg par comprimé.
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 850 mg par comprimé pelliculé.

c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte hospitalière de 100.
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et de 60 et boîte hospitalière de 100.

d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

3. ATTENTION!

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie ou une urographie veineuse ou une angiographie.

- En cas d'usage concomitant de l'
grossesse ou d'allaitement, bien in
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDIS
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

ou en cas de
VOTRE MEDECIN

b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surveillée et maintenue une diurèse correcte, et
- Un régime alimentaire hypocalorique d'une activité physique d'entretien
- En cas d'hospitalisation inopinée, la

de manière à
semaines.
que le maintien
dit l'âge.
acte diagnostique

1910

GLYCAN®

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 500 mg par comprimé.
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 850 mg par comprimé pelliculé.

c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte hospitalière de 100.
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et de 60 et boîte hospitalière de 100.

d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

3. ATTENTION!

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie ou une urographie veineuse ou une angiographie.

- En cas d'usage concomitant de l'
grossesse ou d'allaitement, bien in
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDIS
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

ou en cas de
VOTRE MEDECIN

b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surveillée et maintenue une diurèse correcte, et
- Un régime alimentaire hypocalorique d'une activité physique d'entretien
- En cas d'hospitalisation inopinée, la

de manière à
semaines.
que le maintien
dit l'âge.
acte diagnostique

1910

من شأنهم التفاعل بشكل أكثر حساسية تجاه تأثيرات فولتارين والذين لا ينبعي بهم وبالتالي لا أخذ الجرعة الدنيا الفعالة، على سبيل المحيطة.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليمول من الصوديوم (23 ملغم) لكل وحدة جرعة، أي أنه علماً "خال من الصوديوم". لذلك لا تأخذ فولتارين إلا بعد أن تستشير طبيبك، إذا كنت تعاني من عدم تحمل الميدروكربونات.

الاستعمال أثناء الحمل والرضاع: الحمل

لا يجوز تناول فولتارين إلا عند الشرورة القصوى وبوصفة الطبيب. إذا تم تناوله خلال الأشهر الستة الأولى من الحمل، يجب أن تبقى الجرعة منخفضة قدر الإمكان وأن تكون مدة العلاج قصيرة قدر الإمكان. يمكن أن يؤدي تناول المقاير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات اعتباراً من الأسبوع العشرين من الحمل إلى آثار ضارة على طفلك الذي لم يولد بعد. إذا كان العلاج بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية يوم أكثر من يومين، فف يحاج طبيبك إلى مرافقية كمية السائل الأمينوسي في الرحم.

إذا كنت حاملاً أو كنت تتوين الحمل، لا يمكنك أخذ فولتارين إلا بعد أن تكوني ناقشت الأمر مع طبيبك. لا ينبعي استعمال فولتارين في حال الفصل الأخير من الحمل.

الرضاع لا ينبعي استعمال فولتارين في خلال فترة الإرضاع إلا إذا سمح لك الطبيب مراجحة بذلك.

التأثير على قيادة السيارات أو استعمال الألات يمكن أن يوثر هذا الدواء على رذات القفل وعلى القدرة على القيادة وعلى استعمال الأدوات أو الألات.

يجب عليك بشكل خاص عدم قيادة سيارة أو استعمال الألات ويجب أن تتصل بطبيبك على الفور عند الشعور بدوران أو باضطرابات بصرية أو باضطرابات حصبية مركبة أخرى.

السواح ذات التأثير المعروف: السكروز

3. كيف يستعمل فولتارين؟[®] الطبيب هو من يحدد بشكل فردي مقدار الجرعة وطريقة الاستعمال حسب خطورة الاضطرابات والعمر. من المهم أن تتبع بدقة تعليمات طبيبك. لا تختط الجرعة اليومية الموصى بها أو مدة العلاج المحددة من طبيبك.

إذا كنت تأخذ فولتارين لأكثر من ذلك غير مصاب بأقل جانبيّة مخفية. طبيبك ياتنظام لتأكد من ذلك غير مصاب بأقل جانبيّة مخفية.

تكون الجرعة اليومية في بداية العلاج عادة 100-150 ملغم.

فولتارين® 75 ملغم ، أقراص مغلفة. علبة من 20 قرصاً

فولتارين® 100 LP 100 ملغم ، أقراص ملمسة. علبة من 10 أقراص

المادة الفعالة: ديكلوفيناك الصوديوم

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء. احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً. إذا كان لديك أي سؤال آخر أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي. لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصياً. لا تعطه لأشخاص آخرين، فقد يؤديهم حتى لو كانت عوارض مرضاهم مماثلة لعوارض مرضك.

إذا أصبح أحد الآثار الجانبية خطيراً أو إذا لاحظت أثراً جانبياً غير مذكور في هذه النشرة، أعلم الطبيب أو الصيدلي. يرجى الإبلاغ عن أي عارض جانبية مشتبه بها غير منصة الإبلاغ الوطنية عبر الإنترنت. ستجد المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع على: www.capm-sante.ma

ماذا تحتوي هذه النشرة:

- ما هو فولتارين® وما هي دواعي استعماله؟
- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال فولتارين®؟
- كيف يستعمل فولتارين®؟
- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
- كيف يحفظ فولتارين®؟
- معلومات إضافية

استعمال؟

بير ستيرويد

يتميز

الاتهاب مثل الالم

روستانغلاندين

غير أن هذا الدواء لا

6 118001 030408


© VOLTAREN® SR 75 mg
 Comprimés enrobés

PPV : 76.20 DH

يمكنك علاج الآسياب.

NOTICE : INFORMA

TENORETIC 50 mg/12.5 mg

Aténolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TENORETIC 50 mg/12.5 mg, comprimé pelliculé et dans quelles conditions de prendre
2. Quelles sont les informations à prendre sur TENORETIC 50 mg
3. Comment prendre TENORETIC 50 mg
4. Quels sont les effets indésirables
5. Comment conserver TENORETIC 50 mg
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Maphar
Bd Alkmia N° 6, Ql.
Sidi Bernoussi, Casablanca
Tenoretic 50mg/12,5mg

CP pelli b30
P.P.V : 65,40 DH

6 118001 182350

1. QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 MG/12,5 MG, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique ANTIHYPERTENSEUR / ASSOCIATION FIXE D'UN BETA-BLOQUANT ET UN SALIDIURETIQUE (C : système cardio-vasculaire)

NOTICE : INFORMA

TENORETIC 50 mg/12.5 mg

Aténolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TENORETIC 50 mg/12.5 mg, comprimé pelliculé et dans quelles conditions de prendre
2. Quelles sont les informations à lire sur la boîte de TENORETIC 50 mg
3. Comment prendre TENORETIC 50 mg
4. Quels sont les effets indésirables
5. Comment conserver TENORETIC 50 mg
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Maphar
Bd Alkmia N° 6, Ql.
Sidi Bernoussi, Casablanca
Tenoretic 50mg/12,5mg

CP peli b30
P.P.V : 65,40 DH

6 118001 182350

1. QU'EST-CE QUE TENORETIC 50 MG/12,5 MG, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique ANTIHYPERTENSEUR / ASSOCIATION FIXE D'UN BETA-BLOQUANT ET UN SALIDIURETIQUE (C : système cardio-vasculaire)

durée du traitement.
Dans tous les cas,
si vous avez pris
prévenez immédiatement un
importe avec vous
les signes d'un sur-
tiges.

Si vous oubliez de prendre la
Prenez-la dès que possible.
moment de prendre la
dose double pour la
Si vous arrêtez de prendre la
N'arrêtez pas de prendre la
médecin.

Si vous avez d'autre
plus d'information :
3. QUELS SONT
Comme tous les médicaments, ZYLORIC peut causer des effets indésirables.
Le monde.

Si vous présentez immédiatement à un spécialiste ou de la Hypersensibilité.

Les signes peuvent être peu fréquents (peu fréquents) :
• Desquamation de la bouche.

• Très rarement, une soudaine, des palpitations.
Rares (peuvent être) :
• Fièvre et frissons (pauvres) et sensations de froid.
• Réactions d'hyperactivité articulaires et rénales (fonction hépatique normale).
• Tout changement dans la gorge, du nez, des sinus, des cloques généralisées.

• Saignements d'origine générale (organes génitaux).
Très rares (peuvent être) :
• Un choc anaphylactique a été présent dans l'histoire d'allopurinol.

Si vous ressentez une apparaître avec des fréquents (peuvent être) :
• Eruption cutanée d'arrêter immédiatement votre thérapie.

Peu fréquents (peuvent être) :
• Douleur de l'estomac, troubles digestifs peuvent être.
• Anomalies au niveau des reins tels que la néphropathie.

Rares (peuvent être) :
• Occasionnellement, des effets sur votre système immunitaire peuvent être facilement identifiables.
• Des signes d'infection peuvent être.

Très rares (peuvent être) :
• Fièvre (température élevée), présence de sueur, taux élevés de sucre dans le sang.

• Sentiment général de malaise.



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés à libération contrôlée ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Ce médicament agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certaines maladies, telles que les calculs rénaux ou de certains types de maladie rénale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise d'angine de poitrine.
- Êtes d'origine chinoise.
- Avez des problèmes de peau particulièrement :
• Des éruptions cutanées avec l'allopurinol. Faites particulièrement attention au niveau de la bouche (yeux rouges, prématurément, cernes sous les yeux, courbatures (surtout les jambes), une apparition de l'acide urique dans tout le corps et une desquamation de la peau). L'éruption peut évoluer vers une urticaire ou une éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre ce médicament.

LOT 232779
EXP 08/2027
PPV 29.20 DH

ents pré
des ulc
et une co
es sont
maux

...). L'éruption peut évoluer vers une urticaire ou une éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre ce médicament.



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
 - Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensin).
 - Souffrez actuellement d'une c
 - Etes d'origine chinoise, ethnies
 - Avez des problèmes de thyroïde
- Faites particulièrement attention
- Des éruptions cutanées ont l'allopurinol. Fréquemment, l'én
 - niveau de la bouche, de la gorge, etc (yeux rouges et gonflés). C
 - précédées par des symptômes
 - courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

LOT 232779
 EXP 09 2027
 PPV 29.20 DH

l'allergie
 • Si
 past
 Autr
 Infor
 pour
 • As
 • Th
 • Mé
 • Vid
 • Did
 • Ant
 • Mé
 • Mé
 press
 • Mé
 • Mé
 com
 diuré
 • Mé
 warfa
 • Tou
 Veuillez
 récen
 sans
 Gros
 Si vo
 planifi
 avant
 L'utilis
 médier
 En ra
 conse

Cond
 Dans
 ments
 condu

Liste

Si votr
 contac
 L'utilis
 intoléra
 malabs

3. COM
 Veillez
 de votr
 doute.
 Les co
 repas.
Posolo
 La poso
 urique.
 Les pos
 Vous co
 cas éch
 Si vous
 médec
 les pris
 semain
 devra é
Utilisat
 Les pos
Mode e
 Voe ora
 Les co
 repas.