

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

202479

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule 47 80

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KHOU DABI

FATIMA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. 16 45 74 19 50

Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

دكتور الطالبي مصطفى  
Doctor Mustapha TARY  
ORL-Allergologue  
62 Bloc 42 Sidi Othmane, CASA  
Tél: 05 22 59 98 70  
INP: 061126165

Date de consultation : 23 MARS 2024

Nom et prénom du malade : KHOU DABI FATIMA Age: .....

Lui-même

Conjoint

Enfant

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....



#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23 MARS 2021	C2		2500 H	Dr. MUSTAPHA TARY ORL - Allergologue 62, Bloc 47 Sidi Othmane, CASA Télé: 06 22 55 98 70 M. 06 126 165

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p>MARPHACIE IBNOUSSIR EL ALIA Boulevard Sidi Othmane Casablanca - Tél.: 05 22 37 19 63 N° 46 Av. du Nii Sidi Othmane AC : 496033 IF : 501134293137 ICE : 002737880000057</p>	23/3/24	133.50

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION


O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

		H	H
		25533412	21433552
		00000000	00000000
<b>D</b>		00000000	00000000
		35533411	11433553

[Création, remont, adjonc]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr Musapha TARY

Spécialiste :

- \* ORL et chirurgie Maxillo-Cervico-faciale
- \* Chirurgie de surdité, Ronflement et vertige
- \* Formation approfondie à l'IGP (Bordeaux-france)
- \* Diplôme d'allergologie et immunologie clinique
- \* Ancien Chirurgien des hôpitaux
- \* Expert assermenté près des tribunaux



الدكتور مصطفى الطاري

اختصاص:

- أمراض و جراحة الأنف، الأنفونجتير  
جراحة الوجه والعنق والفك  
جراحة الصمم، علاج الشخير والهوار  
تكوين معمق بـ وجـ (بوردو - فرنسا)  
دبلوم في تشخيص وعلاج أمراض الدنسية  
جراح سابق بالمستشفيات  
خبير مطـ لـ المحاكم

Casablanca le : 23 MARS 2024

R Houdari fatma

37.20  
6

L250x42 1/3 pilule

~~PHARMACIE IENOU ZAHR EL ALIA  
BLOC 22 N° 46 Av. du N° Sidi Othmane  
Casablanca - Tél.: 05 22 37 19 63  
RC : 49603301 - F : 50113439  
ICE : 00273900000067~~

03 gouttes à 500 x 02  
mls

2130x6R3  
0

Tanakon

~~PHARMACIE IENOU ZAHR EL ALIA  
BLOC 22 N° 46 Av. du N° Sidi Othmane  
Casablanca - Tél.: 05 22 37 19 63  
RC : 49603301 - F : 50113439  
ICE : 00273900000067~~

25.00

0 fsu oxyprom 10v

133.50 pilule x 31

6 1117050 213497

PPC	25.00 DH
LOT	8010860

شارع النيل سيدى عثمان بلوك 40 رقم 62 (أمام صيدلية ابنة زهر) - الهاتف: 06 28 35 52 69 - 0522 59 98 70

E-mail : mustapha.tary@gmail.com

دكتور مصطفى الطاري  
Dr. Musapha TARY  
ORL - Allergologie  
Bloc 42 Sidi Othmane, CASA  
Tél: 05 22 59 98 70  
INP: 061126165

# Laroxyl® 40 mg/ml

Solution buvable en gouttes

Amitriptyline

## Composition

Solution buvable dosée à 4% d'amitriptyline (présente sous forme de chlorhydrate d'amitriptyline)

Excipients : alcool éthylique, glyciné, eau purifiée. Exipients à effet notoire : alcool éthylique, glyciné.

Flacon compte - gouttes de 20 ml. 1 goutte = 1 mg.

## Dans quelles cas utiliser ce médicament (indications)

Ce médicament est un antidépresseur.

Il est indiqué :

- dans des épisodes dépressifs d'intensité légère, modérée ou sévère,
- dans certaines douleurs ne répondant pas aux antalgiques habituels,
- dans l'épilepsie nocturne de l'enfant (émission involontaire d'urine la nuit).

## Dans quelles cas ne pas utiliser ce médicament (contre-indications)

Faites attention avec LAROXYL® 40 mg/ml, solution buvable :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie connue à l'amitriptyline
  - risque de glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
  - difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
  - infarctus du myocarde récent,
  - traitement par un autre antidépresseur (imipramizide, nialamide) ou par le seudoxyde.
- Le médicament ne doit généralement pas être utilisé dans les cas suivants, sauf avis contraire de votre médecin :
- traitement par un autre antidépresseur (moclobémide, toloxatone) ou par des médicaments agissant sur le système cardiovasculaire (clonidine ou apparentés, adrénairene, noradrérenaline, dopamine) par voie injectable).

## Mises en garde spéciales

Ne pas interrompre brutalement le traitement. De rares cas de syndrome de sevrage (céphalées, malaises, nausées, anxiété, troubles du sommeil) ayant été observés à l'arrêt du traitement, il est recommandé de réduire progressivement les doses et de surveiller tout particulièrement le patient durant cette période.

La prise concomitante d'amitriptyline avec de l'alcool, de la clonidine, ou de la guanafacine, un IMAO-A sélectifs (moclobémide, toloxatone), du linézolide, ou un sympathomimétique alpha et bêta (voie parentérale) est déconseillée (voir Interactions).

Comme pour tous les autres antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement, même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin.

**Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux :**

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles

angoisseux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agression envers vous-même) ou suicidie. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement. Vous êtes alors susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants:

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé.

- si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était accru chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychiatrique et traités par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital.

## Précautions d'emploi

Insonnie ou nervosité en début de traitement peuvent justifier une diminution de la posologie ou un traitement transitoire symptomatique.

En cas de virage maniaque franc, le traitement par l'amitriptyline sera interrompu et, le plus souvent, un neuroleptique sédatif sera prescrit.

Chez les patients épileptiques ou ayant des antécédents d'épilepsie, il est prudent de renforcer la surveillance clinique et électrique, en raison de la possibilité d'abaissement du seuil épileptogène. La survenue de crises convulsives impose l'arrêt du traitement.

L'amitriptyline doit être utilisée avec prudence :

- chez le sujet âgé présentant :
- une plus grande sensibilité à l'hypotension orthostatique et à la sédation;
- une constipation chronique (risque d'iléus paralytique);
- une éventuelle hypertrophie prostatique;
- chez les sujets porteurs de certaines affections cardiovasculaires, en raison des effets quinidiniques, tachycardisants et hypotenseurs de cette classe de produits;

- chez les patients présentant des neuropathies avec troubles neurogénétiques sévères, en raison de l'augmentation du risque d'hypotension orthostatique;
- dans les insuffisances hépatiques et rénales, en raison du risque de surdosage (voir Pharmacocinétique).

Ce médicament contient 2,5 mg d'alcool par goutte. Il est déconseillé chez les patients souffrant de maladie du foie, d'alcoolisme, d'épilepsie, de même que chez les femmes enceintes.

## Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Vous ne devez pas prendre ce médicament en même temps que certains autres médicaments de la dépression (imipramizole, nialamide) ou le seudoxyde. Vous ne devez généralement pas prendre ce médicament, sauf avis contraire de votre médecin, en même temps que :

- certains médicaments de la dépression (moclobémide, toloxatone)
- certains médicaments agissant sur le système cardiovasculaire (clonidine et apparentés, et

adrénaline, noradrénaline, dopamine par voie injectable).

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Grossesse, allaitement

En cas de besoin, ce médicament peut vous être prescrit ou maintenu durant votre grossesse. Dans le cas où ce traitement doit être pris jusqu'à l'accouchement, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire dans la mesure où certains effets du traitement peuvent se manifester aussi chez l'enfant.

Ce médicament passe en faibles quantités dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter d'allaiter pendant la durée du traitement.

De manière générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

## Conducteurs et utilisateurs de machines

L'attention est attirée sur la somnolence et la baisse de vigilance attachées à l'emploi de ce médicament.

## Posologie / Mode et voie d'administration / Durée du traitement

Voie orale. Avoir le médicament avec un peu d'eau.

Le traitement est habituellement de plusieurs mois (de l'ordre de 6 mois).

N'arrêtez pas votre traitement sans avis médical, même si vous ressentez une amélioration.

Dans tous les cas se conformer à la prescription médicale.

## Conduite à tenir en cas de surdosage

Prévenez immédiatement un médecin ou les dispositions nécessaires.

## Risque de syndrome de sevrage

De rares cas de syndrome de sevrage (tête, malaises, nausées, anxiété, sommeil) ayant été observés à l'arrêt du traitement, ne pas interrompre celui-ci sans l'avis de votre médecin.

## Effets non souhaités et gênants (effets indésirables) :

Ils découlent pour la plupart des propriétés pharmacologiques des antidépresseurs imipraminiques.

- Liés aux effets périphériques de la molécule : ils sont habituellement bénins et cèdent le plus souvent à la poursuite du traitement ou à une réduction de la posologie.

- effet anticholinergique (par ordre de fréquence décroissante) : sécheresse de la bouche, constipation, troubles de l'accommodation, tachycardie, sueurs, troubles de la miction et éventuellement rétention urinaire;
- effet adrénoïdylique : hypotension orthostatique, impuissance.

- Liés aux effets centraux :

- fréquemment observée : somnolence ou sédation (effet antihistaminique), plus marquée en début

de traitement;

- beaucoup plus rares : tremblements, crises convulsives sur terrain prédisposé, états confusionnels transitoires, syndrome sérotoninergique (en association).

- Liés à la nature même de la maladie dépressive :
- levée de l'inhibition psychomotrice, avec risque suicidaire;
- inversion de l'humeur avec apparition d'épisodios maniques;
- réactivation d'un délire chez les sujets psychotiques;
- manifestations paroxystiques d'anxiété.

Des cas d'idées et de comportements suicidaires ont été rapportés durant le traitement par LAROXYL® ou peu après son arrêt ( voir mises en garde et précautions d'emploi).

- Les antidépresseurs imipraminiques peuvent également entraîner :
- prise de poids,
- troubles de la conduction ou du rythme (avec des doses élevées),
- troubles endocriniens: hyperthrophie mammaire, galactorrhée,
- bouffées de chaleur,
- réactions cutanées allergiques,
- dysarthrie,
- hépatites cytolytiques ou cholestastiques exceptionnelles,
- troubles hématologiques: hyperéosinophilie, leucopénie, agranulocytose, thrombopénie,
- syncope.

## Effet de classe :

Des études épidémiologiques, réalisées chez des patients âgés de 50 ans ont montré un risque accru de fractures chez les patients recevant des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (ISRS) ou sérotoxines tricycliques. Le mécanisme de ce risque est inconnu.

En épidésie, les posologies préconisées sont plus basses par rapport à celles utilisées dans la dépression et les effets indésirables sont moins marqués.

Certains de ces effets indésirables peuvent être prévenus ou combattus par des thérapeutiques adjuvantes ou correctrices, voir une réduction de la posologie.

En raison de la présence de glycérol dans la solution buvable, risque de troubles digestifs et de diarrhée.

## Conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

PPV:37DH20

PER: 11/26

LOT: M404

autres heures par rapport à celles utilisées dans la dépression et les effets indésirables sont moins marqués.

Certains de ces effets indésirables peuvent être prévenus ou combattus par des thérapeutiques adjuvantes ou correctrices, voir une réduction de la posologie.

En raison de la présence de glycérol dans la solution buvable, risque de troubles digestifs et de diarrhée.

## Conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

**Ne laissez jamais un médicament à la portée des enfants**

Tableau A (liste I)

**Fabriqué par bottu.l.a.  
S.A. Allemagne, produite par Boehringer Ingelheim - Canada  
S. Research - Pharmacie Régionale**





## Durée du traitement

Se conformer à l'avis de votre médecin.

## Si vous oubliez de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### Résumé du profil de sécurité

Les effets indésirables les plus fréquents sont : douleurs abdominales, diarrhée et vertiges.

Si vous développez une réaction allergique sévère (angio-cédème) se manifestant par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, cessez immédiatement de prendre ce médicament et recherchez d'urgence un avis médical.

Autres effets indésirables possibles :

- Fréquents (peut concerner jusqu'à 1 personne sur 10)
  - Réaction allergique, - Difficulté à respirer, - Maux de tête, - Syncope, - Indigestion, - Nausées, - Eczéma, - Démangeaisons.
  - Peu fréquents (peut concerner jusqu'à 1 personne sur 100)
    - Urticaire, - Eruption cutanée.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

### La substance active est :

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extrait sec raffiné et quantifié de feuille de) ..... 40,00 mg  
Quantifié :

- 8,8 à 10,8 mg de flavonoïdes exprimés en héterosides flavoniques
- 1,1 à 1,4 mg de ginkgolides A, B et C
- 1,0 à 1,3 mg de bilobalide

1er solvant d'extraction : acétone 60 % m/m  
Rapport drogue/extrait : 35-67 : 1

Pour un comprimé enrobé

### Les autres composants sont :

I lactose monohydraté, cellulose microcristalline, olioïdale anhydre, talc, hypromellose, macrogol oxyde de titane, oxyde de

LOT : 23E009V  
PER : 07/2016

TANAKAN 40MG

CP ENR B30

P.P.V : 71DH30



6 118000 011545

Ce médicament est vendu sous forme de comprimés enrobés. Boîte de 30.

AN 40 mg, comprimé l'emballage extérieur

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 02/08/2017.

IPSEN

Consumer HealthCare

Fabriqué sous licence par :

maphar

Boulevard ALKIMIA N°6 Ql-Sidi Bernoussi,  
Casablanca.

4000085-01