

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-513521

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input checked="" type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)		<b>21969</b>	
Matricule : <b>12327</b>		Société : <b>RAM</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	Autre : <b>MDAGHRI FILALI MOUNIR</b>	
Nom & Prénom : <b>02/09/1985</b>			
Date de naissance : <b>RES AL FIRDAOUI GH 25 AL 44 APP 79</b>			
Adresse : <b>OLFA CASA</b>			
Tél. : <b>0661 08 7775</b>		Total des frais engagés : <b>974,9 Dhs</b>	

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin : <b>DR. LACHNAB ABDERRAHIM</b> Dr. Lachhab Abderrahim - DU Diabétologue 3 <sup>e</sup> étage, Alazhar 3ème tranche R.D.C - Casablanca Tel: 05 22 73 59 73			
Date de consultation : <b>08/09/2011</b>			
Nom et prénom du malade : <b>MDAGHRI FILALI MOUNIR</b>			
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie : <b>Affection maladie</b>			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : <b>Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.</b>			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.  
**Fait à : CASABLANCA LE 08/09/2011** **Le : 08/09/2011**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/09/2019	Consultation	gmr	15000	DR. LACHHAB ABDERRAHMANE Omar 1 Alazhar 7ème Tranche Casablanca 0522-11-5973

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>GR. AL RUDA HAYEL CASABLANCA 1-05-22/55606</i>	<i>11/2/2020</i>	<i>77910 4580 89192</i>

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES																		
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																		
<b>Important :</b> Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF																		
	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
			INP : <input type="text"/>															
			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>															
			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>															
			DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>															
			FIN D'EXECUTION <input type="text"/>															
	<b>O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES</b> 	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
		<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">35533411 11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> </tr> </table>			H	21433552	25533412	00000000	D		00000000		G		35533411 11433553		B	
		H	21433552															
		25533412	00000000															
		D																
		00000000																
		G																
		35533411 11433553																
		B																
<p style="text-align: center;"><b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>																		
			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>															
			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>															
			DATE DU DEVIS <input type="text"/>															
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>															

# Dr. Abderrahim LACHHAB

Diplômé d'Etat de la Faculté de Médecine  
CHU Ibn Rochd Casablanca

## MEDECINE GENERALE

Ancien FF interne à l'hôpital  
Mohamed V - Hay Mohammadi  
Tél : 05 22 73 59 73



# الدكتور عبد الرحيم الاشھب

خريج كلية الطب - المركز  
الجامعي ابن رشد بالبيضاء  
الطب العام

داخلي سابقًا بمستشفى  
محمد الخامس الحسني المحمدى  
الهاتف : 05 22 73 59 73

Casablanca le, 04/02/2020

Mr MDAGHRI FILALI Mounir

37.20

120 P1

FUCITHALMIC

1 goutte, 2 fois par jour

S.V

AERIUS B/30

1 cp / j, le matin

S.V

4580 X9 CORTANCYL 20

5 cps / j, , ap pet dej , pd 5 js

S.V

1400 X9 HEXOMÉDINE

1 app 2 / j au niveau du gland et le pourtour

S.V

3920 X9 FUCIDINE CREME

1 app 2 / j, après l'Hexomedine

S.V

78.00 X6 NOMYC 150 MG B/4

1 gél / semaine, av, pd 6 mois +++

S.V

PHARMACIE PARIS EL KHAR  
30, CH. AL AZHAR 10002242  
CASABLANCA  
tel: 05 22 73 59 73

PHARMACIE PARIS EL KHAR  
30, CH. AL AZHAR 10002242  
CASABLANCA  
tel: 05 22 73 59 73

PHARMACIE PARIS EL KHAR  
30, CH. AL AZHAR 10002242  
CASABLANCA  
tel: 05 22 73 59 73

DR. LACHHAB Abderrahim  
Casablanca - Kariat Al Azhar - 3ème Tranche - Sidi Bernoussi - Casablanca  
Tél: 05 22 73 59 73  
R.D.C. Casablanca  
Chambre des pharmaciens  
14, Avenue 20 Mai 10002242  
Al Azhar - Casablanca  
www.cpc.ma

21 ، عمارة 11 - الشطر III - قرية الازهر - سيدى الibernوصي - الدار البيضاء

21, Immeuble 11 - Kariat Al Azhar - 3ème Tranche - Sidi Bernoussi - Casablanca  
cabinet.dr.lachhab@gmail.com

Hexomédine®  
Solution



6 118000 180395

إِكْرُومِيدِين®  
مَحْلُولٌ

١٤,٠٠

Hexomédine®  
Solution



6 118000 180395

إِكْرُومِيدِين®  
مَحْلُولٌ

١٤,٠٠



قارورة ٤٥ مل

# Cortancyl® 20 mg

Prednisone

Comprimé sécable

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### Composition

Prednisone .....

Excipients : amidon de maïs, sucre, comprimé sécable.

### Forme pharmaceutique

Comprimé sécable (boîte de 20)

### Classe pharmaco-thérapeutique

GLUCOCORTICOIDE - USAGE HUMAIN  
(H : Hormones non sexuelles)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un corticoïde. Il est indiqué dans certaines maladies inflammatoires et anti-inflammatoires.

### ATTENTION !

#### Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE PRIS :

- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- antécédent d'allergie à l'un des constituants.

**EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Mises en garde spéciales

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

### AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladies du colon, d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment

45180

sanofi aventis



6 118000 060680

# Cortancyl® 20 mg

Prednisone

Comprimé sécable

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### Composition

Prednisone .....

Excipients : amidon de maïs, sucre, comprimé sécable.

### Forme pharmaceutique

Comprimé sécable (boîte de 20)

### Classe pharmaco-thérapeutique

GLUCOCORTICOIDE - USAGE HUMAIN  
(H : Hormones non sexuelles)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un corticoïde. Il est indiqué dans certaines maladies inflammatoires et anti-inflammatoires.

### ATTENTION !

#### Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE PRIS :

- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- antécédent d'allergie à l'un des constituants.

**EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Mises en garde spéciales

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

### AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladies du colon, d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment

**Cortancyl® 20mg**

20 Comprimés



6 118000 060680

son effet

# Aerius® 5 mg comprimés pelliculés



## Desloratadine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionnée dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Aerius et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aerius
3. Comment prendre Aerius
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aerius
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que Aerius et dans quel cas est-il utilisé ?

#### Qu'est-ce que Aerius ?

Aerius contient de la desloratadine qui est un antihistaminique.

#### Comment agit Aerius ?

Aerius est un médicament contre l'allergie qui ne vous rend pas somnolent. Il aide à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

#### Quand Aerius doit-il être utilisé ?

Aerius soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens) chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus. Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démange, les démangeaisons du palais, les yeux qui démangent, qui sont rouges ou larmoyants.

Aerius est aussi utilisé pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte cutanée provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariennes.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aerius ?

#### Ne prenez jamais Aerius

- si vous êtes allergique à la desloratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ou à la loratadine.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre Aerius :

- si vous présentez une maladie des reins.
- si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de convulsions.

#### Utilisation chez les enfants et les adolescents

Ne donnez pas ce médicament à des enfants de moins de 12 ans.

#### Autres médicaments et Aerius

Il n'y a pas d'interactions connues d'Aerius avec d'autres médicaments.

devez donc suivre les instructions de votre médecin.

Si vous avez pris plus d'Aerius que vous n'auriez dû Prenez Aerius uniquement comme il vous a été prescrit. Aucun problème sérieux n'est attendu lors d'un surdosage accidentel. Cependant, si vous avez pris plus d'Aerius que vous n'auriez dû, prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

#### Si vous oubliez de prendre Aerius

Si vous oubliez de prendre votre dose à temps, reprendre la dose normalement. Ne pas prendre deux doses en même temps, sauf si votre traitement normallement. Ne pas vous avez oublié de prendre.

#### Si vous arrêtez de prendre Aerius

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin,

### 4. Quels sont les effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce sont des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement.

Depuis la commercialisation d'Aerius, des cas de réactions indésirables ont été rapportés. Les effets indésirables les plus courants sont : difficultés à respirer, sifflements bronchiques, démangeaisons, éruption cutanée, douleur de tête, nausées, vomissements, somnolence, insomnie, douleur musculaire, mouvements corporels.


Depuis la commercialisation d'Aerius, des effets indésirables rares ont été rapportés. Ces effets indésirables peuvent être graves et nécessitent une hospitalisation.

Très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000. Ces effets indésirables peuvent être graves et nécessitent une hospitalisation.

Très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000. Ces effets indésirables peuvent être graves et nécessitent une hospitalisation.

Augmentés, inflammation du foie, anomalies de la coagulation, réactions allergiques, réactions anaphylactiques.

Fréquence indéterminée : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données.



**AERIUS® 5 mg**  
30 comprimés pelliculés



6 118 000 050 124

# Fucidine® 2% crème

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre pharmacien. Ce médicament a été prescrit pour vous et ne doit pas être donné à une autre personne.

## ◆ IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

FUCIDINE® 2 pour cent, crème.

39,70

## COMPOSITION

Acide fusidique

Excipients q.s.p.

Liste des excipients : bu

Tube de 15 g.

Ce médicament est un A

Il est préconisé dans :

## ◆ ATTENTION !

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament NE EST PAS

• allergie à l'acide fusidique

• infections mammaires

EN CAS DE DOUBTE, IL FAUT CONSULTER UN MÉDECIN

### MISES EN GARDE SPÉCIFIQUES

NE PAS LAISSER À L'ENFANT

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• La crème ne doit pas être appliquée sur les yeux

• Ne pas utiliser la crème si elle a perdu son état de fraîcheur

EN CAS DE DOUBTE, IL FAUT CONSULTER UN MÉDECIN

### INTERACTIONS MÉDÉDICAMENT

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas d'allaitement, ne pas appliquer sur le sein.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'allaitement, de consulter votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

### EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR CERTAINS

Butylhydroxyanisole, sorbate de potassium.

## ◆ COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

### POSOLOGIE

Une ou deux applications par jour après nettoyage de la surface infectée. Limiter le traitement à une semaine, à titre indicatif.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DU MÉDECIN.

### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie cutanée, application locale avec ou sans pansement. Eviter l'application dans les voies respiratoires.

Cette présentation sous forme de crème est plus particulièrement adaptée au traitement des infections cutanées superficielles.

## ◆ EFFETS INDÉSIRABLES

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, CAUSER DES EFFETS INDÉSIRABLES.

Dans certains cas, il est possible que survienne un eczéma allergique avec perte de pigmentation de la peau. Dans ce cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

En fonction de l'absorption du produit à travers la peau, en particulier chez les enfants, une réaction allergique peut être exclue.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET INDÉSIRABLE QUE VOUS AVIEZ NOTÉ.

## ◆ CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITÉE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONTRE

### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à température ambiante (inférieure à 25 °C).

## ◆ CONDITION DE DÉLIVRANCE :

CE MÉDICAMENT EST INSCRIT EN LISTE I

VOTRE PHARMACIEN NE POURRA VOUS EN DÉLIVRER QUE SUR ORDONNANCE DU MÉDECIN.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRÉSCRIT DANS UNE SITUATION

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS

- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MÉDICAL

- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE

Fabriqué sous licence par  POLYMÉDIC

Rue Amyot d'Inville, Quartier Arsalane - Maroc

Dr. M. HOU BACHI : Pharmacien Responsable

Fucidine® 2%

crème

Tube de 15 g

Fucidine® 2% crème

Tube de 15 g



6 118000 120582



# Fucidine® 2% crème

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

## ◆ IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

FUCIDINE® 2 pour cent, crème.

COMPOSITION	Centésimale	Par tube de 15 g
Acide fusidique	2 g	300 mg
Excipients q.s.p.	100 g	15 g

Liste des excipients : butylhydroxyanisole, sorbate de potassium, alcool cétylelique, glycérol, paraffine liquide, polysorbate 60, vaseline, eau purifiée.

Tube de 15 g.

Ce médicament est un ANTIBIOTIQUE A USAGE TOPIQUE (D : Dermatologie).

## ◆ DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un antibiotique.

Il est préconisé dans les infections cutanées dues à certains germes (staphylocoques et streptocoques).

## ◆ ATTENTION !

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'acide fusidique ou à l'un des excipients,
  - infections mammaires lors de l'allaitement en raison du risque d'absorption du produit par le nouveau-né.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE SPÉCIALES

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La crème ne doit pas être appliquée sur l'œil.
  - Ne pas utiliser la crème sur de trop grandes surfaces, en particulier chez le nourrisson.
- EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas d'allaitement, ne pas appliquer sur le sein.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

### EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR CERTAINS PATIENTS

Butylhydroxyanisole, sorbate de potassium.

## ◆ COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

### POSÉOLOGIE

Une ou deux applications par jour après nettoyage de la surface infectée.

Limiter le traitement à une semaine, à titre indicatif.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie cutanée, application locale avec ou sans pansement. Eviter l'application en couche épaisse.

Cette présentation sous forme de crème est plus particulièrement adaptée aux lésions suintantes, macérées et dans les plis.

## ◆ EFFETS INDÉSIRABLES

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

Dans certains cas, il est possible que survienne un eczéma allergique avec parfois des lésions éloignées du lieu de traitement ;

il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

En fonction de l'absorption du produit à travers la peau, en particulier chez le nourrisson, la possibilité d'effets non souhaités au niveau du foie ne peut être exclue.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## ◆ CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT.

### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à température ambiante (inférieure à 25 °C).

## ◆ CONDITION DE DÉLIVRANCE :

CE MEDICAMENT EST INSCRIT EN LISTE I

VOTRE PHARMACIEN NE POURRA VOUS EN DÉLIVRER QUE SUR ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS

- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MEDICAL

- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

Fabriqué sous licence par **R. POLYMÉDIC**

Rue Amyot d'Iville, Quartier Arsalane - Maroc

Dr. M. HOUBACHI : Pharmacien Responsable

Fucidine® 2% crème

Tube de 15 g



6 118000 120582

# NOMYC®

Fluconazole

## COMPOSITIONS

### *NOMYC 50 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule	50,00 mg
---------------------------	-----------	----------

Excipients : q.s.

### *NOMYC 150 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule	150,00 mg
---------------------------	-----------	-----------

Excipients : q.s.

## FORMES ET PRÉSENTATIONS

- Gélule dosée à 50 mg de fluconazole : Boîte de 7 gélules.
- Gélule dosée à 150 mg de fluconazole : Boîte unitaire, 2 et 4 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antifongique triazolé.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

NOMYC est indiqué dans le traitement :

- Des candidoses vaginalies et périnéales, aiguës et récidivantes.
- Des balanites candidosiques.
- Des dermo-épidermomycoses incluant les tinea pedis (intertrigo interorteils), les tinea corporis (Herpès circiné), les tinea cruris (Intertrigo) et les candidoses cutanées.
- Des onychomycoses (tinea unguium).
- Des candidoses oropharyngées, notamment chez les patients immunodéprimés, soit en raison d'une affection maligne soit d'un syndrome de déficience immunitaire acquise (SIDA).
- Des candidoses buccales atrophiques.
- Des cryptococcoses neuromeningénées.
- Traitement d'attaque : son efficacité a été démontrée principalement chez les patients atteints du SIDA.
- Le fluconazole est également indiqué dans le traitement d'entretien des cryptococcoses chez les patients atteints du SIDA. Il doit alors être prescrit indéfiniment.
- Des candidoses systémiques incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), les candidoses œsophagiennes et les candidoses urinaires.
- De la prophylaxie des infections fongiques chez les patients présentant une affection maligne et qui sont prédisposés à ce genre d'infections suite à la chimiothérapie cytotoxique et à la radiothérapie.

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au fluconazole et aux dérivés azotés apparentés,
- Association au Cisapride,
- Femme enceinte ou qui allaita.
- Enfant : les données disponibles sont trop limitées pour recommander son emploi.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## POSLOGIES

Les doses recommandées varient selon le type de l'infection et les conditions particulières de chaque patient.

- **Candidoses vaginalies** : le fluconazole est prescrit en une dose unique de 150 mg. Le traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- **Balanites** : Une dose de 150 mg de fluconazole est administrée en une seule prise.

• **Candidoses oro-pharyngées** : La dose habituelle est de 50 à 100 mg de fluconazole une fois par jour pendant 7 à 14 jours.

Il est parfois nécessaire de prolonger le traitement avec la même dose.

- **Candidoses urinaires** : 100 à 200 mg par jour. La durée du traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- Pour les candidémies, les candidoses disséminées et les atteintes cutanées, la dose recommandée est de 400 mg le premier jour et de 200 mg par jour les jours suivants, augmentée à 400 mg par jour. La durée du traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Méningites cryptococciques et les autres cryptococcoses** : 200 à 400 mg par jour les jours suivants. La durée de traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Dermo-épidermomycoses** incluant tinea pedis (intertrigo) et les candidoses cutanées : la dose recommandée est de 4 semaines. Pour Tinea Pedis, le traitement peut être prolongé à 8 semaines.
- **Les Onychomycoses (Tinea unguilum)** : la dose recommandée devra se poursuivre jusqu'au remplacement des ongles infectés grâce à l'application locale.

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Le Fluconazole est en général bien toléré. Les effets gastro-intestinaux couramment rencontrés.
- Les troubles gastro-intestinaux comportant des nausées, des douleurs abdominales, des céphalées ont été associées au fluconazole.
- Effets allergiques et cutanés : rashes, réactions sévères à type de syndrome de Lyell en particulier au cours de SIDA, réaction d'hypersensibilité.
- Effets hépatiques : augmentation des transaminases hépatiques atteintes hépatiques sévères, éventuellement associées à une insuffisance hépatique, ont été exceptionnellement rapportées.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable rencontré.

## CONSERVATION

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

## CONDITION DE DELIVRANCE

Tableau A.

**NOMYC® 150 mg**

4 Gélules



6 118000 071006

**NOMYC**  
Fluconazole

LOT 199085

EXP 09/22

PPV 78DH00



أفريقيا  
AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Ain Harrouda,

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 - Ain Harrouda 28 630 Mohammedia - Maroc.

# NOMYC®

Fluconazole

## COMPOSITIONS

### *NOMYC 50 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule
Excipients : q.s.	50,00 mg

### *NOMYC 150 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule
Excipients : q.s.	150,00 mg

## FORMES ET PRÉSENTATIONS

- Gélule dosée à 50 mg de fluconazole : Boîte de 7 gélules.
- Gélule dosée à 150 mg de fluconazole : Boîte unitaire, 2 et 4 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antifongique triazolé.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

NOMYC est indiqué dans le traitement :

- Des candidoses vaginalies et périnéales, aiguës et récidivantes.
- Des balanites candidosiques.
- Des dermo-épidermomycoses incluant les tinea pedis (intertrigo interorteils), les tinea corporis (Herpès circiné), les tinea cruris (Intertrigo) et les candidoses cutanées.
- Des onychomycoses (tinea unguium).
- Des candidoses oropharyngées, notamment chez les patients immunodéprimés, soit en raison d'une affection maligne soit d'un syndrome de déficience immunitaire acquise (SIDA).
- Des candidoses buccales atrophiques.
- Des cryptococcoses neuromeningées.
- Traitement d'attaque : son efficacité a été démontrée principalement chez les patients atteints du SIDA.
- Le fluconazole est également indiqué dans le traitement d'entretien des cryptococcoses chez les patients atteints du SIDA. Il doit alors être prescrit indéfiniment.
- Des candidoses systémiques incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), les candidoses œsophagiennes et les candidoses urinaires.
- De la prophylaxie des infections fongiques chez les patients présentant une affection maligne et qui sont prédisposés à ce genre d'infections suite à la chimiothérapie cytotoxique et à la radiothérapie.

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au fluconazole et aux dérivés azotés apparentés,
- Association au Cisapride,
- Femme enceinte ou qui allaita.
- Enfant : les données disponibles sont trop limitées pour recommander son emploi.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## POSLOGIES

Les doses recommandées varient selon le type de l'infection et les conditions particulières de chaque patient.

- **Candidoses vaginalies** : le fluconazole est prescrit en une dose unique de 150 mg. Le traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- **Balanites** : Une dose de 150 mg de fluconazole est administrée en une seule prise.

• **Candidoses oro-pharyngées** : La dose habituelle est de 50 à 100 mg de fluconazole une fois par jour pendant 7 à 14 jours.

Il est parfois nécessaire de prolonger le traitement avec la même dose.

- **Candidoses urinaires** : 100 à 200 mg par jour. La durée du traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- Pour les candidémies, les candidoses disséminées et les atteintes cutanées, la dose recommandée est de 400 mg le premier jour et de 200 mg par jour les jours suivants, augmentée à 400 mg par jour. La durée du traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Méningites cryptococciques et les autres cryptococcoses** : 200 à 400 mg par jour les jours suivants. La durée de traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Dermo-épidermomycoses** incluant tinea pedis (intertrigo) et les candidoses cutanées : la dose recommandée est de 4 semaines. Pour Tinea Pedis, le traitement peut être prolongé à 6 semaines.
- **Les Onychomycoses (Tinea unguilum)** : la dose recommandée devra se poursuivre jusqu'au remplacement des ongles infectés.

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Le Fluconazole est en général bien toléré. Les effets gastro-intestinaux couramment rencontrés.
- Les troubles gastro-intestinaux comportant des nausées, des douleurs abdominales, des céphalées ont été associées au fluconazole.
- Effets allergiques et cutanés : rashes, réactions sévères à type de syndrome de Lyell en particulier au cours de SIDA, réaction d'hypersensibilité.
- Effets hépatiques : augmentation des transaminases hépatiques atteintes hépatiques sévères, éventuellement associées à des effets neurologiques, peuvent survenir.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable rencontré.

## CONSERVATION

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

## CONDITION DE DELIVRANCE

Tableau A.

**NOMYC® 150 mg**

4 Gélules



6 118000 071006

**NOM**  
Fluconazole

LOT 199085

EXP 09/22

PPV 78DH00



أفريقيا  
AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Ain Harrouda,

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 - Ain Harrouda 28 630 Mohammedia - Maroc.

# NOMYC®

Fluconazole

## COMPOSITIONS

### *NOMYC 50 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule	50,00 mg
---------------------------	-----------	----------

Excipients : q.s.

### *NOMYC 150 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule	150,00 mg
---------------------------	-----------	-----------

Excipients : q.s.

## FORMES ET PRÉSENTATIONS

- Gélule dosée à 50 mg de fluconazole : Boîte de 7 gélules.
- Gélule dosée à 150 mg de fluconazole : Boîte unitaire, 2 et 4 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antifongique triazolé.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

NOMYC est indiqué dans le traitement :

- Des candidoses vaginalies et périnéales, aiguës et récidivantes.
- Des balanites candidosiques.
- Des dermo-épidermomycoses incluant les tinea pedis (intertrigo interorteils), les tinea corporis (Herpès circiné), les tinea cruris (Intertrigo) et les candidoses cutanées.
- Des onychomycoses (tinea unguium).
- Des candidoses oropharyngées, notamment chez les patients immunodéprimés, soit en raison d'une affection maligne soit d'un syndrome de déficience immunitaire acquise (SIDA).
- Des candidoses buccales atrophiques.
- Des cryptococcoses neuromeningénées.
- Traitement d'attaque : son efficacité a été démontrée principalement chez les patients atteints du SIDA.
- Le fluconazole est également indiqué dans le traitement d'entretien des cryptococcoses chez les patients atteints du SIDA. Il doit alors être prescrit indéfiniment.
- Des candidoses systémiques incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), les candidoses œsophagiennes et les candidoses urinaires.
- De la prophylaxie des infections fongiques chez les patients présentant une affection maligne et qui sont prédisposés à ce genre d'infections suite à la chimiothérapie cytotoxique et à la radiothérapie.

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au fluconazole et aux dérivés azotés apparentés,
- Association au Cisapride,
- Femme enceinte ou qui allaita.
- Enfant : les données disponibles sont trop limitées pour recommander son emploi.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## POSLOGIES

Les doses recommandées varient selon le type de l'infection et les conditions particulières de chaque patient.

- **Candidoses vaginalies** : le fluconazole est prescrit en une dose unique de 150 mg. Le traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- **Balanites** : Une dose de 150 mg de fluconazole est administrée en une seule prise.

• **Candidoses oro-pharyngées** : La dose habituelle est de 50 à 100 mg de fluconazole une fois par jour pendant 7 à 14 jours.

Il est parfois nécessaire de prolonger le traitement avec la même dose.

- **Candidoses urinaires** : 100 à 200 mg par jour. La durée du traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- Pour les candidémies, les candidoses disséminées et les atteintes cutanées, la dose recommandée est de 400 mg le premier jour et de 200 mg par jour les jours suivants, augmentée à 400 mg par jour. La durée du traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Méningites cryptococciques et les autres cryptococcoses** : 200 à 400 mg par jour les jours suivants. La durée de traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Dermo-épidermomycoses** incluant tinea pedis (intertrigo) et les candidoses cutanées : la dose recommandée est de 4 semaines. Pour Tinea Pedis, le traitement peut être prolongé à 8 semaines.
- **Les Onychomycoses (Tinea unguilum)** : la dose recommandée devra se poursuivre jusqu'au remplacement des ongles infectés grâce à l'application locale.

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Le Fluconazole est en général bien toléré. Les effets gastro-intestinaux couramment rencontrés.
- Les troubles gastro-intestinaux comportant des nausées, des douleurs abdominales, des céphalées ont été associées au fluconazole.
- Effets allergiques et cutanés : rashes, réactions sévères à type de syndrome de Lyell en particulier au cours de SIDA, réaction d'hypersensibilité.
- Effets hépatiques : augmentation des transaminases hépatiques atteintes hépatiques sévères, éventuellement associées à une insuffisance hépatique, ont été exceptionnellement rapportées.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable rencontré.

## CONSERVATION

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

## CONDITION DE DELIVRANCE

Tableau A.

**NOMYC® 150 mg**

4 Gélules



6 118000 071006

**NOMYC**  
Fluconazole

LOT 199085

EXP 09/22

PPV 78DH00



أفريقيا  
AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Ain Harrouda,

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 - Ain Harrouda 28 630 Mohammedia - Maroc.

# NOMYC®

Fluconazole

## COMPOSITIONS

### *NOMYC 50 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule	50,00 mg
---------------------------	-----------	----------

Excipients : q.s.

### *NOMYC 150 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule	150,00 mg
---------------------------	-----------	-----------

Excipients : q.s.

## FORMES ET PRÉSENTATIONS

- Gélule dosée à 50 mg de fluconazole : Boîte de 7 gélules.
- Gélule dosée à 150 mg de fluconazole : Boîte unitaire, 2 et 4 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antifongique triazolé.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

NOMYC est indiqué dans le traitement :

- Des candidoses vaginalies et périnéales, aiguës et récidivantes.
- Des balanites candidosiques.
- Des dermo-épidermomycoses incluant les tinea pedis (intertrigo interorteils), les tinea corporis (Herpès circiné), les tinea cruris (Intertrigo) et les candidoses cutanées.
- Des onychomycoses (tinea unguium).
- Des candidoses oropharyngées, notamment chez les patients immunodéprimés, soit en raison d'une affection maligne soit d'un syndrome de déficience immunitaire acquise (SIDA).
- Des candidoses buccales atrophiques.
- Des cryptococcoses neuromeningénées.
- Traitement d'attaque : son efficacité a été démontrée principalement chez les patients atteints du SIDA.
- Le fluconazole est également indiqué dans le traitement d'entretien des cryptococcoses chez les patients atteints du SIDA. Il doit alors être prescrit indéfiniment.
- Des candidoses systémiques incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), les candidoses œsophagiennes et les candidoses urinaires.
- De la prophylaxie des infections fongiques chez les patients présentant une affection maligne et qui sont prédisposés à ce genre d'infections suite à la chimiothérapie cytotoxique et à la radiothérapie.

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au fluconazole et aux dérivés azotés apparentés,
- Association au Cisapride,
- Femme enceinte ou qui allaita.
- Enfant : les données disponibles sont trop limitées pour recommander son emploi.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## POSLOGIES

Les doses recommandées varient selon le type de l'infection et les conditions particulières de chaque patient.

- **Candidoses vaginalies** : le fluconazole est prescrit en une dose unique de 150 mg. Le traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- **Balanites** : Une dose de 150 mg de fluconazole est administrée en une seule prise.

• **Candidoses oro-pharyngées** : La dose habituelle est de 50 à 100 mg de fluconazole une fois par jour pendant 7 à 14 jours.

Il est parfois nécessaire de prolonger le traitement avec la même dose.

- **Candidoses urinaires** : 100 à 200 mg par jour. La durée du traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- Pour les candidémies, les candidoses disséminées et les atteintes cutanées, la dose recommandée est de 400 mg le premier jour et de 200 mg par jour les jours suivants, augmentée à 400 mg par jour. La durée du traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Méningites cryptococciques et les autres cryptococcoses** : 200 à 400 mg par jour les jours suivants. La durée de traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Dermo-épidermomycoses** incluant tinea pedis (intertrigo) et les candidoses cutanées : la dose recommandée est de 4 semaines. Pour Tinea Pedis, le traitement peut être prolongé à 8 semaines.
- **Les Onychomycoses (Tinea unguilum)** : la dose recommandée devra se poursuivre jusqu'au remplacement des ongles infectés grâce à l'application locale.

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Le Fluconazole est en général bien toléré. Les effets gastro-intestinaux couramment rencontrés.
- Les troubles gastro-intestinaux comportant des nausées, des douleurs abdominales, des céphalées ont été associées au fluconazole.
- Effets allergiques et cutanés : rashes, réactions sévères à type de syndrome de Lyell en particulier au cours de SIDA, réaction d'hypersensibilité.
- Effets hépatiques : augmentation des transaminases hépatiques atteintes hépatiques sévères, éventuellement associées à une insuffisance hépatique, ont été exceptionnellement rapportées.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable rencontré.

## CONSERVATION

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

## CONDITION DE DELIVRANCE

Tableau A.

**NOMYC® 150 mg**

4 Gélules



6 118000 071006

**NOMYC**  
Fluconazole

LOT 199085

EXP 09/22

PPV 78DH00



أفريقيا  
AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Ain Harrouda,

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 - Ain Harrouda 28 630 Mohammedia - Maroc.

# NOMYC®

Fluconazole

## COMPOSITIONS

### *NOMYC 50 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule	50,00 mg
---------------------------	-----------	----------

Excipients : q.s.

### *NOMYC 150 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule	150,00 mg
---------------------------	-----------	-----------

Excipients : q.s.

## FORMES ET PRÉSENTATIONS

- Gélule dosée à 50 mg de fluconazole : Boîte de 7 gélules.
- Gélule dosée à 150 mg de fluconazole : Boîte unitaire, 2 et 4 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antifongique triazolé.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

NOMYC est indiqué dans le traitement :

- Des candidoses vaginalies et périnéales, aiguës et récidivantes.
- Des balanites candidosiques.
- Des dermo-épidermomycoses incluant les tinea pedis (intertrigo interorteils), les tinea corporis (Herpès circiné), les tinea cruris (Intertrigo) et les candidoses cutanées.
- Des onychomycoses (tinea unguium).
- Des candidoses oropharyngées, notamment chez les patients immunodéprimés, soit en raison d'une affection maligne soit d'un syndrome de déficience immunitaire acquise (SIDA).
- Des candidoses buccales atrophiques.
- Des cryptococcoses neuromeningénées.
- Traitement d'attaque : son efficacité a été démontrée principalement chez les patients atteints du SIDA.
- Le fluconazole est également indiqué dans le traitement d'entretien des cryptococcoses chez les patients atteints du SIDA. Il doit alors être prescrit indéfiniment.
- Des candidoses systémiques incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), les candidoses œsophagiennes et les candidoses urinaires.
- De la prophylaxie des infections fongiques chez les patients présentant une affection maligne et qui sont prédisposés à ce genre d'infections suite à la chimiothérapie cytotoxique et à la radiothérapie.

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au fluconazole et aux dérivés azotés apparentés,
- Association au Cisapride,
- Femme enceinte ou qui allaita.
- Enfant : les données disponibles sont trop limitées pour recommander son emploi.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## POSLOGIES

Les doses recommandées varient selon le type de l'infection et les conditions particulières de chaque patient.

- **Candidoses vaginalies** : le fluconazole est prescrit en une dose unique de 150 mg. Le traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- **Balanites** : Une dose de 150 mg de fluconazole est administrée en une seule prise.

• **Candidoses oro-pharyngées** : La dose habituelle est de 50 à 100 mg de fluconazole une fois par jour pendant 7 à 14 jours.

Il est parfois nécessaire de prolonger le traitement avec la même dose.

- **Candidoses urinaires** : 100 à 200 mg par jour. La durée du traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- Pour les candidémies, les candidoses disséminées et les atteintes cutanées, la dose recommandée est de 400 mg le premier jour et de 200 mg par jour les jours suivants, augmentée à 400 mg par jour. La durée du traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Méningites cryptococciques et les autres cryptococcoses** : 200 à 400 mg par jour les jours suivants. La durée de traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Dermo-épidermomycoses** incluant tinea pedis (intertrigo) et les candidoses cutanées : la dose recommandée est de 4 semaines. Pour Tinea Pedis, le traitement peut être prolongé à 8 semaines.
- **Les Onychomycoses (Tinea unguilum)** : la dose recommandée devra se poursuivre jusqu'au remplacement des ongles infectés grâce à l'application locale.

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Le Fluconazole est en général bien toléré. Les effets gastro-intestinaux couramment rencontrés.
- Les troubles gastro-intestinaux comportant des nausées, des douleurs abdominales, des céphalées ont été associées au fluconazole.
- Effets allergiques et cutanés : rashes, réactions sévères à type de syndrome de Lyell en particulier au cours de SIDA, réaction d'hypersensibilité.
- Effets hépatiques : augmentation des transaminases hépatiques atteintes hépatiques sévères, éventuellement associées à une insuffisance hépatique, ont été exceptionnellement rapportées.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable rencontré.

## CONSERVATION

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

## CONDITION DE DELIVRANCE

Tableau A.

**NOMYC® 150 mg**

4 Gélules



6 118000 071006

**NOMYC**  
Fluconazole

LOT 199085

EXP 09/22

PPV 78DH00



أفريقيا  
AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Ain Harrouda,

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 - Ain Harrouda 28 630 Mohammedia - Maroc.

# NOMYC®

Fluconazole

## COMPOSITIONS

### *NOMYC 50 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule
Excipients : q.s.	50,00 mg

### *NOMYC 150 mg*

• Fluconazole (DCI) .....	p. gélule
Excipients : q.s.	150,00 mg

## FORMES ET PRÉSENTATIONS

- Gélule dosée à 50 mg de fluconazole : Boîte de 7 gélules.
- Gélule dosée à 150 mg de fluconazole : Boîte unitaire, 2 et 4 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antifongique triazolé.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

NOMYC est indiqué dans le traitement :

- Des candidoses vaginalies et périnéales, aiguës et récidivantes.
- Des balanites candidosiques.
- Des dermo-épidermomycoses incluant les tinea pedis (intertrigo interorteils), les tinea corporis (Herpès circiné), les tinea cruris (Intertrigo) et les candidoses cutanées.
- Des onychomycoses (tinea unguium).
- Des candidoses oropharyngées, notamment chez les patients immunodéprimés, soit en raison d'une affection maligne soit d'un syndrome de déficience immunitaire acquise (SIDA).
- Des candidoses buccales atrophiques.
- Des cryptococcoses neuromeningées.
- Traitement d'attaque : son efficacité a été démontrée principalement chez les patients atteints du SIDA.
- Le fluconazole est également indiqué dans le traitement d'entretien des cryptococcoses chez les patients atteints du SIDA. Il doit alors être prescrit indéfiniment.
- Des candidoses systémiques incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), les candidoses œsophagiennes et les candidoses urinaires.
- De la prophylaxie des infections fongiques chez les patients présentant une affection maligne et qui sont prédisposés à ce genre d'infections suite à la chimiothérapie cytotoxique et à la radiothérapie.

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au fluconazole et aux dérivés azotés apparentés,
- Association au Cisapride,
- Femme enceinte ou qui allaita.
- Enfant : les données disponibles sont trop limitées pour recommander son emploi.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## POSLOGIES

Les doses recommandées varient selon le type de l'infection et les conditions particulières de chaque patient.

- **Candidoses vaginalies** : le fluconazole est prescrit en une dose unique de 150 mg. Le traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- **Balanites** : Une dose de 150 mg de fluconazole est administrée en une seule prise.

• **Candidoses oro-pharyngées** : La dose habituelle est de 50 à 100 mg de fluconazole une fois par jour pendant 7 à 14 jours.

Il est parfois nécessaire de prolonger le traitement avec la même dose.

- **Candidoses urinaires** : 100 à 200 mg par jour. La durée du traitement doit continuer jusqu'à ce que les analyses du laboratoire et les paramètres cliniques prouvent que l'infection fongique est contrôlée, et sa durée doit être de telle sorte à éviter une récurrence de l'infection.
- Pour les candidémies, les candidoses disséminées et les atteintes cutanées, la dose recommandée est de 400 mg le premier jour et de 200 mg par jour les jours suivants, augmentée à 400 mg par jour. La durée du traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Méningites cryptococciques et les autres cryptococcoses** : 200 à 400 mg par jour les jours suivants. La durée de traitement dépendra de l'évolution de l'infection.
- **Dermo-épidermomycoses** incluant tinea pedis (intertrigo) et les candidoses cutanées : la dose recommandée est de 4 semaines. Pour Tinea Pedis, le traitement peut être prolongé à 6 semaines.
- **Les Onychomycoses (Tinea unguilum)** : la dose recommandée devra se poursuivre jusqu'au remplacement des ongles infectés grâce à l'application locale.

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Le Fluconazole est en général bien toléré. Les effets gastro-intestinaux couramment rencontrés.
- Les troubles gastro-intestinaux comportant des nausées, des douleurs abdominales, des céphalées ont été associées au fluconazole.
- Effets allergiques et cutanés : rashes, réactions sévères à type de syndrome de Lyell en particulier au cours de SIDA, réaction d'hypersensibilité.
- Effets hépatiques : augmentation des transaminases hépatiques atteintes hépatiques sévères, éventuellement associées à des effets neurologiques, peuvent survenir.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable rencontré.

## CONSERVATION

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

## CONDITION DE DELIVRANCE

Tableau A.

**NOMYC® 150 mg**

4 Gélules



6 118000 071006

**NOMYC**  
Fluconazole

LOT 199085

EXP 09/22

PPV 78DH00



أفريقيا  
AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Ain Harrouda,

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 - Ain Harrouda 28 630 Mohammedia - Maroc.