

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 068314

☐ Maladie ☐ Dentaire ☒ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3189 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : I. Drim Hbark
Date de naissance :
Adresse :
Tél. : 06.68.32.01.14 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :
Nom et prénom du malade : Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le :
Signature de l'adhérent(e) :





Déclaration de maladie N° P19-068314

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :
Nom de l'adhérent(e) :
Total des frais engagés :
Date de dépôt :

 MUPRAS Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc		FEUILLE DE SOIN N° W		DATE DE DEPOT	
A REMPLIR PAR L'ADHERENT					
NOM & Prénom : IDRISSI MBARK		Téléphone : 06.68.32.01.14		Signature de l'adhérent	
Fonction : retraité		Matricule : 3189			
A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT					
NOM & Prénom du patient : ABALAGH AOUACH		Age : 01/01/1963		Date de la première visite : 12/01/2015	
Nature de la maladie : HTA		Adhérent ☐ Conjoint ☒ Enfant ☐		Docteur A. RAMI Cardiologue et Néphrologue de la Faculté de Médecine de Lille - France 8846335 / 0320821050	
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances					
RELEVÉ DES FRAIS & HONORAIRES DU MEDECIN					
Dates des actes : 30/1/20		Nature des actes : C24 ECG		Montant détaillé des Honoraires : 300 DH	
EXECUTION DES ORDONNANCES					
Dates : 30/01/2015		Montant de la facture : 626,91			
ANALYSES - RADIOGRAPHIES					
Dates :		Désignation des Coefficients :		Montant détaillé des Honoraires :	
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur					
AUXILIAIRES MEDICAUX					
Dates :		Nombre :			
		AM PC IM IV			
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur		Montant détaillé des Honoraires :			

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES																
Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins. Veuillez fournir une facture Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.																
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des travaux Montant des soins Début d'exécution Fin d'exécution												
																
O.D.F. Prothèses dentaires	Détermination du coefficient masticatoire		Coefficient des travaux Montant des soins Date du devis Fin de l'exécution													
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>		H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	G	00000000	00000000	B	35533411	11433553	(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession	
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
G	00000000	00000000														
B	35533411	11433553														
Visa et cachet du praticien attestant le devis		Visa et cachet du praticien attestant l'exécution														
VOLET ADHERENT																
NOM du Patient :			DECLARATION N°													
			W													
MATRICULE N°	Date de Dépôt	Montant engagé	Nbre de pièces Jointes													
Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle			Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois													

Docteur A. RAMI

Ancien Attaché des Services de
Cardiologie et Néphrologie de C.H.U
de Lille en France

Spécialiste des Maladies du Cœur
et des Vaisseaux

Diplômé des Etudes Spéciales de
Néphrologie

Diplômé de Médecine du Travail

الدكتور عبد الفتاح الرامي

ملحق سابقا بأقسام القلب و أمراض الكلى
بالمركز الطبي الجامعي بليل في فرنسا

إختصاصي في أمراض القلب
و الدورة الدموية

إختصاصي في أمراض الكلى
إختصاصي في الطب المهني

Agadir, le 30/1/2020 أكادير في

ABALACH Asouiche

2 water
68 x 21 1) Fluidex LP 14 ml
→ 2445
83 x 4 2) Tenormin 100
→ 3324 14/

Pharmacie EL OUAFI
Dr. Driss BENMAMMED
Tél : 05 28 87 66 96
Av. CAIRE - Sidi Inni
INP: 042074161
ICE: 00123129400006

INP: 042074161

Docteur A. RAMI

Cardiologue et Néphrologue
de la Faculté de Médecine
de Lille - France

Tel: 0528846236 / 0528841050

عمارة أرسلان زاوية زنقة مراکش وزنقة ماسة - أكادير - العنوان الإلكتروني: drrami@menara.ma

الهاتف: 05 28 82 62 06 - الفاكس: 05 28 84 63 35 / 05 28 82 10 50

Imm Arsalane Angle Rue de Marrakech et Rue de Massa - AGADIR - E-mail: drrami@menara.ma
Tél.: 05 28 82 10 50 / 05 28 84 63 35 - Fax: 05 28 82 62 06 - Patente: 48 111 383 - IGR: 75 700 610

Docteur A. RAMI

Ancien Attaché des Services de
Cardiologie et Néphrologie de C.H.U
de lille en france

Spécialiste des Maladies du Cœur
et des Vaisseaux

Diplômé des Etudes Spéciales de
Néphrologie

Diplômé de Médecine du Travail

الدكتور عبد الفتاح الرامي

ملحق سابقا بأقسام القلب و أمراض الكلى
بالمركز الطبي الجامعي بليل في فرنسا

إختصاصي في أمراض القلب
و الدورة الدموية

إختصاصي في أمراض الكلى
إختصاصي في الطب المهني

Agadir, le 30/11/20

ABALAGA

NOTE D'HONORAIRES

- Consultation	
- Electrocardiogramme	3000H
- Visite	
- Echo Doppler	
- Expertise	

Total:

Arrêté la présente Note à la somme de

DH:

Avec mes Compliments

Docteur A. RAMI
Cardiologue et Néphrologue
de la Faculté de Médecine
de Lille - France
Tél: 0528846335 / 0528821050

ICE: 0015815780000092

عمارة أرسلان زاوية زنقة مراکش وزنقة ماسة - أكادير - العنوان الإلكتروني: drrami@menara.ma

الهاتف: 05 28 82 10 50 / 05 28 84 63 35 - الفاكس: 05 28 82 62 06

Imm Arsalane Angle Rue de Marrakech et Rue de Massa - AGADIR - E-mail: drrami@menara.ma

Tél.: 05 28 82 10 50 / 05 28 84 63 35 - Fax: 05 28 82 62 06 - Patente: 48 111 383 - IGR: 75 700 610

Modèle public : boîtes de 14 et 28 comprimés.

Liste I.

■ DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Septembre 2004.

Les conseils suivants vous sont donnés par l'industrie pharmaceutique, les professions de santé et des organismes de réglementation :

Ce médicament est un médicament à action rapide, qui est l'un des points de ce système. Les bêta-bloquants sont utilisés pour le traitement du trouble du rythme. Dans la majorité des cas, il ne doit pas être utilisé en association avec d'autres médicaments. L'utilisation de ce médicament doit être soignée et, en particulier, il faut respecter les recommandations suivantes :

- 1) L'utilisation de ce médicament doit être soignée et, en particulier, il faut respecter les recommandations suivantes :
- 2) En outre, pour éviter les effets indésirables, il ne faut pas l'utiliser en association avec d'autres médicaments.
- 3) Ne prenez pas ce médicament si vous avez des problèmes cardiaques, car certains médicaments peuvent aggraver ces problèmes.

4) En raison de son mode d'action, il arrive parfois que certaines personnes le tolèrent moins bien que d'autres. Donc, si vous avez l'impression que ce médicament provoque chez vous certains troubles plus ou moins gênants, ne vous alarmez pas, mais prévenez votre médecin sans attendre.

Si vous êtes asthmatique, avertissez-en votre médecin avant même de commencer le traitement.

En suivant ces quelques recommandations et les conseils d'hygiène de vie que vous aura donnés votre médecin, vous obtiendrez un bénéfice maximal de l'usage de ce médicament.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.
VOTRE MEDECIN, VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS, N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

AstraZeneca

maphar

R. LAMRINI, Pharmacien Responsable

AstraZeneca

TENORMINE® 100 mg

ATENOLOL

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

Composition qualitative et quantitative

Atenolol 100 mg

Excipients : carbonate de magnésium lourd, amidon de maïs, gomme de sodium, stéarate de magnésium, hypromellose, glycérol, dioxyde de titane (E171).

Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé sécable

Classe pharmaco-thérapeutique

BETA-BLOQUANT/SELECTIF

(Système cardio-vasculaire)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un «bêta-bloquant», il diminue certains effets (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardio-vasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- hypertension artérielle
- prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine
- après un infarctus du myocarde
- certains troubles du rythme

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement).
- insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlée par le traitement).
- choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque).
- bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque).
- angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie), (variété de crises d'angine de poitrine).
- maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).
- bradycardie importante (< 45-50 battements par minute), (ralentissement du rythme cardiaque).

Modèle public : boîtes de 14 et 28 comprimés.

Liste I.

■ DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Septembre 2004.

Les conseils suivants vous sont donnés par l'industrie pharmaceutique, les professions de santé et des organismes de réglementation :

Ce médicament est un médicament à action rapide, qui est l'un des points de ce système. Les bêtas bloquent le rythme cardiaque. Dans la majorité des cas, il ne doit pas être utilisé. L'utilisation de ce médicament, en particulier, doit être surveillée. - respectez les doses prescrites - n'arrêtez pas le traitement sans avis de votre médecin. 2) En outre, pour éviter les effets secondaires, ne prenez pas d'autres médicaments, car certains peuvent interférer avec l'action de ce médicament.

4) En raison de son mode d'action, il arrive parfois que certaines personnes le tolèrent moins bien que d'autres. Donc, si vous avez l'impression que ce médicament provoque chez vous certains troubles plus ou moins gênants, ne vous alarmez pas, mais prévenez votre médecin sans attendre. Si vous êtes asthmatique, avertissez-en votre médecin avant même de commencer le traitement. En suivant ces quelques recommandations et les conseils d'hygiène de vie que vous aura donnés votre médecin, vous obtiendrez un bénéfice maximal de l'usage de ce médicament.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS. VOTRE MEDECIN, VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS, N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

AstraZeneca

maphar

R. LAMRINI, Pharmacien Responsable

AstraZeneca

TENORMINE® 100 mg

ATENOLOL

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

Composition qualitative et quantitative

Atenolol 100 mg

Excipients : carbonate de magnésium lourd, amidon de maïs, gomme de sodium, stéarate de magnésium, hypromellose, glycérol, dioxyde de titane (E171).

Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé sécable

Classe pharmaco-thérapeutique

BETA-BLOQUANT/SELECTIF

(Système cardio-vasculaire)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un «bêta-bloquant», il diminue certains effets (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardio-vasculaire. Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- hypertension artérielle
- prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine
- après un infarctus du myocarde
- certains troubles du rythme

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

- Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
 - asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement).
 - insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlée par le traitement).
 - choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque).
 - bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque).
 - angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie), (variété de crises d'angine de poitrine).
 - maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).
 - bradycardie importante (< 45-50 battements par minute), (ralentissement du rythme cardiaque).

Modèle public : boîtes de 14 et 28 comprimés.

Liste I.

■ DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Septembre 2004.

Les conseils suivants vous sont donnés par l'industrie pharmaceutique, les professions de santé et des organismes de réglementation :

Ce médicament est un médicament à action rapide, qui est l'un des points de ce système. Les bêta-bloquants sont utilisés pour le traitement du trouble du rythme. Dans la majorité des cas, il ne doit pas être utilisé en association avec d'autres médicaments. L'utilisation de ce médicament doit être surveillée et, en particulier, les patients doivent être informés de :

- n'arrêter pas le traitement sans avis médical
- dans certains cas, le traitement peut provoquer des effets indésirables
- En outre, pour éviter les effets indésirables, il est recommandé de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, de ne pas prendre d'autres médicaments, de ne pas conduire un véhicule ou de ne pas faire de travail dangereux.

4) En raison de son mode d'action, il arrive parfois que certaines personnes le tolèrent moins bien que d'autres. Donc, si vous avez l'impression que ce médicament provoque chez vous certains troubles plus ou moins gênants, ne vous alarmez pas, mais prévenez votre médecin sans attendre.

Si vous êtes asthmatique, avertissez-en votre médecin avant même de commencer le traitement.

En suivant ces quelques recommandations et les conseils d'hygiène de vie que vous aura donnés votre médecin, vous obtiendrez un bénéfice maximal de l'usage de ce médicament.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.
VOTRE MEDECIN, VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS, N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

AstraZeneca

maphar

R. LAMIRINI, Pharmacien Responsable

AstraZeneca

TENORMINE® 100 mg

ATENOLOL

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

Composition qualitative et quantitative

Atenolol 100 mg

Excipients : carbonate de magnésium lourd, amidon de maïs, gomme de sodium, stéarate de magnésium, hypromellose, glycérol, dioxyde de titane (E171).

Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé sécable

Classe pharmaco-thérapeutique

BETA-BLOQUANT/SELECTIF

(Système cardio-vasculaire)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un «bêta-bloquant», il diminue certains effets (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardio-vasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- hypertension artérielle
- prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine
- après un infarctus du myocarde
- certains troubles du rythme

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement).
- insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlée par le traitement).
- choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque).
- bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque).
- angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie), (variété de crises d'angine de poitrine).
- maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).
- bradycardie importante (< 45-50 battements par minute), (ralentissement du rythme cardiaque).

Modèle public : boîtes de 14 et 28 comprimés.

Liste I.

■ DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Septembre 2004.

Les conseils suivants vous sont donnés par l'industrie pharmaceutique, les professions de santé et des organismes de réglementation :

Ce médicament est un médicament à action rapide, qui est l'un des points de ce système. Les bêta-bloquants sont utilisés pour le traitement du trouble du rythme. Dans la majorité des cas, il ne doit pas être utilisé en association avec d'autres médicaments. L'utilisation de ce médicament doit être surveillée et, en particulier, les patients doivent être informés de :

- n'arrêter pas le traitement sans avis médical
- dans certains cas, le traitement peut provoquer des effets indésirables
- En outre, pour éviter les effets indésirables, il est recommandé de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, de ne pas prendre d'autres médicaments, de ne pas conduire un véhicule ou de ne pas faire de travail dangereux.

4) En raison de son mode d'action, il arrive parfois que certaines personnes le tolèrent moins bien que d'autres. Donc, si vous avez l'impression que ce médicament provoque chez vous certains troubles plus ou moins gênants, ne vous alarmez pas, mais prévenez votre médecin sans attendre.

Si vous êtes asthmatique, avertissez-en votre médecin avant même de commencer le traitement.

En suivant ces quelques recommandations et les conseils d'hygiène de vie que vous aura donnés votre médecin, vous obtiendrez un bénéfice maximal de l'usage de ce médicament.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.
VOTRE MEDECIN, VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS, N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

AstraZeneca

maphar

R. LAMIRINI, Pharmacien Responsable

AstraZeneca

TENORMINE® 100 mg

ATENOLOL

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

Composition qualitative et quantitative

Atenolol 100 mg

Excipients : carbonate de magnésium lourd, amidon de maïs, gomme de sodium, stéarate de magnésium, hypromellose, glycérol, dioxyde de titane (E171).

Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé sécable

Classe pharmaco-thérapeutique

BETA-BLOQUANT/SELECTIF

(Système cardio-vasculaire)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un «bêta-bloquant», il diminue certains effets (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardio-vasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- hypertension artérielle
- prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine
- après un infarctus du myocarde
- certains troubles du rythme

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement).
- insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlée par le traitement).
- choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque).
- bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque).
- angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie), (variété de crises d'angine de poitrine).
- maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).
- bradycardie importante (< 45-50 battements par minute), (ralentissement du rythme cardiaque).

FLUDEX[®] 1,5 MG

30 comprimé pellicule à libération Prolongée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique - Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pellicule à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pellicule à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pellicule à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pellicule à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1-QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULE À LIBÉRATION

PROLONGÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pellicule à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif. L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULE À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

- Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pellicule à libération prolongée: avant de prendre ce médicament.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez une maladie grave du rein.
- Si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau).
- Si vous avez un taux de potassium dans le sang.

3-QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULE À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg : si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous souffrez de troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilisation.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption.

Sans ob
Enfants
Autres
prolon
informe
jour

06,90

RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

Liste II - UNIFORMEMENT SUR ORDONNANCE

FLUDEX[®] 1,5 MG

30 comprimé pellicule à libération prolongée

SERVIER MAROC
Les Laboratoires Servier - France
Rte d'Azemour, 20180 Casablanca
S.M. ZEVAO, lot FATH 4

FLUDEX[®] 1,5 MG
30 Comprimés pelliculés
à libération Prolongée

6 118000 100126

001 229940003

SPORTS

Attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

FLUDEX[®]

INDAPAMIDE 1,5 MG

30 comprimé pellicule à libération Prolongée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique - Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pellicule à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pellicule à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pellicule à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pellicule à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1-QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULE À LIBÉRATION

PROLONGÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pellicule à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif. L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE

FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULE À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pellicule à libération prolongée :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux élevé de potassium dans le sang.

Adresser-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilisation.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption.

Sorption

Enfants

Sans ob

Autres

prolon

droqui

mét

anxiété

roge

de

clis

sp

pot

chez

na

pe

foin

ar

forte

ir

at

so

•

•

•

•

•

•

•

•

احفظوا هذه النسخة

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

قائمة II - UNIFORMEMENT SUR ORDONNANCE

فلوكسي[®] LP

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30



FLUDEX LP[®]

30 Comprimés pelliculés à libération Prolongée

SERVIER

Les Laboratoires Servier - France

Rte d'Azemour, 20180 Casablanca

Im. ZEYACO, lot FATH 4

6 118000 100126

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

001 042074 0000

ngée avec des ali-

unes ou de maladies

es suite à une trans-

ayons X).

ne, (triarmière),

maladie comme la

me sévère et arti-

alter l'hypertension

ex : l'hyperprotéine ou

ne le rythme des

palpisme),

symptomatiques

asthmaux),

biologiques, utilis-

at des douleurs

/choliques, neu-

que dépression,

quintidine, hy-

édicin, certains

er la dépression),

ment pris ou

à libération

•

•

•

•

•

•

•

•


•

•

ECG

Dr A. RAMI

NOM:ABALAGH AOUICHA ID: Genre: Age: DOB:01-01-1960 Date of Test:30-01-2020 11:32
05 28 82 10 50: 05 28 84 63 35: Médecin Référent:Doctor RAMI



Fréquence :	1000 Hz	Intervalle QT :	397 ms
Durée Echantillon :	9 s	Intervalle QTc :	400 ms
FC :	61 bpm	Axe P :	62.6°
Durée P :	119 ms	Axe QRS :	56.1°
Durée QRS :	91 ms	Axe T :	137.0°
Durée T :	276 ms	RV5/SV1:	1.57/1.16mV
PQ Interval :	193 ms	RV5+SV1:	2.73mV

Suggestion :
Total Batts 9, Batts Normaux 9,*** Sous décalage ST modéré,(Sous décalage ST de 0.05+ mV,) Anomalie ST onde T non spécifique, - avec 1 bloc AV, ECG Anormal ECG,

Signature Médecin: