

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothétique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-524750


<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Au
Cadre réservé à l'adhérent (e)		2256	
Matricule :	SALI		
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	Pensionné(e)	Société :	
Nom & Prénom : El OUELD SIDI HIR Abdellah		Autre :	
Date de naissance : le 05/11/1961		Adresse : 125 Rue Larache Hay Salam	
Tél. : 0601461915		Total des frais engagés : 1623,80 DT	

Cadre réservé au Médecin		Dr TAZI SIDOUI Khalid	
Cachet du médecin :		SPÉCIALISTE EN PNEUMOLOGIE 1, Av. Lalla Yacoub - CASABLANCA Tel. : 0522.22.09.88 - 0522.20.75.24 Tél. Urgence : 06 61 42 42 57	
Date de consultation :		18 FEV. 2020	
Nom et prénom du malade :		El Ouelid Sidi HIR Abdellah	
Lien de parenté :		<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint
Nature de la maladie :		Rhumatisme + Diabète	
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je n'ai pas pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca 220 Le : 18/02/2020

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Nombre et Céficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2	2650	INP : 1111111 18 FEV. 2020 Dr. TAZI SIDQUI Khalid SPECIALISTE EN PNEUMOLOGIE 1, Av. Lalla Yacoub - CASABLANCA Tel. 0522.22.09.88 - 0522.20.15.24 Tél. 0522.22.09.88 - 0522.20.15.24 Fax : 0522.22.09.88 - 0522.20.15.24
EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BABA ESSAÏD Casablanca - Tel. 0522.94.15.15 ICE 01082180008	18/2/20	573,80

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Céficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Céficient	INP : 1111111
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	21433552 00000000	G 00000000 35533411	B 11433553
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Khalid TAZI SIDQUI

DE L'UNIVERSITE DE PARIS

EXPERT ASSERMENTE AUPRES DES TRIBUNAUX

SPECIALISTE PNEUMOPHTISIOLOGUE

MALADIES DES POUMONS - TUBERCULOSE

ASTHME ET ALLERGIES RESPIRATOIRES

CANCEROLOGIE THORACIQUE

PATHOLOGIE RESPIRATOIRE DU SOMMEIL ET RONFLEMENT

EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE

FIBROSCOPIE BRONCHIQUE

الدكتور خالد تازى صدقى

خريج جامعة باريس

خبير محفوظ لدى المحاكم

اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسى

أمراض الرئنة - داء السل

الضيق وحساسيات الجهاز التنفسى

سرطان الرئة - الشخير

الفحص بالمنظار الداخلى

التشخيص الوظيفي للرئنة

Casablanca, le الدار البيضاء في

18/02/2020

MR EL OUELDRHIRI ABDELILAH

56,60

- **Diprostene**
FAIRE 1 INJECTION IM UNIQUE

120,70

- **Aerius 5 mg**
PRENDRE 1 COMPRIMES LE SOIR PENDANT 3 MOIS

123,60

- **Fluxonase 50 µg**
METTRE 2 PULVERISATIONS DANS CHAQUE NARINE
LE MATIN PENDANT 3 MOIS

67,90

- **TOUDEX SUSPENTION BUVABLE**
PRENDRE 1 CAS MATIN MIDI ET SOIR

805,00

- **Tavanic 500mg**
PRENDRE 1 COMPRIME PAR JOUR PENDANT 7 JOURS

573,80

PHARMACIE BAB ESSALAM
MR SEKKAT Oumar
27, RUE DE Jules, C.I.L.
Casablanca - Tél. 0522.94.15.14
ICE 001082118000087

*Dr TAZI SIDQUI Khalid
SPECIALISTE EN PNEUMOLOGIE
1, Av. Lalla Yacut - CASABLANCA
Tel. : 0522.22.09.88 - 0522.20.75.24
Tél. Uraanca 06.51.45.42 F7*

المستعجلات الهاتف : 0661 151 257

رقم 1 شارع لالة ياقوت - الطابق 2 0522 22 09 88/ 0522 20 75 24

Diprostone®

Suspension injectable en seringue pré-remplie

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en lire une autre.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne l'utilisez pas en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

611 800115 013 7
DIPROSTENE 1 Seringue
P.P.V. : 56,60 DH
AMM 235DMP/21/NTT
Distribué par MSD Maroc
B.P. 136 Boukoura

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie ?
 3. COMMENT UTILISER DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
 5. COMMENT CONSERVER DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie ?
 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.
1. QU'EST-CE QUE DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- CORTICOIDES A USAGE SYSTEMIQUE NON ASSOCIES.
- Ce médicament est un corticoïde.
- Il est indiqué en cas de rhinite allergique.
- Il peut être utilisé en injection locale en dermatologie, en rhumatologie et en ORL.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie ?

USAGE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

N'utilisez jamais DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie dans les cas suivants :

- chez les prématurés et nouveau-nés à terme, en raison de la présence d'alcool benzylique,
- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- allergie à l'un des constituants,
- troubles de la coagulation, traitement anticoagulant en cours.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin, en association avec des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque (voir Prise ou utilisation d'autres médicaments).

USAGE LOCAL

N'utilisez jamais DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie dans les cas suivants :

- infections

Aerius® 5 mg comprimés pelliculés

Desloratadine



des aux vôtres.
ien.

comme il vous
accidentel-
médiatement

vous continuez
à la dose que

avez plus
d'informa-
tions

avez plus

AERIUS® 5 mg
30 comprimés pelliculés



6 18000 050124

LUU : 077
PER : OCT 2021
PPV : 120 DH.70

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionnée dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Aerius et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aerius
3. Comment prendre Aerius
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aerius
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Aerius et dans quel cas est-il utilisé ?

Qu'est-ce que Aerius ?

Aerius contient de la desloratadine qui est un antihistaminique.

Comment agit Aerius ?

Aerius est un médicament contre l'allergie qui ne vous rend pas somnolent. Il aide à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

Quand Aerius doit-il être utilisé ?

Aerius soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens) chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus. Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démarque, les démangeaisons du palais, les yeux qui démarquent, qui sont rouges ou larmoyants.

Aerius est aussi utilisé pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte cutanée provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariennes.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aerius ?

Ne prenez jamais Aerius

- si vous êtes allergique à la desloratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ou à la loratadine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre Aerius :

- si vous présentez une maladie des reins.

- si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de convulsions

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Ne donnez pas ce médicament à des enfants de moins de 12 ans.

Autres médicaments et Aerius

Il n'y a pas d'interactions connues d'Aerius avec d'autres médicaments.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Aerius avec des aliments, des boissons et de l'alcool

Aerius peut être pris pendant ou en dehors des repas.

La plus grande prudence est recommandée si vous prenez de l'alcool en même temps que votre traitement par Aerius.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

La prise d'Aerius n'est pas recommandée si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Fertilité

Aucune donnée n'est disponible sur la fertilité chez l'humain.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

À la dose recommandée, il est peu probable que ce médicament affecte votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Bien que la plupart des personnes ne ressentent pas de somnolence, il est néanmoins recommandé de tester votre réponse à ce médicament avant d'accomplir des activités exigeant une vigilance, telles que conduire des véhicules ou utiliser des machines.

Aerius contient du lactose

Tes comprimés d'Aerius contiennent du lactose. Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre Aerius ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Adultes et adolescents de 12 ans et plus

La dose recommandée est d'un comprimé une fois par jour avec de l'eau, au moment ou en dehors des repas.

Ce médicament est destiné à la voie orale.

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera le type de rhinite allergique dont vous souffrez et déterminera la durée pendant laquelle vous devrez prendre Aerius.

Si votre rhinite allergique est intermittente (présence de symptômes sur une période de moins de 4 jours par semaine ou sur une période inférieure à 4 semaines), votre médecin vous recommandera ce traitement pour une durée qui dépendra de l'évaluation des antécédents de votre maladie.

Si votre rhinite allergique est persistante (présence de symptômes sur une période de 4 jours ou plus par semaine et pendant plus de 4 semaines), votre médecin peut vous recommander ce traitement pour une durée plus longue.

Concernant l'urticaire, la durée de traitement peut être variable d'un patient à l'autre et vous

devez donc suivre les instructions de votre pharmacien.

Si vous avez pris plus d'Aerius que vous deviez, par exemple, si vous avez oublié de prendre Aerius.

Si vous oubliez de prendre Aerius

Si vous oubliez de prendre votre dose à l'heure prescrite, prenez-la au plus tôt dans la journée. Ne prenez pas deux doses de plus. Si vous avez oublié de prendre Aerius.

Si vous arrêtez de prendre Aerius

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation d'Aerius, parlez-en à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Depuis la commercialisation d'Aerius, des cas de réactions allergiques sévères (difficulté à respirer, sifflements bronchiques, démangeaisons, urticaire et gonflements) ont été très rarement rapportés. Si vous ressentez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin.

Lors des essais cliniques chez les adultes, les effets indésirables étaient à peu près les mêmes que ceux observés avec un comprimé placebo. Cependant, la fatigue, la sécheresse de la bouche et le mal de tête étaient rapportés plus souvent qu'avec un comprimé placebo.

chez les adolescents, le mal de tête était l'effet indésirable le plus fréquemment rapporté. Dans les essais cliniques avec Aerius, les effets indésirables suivants ont été rapportés :

Fréquent : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 : Fatigue, sécheresse de la bouche, maux de tête

Adultes

Depuis la commercialisation d'Aerius, les effets indésirables suivants ont été rapportés : Très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000 : Réactions allergiques sévères, éruption cutanée, battements du cœur irréguliers ou plus intenses, battements du cœur rapides, douleur d'estomac, nausées, vomissements, pesanteur d'estomac, diarrhées, vertige, somnolence, insomnie, douleur musculaire, hallucinations, convulsions, agitation avec mouvements corporels

Augmentés, inflammation du foie, anomalies du bilan hépatique sanguin.

Fréquence indéterminée : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données

Disponibles : faiblesse inhabituelle, coloration jaune de la peau et/ou des yeux, augmentation de la sensibilité de la peau au soleil, y compris en cas de soleil voilé, ainsi qu'au rayonnement ultraviolet (UV) par exemple aux lampes UV d'un solarium, modification du rythme des battements du cœur,

Anomalie du comportement, Agressivité, Prise de poids, augmentation de l'appétit.

Enfants

Fréquence indéterminée : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données

Disponibles : rythme lent des battements du cœur, modification du rythme des battements du cœur, Anomalie du comportement, Agressivité.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

5. Comment conserver Aerius

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette thermoformée après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C. À conserver dans l'emballage extérieur d'origine.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez un changement de l'aspect des comprimés. Ne jetez aucun médicament au tout-à-égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Aerius

- La substance active est la desloratadine 5 mg.

- Les autres composants du comprimé sont l'hydrogénophosphate de calcium dihydraté, la cellulose microcristalline, l'amidon de maïs, le talc. Le pelliculage du comprimé contient un film d'enrobage (contenant du lactose monohydraté, de l'hypromellose, du dioxyde de titane, du macrogol 400, de l'indigotine (E 132)), un enrobage clair (contenant de l'hypromellose, du macrogol 400), de la cire de carnauba, de la cire blanche.

Qu'est-ce qu'Aerius et contenu de l'emballage extérieur

Aerius 5 mg comprimés pelliculés est conditionné en plaquettes thermoformées dans des étuis de 7, 15, 30 comprimés.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée : Décembre 2017

Liste II.




Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :
Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford
Road, Hoddesdon, Hertfordshire
EN11 9BU, Royaume Uni.

Fabriqué et distribué par:
LABORATOIRES PHARMACEUTICAL INSTITUTE
BP 4491 - 12100 Ain El Aouda - MAROC
h.i PHARMACIEN RESPONSABLE : Maria SEDRATI


Dans tous les cas il convient de toujours chercher la dose minimale efficace. En cas de persistance des troubles, n'augmentez pas la dose, mais consultez Dans tous les cas, conformez-vous à l'ordonnance de votre médecin.

Mode d'administration

Ce médicament doit être administré dans le nez exclusivement (voie nasale).



Lors de la première utilisation ou si vous n'avez pas ou plus, il est nécessaire d'amorcer la pompe après à collerette jusqu'à l'obtention d'une fine giclée.



semaine
jusser la

- Mouchez-vous soigneusement pour assécher le nez avant chaque prise.
- Agitez doucement le flacon.



1. Retirez le capuchon protecteur de l'applicateur nasal (schéma n°1).
2. Bouchez une narine, penchez légèrement la tête en avant, le flacon en position verticale ; insérez doucement l'applicateur nasal dans l'autre narine (schéma n°2).
3. Appuyez une fois de haut en bas sur la collerette avec l'index et le majeur tandis que le pouce supporte la base du flacon. Pressez jusqu'à l'obtention d'une pulvérisation (schéma n°3). Inspirez par cette narine avant de répéter l'opération pour une deuxième pulvérisation, chez l'adulte.
- Répétez pour l'autre narine les deux phases précédentes.
- Essuyez l'applicateur nasal après utilisation et remettez le capuchon.

Le pulvérisateur doit être nettoyé au moins une fois par semaine en faisant tremper le capuchon protecteur (qui aura été au préalablement retiré du pulvérisateur) ainsi que l'applicateur nasal (ou pointe du pulvérisateur, également préalablement retiré du pulvérisateur) dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. Rincer sous le robinet, faire sécher puis replacer l'applicateur nasal et le capuchon protecteur sur le pulvérisateur.

Fréquence d'administration

Dans tous les cas, conformez-vous à l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Dans tous les cas, conformez-vous à l'ordonnance de votre médecin.

Ne pas augmenter ou diminuer la dose sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus de FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse que vous n'auriez dû :

Un surdosage pourra avoir des effets néfastes, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Peuvent survenir :

- des saignements de nez, une irritation de la gorge ou une sensation de brûlure nasale pouvant entraîner des éternuements, une sécheresse de la muqueuse du nez, des maux de tête ainsi qu'un goût et une odeur désagréables.

En cas de persistance d'une irritation nasale, consultez votre médecin.



TOUDEX® sirop

Forme et présentation :

Sirop. Flacon de 125 ml, Flacon de 200 ml

Composition :

Cassis feuille, mauve bleu fleur (eau, glycérine, acide citrique), extrait de sorbate, sodium benzoate, gomme de citrique monohydrate, aspartame,



Propriétés :

TOUDEX® est une association synergique bénéfique pour les irritations et les inflammations des voies respiratoires.

La mauve possède une action pectorale, calmante, adoucissante et émolliente.

Le cassis (i fluid) possède une action anti-inflammatoire naturelle.

*I fluid est un procédé unique breveté grâce auquel l'ensemble des composants de la plante est précieusement préservé, pour être restitué dans son intégrité.

Conseils d'utilisation :

Agiter avant utilisation.

Nourrisson (à partir d'un an) : 1 cuillerée à café 2 fois/jour.

Enfant : 1 à 2 cuillerées à café 3 fois/jour.

Adulte : 1 cuillerée à soupe 3 fois/jour.

Durée d'utilisation :

Une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans le mois suivant son ouverture.

Fabriqué Phytéo Laboratoires

Distribué par Ramo-Pharm

Complément alimentaire n'est pas un médicament

ICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tavanic® 250 mg comprimé pelliculé Tavanic® 500 mg comprimé pelliculé ofloxacine

SANOFI

Ille lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Rendez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Si un autre médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de votre maladie sont identiques aux vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

contient cette notice :

Qu'est-ce que Tavanic et dans quels cas est-il utilisé ?
Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tavanic ?
Comment prendre Tavanic ?
Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Comment conserver Tavanic ?
Contenu de l'emballage et autres informations

QU'EST-CE QUE TAVANIC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Le médicament s'appelle Tavanic. Il contient une substance active appelée ofloxacine. Celle-ci fait partie des médicaments connus sous le nom d'antibiotiques et appartient plus précisément à la famille des quinolones. Il agit en détruisant les bactéries responsables de certaines infections dans l'organisme.

- Si vous avez une insuffisance cardiaque,
- Si vous avez eu un infarctus du myocarde,
- Si vous êtes une femme ou une personne âgée,
- Si vous prenez d'autres médicaments pouvant conduire à des modifications anormales de l'ECG (voir la rubrique intitulée « Autres médicaments et Tavanic »).

- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez des troubles du foie ou en cas de maladie rénale.
- Si vous souffrez d'ostéoporose.

Si vous êtes

à votre médecine

Si vous êtes

envisagez d'in

Tavanic peut me

médicaments pe

Informez votre

médicaments ci

quand ces médic

Tavanic :

- Les corticoïdes, parfois appelés corticostéroïdes, utilisés pour traiter une inflammation, car le risque d'inflammation et/ou de rupture d'un tendon peut augmenter.
- La warfarine, utilisé pour fluidifier le sang, car la prédisposition aux saignements peut augmenter. Le cas échéant, votre médecin vous prescrira des prises de sang régulières pour contrôler la coagulation sanguine.
- La théophylline, utilisée dans les maladies respiratoires chroniques, car le risque de convulsions est plus élevé en cas de prise en association avec Tavanic.
- Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS), utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le fenbufène, le kétoprofène et l'indométhacine, car le risque de convulsions est plus élevé en cas de prise en association avec Tavanic.
- La ciclosporine, utilisée après une greffe d'organes, car le risque d'effets indésirables liés à la ciclosporine est plus élevé.
- Les médicaments ayant un effet connu sur le rythme cardiaque, c'est à dire les médicaments du rythme (antiarrhythmiques).

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1.
Ain sebaâ Casablanca
Tavanic 500mg, cp pel b7
P.P.V : 205,00 DH

6 116001 080830

assé.
musculaire).
concerne, parlez-en
Tavanic.

nts, ou si vous
tre pharmacien
ierrement, certai
nic.

an des
peut augm
ent par

Docteur Khalid TAZI SIDQUI

DE L'UNIVERSITE DE PARIS

EXPERT ASSERMENTE AUPRES DES TRIBUNAUX

SPECIALISTE PNEUMOPHTISIOLOGUE

MALADIES DES POUMONS - TUBERCULOSE

ASTHME ET ALLERGIES RESPIRATOIRES

CANCEROLOGIE THORACIQUE

PATHOLOGIE RESPIRATOIRE DU SOMMEIL ET RONFLEMENT

EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE

FIBROSCOPIE BRONCHIQUE

الدكتور خالد تازى صدقى

خريج جامعة باريس

خبير محفى لدى المحاكم

اختصاصى فى أمراض الجهاز التنفسى

أمراض الرئة - داء السل

الضفة وحساسيات الجهاز التنفسى

سرطان الرئة - الشخير

الفحص بالمنظار الداخلى

التشخيص الوظيفي للرئة

Casablanca, le الدار البيضاء في

18/02/2020

Facture

MR EL OUELDRHIRI ABDELILAH

Acte	Honoraire
Consultation	250.00 Dh
EFR SPIROMETRIE K30	600.00 Dh
Total	850.00 Dh

Arrêté la présente facture à la somme de :
850.00 Dirhams

Dr TAZI SIDQUI Khalid
SPECIALISTE EN PNEUMOLOGIE
1, AV. Lalla Yacout - CASABLANCA
Tel. : 0522 22 09 88 / 0522 20 75 24
Tél. Urgence : 06 61 45 12 67

ICE:
001649343000051

المستعجلات الهاتف : 0661 151 257

1, Av Lalla Yacut 2^{ème} étage - Casablanca © 0522 22 09 88 / 0522 20 75 24 © رقم 1 شارع لالة ياقوت - الطابق 2

DR KHALID TAZI SIDQUI
 DE L'UNIVERSITE DE PARIS
 SPECIALISTE PNEUMOPHTISIOLOGUE
 EXPERT ASSERMENTE AUPRES DES TRIBUNAUX

Nom : **ABDELILAH EL OUELD RHIRI**

Taille: **179 cm**

Age: **58 Ans**

Date Naissance: **05/10/1961**

ID: **ABDEL 05101961**




Poids: **92 kg**

Genre: **Masculin**

BMI: **28,7 kg/m²**

Medication:

RAPPORT DE SPIROMETRIE




Paramètre	Unité	Ref	Pré	%Ref
CV	l	4,65	6,79	146
CI	l	3,59	3,85	107
VC	l		0,48	
VRE	l	1,23	2,80	228



Commentaire:

- Bonne coopération
 - EFR dans la limite
 de la norme -

Paramètre	Unité	Ref	Pré	%Ref
VEMS	l	3,53	5,14	146
CVFex	l	4,46	6,54	147
VEMS/CVF	%	77	79	
DEP	l/s	8,65	11,53	133
DEM25	l/s	1,82	1,45	79
DEM50	l/s	4,64	5,81	125
DEM75	l/s	7,62	11,19	147
DEM 25-75	l/s	3,68	4,21	115
tex	s		8,0	



Dr TAZI SIDQUI KHALID
 SPECIALISTE EN PNEUMOLOGIE
 1, Av. Lalla Yacout 2ème étage - Casa
 Tel. : 0522.22.09.88 - 0522.20.75.24
 Fax : 0522.48.72.53

18/02/2020

12:38

Température ambiante:

Pression ambiante:

Humidité ambiante :

21 °C

1049 hPa

67 %

Technicien :