

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.


Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire 22324	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)		Société :	
Matricule : 800		Nom & Prénom : <i>Véwe Khadija Raga (veuve Hassine Hajjaj)</i>	
Actif		Pensionné(e)	
Autre :			
Date de naissance :			
Adresse : <i>Bloc 300 N° 4 Quartier Dar el Khéa</i>			
Tél. : 0661 619291		Total des frais engagés : <i>✓</i>	
Dhs			

Cadre réservé au Médecin : <i>Dr. Najaatt KARIM ép. KABLI CARDIOLOGUE</i> Angle Av. Hassan II & Abderrahim Bouabdil Res. Borj Dialalé - H1 2ème Etage - AGADIR Tél: 05 28 84 82 92 - 06 61 38 51 65	
Cachet du médecin :	
Date de consultation :	
Nom et prénom du malade : <i>ROQAG. Khadija</i> Age: <i>✓</i>	
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie : <i>cardiopathie</i> <i>Brûlure</i>	
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : <i>✓</i>	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.	
Fait à : <i>✓</i>	
Signature de l'adhérent(e) : <i>✓</i>	
Date : <i>24 FEV 2011</i>	



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/07/2020	- Consultation	1/250,-	1/250,-	INP : 041083387 Dr. Najaatt KARIM ép. KABLI CARDIOLOGUE Apt. Av. Hassan II 8 Abderrahmane Bouabid Res. Buij Dialekt - H1 2 ^{ème} Etage - AGADIR Tél. : 0522 - 06 61 38 51 65
	- Eco	1/200,-		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE LA AZZIZ Dr. KSAKES Ahmed N°22 Amsernat Aedid 5.28.22.09.14023/01/2023	18.25.00	

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

DOCTEUR NAJAAATT KARIM ép. KABLI

CARDIOLOGUE

Echo-doppler cardio-vasculaire

Holter ECG

Diplômée de l'Université de Rennes I-France

Ancienne Médecin Assistante des Hôpitaux

de l'Ouest-France



دكتورة نجات كريم القبلي

اختصاصية في أمراض القلب والشرايين

الفحص بالصدى والدوبلير

مولتير التخطيط الكهربائي للقلب

خريجة جامعة رين 1- فرنسا

طبيبة معايدة سابقاً بمستشفيات

غرب فرنسا

Agadir 07/01/2020 أكادير

Q

Khatrije foqah

30.70 x 4

1) Kandil 75/0. 1- 0

S.V

108.65 x 2

2) Osteocalcium (0 - 1- 0) 23

S.V

39.200 x 3

3) Aldactazin (1/2 - 0 - 0)

S.V

155.80 x 4

4) Aparane 150/5 (1 - 0 - 0)

S.V

162.60 x 2

5) Nebulet 5 (0 - 1/2 - 0) **S.V**

155.80 x 2

6) losinta 10 (1/2 - 0 - 0) ~~مختبر~~ **S.V**

ملحقى شارع الحسن الثاني وشارع عبد الرحيم بوعبيد - إقامة برج الدلالات - HI الطابق الثاني 109 - أكادير
Angle Av. HASSAN II & ABDERRAHIM BOUABID - Rés. Borj Dlalate - HI 2 ème étage, N°109 - AGADIR

Gsm : + 212 661 385 165 - Tél : + 212 528 848 292 - E-mail : najat.karimkabli@gmail.com

ICE : 001651939000090 - IF : 75932640 - CNSS : 2709254 - TP : 48174640 - INP : 041083387

S.V

07.00

7) Relax 700 (0-0-1) NB
78

06.00 8) Dystoflex (0-0-1) CP 13

S.V

T: 1827.00

Dr. Najaatt KARIM ép. KABLI
CARDIOLOGUE

Angle Av. Hassan II & Abderrahim Bouabid
Rés. Borj Dialate - H1 2^{me} Etage - AGADIR
Tél: 05 28 84 82 92 - 06 91 38 51 65

PHARMACIE LAAZIB
Dr. KENYES Ahmed
304 N°22 Ainsenni Agadir
Tél: 05 28 22 09 74

Q 80 49 - th m/s

ALDACTAZINE®



spironolactone, altizide

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a. DENOMINATION

b. **Aldactazine®**

20 Comprimés enrobés



c. FORME QUANTITATIVE

25 mg

15 mg

un comprimé

b de 20.

d. UTIQUE

Le épargneur potassique en association

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :

- Hypertension artérielle.

LOT N° :

1 2 6 9 1 7 9

UT. AV. :

0 9 2 1

P.P.M

3 9 3 0

ivants :

39,30

- Allergie à l'un des constit
- Association à d'autres c

EN CAS DE DOUTE, IL E
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

ce médicament :

épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).
PENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE

b. MISES EN GARDE SPECIALES

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

c. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

ALDACTAZINE®



spironolactone, altizide

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a. DENOMINATION

b. **Aldactazine®**

20 Comprimés enrobés



c. FORME QUANTITATIVE

25 mg

15 mg

un comprimé

b de 20.

d. UTIQUE

Le épargneur potassique en association

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :

- Hypertension artérielle.

LOT N° :

1 2 6 9 1 7 9

UT. AV. :

0 9 2 1

P.P.M

3 9 3 0

ivants :

39,30

- Allergie à l'un des constit

- Association à d'autres c

EN CAS DE DOUTE, IL E

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

ce médicament :

épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).
PENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE

b. MISES EN GARDE SPECIALES

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

c. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

ALDACTAZINE®



spironolactone, altizide

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a. DENOMINATION

b. **Aldactazine®**

20 Comprimés enrobés



c. FORME QUANTITATIVE

25 mg

15 mg

un comprimé

b de 20.

d. UTIQUE

Le épargneur potassique en association

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :

- Hypertension artérielle.

LOT N° :

1 2 6 9 1 7 9

UT. AV. :

0 9 2 1

P.P.M

3 9 3 0

ivants :

39,30

- Allergie à l'un des constit
- Association à d'autres c

EN CAS DE DOUTE, IL E
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

ce médicament :

épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).
PENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE

b. MISES EN GARDE SPECIALES

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

c. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable.

b) Composition :

ACETYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 135 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 75 mg).

Excipients : Glycocolle, arôme mandarine, glycyrrhizinate d'ammonium.

c) Forme pharmaceutique :

poudre pour solution buvable ; sachet-dose ; boîte de 30.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGREGATION

PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

(Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique,
- En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3 g/j)),
- En dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une

surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est

CONTRE-INDICATION

Grossesse et

Ce médican

avis contrai

saignement/

concomitai

l'aspirine e

uricosuriques,

ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

b) Mises en garde spéciales :

Réservez à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

c) Précautions d'emploi :

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet. L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou de l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j).

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70

6 118000 061847

it lorsque

ne, les

uricosuriques,

ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

it lorsque

ne, les

uricosuriques,

ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

it lorsque

ne, les

uricosuriques,

ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

it lorsque

ne, les

uricosuriques,

ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

it lorsque

ne, les

KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable.

b) Composition :

ACETYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 135 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 75 mg).

Excipients : Glycocolle, arôme mandarine, glycyrrhizinate d'ammonium.

c) Forme pharmaceutique :

poudre pour solution buvable ; sachet-dose ; boîte de 30.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGREGATION

PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

(Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique,
- En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3 g/j)),
- En dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une

surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est

CONTRE-INDI

Grossesse et

Ce médican

avis contrai

saignement/

concomitai

l'aspirine e

uricosuriques,

ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

b) Mises en garde spéciales :

Réservez à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

c) Précautions d'emploi :

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet. L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou de l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j).

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70

6 118000 061847

KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable.

b) Composition :

ACETYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 135 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 75 mg).

Excipients : Glycocolle, arôme mandarine, glycyrrhizinate d'ammonium.

c) Forme pharmaceutique :

poudre pour solution buvable ; sachet-dose ; boîte de 30.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGREGATION

PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

(Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique,
- En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3 g/j)),
- En dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une

surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est

CONTRE-INDICATION

Grossesse et

Ce médican

avis contrai

saignement/

concomitai

l'aspirine e

uricosuriques,

ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

b) Mises en garde spéciales :

Réservez à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

c) Précautions d'emploi :

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet. L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou de l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j).

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70

6 118000 061847

it lorsque

ne, les

uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

it lorsque

ne, les

uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

it lorsque

ne, les

uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

it lorsque

ne, les

uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

it lorsque

ne, les

uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notam

lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf.

Interactions médicamenteuses et autres interactions).

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf.

Grossesse et Allaitement).

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs au Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne, appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING

Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSC,
Professeur Emérite,
Université de Londres
(1920-2010)


Chairman, Vitabiotics

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace® Vitabiotics



Ingrediénts: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes & Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique. Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintégrant: Glycolate d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Sulfate de zinc, Vitamine D3 Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholécalciférol, [Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Éthylcellulose])

wellman®

vancée nutritionnelle que pour les hommes



wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir tous les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio- actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman® original.

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs au Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne, appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com




VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING

Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSC,
Professeur Emérite,
Université de Londres
(1920-2010)


Chairman, Vitabiotics

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace®



Ingrediénts: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes & Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique. Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintégrant: Glycolate d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Sulfate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholécalciférol, [Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Éthylcellulose])

wellman®

vancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir tous les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.

NEBILET® 5 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 162DH60

relire.
ute,
otre

rit. Ne
as de

NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

La substance active est :

Nébivolol 5,00 mg

Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg

pour un comprimé quadrisécable

Les autres composants sont :

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Titulaire

BERLIN CHEMIE AG, SITE ADLERSHOF

Glienicker Weg 125 - 12489 Berlin - ALLEMAGNE

Fabricant

BERLIN CHEMIE AG, SITE ADLERSHOF

Glienicker Weg 125 - 12489 Berlin - ALLEMAGNE

1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrisécable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Liste des excipients à effet notoire

Lactose.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

L'association du nébivolol avec d'autres médicaments peut affecter son activité ou celle des autres médicaments associés : il s'agit notamment de certains médicaments pour le cœur (comme certains antagonistes calciques (vérapamil, diltiazem), ou certains anti-arythmiques de classe I (quinidine, hydroquinidine, cibenzoline, flecaïnide, disopyramide, lidocaïne, mexiléthine, propafenone) ; de certains médicaments pour l'hypertension artérielle (comme certains anti-hypertenseurs d'action centrale (clonidine, guanfacine, moxonidine, méthyldopa, rilménidine).

L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour.

Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour.

L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines.

Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

NEBILET® 5 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 162DH60

relire.
ute,
otre

rit. Ne
as de

NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

La substance active est :

Nébivolol 5,00 mg

Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg

pour un comprimé quadrisécable

Les autres composants sont :

Polysorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Titulaire

BERLIN CHEMIE AG, SITE ADLERSHOF

Glienicker Weg 125 - 12489 Berlin - ALLEMAGNE

Fabricant

BERLIN CHEMIE AG, SITE ADLERSHOF

Glienicker Weg 125 - 12489 Berlin - ALLEMAGNE

1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrisécable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Liste des excipients à effet notoire

Lactose.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

L'association du nébivolol avec d'autres médicaments peut affecter son activité ou celle des autres médicaments associés : il s'agit notamment de certains médicaments pour le cœur (comme certains antagonistes calciques (vérapamil, diltiazem), ou certains anti-arythmiques de classe I (quinidine, hydroquinidine, cibenzoline, flecaïnide, disopyramide, lidocaïne, mexiléthine, propafenone) ; de certains médicaments pour l'hypertension artérielle (comme certains anti-hypertenseurs d'action centrale (clonidine, guanfacine, moxonidine, méthyldopa, rilménidine).

L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour.

Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour.

L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines.

Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

119,80

LOSCITA® 10 mg

Escitalopram

LOSCITA® 10 mg
Escitalopram

28 Comprimés pelliculés sécables



6 118000 041610

té de
relire.
ute, den

nois à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes indésirables. Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

PPV 119DH80
1ER 09/22
LOT 11963

® 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUEL

m)

10,00 mg

Les autres composants sont : Cellulose microcristalline silicifiée, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, OPADRY white.

Pour un comprimé pelliculé sécable.

Boîtes de 14 ou 28 comprimés pelliculés sécables.

Classe pharmacothérapeutique : antidépresseur / inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un antidépresseur, il est indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs majeurs, le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie, le traitement de la phobie sociale, troubles obsessionnels compulsifs.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LOSCITA® 10 mg, comprimé pelliculé sécable?

Contre-indications :

Ne prenez jamais LOSCITA® 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- allergie à l'escitalopram ou à l'un de ses constituants,
- association avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Prévenez votre médecin en cas d'idées suicidaires, celles-ci peuvent persister en début de traitement de la dépression. Ce médicament n'est pas recommandé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Précautions d'emploi et mises en garde spéciales :

Faites attention avec LOSCITA® 10 mg, comprimé pelliculé sécable :

- en cas de maladie du foie ou de diabète,
- en cas de trouble maniaque,
- en cas d'épilepsie ou d'antécédents de convulsions.
- La survenue ou l'augmentation de la fréquence de crises convulsives impose l'arrêt du traitement,
- en cas d'antécédents d'anomalies de la coagulation, de tendance aux hémorragies ou de traitement par des médicaments pouvant augmenter le risque de saignement (anticoagulants oraux, certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine, antidépresseurs tricycliques, ticlopidine, dipyridamole...),
- si vous avez une insuffisance rénale sévère,
- si vous présentez une maladie coronarienne (angine de poitrine),
- en cas d'allaitement.

Aliments et boissons : la consommation d'alcool est déconseillée au cours du traitement.

Grossesse : il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez une grossesse pendant le traitement, consultez votre médecin.

Allaitement : l'utilisation de ce médicament est déconseillée en cas d'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : LOSCITA® ne provoque pas de somnolence. Cependant, vous devez, suite à la prise de ce médicament comme avec tout autre nouveau médicament, faire attention lors de la conduite d'un véhicule et l'utilisation d'une machine et ceci, tant que vous ne connaissez pas votre sensibilité à ce produit.

Interactions avec d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Vous ne devez pas prendre ce médicament en même temps que certains médicaments utilisés dans :

- le traitement de la dépression : IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide) : respectez un délai de 2 semaines entre l'arrêt de ces médicaments et le début du traitement par LOSCITA®, et d'au moins 1 semaine entre l'arrêt de LOSCITA® et le début du traitement par ces médicaments.



119,80

LOSCITA® 10 mg

Escitalopram

LOSCITA® 10 mg
Escitalopram

28 Comprimés pelliculés sécables



6 118000 041610

té de
relire.
ute, den

nois à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes indésirables. Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

PPV 119DH80
1ER 09/22
LOT 11963

® 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUEL

m)

10,00 mg

Les autres composants sont : Cellulose microcristalline silicifiée, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, OPADRY white.

Pour un comprimé pelliculé sécable.

Boîtes de 14 ou 28 comprimés pelliculés sécables.

Classe pharmacothérapeutique : antidépresseur / inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un antidépresseur, il est indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs majeurs, le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie, le traitement de la phobie sociale, troubles obsessionnels compulsifs.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LOSCITA® 10 mg, comprimé pelliculé sécable?

Contre-indications :

Ne prenez jamais LOSCITA® 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- allergie à l'escitalopram ou à l'un de ses constituants,
- association avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Prévenez votre médecin en cas d'idées suicidaires, celles-ci peuvent persister en début de traitement de la dépression. Ce médicament n'est pas recommandé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Précautions d'emploi et mises en garde spéciales :

Faites attention avec LOSCITA® 10 mg, comprimé pelliculé sécable :

- en cas de maladie du foie ou de diabète,
- en cas de trouble maniaque,
- en cas d'épilepsie ou d'antécédents de convulsions.
- La survenue ou l'augmentation de la fréquence de crises convulsives impose l'arrêt du traitement,
- en cas d'antécédents d'anomalies de la coagulation, de tendance aux hémorragies ou de traitement par des médicaments pouvant augmenter le risque de saignement (anticoagulants oraux, certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine, antidépresseurs tricycliques, ticlopidine, dipyridamole...),
- si vous avez une insuffisance rénale sévère,
- si vous présentez une maladie coronarienne (angine de poitrine),
- en cas d'allaitement.

Aliments et boissons : la consommation d'alcool est déconseillée au cours du traitement.

Grossesse : il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez une grossesse pendant le traitement, consultez votre médecin.

Allaitement : l'utilisation de ce médicament est déconseillée en cas d'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : LOSCITA® ne provoque pas de somnolence. Cependant, vous devez, suite à la prise de ce médicament comme avec tout autre nouveau médicament, faire attention lors de la conduite d'un véhicule et l'utilisation d'une machine et ceci, tant que vous ne connaissez pas votre sensibilité à ce produit.

Interactions avec d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Vous ne devez pas prendre ce médicament en même temps que certains médicaments utilisés dans :

- le traitement de la dépression : IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide) : respectez un délai de 2 semaines entre l'arrêt de ces médicaments et le début du traitement par LOSCITA®, et d'au moins 1 semaine entre l'arrêt de LOSCITA® et le début du traitement par ces médicaments.





Gélule
Voie orale

Relaxium B6

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....

équivalent en magnésium

Vitamine B6.....

Excipients : stéarate de magnésium,

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....

équivalent en Magnésium.....

Vitamine B6 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.,

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° :DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1



MYDOFLEX 150 mg

Comprimés pelliculés
Tolperisone HCl

Lisez attentivement
de prendre ce médicament.
Elle contient des informations
sur son usage, son
traitement et votre maladie.
Si vous avez d'autre
demandez plus d'informations
à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.



6 118001 260850



Batch No./Exp./PPV 94 dhs (0)

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

MYDOFLEX 150mg, boîte de 30 comprimés pelliculés

2. Composition du médicament :

Composition :

TOPLERISONE (DCI)..... 150mg

Excipients : Acide citrique anhydre, povidone, cellulose microcristalline PH102, eau purifiée, cellulose microcristalline PH112, dioxyde de silice colloïdale, Crospovidone, stéarate de magnésium, alcool polyvinyle partiellement hydrolysé, dioxyde de titane, polyéthylène de glycol, Talc

3. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité:

MYDOFLEX est un myorelaxant

4. Indications thérapeutiques

MYDOFLEX contient le principe actif chlorhydrate de tolperisone qui est un décontracturant musculaire. Il est utilisé, sur prescription médicale, dans le traitement des spasmes musculaires, lors d'affections douloureuses d'origine musculo-squelettique, notamment de la colonne vertébrale et des grosses articulations. Il peut aussi être prescrit dans l'hypertonie de la musculature squelettique associée à une affection neurologique.

5. Posologie et mode d'administration :

Chez l'adulte la dose initiale est en général d'un comprimé pelliculé de MYDOFLEX (soit une dose de 150 mg) matin, midi et soir (soit une dose journalière de 450 mg). Dans certains cas le médecin peut prescrire une dose plus importante (quatre fois un comprimé pelliculé à 150 mg par jour). Chez les personnes âgées, ou en cas de certaines maladies associées (insuffisance hépatique ou rénale), la dose prescrite est souvent plus faible. La dose journalière est maintenue jusqu'à l'obtention du résultat thérapeutique. La prescription médicale peut prévoir pour la suite un intervalle plus long entre les prises. En cas de simple retard d'une prise prenez la dose prévue. En cas d'oubli complet d'une prise ne pas doubler la dose suivante.

entre-indications

Ne prenez jamais MYDOFLEX 150 mg comprimés pelliculés dans les cas suivants :
Myasthénie grave (maladie rare entraînant une faiblesse musculaire).

Allergie antérieure au MYDOFLEX

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. Effets indésirables

Les récentes études cliniques ont montré que moins de 5% des patients traités avaient annoncé des effets indésirables. Les effets indésirables rapportés sont les suivants:

Système nerveux central:

Occasionnel: vertige, tremblement, paraesthesia

Peu fréquent: mal de tête

Système cardiovasculaire:

Occasionnel: palpitations, hypotension

Etendue gastro-intestinale:

Occasionnel: bouche sèche, dyspepsie, nausée, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, flatulence

Peu fréquent: constipation, brûlures d'estomac

Peau:

Occasionnel: transpiration, urtication, éruption

Troubles généraux:

Peu fréquent: asthenie, somnolence, douleur

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8. Mises en garde spéciales :

Faites attention avec MYDOFLEX 150 mg :

En prescrivant MYDOFLEX le médecin doit informer le patient des risques d'allergies liés à ce produit (voire Effets indésirables). Si après la prise du médicament, vous ressentez des manifestations anormales (fourmillements dans les mains, les pieds, apparition de plaques ouges, enflure de la face ou des muqueuses, gêne respiratoire, malaise, signes pouvant faire penser à une allergie médicamenteuse), il faut arrêter le traitement et avertir immédiatement le médecin.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

APROVASC® 150 mg/5 mg
APROVASC® 150 mg/10 mg
APROVASC® 300 mg/5 mg
APROVASC® 300 mg/10 mg

Irbésartan / bésilate d'amlopipine

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

APROVASC

2. DENOMINATION COMM

Irbésartan / Bésilate d'am

Sanofi-aventis Maroc
 Route de Rabat -R.P.1,
 Ain seba Casablanca
 APROVASC 150mg/5mg B28
 Cp Pel

PPV : 155.80 DH



3. FORME PHARMACEUTI

COMPRIME

FORMULATION :

Chaque comprimé contient :				
Irbésartan	150 mg	150 mg	300 mg	300 mg
Bésilate d'amlopipine correspondant à amlopipine	5 mg	10 mg	5 mg	10 mg
Excipient q.s.	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitemet de l'hypertension artérielle essentielle.

APROVASC est contre-indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'hypertension artérielle insuffisamment contrôlée par irbésartan ou amlopipine en monothérapie.

5. CONTRE-INDICATIONS

L'irbésartan et l'amlopipine étant tous deux présents dans le médicament, APROVASC est contre-indiqué dans les cas suivants :

- hypersensibilité à l'un ou l'autre principe actif, voire aux deux, ou à l'un des autres constituants,
- hypersensibilité aux dihydropyridines,
- choc cardigénique, sténose aortique cliniquement significative, angor instable (à l'exception de l'angor de Prinzmetal),
- grossesse et allaitement (voir rubrique 5, « Mises en garde » et rubrique 7).

Conséquence du blocage du système rénine-angiotensine-aldostéron, les modifications de la fonction rénale sont à prévoir chez les sujets sensibles. Chez les patients dont la fonction rénale dépend de l'activité du système rénine-angiotensine-aldostéron (patients hypertendus présentant une sténose artérielle rénale de l'un des reins voire des deux, ou patients présentant une insuffisance cardiaque congestive sévère), le traitement d'autres médicaments modifiant ce système a été associé à une oligurie et/ou une azotémie progressive ainsi qu'à une insuffisance rénale aiguë et/ou le décès dans de rares cas. La survenue d'un effet similaire avec un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II, ce qu'est l'irbésartan, peut être exclue.

Chez le sujet âgé : parmi les patients ayant reçu l'irbésartan au cours d'études cliniques, il n'a été globalement observé aucune différence en termes d'efficacité et de tolérance entre les patients âgés (âgés de 65 ans) et les patients plus jeunes.

Chez l'enfant : la tolérance et l'efficacité n'ont pas été établies dans la population pédiatrique.

7. RESTRICTIONS D'EMPLOI PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

Grossesse : on ne dispose d'aucune étude pertinente et bien contrôlée chez la femme enceinte. APROVASC est contre-indiqué pendant la grossesse. APROVASC ne doit pas être administré chez la femme en âge de procréer n'utilisant pas de contraception fiable. APROVASC doit être interrompu plus rapidement possible en cas de grossesse diagnostiquée pendant le traitement (voir rubrique 5, « Contre-indications et Mises en garde »).

Allaitemet : APROVASC est contre-indiqué pendant l'allaitement (voir rubrique 5, « Contre-indications »).

8. EFFETS SECONDAIRES ET REACTIONS INDESIRABLES :

EVENEMENTS INDESIRABLES :

Les conditions de réalisation des essais cliniques étant très variables, il n'est pas possible de comparer directement les taux d'effets indésirables d'un médicament observés dans le cadre d'essais cliniques avec ceux survenus lors d'essais cliniques évaluant un autre médicament, et il peut que ces taux ne reflètent pas ceux observés en pratique clinique.

La tolérance de l'irbésartan a été évaluée dans le cadre d'études cliniques chez environ 5 000 sujets, dont 1 300 patients hypertendus traités pendant plus de 6 mois et plus de 400 patients traités pendant 1 an ou plus. Les événements indésirables rapportés chez les patients recevant l'irbésartan ont généralement été légers et transitoires, sans relation avec la thérapie. L'incidence des événements indésirables était indépendante de l'âge, du sexe ou de la race.

Lors d'études cliniques contre placebo et comprenant 1 965 patients traités par l'irbésartan (durée habituelle du traitement entre 1 et 3 mois),

SANOFI

APROVASC® 150 mg/5 mg
APROVASC® 150 mg/10 mg
APROVASC® 300 mg/5 mg
APROVASC® 300 mg/10 mg

Irbésartan / bésilate d'amlopipine

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

APROVASC

2. DENOMINATION COMM

Irbésartan / Bésilate d'am

Sanofi-aventis Maroc
 Route de Rabat -R.P.1,
 Ain seba Casablanca
 APROVASC 150mg/5mg B28
 Cp Pel

PPV : 155.80 DH



3. FORME PHARMACEUTI

COMPRIME

FORMULATION :

Chaque comprimé contient :				
Irbésartan	150 mg	150 mg	300 mg	300 mg
Bésilate d'amlopipine correspondant à amlopipine	5 mg	10 mg	5 mg	10 mg
Excipient q.s.	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitemet de l'hypertension artérielle essentielle.

APROVASC est contre-indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'hypertension artérielle insuffisamment contrôlée par irbésartan ou amlopipine en monothérapie.

5. CONTRE-INDICATIONS

L'irbésartan et l'amlopipine étant tous deux présents dans le médicament, APROVASC est contre-indiqué dans les cas suivants :

- hypersensibilité à l'un ou l'autre principe actif, voire aux deux, ou à l'un des autres constituants,
- hypersensibilité aux dihydropyridines,
- choc cardigénique, sténose aortique cliniquement significative, angor instable (à l'exception de l'angor de Prinzmetal),
- grossesse et allaitement (voir rubrique 5, « Mises en garde » et rubrique 7).

Conséquence du blocage du système rénine-angiotensine-aldostéron, les modifications de la fonction rénale sont à prévoir chez les sujets sensibles. Chez les patients dont la fonction rénale dépend de l'activité du système rénine-angiotensine-aldostéron (patients hypertendus présentant une sténose artérielle rénale de l'un des reins voire des deux, ou patients présentant une insuffisance cardiaque congestive sévère), le traitement d'autres médicaments modifiant ce système a été associé à une oligurie et/ou une azotémie progressive ainsi qu'à une insuffisance rénale aiguë et/ou le décès dans de rares cas. La survenue d'un effet similaire avec un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II, ce qu'est l'irbésartan, peut être exclue.

Chez le sujet âgé : parmi les patients ayant reçu l'irbésartan au cours d'études cliniques, il n'a été globalement observé aucune différence en termes d'efficacité et de tolérance entre les patients âgés (âgés de 65 ans) et les patients plus jeunes.

Chez l'enfant : la tolérance et l'efficacité n'ont pas été établies dans la population pédiatrique.

7. RESTRICTIONS D'EMPLOI PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

Grossesse : on ne dispose d'aucune étude pertinente et bien contrôlée chez la femme enceinte. APROVASC est contre-indiqué pendant la grossesse. APROVASC ne doit pas être administré chez la femme en âge de procréer n'utilisant pas de contraception fiable. APROVASC doit être interrompu plus rapidement possible en cas de grossesse diagnostiquée pendant le traitement (voir rubrique 5, « Contre-indications et Mises en garde »).

Allaitemet : APROVASC est contre-indiqué pendant l'allaitement (voir rubrique 5, « Contre-indications »).

8. EFFETS SECONDAIRES ET REACTIONS INDESIRABLES :

EVENEMENTS INDESIRABLES :

Les conditions de réalisation des essais cliniques étant très variables, il n'est pas possible de comparer directement les taux d'effets indésirables d'un médicament observés dans le cadre d'essais cliniques avec ceux survenus lors d'essais cliniques évaluant un autre médicament, et il peut que ces taux ne reflètent pas ceux observés en pratique clinique.

La tolérance de l'irbésartan a été évaluée dans le cadre d'études cliniques chez environ 5 000 sujets, dont 1 300 patients hypertendus traités pendant plus de 6 mois et plus de 400 patients traités pendant 1 an ou plus. Les événements indésirables rapportés chez les patients recevant l'irbésartan ont généralement été légers et transitoires, sans relation avec la thérapie. L'incidence des événements indésirables était indépendante de l'âge, du sexe ou de la race.

Lors d'études cliniques contre placebo et comprenant 1 965 patients traités par l'irbésartan (durée habituelle du traitement entre 1 et 3 mois),

SANOFI

APROVASC® 150 mg/5 mg
APROVASC® 150 mg/10 mg
APROVASC® 300 mg/5 mg
APROVASC® 300 mg/10 mg

Irbésartan / bésilate d'amlopipine

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

APROVASC

2. DENOMINATION COMM

Irbésartan / Bésilate d'am

Sanofi-aventis Maroc
 Route de Rabat -R.P.1,
 Ain seba Casablanca
 APROVASC 150mg/5mg B28
 Cp Pel

PPV : 155.80 DH



3. FORME PHARMACEUTI

COMPRIME

FORMULATION :

Chaque comprimé contient :				
Irbésartan	150 mg	150 mg	300 mg	300 mg
Bésilate d'amlopipine correspondant à amlopipine	5 mg	10 mg	5 mg	10 mg
Excipient q.s.	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitemet de l'hypertension artérielle essentielle.

APROVASC est contre-indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'hypertension artérielle insuffisamment contrôlée par irbésartan ou amlopipine en monothérapie.

5. CONTRE-INDICATIONS

L'irbésartan et l'amlopipine étant tous deux présents dans le médicament, APROVASC est contre-indiqué dans les cas suivants :

- hypersensibilité à l'un ou l'autre principe actif, voire aux deux, ou à l'un des autres constituants,
- hypersensibilité aux dihydropyridines,
- choc cardigénique, sténose aortique cliniquement significative, angor instable (à l'exception de l'angor de Prinzmetal),
- grossesse et allaitement (voir rubrique 5, « Mises en garde » et rubrique 7).

Conséquence du blocage du système rénine-angiotensine-aldostéron, les modifications de la fonction rénale sont à prévoir chez les sujets sensibles. Chez les patients dont la fonction rénale dépend de l'activité du système rénine-angiotensine-aldostéron (patients hypertendus présentant une sténose artérielle rénale de l'un des reins voire des deux, ou patients présentant une insuffisance cardiaque congestive sévère), le traitement d'autres médicaments modifiant ce système a été associé à une oligurie et/ou une azotémie progressive ainsi qu'à une insuffisance rénale aiguë et/ou le décès dans de rares cas. La survenue d'un effet similaire avec un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II, ce qu'est l'irbésartan, peut être exclue.

Chez le sujet âgé : parmi les patients ayant reçu l'irbésartan au cours d'études cliniques, il n'a été globalement observé aucune différence en termes d'efficacité et de tolérance entre les patients âgés (âgés de 65 ans) et les patients plus jeunes.

Chez l'enfant : la tolérance et l'efficacité n'ont pas été établies dans la population pédiatrique.

7. RESTRICTIONS D'EMPLOI PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

Grossesse : on ne dispose d'aucune étude pertinente et bien contrôlée de la femme enceinte. APROVASC est contre-indiqué pendant la grossesse. APROVASC ne doit pas être administré chez la femme en âge de procréer n'utilisant pas de contraception fiable. APROVASC doit être interrompu plus rapidement possible en cas de grossesse diagnostiquée pendant le traitement (voir rubrique 5, « Contre-indications et Mises en garde »).

Allaitemet : APROVASC est contre-indiqué pendant l'allaitement (voir rubrique 5, « Contre-indications »).

8. EFFETS SECONDAIRES ET REACTIONS INDESIRABLES :

EVENEMENTS INDESIRABLES :

Les conditions de réalisation des essais cliniques étant très variables, il n'est pas possible de comparer directement les taux d'effets indésirables d'un médicament observés dans le cadre d'essais cliniques avec ceux survenus lors d'essais cliniques évaluant un autre médicament, et il peut que ces taux ne reflètent pas ceux observés en pratique clinique.

La tolérance de l'irbésartan a été évaluée dans le cadre d'études cliniques chez environ 5 000 sujets, dont 1 300 patients hypertendus traités pendant plus de 6 mois et plus de 400 patients traités pendant 1 an ou plus. Les événements indésirables rapportés chez les patients recevant l'irbésartan ont généralement été légers et transitoires, sans relation avec la thérapie. L'incidence des événements indésirables était indépendante de l'âge, du sexe ou de la race.

Lors d'études cliniques contre placebo et comprenant 1 965 patients traités par l'irbésartan (durée habituelle du traitement entre 1 et 3 mois),

SANOFI

APROVASC® 150 mg/5 mg
APROVASC® 150 mg/10 mg
APROVASC® 300 mg/5 mg
APROVASC® 300 mg/10 mg

Irbésartan / bésilate d'amlopipine

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

APROVASC

2. DENOMINATION COMM

Irbésartan / Bésilate d'am

Sanofi-aventis Maroc
 Route de Rabat -R.P.1,
 Ain seba Casablanca
 APROVASC 150mg/5mg B28
 Cp Pel

PPV : 155.80 DH



3. FORME PHARMACEUTI

COMPRIME

FORMULATION :

Chaque comprimé contient :				
Irbésartan	150 mg	150 mg	300 mg	300 mg
Bésilate d'amlopipine correspondant à amlopipine	5 mg	10 mg	5 mg	10 mg
Excipient q.s.	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitemet de l'hypertension artérielle essentielle.

APROVASC est contre-indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'hypertension artérielle insuffisamment contrôlée par irbésartan ou amlopipine en monothérapie.

5. CONTRE-INDICATIONS

L'irbésartan et l'amlopipine étant tous deux présents dans le médicament, APROVASC est contre-indiqué dans les cas suivants :

- hypersensibilité à l'un ou l'autre principe actif, voire aux deux, ou à l'un des autres constituants,
- hypersensibilité aux dihydropyridines,
- choc cardigénique, sténose aortique cliniquement significative, angor instable (à l'exception de l'angor de Prinzmetal),
- grossesse et allaitement (voir rubrique 5, « Mises en garde » et rubrique 7).

Conséquence du blocage du système rénine-angiotensine-aldostéron, les modifications de la fonction rénale sont à prévoir chez les sujets sensibles. Chez les patients dont la fonction rénale dépend de l'activité du système rénine-angiotensine-aldostéron (patients hypertendus présentant une sténose artérielle rénale de l'un des reins voire des deux, ou patients présentant une insuffisance cardiaque congestive sévère), le traitement d'autres médicaments modifiant ce système a été associé à une oligurie et/ou une azotémie progressive ainsi qu'à une insuffisance rénale aiguë et/ou le décès dans de rares cas. La survenue d'un effet similaire avec un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II, ce qu'est l'irbésartan, peut être exclue.

Chez le sujet âgé : parmi les patients ayant reçu l'irbésartan au cours d'études cliniques, il n'a été globalement observé aucune différence en termes d'efficacité et de tolérance entre les patients âgés (âgés de 65 ans) et les patients plus jeunes.

Chez l'enfant : la tolérance et l'efficacité n'ont pas été établies dans la population pédiatrique.

7. RESTRICTIONS D'EMPLOI PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

Grossesse : on ne dispose d'aucune étude pertinente et bien contrôlée de la femme enceinte. APROVASC est contre-indiqué pendant la grossesse. APROVASC ne doit pas être administré chez la femme en âge de procréer n'utilisant pas de contraception fiable. APROVASC doit être interrompu plus rapidement possible en cas de grossesse diagnostiquée pendant le traitement (voir rubrique 5, « Contre-indications et Mises en garde »).

Allaitemet : APROVASC est contre-indiqué pendant l'allaitement (voir rubrique 5, « Contre-indications »).

8. EFFETS SECONDAIRES ET REACTIONS INDESIRABLES :

EVENEMENTS INDESIRABLES :

Les conditions de réalisation des essais cliniques étant très variables, il n'est pas possible de comparer directement les taux d'effets indésirables d'un médicament observés dans le cadre d'essais cliniques avec ceux survenus lors d'essais cliniques évaluant un autre médicament, et il peut que ces taux ne reflètent pas ceux observés en pratique clinique.

La tolérance de l'irbésartan a été évaluée dans le cadre d'études cliniques chez environ 5 000 sujets, dont 1 300 patients hypertendus traités pendant plus de 6 mois et plus de 400 patients traités pendant 1 an ou plus. Les événements indésirables rapportés chez les patients recevant l'irbésartan ont généralement été légers et transitoires, sans relation avec la thérapie. L'incidence des événements indésirables était indépendante de l'âge, du sexe ou de la race.

Lors d'études cliniques contre placebo et comprenant 1 965 patients traités par l'irbésartan (durée habituelle du traitement entre 1 et 3 mois),

SANOFI

DOCTEUR NAJAT KARIM ép. KABLI

CARDIOLOGUE

Echo-doppler cardio-vasculaire

Holter ECG

Diplômée de l'Université de Rennes I-France

Ancienne Médecin Assistante des Hôpitaux

de l'Ouest-France

الدكتورة نجات كريم ح. القبلي
اختصاصية في أمراض القلب والشرايين
الفحص بالصدى والدوبلير
هولتير التخطيط الكهربائي للقلب
خريجة جامعة رين 1-فرنسا
طبيبة مساعدة سابقا بمستشفيات
غرب فرنسا

Agadir... 07.01.2020

0000033

Note d'honoraires Dr. Najaatt KARIM ép. KABLI k. Khadija.....

✓ Consultation :

✓ Hospitalisation :

✓ E.CG :

- Holter rythmique :
- Echo-doppler cardiaque :
- Echo-doppler vasculaire :
- Epreuve d'effort :
- Autres :

100,-

TOTAL =

350,- Dhs.

Arrêtée la présente note d'honai à la somme de : Trois Cen +

Cinquante Dhs.

Dr. Najaatt KARIM ép. KABLI

Angle Av. Hassan II & Abderrahim BOUABID
Rés. Borj Dlalate - HI 2^{me} Etage, n°109-AGADIR
Tél: 05 28 84 82 92 - 06 61 38 09

ملتقى شارع الحبيب الثاني وشارع عبد الرحيم بو عبيد-اقامة برج الدلالات-HI الطابق الثاني 109 - أكادير

Angle Av. HASSAN II & ABDERRAHIM BOUABID-Rés.Borj Dlalate-HI 2^{me} étage,n°109-AGADIR

Tél : +212661385165 +212528848292

najat.karimkabli@gmail.com

ICE : 001651939000090 - IF:75932640 - CNSS :2709254 - TP :48174640 - INP :041083387

