

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ons générales :

cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

en cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie
Nº P19- 0044380

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

22321

Cadre réservé à l'adhérent (e)
Matricule : 532

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre : Retraité

Nom & Prénom : WADEH Dchained

Date de naissance : 01.07.1941


Adresse : Hay Inara 1 Rue 5 n° 11 Aïn chock Casab

Tél. : 0661.62.29.79

Total des frais engagés : 1986,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 01.02.2020

Nom et prénom du malade : WADEH, med Age: 79 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : OPTD

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casab

Le : 01/02/2020

Signature de l'adhérent(e) :

WADEH

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des actes
28/11/2020				#2020 DR. N. LATIF IDRISI TRAUMATO-ORTHOPEDISTE 75, Boulevard Massoud Khadra Tel. : 05 22 25 25 16 Fax : 05 22 25 25 07
04/12/2020				DR. N. LATIF IDRISI TRAUMATO-ORTHOPEDISTE

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE EL ANOUAR Dr. Fatih Docteur en Pharmacie Bine Lemdoune, Rue Casablanca - Tél. : 0522 28 17 38	28/11/2020	333 MACIE EL ANOUAR Dr. Fatih Bine Lemdoune, Rue 17 N° 34 Bis Casablanca - Tél. : 0522 28 17 38

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
UROLOGIE Abdelmoula BEN YAHIA Tunisie	01/12/2020	IRX Hanches 13000	

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bila

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux	
				MONTANTS DES SOINS	
DEBUT D'EXECUTION					
FIN D'EXECUTION					
O.D.F PROTHESES DENTAIRES				COEFFICIENT DES TRAVAUX	
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE					
H	25533412	21433552			
D	00000000	00000000			
B	00000000	00000000			
G	35533411	11433553			
MONTANTS DES SOINS					
DATE DU DEVIS					

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nantes France
Ancien Chef de Clinique & Assistant au CHU de Nantes
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nantes
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique Adulte et Pédiatrique
Membre de la Société Française de Chirurgie
Traumato-orthopédique



خريج كلية الطب ببنات

رئيس قسم وجراح مستشفيات ببنات

عضو بالهيئة الفرنسية لجراحة العظام والمفاصل

Casablanca, le :

11 FEB 2020

Mr. (Mme) : السيد (ة)

137,00

Dfzlis My

S.V

56,30 x 2

11,2 60

D Daus 25.000 U.T

S.V

1st / neu 2 45

249,6

PHARMACIE EL ANOUAR
Dr. Fatiha EL HARTI
Docteur en Pharmacie
Bine Lemdoune, Rue 17 N° 34 Bis
Casablanca - Tél. : 0522 28 17 08

PPV :

LOT : 56,30 DH
19F05/B
EXP : 06/2021

D-CURE® AMPOULE



6 118001 320080

SOL

1

2

3

SUBSTANCE ACTIVE : Cholécalciférol (Vitamine D 3)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

Principe actif : Cholécalciférol 25.000 U.I.

Excipients :

Acétate d'alpha-Tocophérol – Essence d'écorce d'orange douce – Oléate de Polyglycérol (E475) – Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

PPV :

LOT : 56,30 DH
19F05/B
EXP : 06/2021

D-CURE® AMPOULE



6 118001 320080

SOL

1

2

3

SUBSTANCE ACTIVE : Cholécalciférol (Vitamine D 3)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

Principe actif : Cholécalciférol 25.000 U.I.

Excipients :

Acétate d'alpha-Tocophérol – Essence d'écorce d'orange douce – Oléate de Polyglycérol (E475) – Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

Folio®, source d'acide folique et d'iode, est un complément alimentaire spécialement conçu pour les femmes désirant un enfant ou enceintes. Au cours de ces périodes de la vie, il est particulièrement important d'avoir un apport adéquat en acide folique ainsi qu'en iode. Il est donc nécessaire de veiller à avoir une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain afin d'apporter la quantité appropriée en iode et acide folique à votre organisme. **Folio®** permet de vous aider à répondre à ces besoins, pour vous et votre enfant.

Acide folique - la vitamine « de la grossesse »

L'acide folique (vitamine B₉) joue un rôle essentiel au cours de la grossesse car il contribue durant cette période à la croissance des tissus maternels dont notamment celle du placenta et du fœtus.

La supplémentation en acide folique augmente le statut maternel en folates. Un faible statut en folates chez la mère augmente les risques d'apparition d'anomalies de fermeture du tube neural chez le fœtus en développement. L'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 400 µg d'acide folique par la femme en âge de procréer, si possible un mois avant la conception et jusqu'à au moins trois mois après la conception.

Un taux satisfaisant en acide folique contribue de plus à un fonctionnement normal du système immunitaire, au métabolisme normal de l'homocystéine et à une réduction de la fatigue.

Sources : foies, légumes verts à feuilles (épinards, brocoli, salades), légumineuses, céréales, levure, œufs et noix.

Iode - l'oligo-élément

L'iode est un oligo-élément essentiel que nous devons ingérer à travers notre alimentation afin de permettre à notre organisme d'assurer de nombreuses fonctions.

L'iode intervient dans la synthèse normale des hormones thyroïdiennes.

La grossesse s'accompagne d'un besoin supplémentaire en iode qui perdure si l'allaitement maternel est pratiqué.

Sources : Poissons de mer, crustacés et mollusques, algues, lait et produits laitiers, œufs et sel iodé.

Quand prendre Folio® ?

Folio® vous aide à couvrir vos besoins en acide folique et en iode avant et pendant la grossesse, ainsi que pendant la période d'allaitement.

Avertissements : en cas d'allergie à l'un des constituants. En cas d'affection thyroïdienne ou de prise d'autres préparations contenant de l'iode, prendre l'avis de votre médecin.

Composition

Nutriments	par comprimé	%VNR*
Acide folique	200 µg	100
Iode	150 µg	100

*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.

Conseil d'utilisation : prendre un comprimé par jour au cours d'un repas avec un verre d'eau. Ne pas dépasser la dose recommandée.

Conditions de conservation : à conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité (ne pas mettre dans la salle de bain ou au réfrigérateur!), à température ambiante.

Tenir hors de portée des enfants.

Ingrediénts : agents de charge: lactose ; antiagglomérant : talc ; cellulose; glucose ; antiagglomérant : silice colloïdale anhydre, sels de magnésium d'acides gras ; acide pteroymonoglutamique (acide folique), iodure de potassium .

Sans fructose. Ne contient pas de constituants d'origine animale.

Code Produit (GLN) : 4 260139 87024 0 (120 comprimés)

Code Produit (GLN) : 4 260139 87025 7 (20 comprimés)

 **SteriPharm Export**

www.steripharm-export.com

Visitez notre site internet

SteriPharm Export GmbH

Herderstraße 29, 61350 Bad Homburg v.d. Höhe - Germany

Dr. N. Latif - IDRISI

Chirurgien Orthopédiste

الدكتور لطيف الأدريسي نور الدين

جراحة العظام والمفاصل

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nantes France
Ancien Chef de Clinique & Assistant au CHU de Nantes
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nantes
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique Adulte et Pédiatrique
Membre de la Société Française de Chirurgie
Traumato-orthopédique

خريج كلية الطب بنانت
رئيس قسم و جراح مستشفى بنانت
عضو بالهيئة الفرنسية لجراحة العظام والمفاصل

Dr. N. Latif - IDRISI
TRAUMATO-ORTHOPÉDISTE
75, Boulevard Massira Al Khadra
Tél. : 05 22 25 39 25
Fax : 05 22 25 25 16

04 FEB 2020

Mr. (Mme) :

WASSAL, MEF

السيد (ة) :

S.V

① ACFOR M-

11 60

51,60 x 2

① Taxis B9

1 60

103,20

Dr. Latif IDRISI
Dr. Fatiha EL HARTI
Docteur en Pharmacie
Bine Lemdoune en Pharmacie
Casablanca - Tél. : 0522 28 1758

DR. N. LATIF IDRISI
TRAUMATO-ORTHOPÉDISTE
75, Boulevard Massira Al Khadra
Tél. : 05 22 25 39 25 16
Fax : 05 22 25 25 07

Tardyferon B9

comprimé pelliculé
Fer/ acide folique

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'
Elle contient des informations importantes !

Si vous avez d'autres questions, si vous avez ur
d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de

• Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez en informer votre pharmacien.

• Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
• Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.



6 118001 100620
TARDYFERON B9
30 comprimés pelliculés
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg

Distribué par Cooper Pharma
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca
Amina DAOUDI - Pharmacien Responsable
PPV : 51.60 DH

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients

base de fer. Cette coloration peut gêner une

niveau gastro-intestinal.

de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé

ment en même temps que cette boisson.

éiser à demander l'avis de votre médecin ou

32084 la portée des enfants.

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par TARDYFERON B9, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques de dose ou de moment de prise par exemple.

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez un médicament pour traiter les calculs urinaires infectés (l'acide acéthydroxamicique).
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la lénodopa, la carbipoda).
- Si vous prenez du zinc et du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antiacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez des médicaments permettant d'éliminer ou de réduire la fréquence des crises d'épilepsie comme le phénobarbital, la primidone, la phénytoïne, la fosphénytoïne.
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestyramine).

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de légumineuses, de laitage, de thé, de café, de vin rouge, d'œufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allait. DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Posologie

1 comprimé par jour 50 mg de fer élément et 350 µg d'acide folique pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4^{ème} mois). DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PRÉPARATIONS ANTIANEMIQUES -
Code ATC : B03AD03

Apport de fer et d'acide folique.

Traitemen préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré.

Ne doit pas être utilisé dans la prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AFN : spina bifida...).

TARDYFERON B9 est indiqué seulement chez la femme enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON B9, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au fer ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous présentez une surcharge en fer (comme une hémochromatose par exemple).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON B9.

Si vous prenez TARDYFERON B9 pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON B9 ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sucés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau. Si vous ne pouvez

Tardyferon B9

comprimé pelliculé
Fer/ acide folique

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'
Elle contient des informations importantes !

Si vous avez d'autres questions, si vous avez ur
d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de

• Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez en informer votre pharmacien.

• Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
• Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.



6 118001 100620
TARDYFERON B9
30 comprimés pelliculés
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg

Distribué par Cooper Pharma
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca
Amina DAOUDI - Pharmacien Responsable
PPV : 51.60 DH

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients

base de fer. Cette coloration peut gêner une

niveau gastro-intestinal.

de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé

ment en même temps que cette boisson.

éiser à demander l'avis de votre médecin ou

32084 la portée des enfants.

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par TARDYFERON B9, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques de dose ou de moment de prise par exemple.

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez un médicament pour traiter les calculs urinaires infectés (l'acide acéthydroxamicique).
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la lénodopa, la carbipoda).
- Si vous prenez du zinc et du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antiacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez des médicaments permettant d'éliminer ou de réduire la fréquence des crises d'épilepsie comme le phénobarbital, la primidone, la phénytoïne, la fosphénytoïne.
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestyramine).

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de légumineuses, de laitage, de thé, de café, de vin rouge, d'œufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allait. DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Posologie

1 comprimé par jour 50 mg de fer élément et 350 µg d'acide folique pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4^{ème} mois). DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PRÉPARATIONS ANTIANEMIQUES -
Code ATC : B03AD03

Apport de fer et d'acide folique.

Traitemen préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré.

Ne doit pas être utilisé dans la prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AFN : spina bifida...).

TARDYFERON B9 est indiqué seulement chez la femme enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON B9, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au fer ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous présentez une surcharge en fer (comme une hémochromatose par exemple).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON B9.

Si vous prenez TARDYFERON B9 pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON B9 ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sucés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau. Si vous ne pouvez

Dr. N. Latif - IDRISI

Chirurgien Orthopédiste

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nantes France
Ancien Chef de Clinique & Assistant au CHU de Nantes
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nantes
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique Adulte et Pédiatrique
Membre de la Société Française de Chirurgie
Traumato-orthopédique



الدكتور نظيف الأدريسي نور الدين

جراحة العظام واللهاص

خريج كلية الطب بباتنة

رئيس قسم و جراح مستشفى بباتنة

عضو بالهيئة الفرنسية لجراحة العظام واللهاص

Casablanca, le :

Dr. N. LATIF IDRISI
DR. N. LATIF IDRISI
ORTHOPEDISTE

Mr. (Mme) :

75, Boulevard Massira Al Khadra
Casablanca - Tél. : 05 22 25 16

Fax : 05 22 25 07



Telephone

22 25 07 201

Dr. Al Nakajni

Dr. Fatima El Harti

Docteur en Pharmacie

33, Rue 17 N° 34 Bis
Boulevard Massira Al Khadra
Casablanca - Tél. : 0522 28 17 08

Dr. N. LATIF IDRISI
TRAUMATO - ORTHOPÉDISTE
75, Boulevard Massira Al Khadra

Tél. : 05 22 25 16

Fax : 05 22 25 07



GÉLUPRANE® 500 mg

Enfant (à partir de 27 kg)

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination : GÉLUPRANE

Composition : Paracé

paracétamol par boîte

Excipients : q.s.p. 1 gélule

16,60

8 g de



Forme pharmaceutique

Classe pharmaceutique

- Antalgique : il calme la douleur
- Antipyrrétique : il fait baisser la température

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué dans le traitement de la douleur, notamment en cas de :

- maux de tête, migraines,
- douleurs rhumatismales, lumbagos, sciatiques, lombalgies, torticolis,
- douleurs musculaires et tendineuses, contractures douloureuses,
- fractures, entorses, luxations, douleurs après traitement orthopédique,
- douleurs au cours des interventions O.R.L.,
- règles douloureuses,

Ce médicament est également indiqué dans le traitement de la fièvre, notamment :

- états grippaux, grippe,
- maladies infectieuses, bactériennes et virales.

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Contre-indications

GÉLUPRANE 500 mg ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie antérieure au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- Enfant de poids inférieur à 27 kg : il existe d'autres formes de paracétamol (sachet/suppositoire) adaptées au poids de l'enfant.

Précautions d'emploi

Ne pas dépasser les posologies indiquées.

Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis du médecin.

En cas de doute sur les effets du médicament, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

GÉLUPRANE peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

GÉLUPRANE n'est pas agressif pour votre estomac ou votre intestin. Il peut être pris en cas d'ulcère gastrique ou duodénal.

Interactions médicamenteuses

Veuillez signaler la prise de GÉLUPRANE à votre médecin s'il vous a prescrit un dosage d'acide urique sanguin ou un dosage de la glycémie.

GÉLUPRANE peut être associé aux :

- anti-inflammatoires,
- cortisone et ses dérivés,
- anticoagulants.

GÉLUPRANE® 500 mg

Enfant (à partir de 27 kg)

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination : GÉLUPRANE

Composition : Paracé

paracétamol par boîte

Excipients : q.s.p. 1 gélule

16,60

10/2021
01/2022
10/2022

8 g de



Forme pharmaceutique

Classe pharmaceutique

- Antalgique : il calme la douleur
- Antipyrrétique : il fait baisser la température

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué dans le traitement de la douleur, notamment en cas de :

- maux de tête, migraines,
- douleurs rhumatismales, lumbagos, sciatiques, lombalgies, torticolis,
- douleurs musculaires et tendineuses, contractures douloureuses,
- fractures, entorses, luxations, douleurs après traitement orthopédique,
- douleurs au cours des interventions O.R.L.,
- règles douloureuses,

Ce médicament est également indiqué dans le traitement de la fièvre, notamment :

- états grippaux, grippe,
- maladies infectieuses, bactériennes et virales.

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Contre-indications

GÉLUPRANE 500 mg ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie antérieure au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- Enfant de poids inférieur à 27 kg : il existe d'autres formes de paracétamol (sachet/suppositoire) adaptées au poids de l'enfant.

Précautions d'emploi

Ne pas dépasser les posologies indiquées.

Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis du médecin.

En cas de doute sur les effets du médicament, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

GÉLUPRANE peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

GÉLUPRANE n'est pas agressif pour votre estomac ou votre intestin. Il peut être pris en cas d'ulcère gastrique ou duodénal.

Interactions médicamenteuses

Veuillez signaler la prise de GÉLUPRANE à votre médecin s'il vous a prescrit un dosage d'acide urique sanguin ou un dosage de la glycémie.

GÉLUPRANE peut être associé aux :

- anti-inflammatoires,
- cortisone et ses dérivés,
- anticoagulants.

CASA RADIOLOGIE

Dr Y. BENHADDOU
Dr K. BENYACHOU



البيضاء
للفحص بالأشعة

الدكتور يوسف بنحدو
الدكتور خالد بنېشو

Casablanca, le 01/02/2020

FACTURE :01131/2020

Nom & Prénom : WADEH MOHAMED

Examen(s)	
RADIOGRAPHIE DE LA HANCHE F/P OSTEODENSITOMETRIE	
Montant TOTAL	1300 DH

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
mille trois cents (1300 DH)

*CASA RADILOGIE
Drs. BENHADDOU / BENYACHOU
119, Bd. Abdeloumen - Casablanca
Tél: 05 22 27 44 27/27 44 67 46 72*

Dr. N. Latif - IDRISI

Chirurgien Orthopédiste

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nantes France
Ancien Chef de Clinique & Assistant au CHU de Nantes
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nantes
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique Adulte et Pédiatrique
Membre de la Société Française de Chirurgie
Traumato-orthopédique



جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب بنانت
رئيس قسم وجراح مستشفى بنانت
عضو بالهيئة الفرنسية لجراحة العظام والمفاصل

Casablanca le 12.8.2000
Dr. N. LATIF IDRISI
Mr. (Mme) : TRAUMATO-ORTHOPÉDISTE
75, Boulevard Abdellatif Mekhdoum
Tél. : 05 22 25 16
Fax : 05 22 25 07

Dr. Latif Mekhdoum
F.D.

Dr. Latif Mekhdoum

CASA RADILOGIE
Drs. BENHADDOU / BENYACHOU
119, Bd. Abdelmoumen - Casablanca
Tél. : 05 22 27 44 27 07 77 11 66 61 67 02
Dr. N. LATIF IDRISI
TRAUMATO - ORTHOPÉDISTE
75, Boulevard Abdellatif Mekhdoum
Tél. : 05 22 25 16
Fax : 05 22 25 07

Le Samedi 1 Février 2020,

Chèr(e) collègue,

L'examen a été pratiqué sur plusieurs sites. Les résultats sont détaillés ci-dessus et dans le rapport patient.

Cordialement.

Patient:

Prénom :	Mohamed	Taille :	172 cm
Nom :	WADEH	Poids :	95 kg
Date de naissance :	07/01/1941	Date d'examen :	01/02/2020
Sexe :	Homme	Appareil :	DMS / Stratos DR

Résultats:

Measure Type	Region	Exam Date	Age	BMD	T-Score	Z-Score
Avant-bras Gauche	Mid.Ultra.1/3.	01/02/2020	79	0.742 g/cm ²	0.9	2.6
Fémur Gauche	Fémur total	01/02/2020	79	1.039 g/cm ²	-0.6	0.4
Rachis	L1-L4	01/02/2020	79	1.092 g/cm ²	-0.1	1.1

RAPPORT

L'examen a été pratiqué sur plusieurs sites. **Néanmoins, le résultat retenu comme le plus bas a été mesuré sur le Fémur Gauche.** La DMO de 1.039 g/cm², mesurée sur ce site, correspond à:

* Un T-Score de **-0.6(-9%)**. Pour rappel, le T-score représente la différence entre la DMO du patient et la valeur moyenne d'**une jeune population** en bonne santé, du même sexe et du même groupe ethnique.

* Un Z-Score de **0.4(7%) (106.6%)**. Pour rappel, le Z-Score représente la différence entre la DMO du patient et la valeur moyenne d'**une population du même âge**.

Conclusion: Selon l'OMS, ce T-Score le plus bas est normal et représente un risque de fracture très faible. Néanmoins, afin de surveiller efficacement l'évolution de la DMO de votre patient, un nouveau contrôle est recommandé d'ici trois à cinq ans si de nouveaux facteurs de risque apparaissent.

Cordialement,

Evaluation: Définitions du T-score selon l'Organisation Mondiale de la Santé

Normal: T-score supérieur à -1.0

Ostéopénique: T-score inférieur ou égal à -1.0 et supérieur à -2.5

Ostéoporotique: T-score inférieur ou égal à -2.5

CASA RADILOGIE
OSTEODENSITOMETRIE

119, Bd Abdelmoumen

20360 CASABLANCA

Tél : 00212522272020

E-Mail :

Fax :

Patient : WADEH Mohamed

Taille : 172 cm **Poids :** 95 kg

Operateur

Id. Patient :

Ethnie : Caucasiennne

Sexe : Homme

Prescripteur :

Date de naissance : 07/01/1941

Age : 79 Ans

Médecin :

***Dose eff./PDS/entrée:** 2.5 µSv/22.418 mGy.cm²/64.2 µGy

IMC: 32.11 kg/m²

FRAX Fémur Gauche

Pays :	Morocco
Fractures précédentes :	N
Fractures parentales :	N
Fumeur :	N
Glucocorticoïdes :	N
Arthrose rhum. :	N
Ostéo. secondaire :	N
Alcool :	N
T-score col :	-0.7

Probabilité de fracture sur 10 ans

	Pays : Morocco	Type de fracture	Sans DMO %	Avec DMO %
		Ostéoporotique	1.76	1.42
		Fémur	0.78	0.48

CASA RADIOLOGIE
OSTEODENSITOMETRIE
119, Bd Abdelmoumen
20360 CASABLANCA

Tél : 00212522272020

E-Mail :

Fax :

Patient : WADEH Mohamed

Id. Patient :

Ethnie : Caucasiennne

Date de naissance : 07/01/1941

Age : 79 Ans

*Dose eff./PDS/entrée: 2.5 µSv/22.418 mGy.cm²/64.2 µGy

Taille : 172 cm Poids : 95 kg

Sexe : Homme

Operateur

Prescripteur :

Médecin :


IMC: 32.11 kg/m²**Rachis Résultats détaillés**

ROI	DMO(g/cm ²)	CMO(g)	Aire(cm ²)	T-score	Z-score
I1-I2	1.049	32.00	30.52	-0.4	0.8
I1-I3	1.091	48.74	44.68	-0.1	1.0
I1-I4	1.092	77.35	70.83	-0.1	1.1
I2-I3	1.139	33.96	29.82	0.0	1.2
I2-I4	1.118	62.56	55.98	0.0	1.2
I3-I4	1.125	45.35	40.32	0.2	1.3

Résultats de l'analyse structurelle Femur G.

Mesures	Distance(cm)	Angle(°)
FNA	NC	127
HAL	12.93	NC
FNAL	11.01	NC
IH	3.74	NC

Ref. : 10.33



Risque de fracture augmenté

Information sur le risque de fracture.

MOYENNE : 10.33 - ET : 0.68.



2D Fan Beam DEXA Date/Heure d'impression : 01/02/2020 10:59:37 Haute Energie:70 keV, Basse Energie:43 keV
Courbe utilisée : Caucasiennne M LeffForearm from DMS normality curves, 2003/2004.

* Les doses d'entrée et effective sont mesurées pour le rachis et le fémur
en mode normal, patient normal (18<IMC<25). Stratos DR dosimétrie (Fevrier 2009)

Ver V4.0.10.1 20/03/2019 / H106 138 - SN: D19 7H 0561

STRATOS DR

CASA RADIOLOGIE
OSTEODENSITOMÉTRIE
119, Bd Abdelmoumen
20360 CASABLANCA

Tél : 00212522272020

E-Mail :

Fax :

Le Samedi 1 Février 2020,

Objet: Compte-rendu suite à l'évaluation de la densité minérale osseuse de Mohamed WADEH, né(e) le 07/01/1941.

Cher(e) **Mohamed WADEH**,

Votre examen de Densité Minérale Osseuse (DMO) a été fait dans notre centre le 01/02/2020 sur un ostéodensitomètre DMS Stratos DR.

Au niveau du site Avant-bras Gauche, la densité minérale osseuse moyenne mesurée est de **0.742 g/cm²**, ce qui correspond à:

- * Un T-score de **0.9(8%)**, si on la compare à une population jeune et en bonne santé.
- * Un Z-score de **2.6(3%)**, si on la compare à une population du même âge que le vôtre.

Au niveau du site Fémur Gauche, la densité minérale osseuse moyenne mesurée est de **1.039 g/cm²**, ce qui correspond à:

- * Un T-score de **-0.6(-9%)**, si on la compare à une population jeune et en bonne santé.
- * Un Z-score de **0.4(0%)**, si on la compare à une population du même âge que le vôtre.

Au niveau du site Rachis (si applicable), la densité minérale osseuse moyenne mesurée est de **1.092 g/cm²**, ce qui correspond à:

- * Un T-score de **-0.1(-1%)**, si on la compare à une population jeune et en bonne santé.
- * Un Z-score de **1.1(1%)**, si on la compare à une population du même âge que le vôtre.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), votre T-Score le plus bas, mesuré sur le site Fémur Gauche, **est considéré comme normal**.

Afin de surveiller votre évolution efficacement, nous vous conseillons de reprendre rendez-vous dans notre centre si besoin.

Cordialement,

Patient : WADEH Mohamed

Id. Patient :

Date de naissance : 07/01/1941

*Dose eff./PDS/entrée: 2.5 µSv/22.418 mGy.cm²/64.2 µGy

Ethnie : Caucasianne

Age : 79 Ans

Taille : 172 cm Poids : 95 kg


Sexe : Homme

IMC: 32.11 kg/m²



Operateur

Prescripteur :



Médecin :

1 - Avant-bras Gauche


01/02/2020 10:53 172 cm 95 kg

Courbe de normalité Avant-bras Gauche**Total : 0.742 (g/cm²)****2 - Fémur Gauche**

01/02/2020 10:49 172 cm 95 kg

Courbe de normalité Fémur Gauche**Total : 1.039 (g/cm²)****3 - Rachis**

01/02/2020 10:45 172 cm 95 kg

Courbe de normalité Rachis**Total : 1.092 (g/cm²)**

ROI	DMO(g/cm ²)	CMO(g)	Aire(cm ²)	T-score	Z-score
1 - Avant-bras Gauche - Total	0.742	26.29	35.43	0.9 (8%)	2.6 (24%)
2 - Fémur Gauche - Fémur total	1.039	48.24	46.44	-0.6 (-9%)	0.4 (7%)
3 - Rachis - L1-L4	1.092	77.35	70.83	-0.1 (-1%)	1.1 (17%)
L1	0.995	14.78	14.85	-0.4 (-5%)	0.7 (11%)
L2	1.099	17.22	15.66	-0.2 (-3%)	0.9 (14%)
L3	1.182	16.74	14.16	0.5 (7%)	1.6 (24%)
L4	1.094	28.61	26.16	0.1 (2%)	1.2 (19%)



Casablanca le 01/02/2020

Médecin Traitant : **DR N. LATIF IDRISI**

Nom du patient : **MR WADEH MOHAMED**

RADIOGRAPHIE DU BASSIN DE FACE + HANCHES DE PROFIL

Contrôle.

Prothèse totale de la hanche droite.

Coxarthrose très avancée à gauche avec lacunes dystrophiques sur le cotyle et surtout sur la tête fémorale et important pincement globale de l'interligne articulaire coxo-fémoral.

Fin liseré clair autour de la manche prothétique faisant craindre un début de descellement.

Bien confraternellement à vous.
DR K. BENYACHOU

CASA RADIOLOGIE
Drs. BENHADDOU / BENYACHOU
119, Bd. Abdelmoumen - Casablanca
Tel: 0522 27 44 07/21 77 44 06 61 67 46 72



Casablanca le 01/02/2020

Médecin Traitant : **DR N. LATIF IDRISI**
Nom du patient : **MR WADEH MOHAMED**
Examen Réalisé : **OSTEODENSITOMETRIE**

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Bilan.

TECHNIQUE :

Examen réalisé sur le système d'ostéodensitométrie DMS Stratos DR.

RESULTATS :

Au niveau du site Rachis, la densité minérale osseuse mesurée est de 1.092g/cm², ce qui correspond à :

- Un T-score de -0,1 (-1%), si on la compare à une population jeune et en bonne santé.
- Un Z-score de 1.1 (1%), si on la compare à une population du même âge que le vôtre.

Au niveau du site Fémur Gauche, la densité minérale osseuse mesurée est de 1.039g/cm², ce qui correspond à :

- Un T-score de -0,6 (-9%), si on la compare à une population jeune et en bonne santé.
- Un Z-score de 0.4 (0%), si on la compare à une population du même âge que le vôtre.

Au niveau du site Avant-bras, la densité minérale osseuse mesurée est de 0.742g/cm², ce qui correspond à :

- Un T-score de 0,9 (8%), si on la compare à une population jeune et en bonne santé.
- Un Z-score de 2.6 (3%), si on la compare à une population du même âge que le vôtre.

CONCLUSION :

*Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), votre T-score correspond à un diagnostic normal
Prothèse de la hanche droite.*

Bien confraternellement à vous.
DR Y. BENHADDOU

CASA RADIOLOGIE
Drs. BENHADDOU / BENYACHOU
119, Bd. Abdelmoumen - Casablanca
Tél.: 05 22 27 44 27/27 77 44/06 61 67 46 72