

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles


- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ▪ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ▪ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ▪ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-424189

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input checked="" type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule :	0715	Société :	RAM
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	Mohamed
Nom & Prénom : BENCHEKRONE			
Date de naissance : 01-07-1948			
Adresse : 19, Rue Al Yacmine Hay Erraha CASA (Beaujolais)			
Tél. : 0671543864	Total des frais engagés : Dhs		

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :	 Docteur MOUTAMMIL Z. Spécialiste des Maladies Respiratoires Centre Commercial Nadia - Imm 4 Bd. Brahim Roudani 0522 98 88 54 INPE: 091114637		
Date de consultation :	Mc Benchekrone Mohamed Age:		
Nom et prénom du malade :	Mc Benchekrone Mohamed		
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	Affection respiratoire		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
 Fait à : CASA Le : 25/02/2020
 Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/11/2013	C	2	250,00	INP :
01/12/2013	cautériel	C		Docteur MOUTAMMIL Spécialiste des Maladies Respiratoires Centre Commercial Nadia - Immeuble N° 1 Rue de la Gare - 1000 Bruxelles Téléphone : 02 645 52 84

EXECUTION DES ORDONNANCES INPE

Cachet du Pharmacien ou du Fourmisseur	Date	Montant de la Facture
	28/11/19	56.140
	9/12/19	28.5,-80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Zoubida MOUTAMMIL
SPECIALISTE EN PNEUMO-PHTISIOLOGIE
Maladies Respiratoires - Tuberculose
Asthme - Allergie Respiratoires

DIPLÔMEE EN MEDECINE DU TRAVAIL
Faculté de Médecine de RENNES

الدكتورة زبيدة متميل
اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسى
أمراض الرئة . السل . الضيقه
أمراض الحساسية
حاملة شهادة في طب الشغل
كلية الطب ببرانس

Casablanca, le 28 / 11 / 2019 الدار البيضاء، في

Mr Benchehrae Mohamed

- 16820 - Augmenter l'apport (b de 16)
→ sachez manger pour un débit
m 900 de repas
- 16920 - Pluie d'eucalyptus
2 pulv marine x 3/j
pot 10g ,
Bronchial
- 31720 - Ec à s x 3/j après repas .
- 24300 - Synchronicat 100
→ bouffée toute la nuit
- 56140

Docteur MOUTAMMIL Z.
Spécialiste des Maladies Respiratoires
Centre Commercial Nadia Imm 4
Bd. Brahim Roudani N° 1 - Casablanca - Tél. : 05 22 98 88 54
المركز التجاري نادية . عزازع ابراهيم الرو丹ي . الدار البيضاء . الهاتف : 05 22 98 88 54
N°PE: 0911140374



AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé Amoxicilline/Acide clavulanique

Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à votre enfant). Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous présentez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. OÙ EST-CE QU'AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?
3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER AUGMENTIN ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. OÙ EST-CE QU'AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter de très efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

Indications thérapeutiques

AUGMENTIN est utilisé pour traiter les infections dues aux germes sensibles et/ou après un traitement par ce même médicament administré par voie injectable, notamment dans certaines situations où les espèces bactériennes responsables de l'infection peuvent être multiples et/ou résistantes aux antibiotiques actuellement disponibles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose :
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre(s), contactez-le avant de prendre ce médicament.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé : sans objet.

Ne prenez jamais AUGMENTIN :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans AUGMENTIN (dont la liste est fournie à la rubrique 6).
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

→ Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Faites attention avec AUGMENTIN :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent de AUGMENTIN ou un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous prenez AUGMENTIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière (ier) que vous prenez AUGMENTIN. En effet, AUGMENTIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin ou à

PPV : 168,20 DH
LOT : 611232
PER : 11/20



tonnance, et aussi les produits

AUGMENTIN, le risque de réaction

cutanée allergique est plus élevé.

Si vous prenez du probénécide (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'ajuster votre dose de AUGMENTIN.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises. AUGMENTIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales). AUGMENTIN peut influer sur l'action du mycophénolate mofétil (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou s'il est possible que vous le soyez, ou si vous allaitez, vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un quelconque médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

AUGMENTIN peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

Informations importantes concernant certains composants de AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose :

- AUGMENTIN contient de l'Aspartam (E951), qui est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive chez les enfants nés avec une maladie appelée « phénylketonurie ».
- AUGMENTIN contient de la mattoedoxine (glucose). Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre(s), contactez-le avant de prendre ce médicament.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé : sans objet.

3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN ?

Instructions pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Adultes et enfants de 40 kg et plus

- Dose habituelle : 1 sachet 1g/125 mg ou 2 comprimés 500 mg/62,5 mg trois fois par jour
- Dose inférieure : 1 sachet 1g/125 mg ou 2 comprimés 500 mg/62,5 mg deux fois par jour

Enfants pesant moins de 40 kg

Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent de préférence être traités avec AUGMENTIN en suspension buvable ou en sachet 500 mg/62,5 mg.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous devez donner des comprimés de AUGMENTIN à des enfants pesant moins de 40 kg.

Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

- En cas de problèmes rénaux, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- En cas de problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de votre foie.

Comment prendre AUGMENTIN ?

- AUGMENTIN 1g/125 mg sachets : Juste avant la prise de AUGMENTIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un demi-verre d'eau.

Avez le mélange au début d'un repas ou un peu avant.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg adulte comprimé : Avez les comprimés entiers avec un verre d'eau au début d'un repas ou un peu avant.

• Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées de au moins 4 heures. Ne prenez pas 2 doses en 1 heure.

• Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

• Ne prenez pas AUGMENTIN pendant plus de 2 semaines. Si vos symptômes persistent, consultez de nouveau un médecin.

Si vous avez pris plus de AUGMENTIN que vous n'auriez dû :

La prise d'une quantité excessive de AUGMENTIN peut entraîner des maux de ventre (nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en à votre médecin le plus tôt possible. Montez la boîte de médicament à un médecin.

Si vous oubliez de prendre AUGMENTIN :

Si vous avez oublié une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Attendez ensuite environ 4 heures avant de prendre la dose suivante.

Si vous arrêtez de prendre AUGMENTIN :

Vous devez continuer de prendre AUGMENTIN jusqu'à la fin du traitement, même si vous vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines bactéries devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.



PHYSIOMER®

Όλα τα οφέλη της θάλασσας για καλύτερη αναπνοή.

All the goodness of the sea to breathe better.

Toute la richesse de l'eau de mer pour mieux respirer.

To PHYSIOMER είναι μια πλήρης σειρά φυσικών προϊόντων ρινικής φροντίδας που αποσυμφρόρησης του θαλασσινού νερού του Saint-Malo και ανακουφίζει από τους ρινικούς κόλπους.

Τα προϊόντα PHYSIOMER δεν περιέχουν συντηρητικά και δεν επηρεάζουν τη σωστή

Υγειενή - Ενέργη πρόληψη <ul style="list-style-type: none"> Καθημερινή χρήση Ως συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία του κρυολογήματος 	Βρέφη Από τη γέννηση	<ul style="list-style-type: none"> Unidoseς⁽¹⁾⁽³⁾ Baby⁽¹⁾⁽⁵⁾ 	Αποστειρωμένο ισότονο διάλυμα θαλασσινού νερού	<p>Ημίσειρα εσπιτομικευμένη για βρέφη, για την καθημερινή υγειείνη και την αντιμετώπιση κρυολογήματος.</p>
	Ενήλικες Παιδιά	<ul style="list-style-type: none"> Kids⁽¹⁾⁽⁵⁾ (από 2 ετών +) Jet normal⁽¹⁾⁽⁵⁾ (από 6 ετών +) Jet fort⁽¹⁾⁽⁵⁾ (από 10 ετών +) 		<p>Μια πλήρης σειρά προϊόντων με διαφορετικές εντάσεις ψεκασμού, ανάλογα με την ηλικία και το είδος των εκκρίσεων:</p> <ul style="list-style-type: none"> Υδαρείς εκκρίσεις: Kids, Jet normal Παχύρρευστες εκκρίσεις: Jet fort
Αποσυμφορητικό <ul style="list-style-type: none"> Κρυολογήματα Ρινίτιδα 	Βρέφη	<ul style="list-style-type: none"> Nasal Aspirator⁽²⁾ (από τη γέννηση) Baby Hypertonic⁽¹⁾⁽⁴⁾ (από 1 μηνός +) 	Αποστειρωμένο υπέρτονο διάλυμα θαλασσινού νερού (με συγκέντρωση ανόργανων αλάτων 22g/l)	<p>Δύο συμπληρωματικά προϊόντα για την ανακούφιση των βρεφών από τη ρινική συμφόρηση και την απομάκρυνση των ρινικών εκκρίσεων.</p>
	Ενήλικες Παιδιά	<ul style="list-style-type: none"> Υπέρτονο⁽¹⁾⁽⁵⁾ (από 2 ετών +) Ευκάλυπτος⁽⁶⁾ (από 6 ετών +) 	Υπέρτονο διάλυμα θαλασσινού νερού (με συγκέντρωση ανόργανων αλάτων 22g/l), <i>Eucalyptus globulus</i> , φυσικό εκχύλισμα άγριας μέντας	<p>Αποσυμφορεί τη μύτη. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες άνω των 2 ετών.</p> <p>Αποσυμφορεί σε 3 λεπτά και καθαρίζει τη μύτη. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλεργίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του, κατά τη διάρκεια της κύησης, ή του θηλασμού και σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.</p>

PHYSIOMER is a complete range of natural 100% seawater nasal care products that preserve the natural decongestant benefits of Saint-Malo seawater and efficiently relieve nasal and sinus symptoms.

Preservative free, PHYSIOMER products do not impair the functioning of nasal mucosa.



laboratoire
de la Mer

الغوان
استاد اد شيك ستار، للتجهيز الدليل

BOTTU SA
PPC | 119DH00

ηαπτρούν τις φυσικές ιδιότητες
πτώματα και τα συμπτώματα

BRONCHATHIOL

Carbocisteïne 5%



FLUIDIFIANT des voies respiratoires ADULTE

Solution Buvable

Veuillez lire attentivement cette notice. Si vous avez toute autre question, veuillez la poser à votre pharmacien ou à votre médecin.

FORMULE

Carbocisteïne

Excipients :

Saccharinate de sodium, rouge cochenille A,

parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle,

glycérol, excipient aromatisé hypocalorique, hypoglucidique

q.s.p.....

Facon de 150 ml.

EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE :

Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de Propyle, sodium, rouge cochenille A.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

MUCOLYTIQUE

(R: Système respiratoire)

Ce médicament en modifiant les sécrétions bronchiques, facilite leur évacuation par la toux.

INDICATIONS :

Ce médicament est préconisé chez l'adulte (plus de 15 ans) en cas d'affections respiratoires récentes avec difficulté d'expectoration (difficultés à rejeter en crachant les sécrétions bronchiques).

POSÉLOGIE USUELLE : voie orale.

1 cuillère à soupe 3 fois par jour.

Pour les enfants de moins de 15 ans : utiliser BRONCHATHIOL® Enfant.

- A prendre de préférence en dehors des repas.

- La durée de traitement doit être brève et ne pas excéder 5 jours.

CONTRE-INDICATIONS

La forme adulte est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 15 ans.

EFFETS INDESIRABLES

A fortes doses, on peut parfois constater nausées, diarrhées.

Mises en garde spéciales et Précautions d'emploi

Faites attention avec BRONCHATHIOL®.

Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'adulte (p.

À prendre de préférence en dehors des

La durée de traitement doit être brève et

Les toux productives, qui représentent

broncho-pulmonaire, sont à respecter.

L'association de mucocommodificateurs br

asséchant les sécrétions (atropiniques).

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de propyle (E214)

(éventuellement retardées).

Ce médicament contient un agent azoïque le rouge cochenille A (E124) et peut provoquer

des réactions allergiques.

Précautions d'emploi

La prudence est recommandée chez les sujets atteints d'ulcères gastroduodénaux.

PRÉNEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez,

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien

- Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

- Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

- Il est possible d'allaiter votre enfant en cas de traitement par ce médicament.

- Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de BRONCHATHIOL® EXPECTORANT ADULTES, solution buvable que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage accidentel, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MEDECIN

- COMMENT CONSERVER BRONCHATHIOL® EXPECTORANT ADULTES, solution buvable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

- Date de péremption

Ne pas utiliser BRONCHATHIOL® EXPECTORANT ADULTES, solution buvable après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

- Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Fabriqué par bottu s.a.

Sous licence HEPATOUM

82, Allée des Casuarinas - Ain Séba - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

docteur Zoubida MOUTAMMIL
SPECIALISTE EN PNEUMO-PHTISIOLOGIE
Maladies Respiratoires - Tuberculose
Asthme - Allergie Respiratoires

الدكتورة متميل زبيدة
اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسى
أمراض الرئة - السل - الضيق
أمراض الحساسية
حاملة شهادة في طب الشغل
كلية الطب ببرانس

DIPLÔMEE EN MEDECINE DU TRAVAIL
Faculté de Médecine de RENNES

Casablanca, le ٩/١٢/٢٠١٩ الدار البيضاء، في

Mr Baudoukroune Mohamed

7280
- Vaxigrip touché 2019-2020
en inj S/C .
ggos

7500
- Odele 20 (b de 28)

A gélule 1/2 le soir au couche
Narcan

3900 2 pulv/marin le matin

- Doxicot 1/2 à sucer

28580 A cpr à sucer 3 fois/j

Docteur MOUTAMMIL
Spécialiste des Maladies Respiratoires
Centre Commercial Nadia Imm. 4
Bd Brahim Roudani Casablanca
Tél. : 0522 98 88 54
INPE: 09114537

05 22 98 88 54 شارع ابراهيم الروదاني . الدار البيضاء . الهاتف :
Centre Commercial Nadia - Imm. 4 - Appt. N° 1 - Bd Brahim Roudani - Casablanca - Tél. : 05 22 98 88 54

que contient cette notice :

- Ce vaccin vous a été prescrit à vous ou à votre parent. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
 - Si vous ou votre enfant ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cet supplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

6 118001 080748
P.P.V : 72,80 DH
0,5 ml
Ain seba3 Casablanca
Route de Rabat-R.P.1.
Sanof-Aventis Maroc

Suches 2019/2020

314 751274

OEDES® 20 mg

Microgranules gastro-résistants en gélules

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir des questions.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez des symptômes d'alerte, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé, même si vous l'avez acheté chez un autre, même en cas de symptômes identiques à ceux pour lesquels il a été prescrit.
- Si l'un des effets indésirables devient grave et non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

LOT 181763
EXP 08/2021
PPV 99.00 DH

DENOMINATION DU MEDICAMENT :

OEDES® 20 mg

COMPOSITION :

Chaque gélule contient 20mg de substance active : oméprazole.

Excipients : qsp 1 gélule.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS :

Microgranules gastro-résistants en gélules. Disponibles en boîtes de 7, 14, 28 et 56 gélules.

CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE :

Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule contient une substance appelée oméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications :

Adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcèreuse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Oesophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-oesophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodenal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

Enfant à partir de 1 an :

- Oesophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Contre-indications :

Ne prenez jamais Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule:

- En cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NAZAIR® 50µg /dose

Suspension pour pulvérisation nasale

Propionate de fluticasone

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

Dénomination

NAZAIR® 50µg/dose, suspension pour pulvérisation nasale.

Forme pharmaceutique et présentations

Suspension pour pulvérisation nasale, boîte de 1 flacon pulvérisateur avec pompe dosseuse assurant 100 doses de 50 µg.

Composition

Propionate de fluticasone (DCI) 50,30 µg

Equivalent en fluticasone 50 µg

Excipients : Dextrose anhydre, cellulose microcristalline et carboxyméthylcellulose sodium, chlorure de benzalkonium, polysorbate 80, alcool phénylethylique, eau purifiée, q.s.p une pulvérisation.

Classe pharmaco-thérapeutique

Glucocorticoïde par voie locale.

2. DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Indications :

Ce médicament contient un corticoïde. Il s'administre par voie nasale.

C'est un médicament anti-inflammatoire indiqué:

- en traitement de la rhinite allergique chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans et uniquement en traitement de la rhinite allergique saisonnière (rhume des foins) chez l'enfant de 4 à 12 ans.
- pour soulager les symptômes liés à la présence de polypes dans les fosses nasales chez l'adulte.

3. DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Contre indications :

Ne prenez jamais NAZAIR® 50µg/dose, suspension pour pulvérisation nasale dans les cas suivants:

- allergie à l'un des composants,
- trouble de la coagulation sanguine avec en particulier saignements de nez,
- en cas d'infection herpétique nasale, buccale, orale ou oculaire.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec NAZAIR® 50µg/dose, suspension pour pulvérisation nasale.

Mises en garde spéciales :

En cas de surinfection (mouchage purulent), de fièvre ou d'infection broncho-pulmonaire concomitante, prévenir votre médecin.

Ce produit n'est pas recommandé chez les patients ayant subi récemment une intervention chirurgicale ou un traumatisme au niveau du nez, tant que la guérison n'est pas complète.

Précautions d'emploi :

Ce médicament est un traitement régulier et continu. Son efficacité sur les symptômes ne peut apparaître que plusieurs jours après le début du traitement.

Pour que ce médicament soit actif, les fosses nasales doivent être libres.

Il convient par conséquent de se moucher avant l'instillation du produit.

Si l'obstruction nasale (sensation de nez bouché) persiste malgré la mise en route du traitement, consultez votre médecin afin qu'il réévalue le traitement.

En cas de traitement prolongé, un examen détaillé de la muqueuse nasale doit être réalisé.

Excipients à effet notoire : En raison de la présence du chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une gêne respiratoire.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sportifs

Attention cette spécialité contient un principe actif interdit aux sportifs.

Le principe actif est le fluticasone propionate.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétition.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétion.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétion.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétion.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétion.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétion.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétion.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétion.

Il est interdit de l'utiliser dans les sports de compétion.



Sirop
Voie orale

DociVox

Sirop naturel sans conservateur

Deva
Pharmaceutique

FORMES ET PRESENTATIONS

DociVox sirop - Flacon 200 ml - Flacon 125 ml

PROPRIETES :

DociVox sirop naturel est à base d'extraits de plantes (le Thym, la Mauve d'eucalyptus, du miel et de la propolis). DociVox sirop naturel apaise les voies respiroatoires en cas de toux et renforce les défenses naturelles de l'organisme. DociVox sirop naturel est sans conservateur.

UTILISATIONS :

- Voies respiratoires encombrées - Gorge irritée - Toux - Enrouement.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Adulte : une cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour.

Enfant : une cuillère à café 2 à 4 fois par jour.

Dans tous les cas, se conformer à la prescription de votre médecin ou pharmacien.

DociVox sirop naturel est administré par voie orale.

Bien agiter le flacon avant chaque emploi.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche ou à l'un des constituants
- Déconseillé chez la femme enceinte, allaitante et nourrisson.
- Le produit peut présenter un léger dépôt, des changements de couleur ou de goût qui sont attribuables aux caractères naturels des plantes; toutefois la qualité et l'efficacité du produit ne sont pas altérées.
- Après ouverture, à conserver au frais et à consommer dans un délai de 4 semaines.
- Tenir hors de la portée des enfants.

COMPOSITION :

Sirop de fructose; Arôme naturel de miel; Maltodextrine; Eau purifiée; Extrait de Propolis; Extrait aqueux de plantes obtenu à partir de feuille de Thym (*Thymus vulgaris*); Feuille de Mauve (*Malva sylvestris*); Extrait de Mélèze; Huile essentielle d'eucalyptus; Extrait de rocou; Caramel; Menthol; Acide citrique.
Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Autorisation du Ministère de la Santé n° : DA 20171612029DMP/20UCAv1

مخترفات ديفا للصيدلة
ج. واجدي صيدلي مسؤول

Deva
Pharmaceutique

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J.OUAJDI Pharmacien Responsable