

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Prothésiste :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

ND. 03263

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 7700 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : SAOUD ARDEL KHALEK

Date de naissance : 16-08-1954

Adresse : 18 KOREA Rue 22 N° 43. 20520 Casablanca

Tél. : 0668380583 Total des frais engagés : 1029,40 - Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Dr JBIHA  
INPE:091080671



Date de consultation : 01/03/2015


Nom et prénom du malade : SAOUD ARDEL KHALEK Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Comptant  Enfant

Nature de la maladie : 11.1

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : 09 MARS 2010

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) : 02/03/2010

Le : 02/03/2010

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

## EXECUTION DES ORDONNANCES

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	02/03/2023		872,40

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Professionnel	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
<b>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</b>		<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b> $  \begin{array}{r l}  H & 25533412 \quad 21433552 \\  \hline  D & 00000000 \quad 00000000 \\  & 00000000 \quad 00000000 \\  B & 35533411 \quad 11433553  \end{array}  $		
		<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. JBIHA  
INPE:091080671



F0  
52

valable 3 mois

Le 21.05.2020

F0  
52

## DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné :


Certifie que Mlle, Mme, M. :

Présente

Nécessitant un traitement d'une durée de :

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit)



site : [www.mupras.com](http://www.mupras.com) // mail : [redamation@mupras.com](mailto:redamation@mupras.com) // phone : 0522-22-78-14 / 0522-22-78-15 / fax : 0522-22-78-18  
Adresse : 6ème étage, Angle Rue Alal BENABDELLAH et Rue Fakir Mohammed (ex Rue Heintz) - Casablanca

Dr. JBIHA  
INPE:091080671







# ASPÉGIC® NOURRISSONS 100mg

*Acétylsalicylate de DL-Lysine*

poudre pour solution buvable en sachet-dose

**SANOFI**

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

- a/ **Dénomination :** ASPÉGIC NOURRISSONS, 100 mg.  
 b/ **Composition :** Acétylsalicylate de DL-Lysine ... 180,00 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique ... 100 mg)  
 Exipients : glycine, arôme mandarine (contenant du lactose, jus d'orange, huile essence de mandarine), glycyrrhizate d'ammonium, pour un sachet-dose de 204,6 mg.

## c/ Forme pharmaceutique et présentation :

Poudre pour solution buvable en sachet-dose, boîte de 20.

## d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIE ET ANTIPIRÉTIQUES

## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

**Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## a/ Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

reins, • maladie grave du dosages supérieures à 20 mg fortes doses, notamment rhumatismales (50 à 100 jusqu'à 60 mg/kg par jour et lorsque l'aspirine est uti- traitements des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal (Cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

**EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**b) Mises en garde spéciales :** • Ce médicament contient du lactose. Sa utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine prévenez immédiatement un médecin.

- \* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismales, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyses (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par ; • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, • des

LOT : 19E005  
PER : 06/2021

ASPEGIC 100MG  
SACHETS B20

P.P.V : 21DH80

6 118000 061113



# ASPÉGIC® NOURRISSONS 100mg

*Acétylsalicylate de DL-Lysine*

poudre pour solution buvable en sachet-dose

**SANOFI**

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

- a/ **Dénomination :** ASPÉGIC NOURRISSONS, 100 mg.  
 b/ **Composition :** Acétylsalicylate de DL-Lysine ... 180,00 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique ... 100 mg)  
 Exipients : glycine, arôme mandarine (contenant du lactose, jus d'orange, huile essence de mandarine), glycyrrhizate d'ammonium, pour un sachet-dose de 204,6 mg.

## c/ Forme pharmaceutique et présentation :

Poudre pour solution buvable en sachet-dose, boîte de 20.

## d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIE ET ANTIPIRÉTIQUES

## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

**Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## a/ Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

reins, • maladie grave du dosages supérieures à 20 mg fortes doses, notamment rhumatismales (50 à 100 jusqu'à 60 mg/kg par jour et lorsque l'aspirine est utilisée pour le traitement des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal (Cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

**EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

b) **Mises en garde spéciales :** • Ce médicament contient du lactose. Sa utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenir immédiatement un médecin.

- \* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismales, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyses (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par : • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, • des

LOT : 19E005  
PER : 06/2021

ASPEGIC 100MG  
SACHETS B20

P.P.V : 21DH80

  
6 118000 061113



# ASPÉGIC® NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

- a/ Dénomination : ASPÉGIC NOURRISSONS, 100 mg.  
 b/ Composition : Acétylsalicylate de DL-Lysine ... 180,00 mg  
 (quantité correspondante en acide acétylsalicylique ... 100 mg)  
 Excipients : glycine, arôme mandarine (contenant du lactose, jus d'orange, huile essence de mandarine), glycyrrhizate d'ammonium, pour un sachet-dose de 204,6 mg.

## c/ Forme pharmaceutique et présentation :

Poudre pour solution buvable en sachet-dose, boîte de 20.

## d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIE ET ANTIPIRÉTIQUES

## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

**Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

reins, • maladie grave du dosages supérieurs à 20 mg fortes doses, notamment rhumatismales (50 à 100 jusqu'à 60 mg/kg par jour et lorsque l'aspirine est utilisée pour le traitement des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal (Cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

**EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

b) Mises en garde spéciales : • Ce médicament contient du lactose. Sa utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenir immédiatement un médecin.

\* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismales, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyses (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par : • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, • des

LOT : 19E005  
PER : 06/2021

ASPEGIC 100MG  
SACHETS B20

P.P.V : 21DH80

  
6 118000 061113

کوفیرام® 5 ملغ / 10 ملغ  
براند و سریل ارجمند / امدادی

كوفيرام® 10 ملغ/10 ملغ  
بيراندوبريل أرجينين / أملاوديبين

هذه النشرة تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- أقر بأن بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئصال إليها من جديد.

• إذا كان لديك أسللة أخرى إسال الطبيب أو الصيدلاني.

• إذا لقد صuf هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاء لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق بهضر.

• إذا لقد صuf بأثر جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المثلث بها في هذه النشرة.

• إذا لقد صuf مقطع 4: «ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟»

• أنت الى لقد صuf بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئصال إليها من جديد.

三

جب أن تخبرني طبيبك إذا كنت تعانين بأثأك حامل (وقد تصبحين) حاملاً.  
إذا سُوفَ ينصح طبيبك بالوقف عن أخذ كوفيرم حبة قبل حمل العمل أو مجرد وقوفه حيث  
يُنصح بذلك كل دواء آخر يدخل به.  
يُنصح باخذ كوفيرم حبة في بداية العمل، كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وخيمة للجهاز عند  
استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

لارفع  
لقد ثبت أن الالملوديين يهربون في حليب الأم بكميات ضئيلة .  
علمليك إن كنت ترضعين أو على وشك الإضاء .

لا يوصى بإعطاء كوفيرينج حية للأمهات المرضعات، ويمكن لطبيبك أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت تفضلين الإرضاخ خاصة إذا كان مطلبك حدث الولادة أو سابق لولادتك.

الى تنفيسي السيارات والعاملين على الآليات :  
فقط كفراهم حية على قدرتك على قيادة الحياة أو تشنع الآليات : اذا كانت الاقواط .

قد يدور سيريرك على سرير سيارة أو سرير ادبيات. إذا كانت الظروف سبب ذلك الشعور بالدوخة أو القصف أو التعب، أو تسبب لك الصداع، فيجب أن تتجنبقيادة أو تشغيل مركبة على الفور.

الآلات واد تصل بطيئاً إلى حركة  
جذري كوفرام حية ، على سكر الحليب  
الآن ، على إعلانات بذلك ، كـ ذات الماء

إذا كان طبيبك قد سبق وأعدهك بذمك حمل بعض أنواع السكر، فاتصل بالطبيب قبل المعاشرة بتناول هذا الماء.

269,00

مُنْتَهَى

٦٣

10

في هذه النسخة، وفي أيّة حالة يستعمل؟

١. ما هو موسوعة المعلومات؟
  ٢. ما هي مصادر المعلومات؟
  ٣. كيف يوحد موسوعة المعلومات؟
  ٤. ما هي الآليات المطبقة في إعداد موسوعة؟
  ٥. كيف يتحقق تدوين موسوعة؟
  ٦. محتوى الموسوعة ومعلومات إضافية.

٧. وفي أي حالة يستعمل؟

١. ما هو كوفيرام ، مثبط للخميرة المغولية للأنيبيوتين (IBC) وحااصر للكلسيوم .

كود ATC: C09BB04  
الفعة العلاجية: جنة لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني وألولعلاج الأمراض الإكليلية الثابتة (في حال  
ارتفاع ضغط الدم) (في حال ارتفاع ضغط الدم)

يُوصَفُ كَوْفِيرَامُ الْمَدِ الْوَارِدُ لِلْقَلْبِ. يَعْدُمُونَ بِوَاسْطَةِ الْبِيرَانِدُورِيلِ وَالْأَمْلُودِيَّينَ أَنْ يَأْخُذُوا كُلَّا المَادَتَيْنِ فِي

نماذج وأسلوبات الدين .  
في إمكانات المرض .  
كفرام .  
زيز من مادتين فقاقيع : السائد والمؤديين .

کوفیرام® 5 ملغ / 10 ملغ  
براند و سریل ارجمند / امداد دهیان

كوفيرام® 10 ملغ/10 ملغ  
بيراندوبريل أرجينين / أمليوديبين

٤- تأخذ هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- **أقر بالعمر** بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئصال إليها من جديد.

• **إنه ينفع** كان لديك أسلمة أخرى إسال الطبيب أو الصيدلاني.

• **إذا فوجئت** إذا صاح هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاء لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق بهضر.

• **لقد شعر** يأدي أثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المطلبي بها في هذه النشرة.

• **إذا شعر** **مقطع 4: ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟**

• **أنظر إلى**

三

جب أن تخبرني طبيبك إذا كنت تعانين بأثأك حامل (وقد تصبحين) حاملاً.  
إذا سُوفَ ينصح طبيبك بالوقف عن أخذ كوفيرم حبة قبل حمل العمل أو مجرد وقوفه حيث  
يُنصح بذلك كل دواء آخر يدخل به.  
يُنصح باخذ كوفيرم حبة في بداية العمل، كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وخيمة للجهاز عند  
استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

لارفع  
لقد ثبت أن الالملوديين يهربون في حليب الأم بكميات ضئيلة .  
علمليك إن كنت ترضعين أو على وشك الإضاء .

لا يوصى بإعطاء كوفيرينج حية للأمهات المرضعات، ويمكن لطبيبك أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت تفضلين الإرضاخ خاصة إذا كان مطلبك حدث الولادة أو سابق لولادتك.

الى تنفيسي السيارات والعاملين على الآليات :  
فقط كفراهم حية على قدرتك على قيادة الحياة أو تشنها الآليات : اذا كانت الاقواط .

قد يدور سيريرك على سرير سيارة أو سرير ادبيات. إذا كانت الظروف سبب ذلك الشعور بالدوخة أو القصف أو التعب، أو تسبب لك الصداع، فيجب أن تتجنبقيادة أو تشغيل مركبة على الفور.

الآلات واد نصل بطيئاً في حوارٍ  
بحفي كوفرام حية ، على سكر الحليب

إذا كان طبيبك قد سبق وأعدهك بذمك حمل بعض أنواع السكر، فاتصل بالطبيب قبل المعاشرة بتناول هذا الماء.

~~269,00~~

٦٧

٦٣

في هذه النشرة وفي أيّة حالة يستعمل؟  
أ. كفران ، التي ينبغي معرفتها قبلأخذ كوفيرام ، حية؟

١. محتوى المجموعات ، حصة ٢
  ٢. ما هي المجموعات ، حصة ٢
  ٣. كيف يتحقق تكامل المجموعة؟
  ٤. ما هي الآثار الجاذبية ، حصة ٢
  ٥. كيف يتحقق تكامل المجموعة؟
  ٦. محتوى المجموعات ومعلومات إضافية .

١. ما هو كوفير ام \* ملائمة: متيط للخميره المركبة للأحياء تسين (IBC) وحاصر للكليوم .

كـ: ATC: C09BB04: **الغثة العلاجية المسرع** لـ **العلاجارتفاع القسط الشرياني و/أو علاج الأمراض الإكليلية الثانية** (في حال

يُوسف كوفيرام، حيث الوارد للقلب).  
يُستخدمون بواسطة البراندوبيريل والأملوديبين أن يأخذوا كلا المادتين في

تقاضن أو انتقام الدين في إمكان المرضي في قبرام، حيث مزيج من مادتين فعاليتين: السيرانديبوريل والأملوديبين.

