

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



ND: 23250

Déclaration de Maladie : N° P19- 0023481

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 0910 Société :

Actif

Pensionné[e]

Autre :

Nom & Prénom : LAYACHI Abdellah Date de naissance : 1945

Adresse : 66 Rue 2 espoirance 2 Ain Seba

Tél. : 0522 64 49 38 Total des frais engagés : 357, 80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 17/01/2020

Nom et prénom du malade : BENNANI LATIFA Age : 01/01/1942

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent[e] :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/01/2020			150,00	DR. A. BARROU
18				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE HAY KERAM 98 Bis. Av. C. HAY KERAM Q.I. Sidi Bernoussi Casablanca Tél : 05 22 35 93 82 INPE : 092031046	17/01/2020	207,80

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		MONTANTS DES SOINS
	D 00000000 35533411	B 00000000 11433553		
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
DATE DU DEVIS				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Diététique et Nutrition

Diabétologie

Ostéopathie

Traitement de la Douleur

Médecine Générale

Echographie
ECG

التخسيس والحمية الغذائية

داء السكري

طب الإعتلال العظمي

معالجة الألم

الطب العام

الفحص بالصدى

تحفظ الطلاق

تاریخ الفحص
لا يتغير

Casablanca, le...

17/01/2020

Ben namâ latifa.

126,30 ①

Augmentin 19

SV

1 Sachet x 2/j Pd.06j

48,50 ②

Cotipred 20 mg

SV

2 gsp/j le matin Pd of j

33,00 ③

Spectrum 300 mg 3 outtes

SV

Agoutte x 2/j Pd 08j

T = 207,80

~~Dr. Amal BARROU~~
Ostéopathie - Diététologie - Médecine Générale - Diabéto

Lot. Halioua, N° 100, RDC 2, Casablanca - Tél: 05 22 35 52 33

PHARMACIE HAY KARAM

98 Bis, Av. C Hay Karam

Q.t. Sidi Bernoussi - Casa

Tél : 05 22 35 93 82

INPE : 092031046

تجزئة حلية رقم 100 الطابق السادس عين السبع - الدار البيضاء - المغرب : 05 22 35 52 33

Lot Halioua N° 100 RDC 2, Casablanca Tél: 05 22 35 52 33

E-mail : amal.barrou@gmail.com



SPECTRUM® 0,3%

Solution pour instillation auriculaire

Lisez attentivement. Elle contient de la maladie. Si vous avez d'informations, gardez cette

1e
LOT: A090415
PER: 06-2022
PPV: 33,00DH

rant de prendre ce médicament, votre traitement et votre santé. Si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à votre pharmacien. Veuillez lire attentivement la notice.

1- DENOMINATION

SPECTRUM 0,3%

2- COMPOSITION

Ciprofloxacine (sous forme de tartrate)

Excipients : Chlorure de benzalkonium 0,03 %, Chlorure de sodium, Solution de chlorure de benzalkonium à 10 %, Acide chlorhydrique, Eau pour préparations injectables

3- FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS :

Solution pour instillation auriculaire en flacon de 5 ml

4- DANS QUOI

INDICATIONS

Ce médicament est destiné à l'enfant et l'adolescent.

5- DANS QUOI

CONTRE-INDICATIONS

Il n'est pas recommandé

si vous avez une

des quinolones

si vous avez une

EN CAS

MEDECIN

CONSEIL

6- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER

SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire:

Faites attention avec SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire:

Mises en garde spéciales

Ne pas injecter, ne pas avaler.

Si vous avez avalé SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire d'une

manière accidentelle, contactez votre médecin.

Néanmoins, aucune complication

sérieuse n'est attendue.

Des réactions allergiques à type d'urticaire, démangeaisons, fourmillements, et des

chocs d'origine allergique généralisés (brusque gonflement du visage et du cou,

gêne respiratoire, chute de la tension artérielle) pouvant mettre en jeu la vie, ont été

observés, parfois dès la première prise, chez des patients traités par des

médicaments de la famille des quinolones administrés par voie orale ou par

injection.

Si vous remarquez les premiers signes d'une éruption cutanée ou de toute autre

réaction d'hypersensibilité, y compris une urticaire, des démangeaisons ou des

problèmes respiratoires, arrêtez le traitement et contactez immédiatement votre

médecin. Si vous avez une réaction allergique grave, alors vous avez besoin d'un

traitement en urgence.

Si vos symptômes s'aggravent ou reviennent soudainement, consultez votre

médecin. Vous pouvez devenir plus sensibles à d'autres infections avec l'utilisation

de ce médicament, surtout après une utilisation prolongée.

Si vous êtes âgé ou si vous prenez des médicaments appelés corticostéroïdes

utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation, l'asthme ou les problèmes

dermatologiques, vous avez un risque plus élevé d'avoir des problèmes de tendon

pendant le traitement par SPECTRUM 0,3 %, solution pour instillation auriculaire.

Si vous rencontrez une inflammation ou un état inflammatoire, arrêtez le traitement

et consultez immédiatement votre médecin. Si vous ressentez une douleur, un

gonflement ou une inflammation des tendons, pendant ou peu de temps après la

prise de ce médicament, arrêtez le traitement et contactez votre médecin.

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut

provoquer des réactions cutanées. Un suivi médical méticuleux est nécessaire.

N'utilisez SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire chez les enfants de

moins d'un an que s'il est explicitement prescrit par votre médecin.

Au moment de l'emploi, évitez la mise en contact de l'embout avec l'oreille ou les

doigts afin de limiter les risques de contamination. Si au bout de 10 jours les symptômes persistent, consultez votre médecin. EN CAS DE DOUZE, IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER LE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. Interactions avec d'autres médicaments. Prise ou utilisation d'autres médicaments. Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez récemment un autre médicament, même sans ordonnance.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement. Grossesse et Allaitement. Ne pas utiliser SPECTRUM 0,3 %, solution pour instillation auriculaire pendant la grossesse ou l'allaitement, sauf si votre médecin ou votre pharmacien vous conseille à votre médecin ou à votre pharmacien.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

L'utilisation de SPECTRUM 0,3 %, solution pour instillation auriculaire n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Liste des excipients à effet notoire:

Chlorure de benzalkonium.

7- EFFETS NON SOUHAITES OU GÉNÉRALISÉS

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, SPECTRUM 0,3 %, solution pour instillation auriculaire est susceptible d'avoir des effets indésirables.

La fréquence des effets indésirables peut varier en fonction de la dose et de la manière de prendre le médicament.

Fréquence indéterminée (peut survenir à tout moment):

Très fréquents (survient chez plus de 1 personne sur 10).

Fréquents (survient chez 1 à 10 personnes sur 100).

Peu fréquents (survient chez 1 à 10 personnes sur 1 000).

Rares (survient chez 1 à 10 personnes sur 10 000).

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée).

Fréquents :

maux de tête, douleurs auriculaires, congestion nasale.

· dermatite, rash, éruption cutanée.

· pyrexie, fièvre.

Fréquence indéterminée :

· acouphènes, bruit dans l'oreille.

Chez l'enfant

Dans les études cliniques, aucune réaction indésirable n'a été rapportée chez les enfants âgés de 1 à 12 ans.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout autre médicament que vous avez mentionné dans cette notice.

8- COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

Cette solution pour instillation auriculaire est destinée à l'usage externe.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de l'âge de 1 an.

À titre indicatif, la posologie usuelle est la suivante :

Adultes: 4 gouttes dans l'oreille atteinte, 2 fois par jour.

Enfants: 3 gouttes dans l'oreille atteinte, 2 fois par jour.

En cas d'utilisation de mèche dans l'oreille, adapter la posologie.

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Voie d'administration

Voie locale. Instillation auriculaire.

Mode d'administration

Tièdir le flacon au moment de l'emploi en le tenant par la paume de la main, afin d'éviter le contact de la main avec l'embout.

Pour mettre les gouttes dans une oreille et éviter la réaction de l'autre oreille :

· il faut d'abord pencher la tête du côté opposé à l'oreille atteinte.

· Mettre les gouttes dans l'oreille atteinte.

· Tirer à différentes reprises sur le pavillon de l'oreille.

· Répéter l'opération pour l'autre oreille.

· Si l'embout est bouché, le nettoyer avec de l'eau tiède et le sécher.

· Ne pas utiliser si l'embout est cassé ou déformé.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

· Ne pas utiliser si l'embout est décoloré ou si la solution est décolorée.

Cotipred® 20 ma

Cotipred® 20 mg
prednisolone
20 comprimés effervescents sécables

31x31x30

..... 20 mg
..... 1 comprimé
..... (pamplemousse)

l'acide ibuprofène mais aussi ou il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

CONTRE-INDICATIONS :

CE MÉDICAMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpes, mentaux non traités, - vaccination par des vaccins vivants,

PPV:48DH50

PIR:07-22

LDT: J1738

NE JAMAIS PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre
s médicaments pouvant donner certains troubles du rythme
hanteuses et autres interactions)

PENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU

MISE

bottu a.s.
82, Allée des Casuarinas - Ain Seba - Casablanca
5.Bachouchi - Pharmacien Responsable

Ge m

stricte surveillance médicale

AVANT LE TRAITEMENT

Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladie du côlon, d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment antécédents de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison de maladies parasitaires.

PENDANT LE TRAITEMENT :

EVITER LE TRAITEMENT : Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Sous traitement et au cours de l'année suivant l'arrêt du traitement, prévenir le médecin de la prise de corticoïde, en cas d'intervention chirurgicale ou de situation de stress (fièvre, maladie).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Pendant le traitement, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel. Tenir compte de la teneur en sodium (51 mg par comprimé).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN et notamment des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque : astémizole, bépridil, erythromycine en injection intra-veineuse, halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, sulfoxide, vincamine.

GROSSESSE - AU LAITEMENT :

GROSSESSE - ALLAITEMENT :
GROSSESSE : Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

ALLAITEMENT : L'allaitement est à éviter pendant le traitement en raison du passage dans le lait maternel.

AUGMENTIN 1 g/125 mg
12 sachets



6 118000 160175

محتوى الدose:

الاستعمال
من الماء
(ثانية)

أن الأشخاص إلا أن ترتكب غير معروفة.

PIPV : 126,30 DH
LOT : 607863
PIER : 10/20

(نقطة سوداء مرئية تحيط بها منطقة أكثر شعوباً).

الاستعمال
من الماء
(ثانية)

- رثى قليل تنسج (وسرع)،
- التهاب الأمعاء البليطية (الظراء)،
- التهاب القشاء الحادى الذي يحيط بالدماغ (التهاب المخ العقلى)،
- رثى القولون البليطية العادقة،
- مقطع متكرر يصلحه تهدىء وتوسيف الجلد، لا سيما حول الفم والأفاف والعيون وفي المثلثة الثالثة (نثار سيفون جوسون)، وشكل من المقطع أكثر حد يناسب في الفحص جانبي حد (أكثى من 30 بالملة من الماء)،
- مقطع جانبي أحمر متكرر تصاحبته تهدىء صفراء على فتح (التهاب الجلد الفقامي أو التفري).

- مقطع جانبي أحمر تصاحبته تهدىء كل تحت الجلد وتحدات (ثانية تمشي)،
- إذا ظهر عليك أحد هذه الأعراض، فل Closet يطيبيه على الفور.
- تناول الكبد،
- البرافان، الذي ينبع عن ارتفاع معدل البيلوبورين في الدم (ردي مادة تفتحها الكبد)، وتركتي إلى ثلثون أصغر
- البشرة وفي المنطقة المصابة من العين.

- القولون الكلري،
- استطالة مدة تناول الماء،
- فرط النشاط،
- تشنجات (أى الأشخاص الذين يتذمرون جر عات مرتقطة من أو يعانون من أو يعانون من مشكل في الكلى)،
- الصلان الأسود (الشرمار والسنان)،
- نون الأنسان (أى الأطفال)، ويطلق عليهم عرضاً عدداً من الأنسان.

- الاكل البليطية التي يمكن أن تؤثر على إفراط تناول الماء أو الماء،
- الانخفاض مهم في عدد الكريات البيضاء،
- انخفاض عدد الكريات الحمراء (فقر الدم الانحداري)،
- بلورات في البول.

- إذا ظهرت عليك أى جهازية،
- إذا لاحصت بأى أثر جانبى، اقتصرت في الأمر مع طبيبك أو الصيدلى، وينطبق هذا الأمر أيضاً على أي أثر جانبى غير متذكر في هذه النشرة الدوائية.

- العراض ينبع من ملحوظة أو غشانت،
- يقطن بعيداً عن مرأى وشئون الأطفال.

- نوع النهاد الصالحة،
- لا ينفع استخدام أو غشانت بعد تاريخ الصلاحية المتذكر على العبة.

- يقطن بعيداً عن الرطوبة وفي حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
- لا ينفع رمي الأدوية في شنطة المجرى أو مع الفحص المزدوجة. استشر الصيدلى عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستخدمة، فقد تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

- 6. معلومات إضافية

- ما الذي يحتوى عليه أو تحتوى 1 غ 125/125 ملجم التكمير، مسحوق لمعلق قليل الشرب في كيس من فرقة واحدة؟

g/125 mg ADULTES, poudre

30 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé

l'intégralité de cette notice vous

pourriez avoir besoin de la relire, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.

personnellement prescrit (ou a été prescrit par un autre, même en cas de symptômes).

ables devient grave ou si vous présentez des symptômes de la notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN?
3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?
5. COMMENT CONSERVER AUGMENTIN?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Classe pharmacothérapeutique

AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables de nombreuses maladies. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulique, qui sont deux groupes de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent être inactives. L'autre constituant actif (l'acide clavulique) est :

Indications thérapeutiques

AUGMENTIN est utilisé pour traiter les infections dues à des bactéries sensibles. Il est administré par voie injectable ou par voie orale. Il est également utilisé dans les situations où les espèces bactériennes responsables de l'infection sont résistantes aux antibiotiques actuellement disponibles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN?

Le tableau suivant indique les informations nécessaires avant la prise du médicament AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, il est recommandé de ne pas prendre AUGMENTIN.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé : Ne prenez jamais AUGMENTIN ;

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulique ou à l'un des autres composants contenus dans AUGMENTIN (dans la rubrique 6).

• Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement des tissus.

• Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un problème dans le foie lors de la prise d'un antibiotique.

→ Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes dans l'une des situations suivantes. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Faites attention avec AUGMENTIN :

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactéries responsables de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent.

Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des réactions allergiques, des convulsions et d'autres effets indésirables. Lorsque vous prenez AUGMENTIN, vous devez surveiller certains symptômes. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière ».

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges, bilans hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), veillez à informer l'infirmière (ier) que vous prenez AUGMENTIN. En effet, AUGMENTIN peut modifier certains résultats de ces types de tests.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament,

N200814-01