

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ons générales :

cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

la validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

entaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

(23563)

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10323

Société : R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : ELHAFID;Abdelkarim.

Date de naissance : 1/1/63


Adresse : 1182 lot ELHAFID Roud

Tél. : 677822394

Total des frais engagés : 500 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 25/02/20

Nom et prénom du malade : Elhafid Abdelkarim

Age :

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Diabète type 2

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :





Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements apportés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 25/02/20

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

De Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/02/20		G		CHOUAIKI Aïcha Médecin Générale Sahua 01 052 22 20 70

G CHOQUA
Nüdeciyan Selim
Gurahda 052252201
tel. 052252201

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE HAY ESSALAM Qat H- 26 Dr. M. A. EL HADID Dr. M. A. EL HADID Tél: 06 30 05 30 14 INPE 06 26 691 A/H	26/02/15	50000

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES	DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

Dr. Bouaikh AFAF Médecine Générale

107, Lot El Wahda II - 1er Etage
Deroua - Tél.: 05 22 53 20 70

الدكتورة الشويخ عفاف
الطب العام

107، تجزئة الوحدة II، الطابق الأول
الدروة، الهاتف : 05 22 53 20 70

Deroua, le 25-02-20 الدروة، في

Elhafidi Abd elKarim

125⁰⁰ x 4

Co. Amarel

$$1 \text{ cp} = 2 \text{ dy}$$

* 2 rows

CHOUAIKH AFAF
Médecine Générale
Lot. El wahda II N°107 1er étage
Sfaxia. Tel : 0521 53 20 70

PHARMACIE NAYSSALAM
100, rue de la République
SAROGUE, Yaoundé 2012
Tél. 021 20 00 3012

Co-Ama

125,00

Glimépiride / chlorhydrate de Me

Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en intégrer une partie dans un dossier médical.
 - Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

Co-Amarel 2mg/500mg, comprimé pelliculé

- Les substances actives sont le glimépiride et le chlorhydrate de metformine. Un comprimé contient 2 mg de glimépiride et 500 mg de chlorhydrate de metformine.
 - Les autres composants sont : lactose, carboxyméthylamidon, povidone K 30, cellulose micro-cristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol 6000, dioxyde de titane (E 171), cire de carnauba, eau purifiée.

1. QU'EST-CE QUE Co-Amarel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Co-Amarel se présente sous forme de comprimés pelliculés blancs de forme ovale. Boîte de 30 comprimés.

Co-Amarel est un antidiabétique oral.

Il est préconisé dans le traitement du diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline (diabète de type 2), en complément d'un régime alimentaire et d'exercice physique :

- lorsqu'un traitement par monothérapie à base de glimépiride ou de metformine n'est pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique,
 - en remplacement de la bithérapie associant glimépiride et metformine.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER

Co-Amarelli

N'utilisez jamais Co-Amarel dans les cas suivants :

- si vous souffrez de diabète insulino-dépendant (diabète de type 1 nécessitant un traitement par

Co-Amarel® 2 mg/500 mg

30 Comprimés pelliculés



6 118000 061854

l'insuline).

- si vous souffrez d'acidocétose diabétique,
 - si vous êtes hypersensible (allergique) au glimépiride ou au chlorhydrate de métformine, ou à l'un des autres composants de Co-Amarel, aux sulfamides et autres sulfonylurées, aux biguanides,
 - si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant,
 - si vous avez déjà souffert d'acidose lactique,
 - si vous souffrez d'une maladie ou d'un dysfonctionnement des reins,
 - si vous souffrez d'insuffisance cardiaque,
 - si vous avez eu récemment un infarctus du myocarde, un choc,
 - si vous souffrez d'une atteinte hépatique grave,
 - si vous consommez de l'alcool de manière excessive (intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme),
 - si vous souffrez d'une infection sévère, de déshydratation,
 - en cas d'exploration radiologique nécessitant l'utilisation de produits de contraste iodés. Vous devrez arrêter votre traitement Co-Amarel au moment de l'examen et pendant quelques jours après l'examen.
 - si vous ne vous alimentez pas correctement, si vous êtes affaibli ou souffrez d'insuffisance hypophysaire ou surréale

Prendre des précautions particulières avec Co-Amarel :

Veuillez respecter consciencieusement les prescriptions de votre medecin pour ce qui concerne les doses de Co-Amarel, la surveillance (analyse de sang et d'urine), le regime alimentaire et l'activite physique (travail et exercice physique).

MISES EN GARDE

Hypoglycémie

Au cours des premières semaines de traitement, le risque

Co-Ama

125,00

Glimépiride / chlorhydrate de Me

Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en intégrer une partie dans un dossier médical.
 - Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

Co-Amarel 2mg/500mg, comprimé pelliculé

- Les substances actives sont le glimépiride et le chlorhydrate de metformine. Un comprimé contient 2 mg de glimépiride et 500 mg de chlorhydrate de metformine.
 - Les autres composants sont : lactose, carboxyméthylamidon, povidone K 30, cellulose micro-cristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol 6000, dioxyde de titane (E 171), cire de carnauba, eau purifiée.

1. QU'EST-CE QUE Co-Amarel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Co-Amarel se présente sous forme de comprimés pelliculés blancs de forme ovale. Boîte de 30 comprimés.

Co-Amarel est un antidiabétique oral.

Il est préconisé dans le traitement du diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline (diabète de type 2), en complément d'un régime alimentaire et d'exercice physique :

- lorsqu'un traitement par monothérapie à base de glimépiride ou de metformine n'est pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique,
 - en remplacement de la bithérapie associant glimépiride et metformine.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER

Co-Amarelli

N'utilisez jamais Co-Amarel dans les cas suivants :

- si vous souffrez de diabète insulino-dépendant (diabète de type 1 nécessitant un traitement par

Co-Amarel® 2 mg/500 mg

30 Comprimés pelliculés



6 118000 061854

l'insuline).

- si vous souffrez d'acidocétose diabétique,
 - si vous êtes hypersensible (allergique) au glimépiride ou au chlorhydrate de métformine, ou à l'un des autres composants de Co-Amarel, aux sulfamides et autres sulfonylurées, aux biguanides,
 - si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant,
 - si vous avez déjà souffert d'acidose lactique,
 - si vous souffrez d'une maladie ou d'un dysfonctionnement des reins,
 - si vous souffrez d'insuffisance cardiaque,
 - si vous avez eu récemment un infarctus du myocarde, un choc,
 - si vous souffrez d'une atteinte hépatique grave,
 - si vous consommez de l'alcool de manière excessive (intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme),
 - si vous souffrez d'une infection sévère, de déshydratation,
 - en cas d'exploration radiologique nécessitant l'utilisation de produits de contraste iodés. Vous devrez arrêter votre traitement Co-Amarel au moment de l'examen et pendant quelques jours après l'examen.
 - si vous ne vous alimentez pas correctement, si vous êtes affaibli ou souffrez d'insuffisance hypophysaire ou surréale

Prendre des précautions particulières avec Co-Amarel :

Veuillez respecter consciencieusement les prescriptions de votre medecin pour ce qui concerne les doses de Co-Amarel, la surveillance (analyse de sang et d'urine), le regime alimentaire et l'activite physique (travail et exercice physique).

MISES EN GARDE

Hypoglycémie

Au cours des premières semaines de traitement, le risque

Co-Ama

125,00

Glimépiride / chlorhydrate de Me

Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en intégrer une partie dans un dossier médical.
 - Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

Co-Amarel 2mg/500mg, comprimé pelliculé

- Les substances actives sont le glimépiride et le chlorhydrate de metformine. Un comprimé contient 2 mg de glimépiride et 500 mg de chlorhydrate de metformine.
 - Les autres composants sont : lactose, carboxyméthylamidon, povidone K 30, cellulose micro-cristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol 6000, dioxyde de titane (E 171), cire de carnauba, eau purifiée.

1. QU'EST-CE QUE Co-Amarel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Co-Amarel se présente sous forme de comprimés pelliculés blancs de forme ovale. Boîte de 30 comprimés.

Co-Amarel est un antidiabétique oral.

Il est préconisé dans le traitement du diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline (diabète de type 2), en complément d'un régime alimentaire et d'exercice physique :

- lorsqu'un traitement par monothérapie à base de glimépiride ou de metformine n'est pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique,
 - en remplacement de la bithérapie associant glimépiride et metformine.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER

Co-Amarelli

N'utilisez jamais Co-Amarel dans les cas suivants :

- si vous souffrez de diabète insulino-dépendant (diabète de type 1 nécessitant un traitement par

Co-Amarel® 2 mg/500 mg

30 Comprimés pelliculés



6 118000 061854

l'insuline).

- si vous souffrez d'acidocétose diabétique,
 - si vous êtes hypersensible (allergique) au glimépiride ou au chlorhydrate de métformine, ou à l'un des autres composants de Co-Amarel, aux sulfamides et autres sulfonylurées, aux biguanides,
 - si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant,
 - si vous avez déjà souffert d'acidose lactique,
 - si vous souffrez d'une maladie ou d'un dysfonctionnement des reins,
 - si vous souffrez d'insuffisance cardiaque,
 - si vous avez eu récemment un infarctus du myocarde, un choc,
 - si vous souffrez d'une atteinte hépatique grave,
 - si vous consommez de l'alcool de manière excessive (intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme),
 - si vous souffrez d'une infection sévère, de déshydratation,
 - en cas d'exploration radiologique nécessitant l'utilisation de produits de contraste iodés. Vous devrez arrêter votre traitement Co-Amarel au moment de l'examen et pendant quelques jours après l'examen.
 - si vous ne vous alimentez pas correctement, si vous êtes affaibli ou souffrez d'insuffisance hypophysaire ou surréale

Prendre des précautions particulières avec Co-Amarel :

Veuillez respecter consciencieusement les prescriptions de votre medecin pour ce qui concerne les doses de Co-Amarel, la surveillance (analyse de sang et d'urine), le regime alimentaire et l'activite physique (travail et exercice physique).

MISES EN GARDE

Hypoglycémie

Au cours des premières semaines de traitement, le risque

Co-Ama

125,00

Glimépiride / chlorhydrate de Me

Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en intégrer une partie dans un dossier médical.
 - Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

Co-Amarel 2mg/500mg, comprimé pelliculé

- Les substances actives sont le glimépiride et le chlorhydrate de metformine. Un comprimé contient 2 mg de glimépiride et 500 mg de chlorhydrate de metformine.
 - Les autres composants sont : lactose, carboxyméthylamidon, povidone K 30, cellulose micro-cristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol 6000, dioxyde de titane (E 171), cire de carnauba, eau purifiée.

1. QU'EST-CE QUE Co-Amarel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Co-Amarel se présente sous forme de comprimés pelliculés blancs de forme ovale. Boîte de 30 comprimés.

Co-Amarel est un antidiabétique oral.

Il est préconisé dans le traitement du diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline (diabète de type 2), en complément d'un régime alimentaire et d'exercice physique :

- lorsqu'un traitement par monothérapie à base de glimépiride ou de metformine n'est pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique,
 - en remplacement de la bithérapie associant glimépiride et metformine.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER

Co-Amarelli

N'utilisez jamais Co-Amarel dans les cas suivants :

- si vous souffrez de diabète insulino-dépendant (diabète de type 1 nécessitant un traitement par

Co-Amarel® 2 mg/500 mg

30 Comprimés pelliculés



6 118000 061854

l'insuline).

- si vous souffrez d'acidocétose diabétique,
 - si vous êtes hypersensible (allergique) au glimépiride ou au chlorhydrate de métformine, ou à l'un des autres composants de Co-Amarel, aux sulfamides et autres sulfonylurées, aux biguanides,
 - si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant,
 - si vous avez déjà souffert d'acidose lactique,
 - si vous souffrez d'une maladie ou d'un dysfonctionnement des reins,
 - si vous souffrez d'insuffisance cardiaque,
 - si vous avez eu récemment un infarctus du myocarde, un choc,
 - si vous souffrez d'une atteinte hépatique grave,
 - si vous consommez de l'alcool de manière excessive (intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme),
 - si vous souffrez d'une infection sévère, de déshydratation,
 - en cas d'exploration radiologique nécessitant l'utilisation de produits de contraste iodés. Vous devrez arrêter votre traitement Co-Amarel au moment de l'examen et pendant quelques jours après l'examen.
 - si vous ne vous alimentez pas correctement, si vous êtes affaibli ou souffrez d'insuffisance hypophysaire ou surréale

Prendre des précautions particulières avec Co-Amarel :

Veuillez respecter consciencieusement les prescriptions de votre medecin pour ce qui concerne les doses de Co-Amarel, la surveillance (analyse de sang et d'urine), le regime alimentaire et l'activite physique (travail et exercice physique).

MISES EN GARDE

Hypoglycémie

Au cours des premières semaines de traitement, le risque