

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OPTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Déclaration de Maladie : N° P19-0005406

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1775

Société : 239ha

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MORCHID ABDES

Date de naissance : 05 MARS 2020

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 24/01/2020

Nom et prénom du malade : Age:

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : MALADIE CARDIAQUE

SAMIRA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 01/01/2020

Signature de l'adhérent(e) : MORCHID ABDES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24/01/2020	S	S	300 (XXX)	Pr ABID-ALLAH Mounib Chirurgien Cardio Vasculaire Gsm: 0661 23 61 24

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DE LA FRESCOURTE Lot. Al Moustakba, Lot 1 Route 1029, Sidi Maâoui - Casablanca Tél.: 0522 97 32 23 - Fax : 0522 97 57 46	24/01/2020	76845

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	B 35533411 11433553	MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

مصححة الاختصاصات الشفائية

Clinique des Spécialités Achrafia

Angle Rues Lahcen et Arjonne et Lavoisier (face Hôpital 20 Août) - Tél. : 05 22 86 22 86
05 22 86 92 20 (10 lignes) - Fax : 05 22 86 22 23 - Casablanca - Maroc

05 22 86 92 29 (10.15.) - Fax : 05 22 86 22 23 - Casablanca - Maroc

E-mail: Cliniqueachifaa@menara.ma

Docteur :

Casablanca, le

24/07/2020

Dr. M. H. Chirurgien Cardio Thoracique
Gsm: 0661 23 81 24

M → Monochrom
3700 x 7. 

① Stenner Ass
20.0 x 15' V S J

② Situation by
size & the  NR

Also set up
86%
1111996

(K) An axial $\frac{V}{2}$ cy e
MS^{oo} (S) AC $\frac{V}{2}$ 1g

→ Twisted shadow lines + from
+ subcine

7684-

Dr ABID-ALLAH Mouhcine
استاد عبيد الله محسن
Chirurgien Cardio Vasculaire
جراح القلب والشرايين
Gsm 0661 23 61 24

مستعجلات 24/24 URGENCES 24/24

أطلاف

أمو كسيسلين + حامض كلاغيلانيك

LOT : 4578

PER : 08-21

P.P.V : 115DH00

1 غ | 125 مغ

كيس 14





37,00

100 mg.
un comprimé.

Comprimés, boîte de 14, 28 et 56.

- **Classe pharmaco-thérapeutique :**
Bêtabloquant sélectif (C07AB03 : système cardiovasculaire)

Dans quels cas utiliser ce médicament ?

- Hypertension artérielle,
- Prophylaxie des crises d'angor d'**effort**,
- Infarctus du myocarde en phase **aiguë** (le traitement est institué au plus tard avant la 12^e heure),
- Arythmies ventriculaires et supraventriculaires.

CONTRE-INDICATIONS

Absolues :

- Asthme et bronchopneumopathies **chroniques** obstructives, dans leurs formes sévères,
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement,
- Choc cardiogénique,
- Blocs auriculoventriculaires des 2^e et 3^e degrés non appareillés,
- Angor de prinzmetal (dans les **formes** pures et monothérapie),
- Maladie du sinus,
- Bradycardie,
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères,
- Phéochromocytome non traité,
- Hypotension,
- Hypersensibilité à l'aténolol,
- Antécédent de réaction anaphylactique,
- Floctafénine et sultopride.

Relative :

- Amiodarone.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :

Ne jamais interrompre brutalement le traitement chez les angineux : l'arrêt brusque peut entraîner des troubles du rythme graves, un infarctus du myocarde ou une mort subite.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment la floctafénine, le sultopride et l'amiodarone, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Dans les conditions normales d'utilisation, ATENOR® peut être prescrit pendant la grossesse si besoin sous surveillance médicale.

En cas de traitement jusqu'à l'accouchement, une surveillance attentive du nouveau-né (fréquence cardiaque et glycémie pendant les 3 à 5 premiers jours de la vie) est recommandée.



37,00

100 mg.
un comprimé.

Comprimés, boîte de 14, 28 et 56.

- **Classe pharmaco-thérapeutique :**
Bêtabloquant sélectif (C07AB03 : système cardiovasculaire)

Dans quels cas utiliser ce médicament ?

- Hypertension artérielle,
- Prophylaxie des crises d'angor d'**effort**,
- Infarctus du myocarde en phase **aiguë** (le traitement est institué au plus tard avant la 12^e heure),
- Arythmies ventriculaires et supraventriculaires.

CONTRE-INDICATIONS

Absolues :

- Asthme et bronchopneumopathies **chroniques** obstructives, dans leurs formes sévères,
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement,
- Choc cardiogénique,
- Blocs auriculoventriculaires des 2^e et 3^e degrés non appareillés,
- Angor de prinzmetal (dans les **formes** pures et monothérapie),
- Maladie du sinus,
- Bradycardie,
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères,
- Phéochromocytome non traité,
- Hypotension,
- Hypersensibilité à l'aténolol,
- Antécédent de réaction anaphylactique,
- Floctafénine et sultopride.

Relative :

- Amiodarone.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :

Ne jamais interrompre brutalement le traitement chez les angineux : l'arrêt brusque peut entraîner des troubles du rythme graves, un infarctus du myocarde ou une mort subite.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment la floctafénine, le sultopride et l'amiodarone, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Dans les conditions normales d'utilisation, ATENOR® peut être prescrit pendant la grossesse si besoin sous surveillance médicale.

En cas de traitement jusqu'à l'accouchement, une surveillance attentive du nouveau-né (fréquence cardiaque et glycémie pendant les 3 à 5 premiers jours de la vie) est recommandée.



37,00

100 mg.
un comprimé.

Comprimés, boîte de 14, 28 et 56.

- **Classe pharmaco-thérapeutique :**
Bêtabloquant sélectif (C07AB03 : système cardiovasculaire)

Dans quels cas utiliser ce médicament ?

- Hypertension artérielle,
- Prophylaxie des crises d'angor d'**effort**,
- Infarctus du myocarde en phase **aiguë** (le traitement est institué au plus tard avant la 12^e heure),
- Arythmies ventriculaires et supraventriculaires.

CONTRE-INDICATIONS

Absolues :

- Asthme et bronchopneumopathies **chroniques** obstructives, dans leurs formes sévères,
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement,
- Choc cardiogénique,
- Blocs auriculoventriculaires des 2^e et 3^e degrés non appareillés,
- Angor de prinzmetal (dans les **formes** pures et monothérapie),
- Maladie du sinus,
- Bradycardie,
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères,
- Phéochromocytome non traité,
- Hypotension,
- Hypersensibilité à l'aténolol,
- Antécédent de réaction anaphylactique,
- Floctafénine et sultopride.

Relative :

- Amiodarone.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :

Ne jamais interrompre brutalement le traitement chez les angineux : l'arrêt brusque peut entraîner des troubles du rythme graves, un infarctus du myocarde ou une mort subite.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment la floctafénine, le sultopride et l'amiodarone, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Dans les conditions normales d'utilisation, ATENOR® peut être prescrit pendant la grossesse si besoin sous surveillance médicale.

En cas de traitement jusqu'à l'accouchement, une surveillance attentive du nouveau-né (fréquence cardiaque et glycémie pendant les 3 à 5 premiers jours de la vie) est recommandée.



37,00

100 mg.
un comprimé.

Comprimés, boîte de 14, 28 et 56.

- **Classe pharmaco-thérapeutique :**
Bêtabloquant sélectif (C07AB03 : système cardiovasculaire)

Dans quels cas utiliser ce médicament ?

- Hypertension artérielle,
- Prophylaxie des crises d'angor d'**effort**,
- Infarctus du myocarde en phase **aiguë** (le traitement est institué au plus tard avant la 12^e heure),
- Arythmies ventriculaires et supraventriculaires.

CONTRE-INDICATIONS

Absolues :

- Asthme et bronchopneumopathies **chroniques** obstructives, dans leurs formes sévères,
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement,
- Choc cardiogénique,
- Blocs auriculoventriculaires des 2^e et 3^e degrés non appareillés,
- Angor de prinzmetal (dans les **formes** pures et monothérapie),
- Maladie du sinus,
- Bradycardie,
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères,
- Phéochromocytome non traité,
- Hypotension,
- Hypersensibilité à l'aténolol,
- Antécédent de réaction anaphylactique,
- Floctafénine et sultopride.

Relative :

- Amiodarone.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :

Ne jamais interrompre brutalement le traitement chez les angineux : l'arrêt brusque peut entraîner des troubles du rythme graves, un infarctus du myocarde ou une mort subite.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment la floctafénine, le sultopride et l'amiodarone, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Dans les conditions normales d'utilisation, ATENOR® peut être prescrit pendant la grossesse si besoin sous surveillance médicale.

En cas de traitement jusqu'à l'accouchement, une surveillance attentive du nouveau-né (fréquence cardiaque et glycémie pendant les 3 à 5 premiers jours de la vie) est recommandée.



37,00

100 mg.
un comprimé.

Comprimés, boîte de 14, 28 et 56.

- **Classe pharmaco-thérapeutique :**
Bêtabloquant sélectif (C07AB03 : système cardiovasculaire)

Dans quels cas utiliser ce médicament ?

- Hypertension artérielle,
- Prophylaxie des crises d'angor d'**effort**,
- Infarctus du myocarde en phase **aiguë** (le traitement est institué au plus tard avant la 12^e heure),
- Arythmies ventriculaires et supraventriculaires.

CONTRE-INDICATIONS

Absolues :

- Asthme et bronchopneumopathies **chroniques** obstructives, dans leurs formes sévères,
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement,
- Choc cardiogénique,
- Blocs auriculoventriculaires des 2^e et 3^e degrés non appareillés,
- Angor de prinzmetal (dans les **formes** pures et monothérapie),
- Maladie du sinus,
- Bradycardie,
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères,
- Phéochromocytome non traité,
- Hypotension,
- Hypersensibilité à l'aténolol,
- Antécédent de réaction anaphylactique,
- Floctafénine et sultopride.

Relative :

- Amiodarone.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :

Ne jamais interrompre brutalement le traitement chez les angineux : l'arrêt brusque peut entraîner des troubles du rythme graves, un infarctus du myocarde ou une mort subite.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment la floctafénine, le sultopride et l'amiodarone, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Dans les conditions normales d'utilisation, ATENOR® peut être prescrit pendant la grossesse si besoin sous surveillance médicale.

En cas de traitement jusqu'à l'accouchement, une surveillance attentive du nouveau-né (fréquence cardiaque et glycémie pendant les 3 à 5 premiers jours de la vie) est recommandée.



37,00

100 mg.
un comprimé.

Comprimés, boîte de 14, 28 et 56.

- **Classe pharmaco-thérapeutique :**
Bêtabloquant sélectif (C07AB03 : système cardiovasculaire)

Dans quels cas utiliser ce médicament ?

- Hypertension artérielle,
- Prophylaxie des crises d'angor d'**effort**,
- Infarctus du myocarde en phase **aiguë** (le traitement est institué au plus tard avant la 12^e heure),
- Arythmies ventriculaires et supraventriculaires.

CONTRE-INDICATIONS

Absolues :

- Asthme et bronchopneumopathies **chroniques** obstructives, dans leurs formes sévères,
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement,
- Choc cardiogénique,
- Blocs auriculoventriculaires des 2^e et 3^e degrés non appareillés,
- Angor de prinzmetal (dans les **formes** pures et monothérapie),
- Maladie du sinus,
- Bradycardie,
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères,
- Phéochromocytome non traité,
- Hypotension,
- Hypersensibilité à l'aténolol,
- Antécédent de réaction anaphylactique,
- Floctafénine et sultopride.

Relative :

- Amiodarone.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :

Ne jamais interrompre brutalement le traitement chez les angineux : l'arrêt brusque peut entraîner des troubles du rythme graves, un infarctus du myocarde ou une mort subite.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment la floctafénine, le sultopride et l'amiodarone, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Dans les conditions normales d'utilisation, ATENOR® peut être prescrit pendant la grossesse si besoin sous surveillance médicale.

En cas de traitement jusqu'à l'accouchement, une surveillance attentive du nouveau-né (fréquence cardiaque et glycémie pendant les 3 à 5 premiers jours de la vie) est recommandée.



37,00

100 mg.
un comprimé.

Comprimés, boîte de 14, 28 et 56.

- **Classe pharmaco-thérapeutique :**
Bêtabloquant sélectif (C07AB03 : système cardiovasculaire)

Dans quels cas utiliser ce médicament ?

- Hypertension artérielle,
- Prophylaxie des crises d'angor d'**effort**,
- Infarctus du myocarde en phase **aiguë** (le traitement est institué au plus tard avant la 12^e heure),
- Arythmies ventriculaires et supraventriculaires.

CONTRE-INDICATIONS

Absolues :

- Asthme et bronchopneumopathies **chroniques** obstructives, dans leurs formes sévères,
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement,
- Choc cardiogénique,
- Blocs auriculoventriculaires des 2^e et 3^e degrés non appareillés,
- Angor de prinzmetal (dans les **formes** pures et monothérapie),
- Maladie du sinus,
- Bradycardie,
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères,
- Phéochromocytome non traité,
- Hypotension,
- Hypersensibilité à l'aténolol,
- Antécédent de réaction anaphylactique,
- Floctafénine et sultopride.

Relative :

- Amiodarone.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :

Ne jamais interrompre brutalement le traitement chez les angineux : l'arrêt brusque peut entraîner des troubles du rythme graves, un infarctus du myocarde ou une mort subite.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment la floctafénine, le sultopride et l'amiodarone, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Dans les conditions normales d'utilisation, ATENOR® peut être prescrit pendant la grossesse si besoin sous surveillance médicale.

En cas de traitement jusqu'à l'accouchement, une surveillance attentive du nouveau-né (fréquence cardiaque et glycémie pendant les 3 à 5 premiers jours de la vie) est recommandée.

مصحة الاختصاصات الشفاء Clinique des Spécialités Achifaa



Angle Rues Lahcen El Arjoune et Lavoisier (face Hôpital 20 Août)
05 22 85 92 20 (10 L.G.) - Fax : 05 22 86 22 23 - Casablanca - Maroc

FACTURE

Le : 24/01/2020

NOM :Mourchid

PRENOM : Samira

Examen :

Consultation :..... 300 Dhs

Arrêtée la présente facture à la somme de : Trois cent dirhams.

Pr M Abid-Allah

Chirurgien Cardiovasculaire

Dr ABID-ALLAH Mouhcine
الأستاذ عبد الله محسن
Chirurgien Cardio Vasculaire
جراح القلب والشرايين
0661 23 61 24

Angle Rues Lahcen El Arjoune et Lavoisier (face Hôpital 20 Août) - Casablanca - Maroc
Tél.: 05 22 85 92 20 (10 L.G.) - Fax : 05 22 86 22 23 - URGENCES 24/24
E-mail : cliniqueachifaa@menara.ma - Cpt : 190780212119260735000196
I.F. : 40158488 - CNSS : 7724223 - Patente N° : 37908413 - ICE : 001743751000001

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

• phlébite (caillot dans une veine),

• embolie pulmonaire (caillot dans les

sont pas interdits, à la manière régulière et sans excès. Durant le traitement par excessive d'alcool, évitez de prendre Sintrom sur votre organisme.

Interaction avec les produits de santé.
Utilisation pendant la grossesse. En général, l'utilisation de Sintrom pendant la grossesse, Prévenez votre pharmacien. En cas de besoin, veillez à prendre un anticoagulant pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être enceinte, en particulier, votre traitement peut être modifié. L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MéDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Sintrom n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable : Lactose

Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Instruction pour un bon usage.

PPV :

Exp :

N° Lot :

A.90



SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),

sont pas interdits, à manière régulière et sans excès. Durant le traitement par excessive d'alcool, évitez de prendre Sintrom sur votre organisme.

Interaction avec les produits de santé.
Utilisation pendant la grossesse.
En général, l'utilisation de Sintrom pendant la grossesse, n'a pas été étudiée. Prévenez votre pharmacien. En cas de besoin, veillez à prendre un anticoagulant pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être enceinte, en particulier, votre traitement doit être adapté. L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MéDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :
SINTROM n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable : Lactose

Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

- Instruction pour un bon usage.

PPV :

Exp :

N° Lot :

A.90



SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),

sont pas interdits, à manière régulière et sans excès. Durant le traitement par excessive d'alcool, évitez de prendre Sintrom sur votre organisme.

Interaction avec les produits de santé.
Utilisation pendant la grossesse.
En général, l'utilisation de Sintrom pendant la grossesse, n'a pas été étudiée. Prévenez votre pharmacien. En cas de besoin, veillez à prendre un anticoagulant pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être enceinte, en particulier, votre traitement doit être adapté. L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MéDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :
SINTROM n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable : Lactose

Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

- Instruction pour un bon usage.

PPV :

Exp :

N° Lot :

A.90



SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),

sont pas interdits, à manière régulière et sans excès. Durant le traitement par excessive d'alcool, évitez de prendre Sintrom sur votre organisme.

Interaction avec les produits de santé.
Utilisation pendant la grossesse.
En général, l'utilisation de Sintrom pendant la grossesse, n'a pas été étudiée. Prévenez votre pharmacien. En cas de besoin, veillez à prendre un anticoagulant pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être enceinte, en particulier, votre traitement doit être adapté. L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MéDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :
SINTROM n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable : Lactose

Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

- Instruction pour un bon usage.

PPV :

Exp :

N° Lot :

A.90



SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

• phlébite (caillot dans une veine),

• embolie pulmonaire (caillot dans les

sont pas interdits, à la manière régulière et sans excès. Durant le traitement par excessive d'alcool, évitez de prendre Sintrom sur votre organisme.

Interaction avec les produits
Sont interdits, à la manière régulière et sans excès. Durant le traitement par excessive d'alcool, évitez de prendre Sintrom sur votre organisme.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement
En général, l'utilisation de Sintrom n'a pas d'influence sur la grossesse. Prévenez votre pharmacien. En cas de besoin, veillez à prendre un anticoagulant pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être en particulier, votre traitement peut être modifié. L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MéDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :
SINTROM n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable : Lactose

Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Instruction pour un bon usage.

PPV :

Exp :

N° Lot :

A.90



SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
 2. Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
 3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
 4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
 5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
 7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- #### **• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité •**

*** Indications thérapeutiques**

• Indications thérapeutiques : Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

- Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :
• phlébite / caillot dans une veine.

- phlébite (caillot dans une veine).
- embolie pulmonaire (caillot dans les artères pulmonaires).

sont pas interdits, à manière régulière et sans excès. Durant le traitement, l'abus excessif d'alcool, évidemment, est à proscrire. Sintrom sur votre organisme. Interaction avec les psychotropes. Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse. Prévenez votre pharmacien. En cas de besoin, vous prendrez un anticoagulant pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être enceinte, particulier, votre traitement sera modifié. L'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE
OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN
MÉDICAMENT.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : SINTROM n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte médicale d'eventuelles blessures.

Excipients à effet notoire : Lactose
Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

PPV

Exp

N° Lot

M.90



SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre, même si vous pourriez leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4mg, comprimé ?

3. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

6. Informations supplémentaires

EST-IL UTILE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde.

Il peut également être prescrit dans une héparine (autre médicament anticoagulant). **QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?**

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

• En cas d'allergie importante à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

• En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie). **Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :**

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

• En cas de risque connu de saignement.

• En cas d'insuffisance rénale sévère.

• En association avec :

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
- le fluoruracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

sont pas interdits, à condition de manière régulière et sans excès. Durant le traitement par anticoagulant, il faut éviter l'abus d'alcool, établir un rapport sur votre organisme et faire une interaction avec les prémédicaments.

Sans objet :

Utilisation pendant la grossesse :

En général, l'utilisation n'est pas recommandée.

En cas de besoin, l'anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être particulier, votre tratera.

Le traitement est possible.

DURÉE D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

OU DE CALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MEDECIN.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

SINTROM 4 n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable :

Lactose.

Ce médicament contient du lactose.

Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMBIEN PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Indication pour un bon usage :

Poseologie, mode et voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

Posologie :

Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation.

Pour la dose quotidienne, par votre médecin en fonction des résultats de l'INR.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration :

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Réquence d'administration :

La prise régulière et sansoubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement :

Sous prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »);

• un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose normale la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

SYNTHEMEDIC
22-24 Rue Zouber Iboun
El Aouan 20500 Casablanca

PPV :

Exp :

N° Lot :

P.P.V: 20.00



UN

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre, même si vous pourriez leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4mg, comprimé ?

3. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

6. Informations supplémentaires

EST-IL UTILE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde, etc.

Il peut également être prescrit dans une héparine (autre médicament anticoagulant). **QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?**

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- En cas d'allergie importante à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,

- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

- En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

- En cas de risque connu de saignement.

- En cas d'insuffisance rénale sévère.

- En association avec :

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),

- le fluoruracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre, même si vous pourriez leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4mg, comprimé ?

3. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

6. Informations supplémentaires

EST-IL UTILE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde.

Il peut également être prescrit dans une héparine (autre médicament anticoagulant). **QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?**

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

• En cas d'allergie importante à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

• En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie). **Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :**

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

• En cas de risque connu de saignement.

• En cas d'insuffisance rénale sévère.

• En association avec :

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
- le fluoruracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

sont pas interdits, à condition de manière régulière et sans excès. Durant le traitement par anticoagulant, il faut éviter l'abus d'alcool, établir un rapport sur votre organisme et faire une interaction avec les prémédicaments.

Sans objet :

Utilisation pendant la grossesse :

En général, l'utilisation n'est pas recommandée.

En cas de besoin, l'anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être particulier, votre tratera.

Le traitement est possible.

DURÉE D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

OU DE CALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MEDECIN.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

SINTROM 4 n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable :

Lactose.

Ce médicament contient du lactose.

Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMBIEN PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Indication pour un bon usage :

Poseologie, mode et voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

Posologie :

Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation.

Pour la dose quotidienne, par votre médecin en fonction des résultats de l'INR.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration :

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Réquence d'administration :

La prise régulière et sansoubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement :

Sous prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »);

• un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose normale la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

SYNTHEMEDIC
22-24 Rue Zouber Iboun
El Aouan 20500 Casablanca

PPV :

Exp :

N° Lot :

P.P.V: 20.00



UN

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre, même si vous pourriez leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4mg, comprimé ?

3. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

6. Informations supplémentaires

EST-IL UTILE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde, etc.

Il peut également être prescrit dans une héparine (autre médicament anticoagulant). **QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?**

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- En cas d'allergie importante à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,

- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

- En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

- En cas de risque connu de saignement.

- En cas d'insuffisance rénale sévère.

- En association avec :

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),

- le fluoruracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l'appareil respiratoire,

- une maladie de l'appareil digestif,

- une maladie de l'appareil urinaire,

- une maladie de l'appareil circulatoire,

- une maladie de l

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre, même si vous pourriez leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4mg, comprimé ?

3. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

6. Informations supplémentaires

EST-IL UTILE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde.

Il peut également être prescrit dans une héparine (autre médicament anticoagulant). **QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?**

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

• En cas d'allergie importante à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

• En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie). **Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :**

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

• En cas de risque connu de saignement.

• En cas d'insuffisance rénale sévère.

• En association avec :

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
- le fluoruracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

sont pas interdits, à condition de manière régulière et sans excès. Durant le traitement par anticoagulant, il faut éviter l'abus d'alcool, établir un rapport sur votre organisme et faire une interaction avec les prémédicaments.

Sans objet :

Utilisation pendant la grossesse :

En général, l'utilisation n'est pas recommandée.

En cas de besoin, l'anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être particulier, votre tratera.

Le traitement est possible.

DURÉE D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

OU DE CALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MEDECIN.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

SINTROM 4 n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable :

Lactose.

Ce médicament contient du lactose.

Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMBIEN PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Indication pour un bon usage :

Poseologie, mode et voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

Posologie :

Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation.

Pour la dose quotidienne, par votre médecin en fonction des résultats de l'INR.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration :

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Réquence d'administration :

La prise régulière et sansoubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement :

Sous prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »);

• un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose normale la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

SYNTHEMEDIC
22-24 Rue Zouber Iboun
El Aouan 20500 Casablanca

PPV :

Exp :

N° Lot :

P.P.V: 20.00



UN

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre, même si vous pourriez leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4mg, comprimé ?

3. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

6. Informations supplémentaires

EST-IL UTILE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde.

Il peut également être prescrit dans une héparine (autre médicament anticoagulant). **QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?**

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

• En cas d'allergie importante à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

• En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie). **Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :**

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

• En cas de risque connu de saignement.

• En cas d'insuffisance rénale sévère.

• En association avec :

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
- le fluoruracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

sont pas interdits, à condition de manière régulière et sans excès. Durant le traitement par anticoagulant, il faut éviter l'abus d'alcool, établir un rapport sur votre organisme et faire une interaction avec les prémédicaments.

Sans objet :

Utilisation pendant la grossesse :

En général, l'utilisation n'est pas recommandée.

En cas de besoin, l'anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être particulier, votre tratera.

Le traitement est possible.

DURÉE D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

OU DE CALLAITEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MEDECIN.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

SINTROM 4 n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable :

Lactose.

Ce médicament contient du lactose.

Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMBIEN PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Indication pour un bon usage :

Poseologie, mode et voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

Posologie :

Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation.

Pour la dose quotidienne, par votre médecin en fonction des résultats de l'INR.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration :

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Réquence d'administration :

La prise régulière et sansoubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement :

Sous prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »);

• un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose normale la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

SYNTHEMEDIC
22-24 Rue Zouber Iboun
El Aouan 20500 Casablanca

PPV :

Exp :

N° Lot :

P.P.V: 20.00



UN

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre, même si vous pourriez leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4mg, comprimé ?

3. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

6. Informations supplémentaires

EST-IL UTILE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde, etc.

Il peut également être prescrit dans une héparine (autre médicament anticoagulant). **QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?**

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- En cas d'allergie importante à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

- En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

- En cas de risque connu de saignement.

- En cas d'insuffisance rénale sévère.

- En association avec :

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
- le fluoruracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

sont pas interdits, à condition de manière régulière et sans excès. Durant le traitement par anticoagulant, il faut éviter l'abus d'alcool, établir un rapport sur votre organisme et faire une interaction avec les prémédicaments.

Sans objet :

Utilisation pendant la grossesse :

En général, l'utilisation n'est pas recommandée.

En cas de besoin, l'anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être particulier, votre tratera.

Le traitement est possible.

DURÉE D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

OU DE CALLAGEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MEDECIN.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

La prise de SINTROM 4 mg n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable :

Lactose.

Ce médicament contient du lactose.

Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMBIEN PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Indication pour un bon usage :

Poseologie, mode et voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

Posologie

Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation.

Pour la dose quotidienne, par votre médecin en fonction des résultats de l'INR.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Réquence d'administration

La prise régulière et sansoubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Selon prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ;

- un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose normale la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

SYNTHEMEDIC

22-24 Rue Zouber Iboun
El Aouan 20500 Casablanca

PPV :

Exp :

N° Lot :

P.P.V: 20.00



E
UN

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre, même si vous pourriez leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4mg, comprimé ?

3. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

6. Informations supplémentaires

EST-IL UTILE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde.

Il peut également être prescrit dans une héparine (autre médicament anticoagulant). **QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?**

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,

- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

- En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

- En cas de risque connu de saignement.

- En cas d'insuffisance rénale sévère.

- En association avec :

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),

- le fluoruracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

- une blessure importante

sont pas interdits, à condition de manière régulière et sans excès. Le traitement par excessive d'alcool, établi sur votre organisme, interaction avec les prises de Sintrom.

Utilisation pendant la grossesse.

En général, l'utilisation de Sintrom n'est pas recommandée.

En cas de besoin, l'anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être particulier, votre tratera.

Le traitement est possible.

DURÉE D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

OU DE CALLAGEMENT DE

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Medicament.

Sportifs :

Evitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entrainer des

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

Sintrom n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Excipients à effet notable :

Lactose.

Ce médicament contient du lactose.

Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMBIEN PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Indication pour un bon usage :

Poseologie, mode et voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

Posologie

Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation.

Pour la dose quotidienne, par votre médecin en fonction des résultats de l'INR.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Réquence d'administration

La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement :

Selon prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ;

- un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose normale la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

SYNTHEMEDIC

22-24 Rue Zouber Iboun
El Aouan 20500 Casablanca

PPV :

Exp :

N° Lot :

P.P.V: 20.00



UN

Casablanca, le 11 juin 2018

NOTE AU PRESTATAIRE

Déterminée à assurer aux prestataires de santé un règlement dans les meilleurs délais, la MUPRAS incite l'ensemble des prestataires de soins à déposer leurs factures avant le 10 du mois.

De ce fait, la MUPRAS a mis en place les conditions suivantes pour garantir la qualité de cette opération :

- Les factures déposées avant le 10 du mois seront traitées pendant le même mois.
- Les factures déposées après le 10 du mois seront traitées le mois M+1.

Pour tout renseignement complémentaire, nos services sont joignables par mail sur facturation@mupras.com .

Direction MUPRAS