

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier d'El Ghazal - Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-488475

☐ Maladie ☒ Dentaire **24550** ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **2172**

Société :

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom :

ARRAKI DAFIR

Date de naissance :

29/09/1953

Adresse :

26152 Lot 4 Bougkoura BP177

Tél :

0661 196269

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

24/02/2020

Nom et prénom du malade :

ARRAKI DAFIR

Age : **1953**

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

hypertension

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la loi relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

20/10/2020

Le :

Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du M attestant le Paiement des
24.02.2020	G	-	4	IMPE: 0910394
24.02.2020	G	1	259,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la facture
Pharmacie AL Joud 161-05 22 33 45 36 Bellaoui Arafat	20/02/20	267,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Laboratoire Bir Anzarane 117 Bd. Bir Anzarane CASABLANCA	24.02.2020	13137,00	1860,80


AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	


VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

SOINS DENTAIRES



O.D.F. PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. CARIU BELQADI Joëlle

ENDOCRINOLOGIE METABOLISME

Lauréate de La Faculté de PARIS

الدكتورة كاريو بلقاضي جوويل

إختصاصية في أمراض الغدد و التغذية

خريجة كلية الطب بباريس

م. ARRARI Dofir

Casablanca, le :

24/02/2020
Dr. CARIU BELQADI Joëlle
ENDOCRINOLOGIE
Maârif - CASABLANCA

Chol T. HDL COL. T₄ & autres -
TSH us - T₄ L - T₃L
Thyroglobuline ore Ale

Dr. CARIU BELQADI Joëlle
ENDOCRINOLOGUE
119, Bd. Bir Anzarane
Maârif - CASABLANCA

Laboratoire Bir Anzarane
119, Bd. Bir Anzarane
CASABLANCA

119, شارع بئر انزران - إقامة رمزي، باب (ب) الطابق الثاني - المعاريف - 20100 الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 98 14 67 - 05 22 23 84 84 - 05 22 99 26 53

119, Bd. BIR ANZARANE - Résidence RAMZI - Porte B 2ème Etage - Maârif - 20100 CASABLANCA

Tél.: 05 22 23 84 84 - 05 22 98 14 67 - 05 22 99 26 53 - E-mail : carioujoelle@yahoo.fr

Dr. CARIOU BELQADI Joëlle

ENDOCRINOLOGIE METABOLISME

Lauréate de La Faculté de PARIS

الدكتورة كاريو بلقاضي جوويل

إختصاصية في أمراض الغدد و التغذية

خريجة كلية الطب بباريس

m^r ANAKI Defir

Casablanca, le : 27 / 02 / 2026

LEVO THYROX 100 - 50

$13,40 \times 9 = 120,60$

1 cp 100 + 1 cp 50 = 175

$24,40 \times 6 = 146,40$

6 pws 17

1 cp 100 + 1 cp 50 = 150

1 jow 17

PHARMACIE AL Joud
Dr. BELLAOUI ARAFAT
Rm al Lahlal Bousskoura
Tél: 05 22 33 45 36

Dr. CARIOU BELQADI Joëlle
ENDOCRINOLOGUE
119, Bd. Bir Anzarane
20100 CASABLANCA

119, شارع بئر انزران - إقامة رمزي، باب (ب) الطابق الثاني - المعاريف - 20100 الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 98 14 67 - 05 22 23 84 84 - 05 22 99 26 53

119, Bd. BIR ANZARANE - Résidence RAMZI - Porte B 2ème Etage - Maârif - 20100 CASABLANCA

Tél.: 05 22 23 84 84 - 05 22 98 14 67 - 05 22 99 26 53 - E-mail : carioujoelle@yahoo.fr



4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتماً عند الجميع
• تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

• علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
• عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
• ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعاً هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضاً على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال .

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العلبة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

سواء يحوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوثيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملاً، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلاً.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام)، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية. هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصاً إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوثيروكس قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوثيروكس

ابلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوثيروكس.



4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتماً عند الجميع
• تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

• علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
• عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
• ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعاً هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضاً على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال .

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العلبة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

سواء يحوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوثيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملاً، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلاً.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام)، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية. هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصاً إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوثيروكس قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوثيروكس

ابلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوثيروكس.



4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتماً عند الجميع
• تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

• علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
• عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
• ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعاً هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضاً على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال .

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العلبة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

سواء يحوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوثيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملاً، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلاً.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام)، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية. هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصاً إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوثيروكس قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوثيروكس

ابلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوثيروكس.



4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتماً عند الجميع
• تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

• علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
• عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
• ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعاً هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضاً على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال .

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العلبة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

سواء يحوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوثيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملاً، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلاً.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام)، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية. هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصاً إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوثيروكس قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوثيروكس

ابلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوثيروكس.



4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتماً عند الجميع
• تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

• علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
• عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
• ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعاً هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضاً على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال .

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العلبة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

سواء يحوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوثيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملاً، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلاً.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام)، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية. هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصاً إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوثيروكس قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوثيروكس

ابلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوثيروكس.



Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

الشيء : هذه الجرعة لا تخرج تاريخ

القبالة ||

طرق الوصف والتسليم

المسألة المغربية

موزج في المغرب من طرف

مشتات - ألمانيا

مركز كيه جي ايه ايه

الصالح :

كل غنية تحتوي على 30 قرص

هذا الدواء يراعى على شكل

ما هو شكل ليفوثيروكسين

الشكل الصيدلاني و الحشو

لا يكون

قائمة السواغات ذو تأثير

كرومكارينول صودي، ستيارات

السواغات هي : لاكتوز

لحرق، جيلاتين،

لحرق قابل للقطع

200 ميكرو غرام

100 ميكرو غرام

50 ميكرو غرام

25 ميكرو غرام

ليفوثيروكسين صودي

المادة الفعالة هي :

100 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ،

على ماذا تحتوي ليفوثيروكسين

قائمة المواد الفعالة و السواغات

6- محتويات العبوة و معلومات أخرى

غير المستعملة. هذه الأجزاء

غير المستعملة. هذه الأجزاء

غير المستعملة. هذه الأجزاء

الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية في

يتغير أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف

هذا الدواء.

حامل أو تخطط للحمل، اسأل طبيبك قبل تناول

إذا كنت حاملاً أو كنت ترضعين، وإذا كنت تعتقد أن

الحمل والرعاية

استخدام أثناء الحمل والرعاية

مكملات مع الصويا

يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية في

قد يكون قد يقل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن

الطعام والشراب

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

عليك بتأخير طبيبكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

المواد الأخرى مثل إيثاناميد، سوليتامين، أو ليفوثيروكسين،

الأدوية لعلاج الإحصاء بغير وسائل الإنجاب،

منج الحمل

الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لعرض دون،

الأدوية لعلاج السيل،

الأدوية لعلاج السيل،

الأدوية لعلاج السيل،

تكون لآلام حادة خلال فترة الحمل بعض الأدوية :

المزمنة السريرية و التليف الكبدية و الكبدية

عند مريض غسيل الكلى

مستقبلات، دواء يستخدم لمنع قرص في

الموضعية و المتخصصات،

الأدوية، سوكوالفات، الموضعية المعدي - المعوي، مضادات

الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجيات التبادل

الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على الحديد، الكالسيوم،

أن أمكن) الأدوية التالية :

من المستحسن أن تأخذ بعيداً عن ليفوثيروكسين (آخر 2 ساعة



Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

الشيء : هذه الجرعة لا تخرج تاريخ

القبالة ||

طرق الوصف والتسليم

المسألة المغربية

موزج في المغرب من طرف

مشتات - ألمانيا

مركز كيه جي ايه ايه

الصالح :

كل غنية تحتوي على 30 قرص

هذا الدواء يراعى على شكل

ما هو شكل ليفوثيروكسين

الشكل الصيدلاني و الحشو

لا يكون

قائمة السواغات ذو تأثير

كرومكارينول صودي، ستيارات

السواغات هي : لاكتوز

لحرق، جيلاتين،

لحرق قابل للقطع

200 ميكرو غرام

100 ميكرو غرام

50 ميكرو غرام

25 ميكرو غرام

ليفوثيروكسين صودي

المادة الفعالة هي :

100 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ،

على ماذا تحتوي ليفوثيروكسين

قائمة المواد الفعالة و السواغات

6- محتويات العبوة و معلومات أخرى

غير المستعملة. هذه الأجزاء

غير المستعملة. هذه الأجزاء

غير المستعملة. هذه الأجزاء

الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية في

يتغير أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف

هذا الدواء.

حامل أو تخطط للحمل، اسأل طبيبك قبل تناول

إذا كنت حاملاً أو كنت ترضعين، وإذا كنت تعتقد أن

الحمل والرعاية

استخدام أثناء الحمل والرعاية

مكملات مع الصويا

يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية في

قد يكون قد يقل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن

الطعام والشراب

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

عليك بتأخير طبيبكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

المواد الأخرى مثل إيثاناميد، سوليتامين، أو ليفوثيروكسين،

الأدوية لعلاج الإحصاء بغير وسائل الإنجاب،

منج الحمل

الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لعرض دون،

الأدوية لعلاج السيل،

الأدوية لعلاج السيل،

الأدوية لعلاج السيل،

تكون لآلام حادة خلال فترة الحمل بعض الأدوية :

المزمنة السريرية و التليف الكبدية و الكبدية

عند مريض غسيل الكلى

مستقبلات، دواء يستخدم لمنع قرص في

الموضعية و المتخصصات،

الأدوية، سوكوالفات، الموضعية المعدي - المعوي، مضادات

الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجيات التبادل

الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على الحديد، الكالسيوم،

أن أمكن) الأدوية التالية :

من المستحسن أن تأخذ بعيداً عن ليفوثيروكسين (آخر 2 ساعة



Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

الشيء : هذه الجرعة لا تخرج تاريخ

القبالة ||

طرق الوصف والتسليم

المسألة المغربية

موزج في المغرب من طرف

مشتات - ألمانيا

مركز كيه جي ايه ايه

الصالح :

كل غنية تحتوي على 30 قرص

هذا الدواء يتر على شكل أقراص

ما هو شكل ليفوثيروكسين ومحتوى

الشكل الصيدلاني و المحتوي

لا يكون

قائمة السواغات ذو تأثير معروف

كرومكارينول صودي، سترات المينوريون

السواغات هي : لا يكون السوا

التياء الدماء، تشاء الدماء، جيلاتين،

لقرص قابل للقطع

200 ميكرو غرام

100 ميكرو غرام

50 ميكرو غرام

25 ميكرو غرام

ليفوثيروكسين صودي

المادة الفعالة هي :

100 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ، قرص قابل للقطع

على ماذا تحتوي ليفوثيروكسين 25 ميكرو غرام ، 50 ميكرو غرام ،

قائمة المواد الفعالة و السواغات

6- محتويات الطنية و معلومات أخرى

غير المستعملة. هذه الأجزاء مستح

بمحافظة الشية.

عن بعد

الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة تدريجياً في

تتغير إن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف

هذا الدواء.

حامل أو تخطط للحمل، اسأل طبيبك قبل تناول

إذا كنت حاملاً أو كنت ترضعين، وإذا كنت تعتقد أن

الحمل والرعاية

استخدام أثناء الحمل والرعاية

مكملات مع الصويا

يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج من بداية في

قد يكون قد قلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن

الطعام والشراب

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

عليك بتأثير طبيبك في حالة ما أخذت أو تأخذون أدوية أخرى.

المواد الأخرى مثل إيثانبروب، سوليتامين، أو ليفوثيروكسين،

الأدوية لعلاج الإحصاء بغيره من الأدين،

منج الحمل

الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لعرض دون،

الأدوية لعلاج السيل،

الأدوية لعلاج السيل،

الأدوية لعلاج السيل،

تكون لآلام حادة خلال فترة الحمل بعض

المرأة أثناء الحمل و السريرية و السريرية و السريرية

عند مريض غسيل الكلى

مستقبلات، دواء يستخدم لمنع قرص في كمية

الموضعية و المتخصصات،

الأدوية، سوكوالفات، الموضعية المعدي - المعوي،

الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجيات

الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على

أن أمكن) الأدوية التالية:

عن بعد



Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

الشيء : هذه الجرعة

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح



Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

الشيء : هذه الجرعة

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح



Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

الشيء : هذه الجرعة

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح



Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

الشيء : هذه الجرعة

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح



Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

الشيء : هذه الجرعة

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح

التي تخرج لتريح



Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

الشيء : هذه الجرعة

التي تخرج

طرق الوصف والتسليم

المسألة المغربية

موزج في المغرب من طرف

مشتات - ألمانيا

مركز كيه جي ايه ايه

الصالح :

كل غنية تحتوي على 30 قرص

هذا الدواء يراعى على شكل

ما هو شكل ليفوثيروكسين

الشكل الصيدلاني و الحشو

لا يكون

قائمة السواغات ذو تأثير

كرومكارينول صودي، سترات

السواغات هي : لا يكون

الجزء، الجلاء الحشو،

لقرص قابل للقطع

200 ميكرو غرام

100 ميكرو غرام

50 ميكرو غرام

25 ميكرو غرام

ليفوثيروكسين صودي

المادة الفعالة هي :

100 ميكرو غرام ، 200

على ماذا تحتوي ليفوثيروكسين

50 ميكرو غرام ، 25

قائمة المواد الفعالة و السواغات

6- محتويات العبوة و معلومات أخرى

غير المستعملة. هذه الأجزاء

الطبيب. قد يحتاج طبيبك

يتبين ان يستمر هذا العلاج

هذا الدواء.

حاصل أو خططين للحمل،

إذا كنت حاملاً أو كنت

الحمل والرعاية

استخدام أثناء الحمل

مكملات مع الصويا

يحتاج إلى تغيير جرعة

المرضى قد يقل من فعالية

الطعام والشراب

التفاعل مع المواد

الغذائية والمشروبات

عليك بتأثير طبيبكم

المواد الأخرى مثل

الأدوية لعلاج

منج الحمل

الأدوية التي تحتوي

دون، لعرض دون،

الأدوية لعلاج

الأدوية لعلاج

الأدوية لعلاج

تكون الأجزاء

المرضى الذين يعانون

عند مرض غشيل الكلي

مستقبلات، دواء

الموضعية و المتخصصات

الأدوية، سوكرالات،

الأدوية لعلاج

الأدوية عن طريق

أن أمكن (الأدوية



Prescripteur : Dr JOELLE LUCIENNE CARIOU BELQADI

Réf : 2002241053

Dossier ouvert le : 24-02-2020 10:07

Edité le : 27-02-2020

Mr. ARRAKI Dafir

Compte Rendu d'Analyse

Page 1 / 1

BIOCHIMIE SANGUINE

Roche Cobas 6000

Cholestérol total:	2.12	g/l	(<2.00)	12-11-2019
	5.48	mmol/L	(<5.17)	3.15
Cholestérol HDL:	0.49	g/L	(>0.40)	12-11-2019
	1.26	mmol/L	(>1.03)	0.44
Cholestérol LDL:	1.28	g/L	(<1.60)	12-11-2019
	3.31	mmol/L	(<4.14)	2.32
Triglycérides:	1.74	g/L	(0.40-1.50)	12-11-2019
	1.98	mmol/L	(0.46-1.71)	1.94

ENDOCRINOLOGIE

Ac Anti-Thyroglobuline: (cobas 6000)	10	UI/mL	(<115)
Thyroglobuline ultra sensible: (Chimiluminescence/Cobas6000)	<0.10	ng/mL	(1.40-78.00)

HORMONOLOGIE

T.S.H: (Chimiluminescence/Cobas6000)	0.02	mUI/L	(0.25-5.00)	12-11-2019
Résultat contrôlé				32.34
T4 LIBRE: (Chimiluminescence/Cobas6000)	24.29	pmol/L	(10.30-22.00)	12-11-2019
	18.95	ng/L	(8.03-17.16)	14.00
T3 Libre (vidas): (Vidas Biomerieux)	5.16	pmol/L	(3.00-8.50)	
	3.35	ng/L	(1.95-5.53)	

Laboratoire d'Analyse
de Biologie Médicale
Bir Anzarane - Casa
Fin du compte rendu
ICE : 00411880083
INPE : 093001196

Dr A. Azeddoug
Médecin Biologiste

Biologistes Responsables :
- Dr. A. AZEDDOUG
- Dr. N. BAAJ

Dossier Validé

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale Bir Anzarane

117, Bd Bir Anzarane 20 100 Maarif Casablanca

Tél : 05 22 99 46 63/ 05 22 25 82 05 Fax : 05 22 98 09 11

ICE : 001748386000083

Patente : 35870583

IF : 01006693

CNSS : 7070999

Compte bancaire : BMCI Casa Normandie

RIB : 013 780 01802 000329 001 80 48

INPE : 093001196

Casablanca le : 24-02-2020

Mr. Dafir ARRAKI

FACTURE N°	2002241053
------------	------------

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
0110	Cholestérol HDL +LDL	B80	B
PS	Prélèvement sang	E25	E
9105	FORFAIT DE SECURITE POUR ECHANTILLON SANGUIN	E0	E
0159	Triodothyronine :T3 ou FT3	B200	B
0161	Thyroxine libre: T4 libre	B200	B
0163	TSH	B250	B
	Cholestérol Total	B30	B
0349	Anticorps anti thyroïdiens : AC anti Thyroglobulines	B150	B
0134	Triglycérides	B60	B
	Thyroglobuline:	B400	B

Total de B : 1370

TOTAL DOSSIER	1860.80 DH
---------------	------------

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille huit cent soixante dirhams quatre-vingts centimes

Laboratoire d'Analyses
de Biologie Médicale
Bir Anzarane
117, Bd. Bir Anzarane - Casablanca
ICE : 001748386000083
INPE : 093001196