

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR CTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

N° P19-

065448

MD 24483

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1655

Société : Letnante

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Bouziane Ahmed

Date de naissance : 06-01-1951

Adresse : 661 lotissement Jaimoune Casablanca

Tél. : 06721213729

Total des frais engagés : 315,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 27/02/2004

Nom et prénom du malade : Bouziane Ahmed Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : DMH bilatéral

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 1/1/2004

Signature de l'adhérent(e) :

1/1/2004

Déclaration de Maladie

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27-08-2020	C	S		 Dr. NAKHLOU Professeur Agrégé de Médecine Dr. Abdourahmane NAKHLOU 2229815599 055

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE LAMOURA 6, Lot. Allaymouna El sasfa Casablanca - Tél. : 05 22 90 94 94 381/81 - IP : 3093297 - IF : 24821866 00135022500039	27/02/2020	315.00

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES																																																																	
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																																																																	
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de																																																																	
SOINS DENTAIRES 	Dents Traitées <table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> </table>																					Nature des Soins <table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> </table>																					Coefficient <table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> </table>																					COEFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS <table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> </table>																									DEBUT D'EXECUTION																																								
FIN D'EXECUTION <table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> </table>																									COEFFICIENT DES TRAVAUX																																								
DETERRMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>					H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000	G	35533411	11433553	MONTANTS DES SOINS																																																
H	25533412	21433552																																																															
D	00000000	00000000																																																															
B	00000000	00000000																																																															
G	35533411	11433553																																																															
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession					DATE DU DEVIS																																																												
					DATE DE L'EXECUTION																																																												
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS					VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																																																												

PROFESSEUR Ali EL MAKHLOUF
Cardiologie adulte et pédiatrique
Explorations Cardio-vasculaires

5, rue Mohamed Abdou
CASABLANCA

Tél. : 0522.29.81.55/59 ou 0522.47.26.89

Fax : 0522.22.62.97

Dom : 0522.79.85.32

GSM cabinet : 06 78 18 18 16

Casablanca, Le 27/02/2020

Mr BOUZIANE Ahmed

20.00 x 6

**1 - SINTROM 4 mg:
3/4 CP LE SOIR UN J ET 1/2CP X 2 J**



97.40

**2 - TRIATEC 2.5 mg :
1 CP PAR JOUR MATIN SANS ARRET**



**3 - OMEGA COEUR :
1 X 4 PAR JOUR SANS ARRET**

315.40

Dr. EL MAKHLOUF Ali
Professeur Agrégé Cardiologie
5, Rue Med. Abdouh - Casa
Tél. : 05 22.29.81.55/59 - 05 22.47.26.89

PHARMACIE LAIMOUN SARL AU
466, Lot. Allaymoune Lissasfa
Casablanca - Tél. : 05 22 90 94 94
RC : 391781 - TP : 36293297 - IF : 24821866
ICE : 001850225000039

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK). Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- préopératoire (caillot dans les veines).

- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons).

- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde.

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie).

- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- les anticoagulants à forte dose :
- le monarazolol utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

- En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.

- En cas d'insuffisance rénale sévère.

- En association avec :

- les AINS ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés).

- le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

sont pas
manière

Durant le
excessive

Sintrom s

Interacti

Sans obje

Utilisatio

En génér

générale

En cas d

anticoagula

Si vous sou

particulier, vo

L'allaiteme

D'UNE FAÇON

QUE DE ALLAITEME

MENT DE VOTRE

PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN

Sportifs :

Evitez les sports ou les co

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire

SINTROM n'a pas d'influen

à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte

générale de l'effet des médicaments

qui peuvent entraîner un

effet indésirable.

Ce médicament contient de

patients présentant une inf

ou un syndrome de mal

hérités rares).

3. COMMENT PRENDRE

• Instruction pour un bo

• Posologie, mode et/ou

• Durée et mode de traitement

• Posologie

Possez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation.

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR.

pour obtenir le traitement.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration

VOIE ORALE : avalez les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans

l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de la prendre le soir, afin que votre médecin

puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Sur prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de Sintrom 4 mg, comprimé que vous n'aurez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

• l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »);

• un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un

traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié une dose de 4 mg, comprimé, il ne faut jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8

heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est

préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre

carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez, en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

mentation de

insomnies

r l'action de

Alternatives

pendant la
tés enceinte
à grossesse.

Sauf cas très

entraîner des

machines :

• véhicules et

coagulant, en

llez chez les

cas de Lapp

ie (maladies

administrati

SINTROM® 4 mg
Acénocoumarol 10 comprimés

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

6 118 000 18 118 7

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK). Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- préopératoire (caillot dans les veines).

- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons).

- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde.

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie).

- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- les anticoagulants à forte dose :
- le monarazolol utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

- En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.

- En cas d'insuffisance rénale sévère.

- En association avec :

- les AINS ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),

- le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

sont pas
manière

Durant le

excessive

Sintrom s

Interacti

Sans obje

Utilisatio

En génér

générale

En cas d

anticoagula

Si vous sou

particulier, vo

L'allaiteme

DU FACON G

QUE L'ALLAITEM

MEDICAMENT OU

UN MEDICAMENT.

Sports :

Evitez les sports ou les co

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire :

SINTROM n'a pas d'influen

à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte

générale de l'effet des médi

ciéments à effet notoire

Ce médicament contient d

patients présentant une inf

ou un syndrome de mal

hérités rares).

3. COMMENT PRENDRE

• Instruction pour un bo

• Posologie, mode et/ou

• Durée du traitement

Posologie

Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation.

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR.

pour obtenir le traitement.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans

l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de la prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Sur prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de Sintrom 4 mg, comprimé que vous n'aurez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »);

- un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un

traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié une dose de 4 mg, comprimé, il ne faut jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8

heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est

préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre

carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez, en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

mentation de

insomnies

r l'action de

Alternatives

pendant la
tés enceinte
à grossesse.

Sauf cas très

entraîner des

machines :

• véhicules et

coagulant, en

llez chez les

cas de Lapp

(maladies

administrati

JE LA GROSSESSE
DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN

Sintrom® 4 mg

Acénocoumarol 10 comprimés

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

6 118000 181187

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK). Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- préopératoire (caillot dans les veines),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- les anticoagulants à forte dose,
- le monamazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires;

- En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :

 - les AINS ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
 - le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

PPV :

Exp :

N° Lot :



Sintrom® 4 mg
Acénocoumarol 10 comprimés



6 118000 181187

mentation de
insomnies
r l'action de
lternatives

pendant la
tés enceinte,
à grossesse.

Sauf cas très
. Sauf cas, très
grossesse.

entraîner des
machines :
s véhicules et
coagulant, en

llez chez les
lase de Lapp
ie (maladies

administrati-

Effet sur l'aptitude à conduire
SINTROM n'a pas d'influence sur l'aptitude à conduire des machines.

Gardez sur vous une carte d'identité, un passeport, un numéro de téléphone et d'adresses utiles en cas d'urgence. Les patients présentant une infarctus du myocarde, rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Instruction pour un bol

Position : mode et/ou

durée du traitement

Posologie

Poser strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation. Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour obtenir votre traitement.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de la prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Sur prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de Sintrom 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

• l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »);

• un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié une ou plusieurs doses de Sintrom 4 mg, comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez, en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Car elle contient des informations importantes pour vous.
• Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK). Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :
• prophéte (caillot dans les veines),
• embolie pulmonaire (caillot dans les poumons).

• maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
• certains infarctus du myocarde,

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ;
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- les anticoagulants à forte dose,
- le monamazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires ;

- En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie). Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :

 - les AINS ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
 - le fluorurocétale et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

PPV : _____

Exp : _____

N° Lot : _____

mentation de
insomnies
r l'action de
lternatives

pendant la
tés enceinte,
à grossesse.

Sauf cas très

entraîner des

machines :
véhicules et
coagulant, en

llez chez les
lase de Lapp
ie (maladies

administrati-

Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation. Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour obtenir votre traitement.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de la prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Sur prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de Sintrom 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :
- Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales ») ;

- un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié de prendre 4 mg, comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez, en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre



Sintrom® 4 mg

Acénocoumarol 10 comprimés



6 118000 181187

administra-

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK). Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- préopératoire (caillot dans les veines).

- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons).

- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde.

Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie).

- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- les anticoagulants à forte dose :
- le monarazolol utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

- En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.

- En cas d'insuffisance rénale sévère.

- En association avec :

- les AINS ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés).

- le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

• sont pas
maniables.

Durant le

excessive

Sintrom s

Interacti

Sans obje

Utilisatio

En génér

générale

En cas d

anticoagula

Si vous sou

particulier, vo

L'allaiteme

DU FACON G

QUE L'ALLAITEM

MEDICAMENT OU

UN MEDICAMENT.

Sports :

Evitez les sports ou les co

traumatismes.

Effet sur l'aptitude à conduire :

SINTROM n'a pas d'influen

à utiliser des machines.

Gardez sur vous une carte

générale de l'effet des médicaments à effet notoire

Ce médicament contient de

patients présentant une inf

ou un syndrome de mal

hérités rares).

3. COMMENT PRENDRE

• Instruction pour un bo

• Posologie, mode et/ou

• Durée du traitement

Posologie

Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation.

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR.

pour obtenir le traitement.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans

l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de la prendre le soir, afin que votre médecin

puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Sur prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de Sintrom 4 mg, comprimé que vous n'aurez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »);

- un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un

traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié une dose de 4 mg, comprimé, il ne faut jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8

heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est

préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre

carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez, en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

PPV :

Exp :

N° Lot :

mentation de

insomnies

r l'action de

Alternatives

90,00

pendant la
tés enceinte
à grossesse.

Sauf cas très

à grossesse.

entraîner des

machines :

• véhicules et

coagulant, en

lîe chez les

lase de Lapp

ie (maladies

administrat

JE LA GROSSESSE
DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN

Sintrom® 4 mg
Acénocoumarol 10 comprimés

6 118 000 18 118 7

l'INR, pour obtenir le résultat.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si

possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans

l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de la prendre le soir, afin que votre médecin

puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Quelques recommandations

Sur prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de Sintrom 4 mg, comprimé que vous n'aurez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »);

- un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous

suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un

traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié une dose de 4 mg, comprimé, il ne faut jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8

heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est

préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre

carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de saignement :

Vous ne devrez, en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Que contient cette notice ?
- Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotiques (code ATC : B01AA07).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK). Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- préopératoire (caillot dans les veines),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),
- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
- certains infarctus du myocarde,
- Il peut être prescrit en relais d'une héparine (autre médicament anticoagulant).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

• Informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
- En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie);
- En cas d'association avec les médicaments suivants :

- les anticoagulants à forte dose,
- le monamazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,
- les AINS pyrazolés : phénylbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires;

- En cas d'association avec le millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :

 - les AINS ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),
 - le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et si vous avez ou avez eu :

PPV :

Exp :

N° Lot :

mentation de
insomnies
r l'action de
lternatives

pendant la
tés enceinte,
à grossesse.

Sauf cas très

entraîner des

machines :
• véhicules et
coagulant, en

llez chez les
lase de Lapp
ie (maladies

administrati-

Mises en garde spéciales ».

A titre indicatif :

La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation. Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour obtenir votre traitement.

Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement et jamais par vous-même.

Mode d'administration

VOIE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

La prise régulière et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe.

Une prise par jour est préférable de la prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Sur prescription médicale.

Le comprimé peut être divisé en dose égale.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de Sintrom 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Un surdosage peut se manifester par :

- l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »);
- un INR supérieur à 5, avec ou sans saignement associé.

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit.

Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié une ou plusieurs doses de Sintrom 4 mg, comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médiamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Vous ne devrez, en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que votre



Sintrom® 4 mg

Acénocoumarol 10 comprimés



6 118000 181187

Posologie :

La dose peut être ajustée individuellement.

Mode d'administration :

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec au moins $\frac{1}{2}$ verre de liquide. Ils ne doivent être ni mâchés, ni écrasés.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Surdosage :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Le plus fréquent : la toux.

Moins fréquents :

- Céphalées, fatigue,
- tachycardie, détérioration de la capacité à réagir,
- nausées,
- exanème, prurit, urticaire (parfois avec fièvre), angio-œdème avec enfllement de la face, des membres, de la langue, de la glotte et/ou du larynx,
- augmentation du taux sérique de bilirubine et/ou des enzymes du foie cholestati-que hépatique,
- faiblesse,
- altération de la fonction rénale, augmentation de la créatinine sérique et de l'urée,
- conjonctivite,
- troubles de l'équilibre.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITION-EMENT EXTÉRIEUR.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 - Aïn Sebaâ
20250 Casablanca

TRIATEC®

1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Ramipril

Comprimé

sanofi aventis

Cette notice étant régulièrement remise à jour, il convient de la lire attentivement avant d'utiliser une nouvelle boîte. Pour toute question ne pas hésiter.

COMPOSITU

TRIATEC® 1

TRIATEC® 2

TRIATEC® 5

TRIATEC® P

Excipients (c
prégalatinisé,
fer jaune (pour

97,70

**FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS**

TRIATEC® 1,25 mg : comprimés dosés à 1,25 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 2,5 mg : comprimés dosés à 2,5 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 5 mg : comprimés dosés à 5 mg, boîtes de 15 et 30.

TRIATEC® Protect 10 mg : comprimés de

TRIATEC® 2,5mg
30 Comprimés

INDICATIONS

- Hypertension artérielle.
- Insuffisance cardiaque.
- Réduction de la mortalité en cas d'infarctus aiguë d'un infarctus du myocarde.
- Néphropathie glomérulaire manifeste
- Début de néphropathie diabétique chez du type II et d'hypertension artérielle.
- Maladie vasculaire avec athérosclérose établie (avec ou sans diabète de type II) : prévention de l'infarctus du myocarde, de l'accident vasculaire cérébral ou des décès cardiovasculaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au ramipril, à un autre inhibiteur de l'enzyme de



6 118000 060185

ase

ête

Posologie :

La dose peut être ajustée individuellement.

Mode d'administration :

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec au moins $\frac{1}{2}$ verre de liquide. Ils ne doivent être ni mâchés, ni écrasés.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Surdosage :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Le plus fréquent : la toux.

Moins fréquents :

- Céphalées, fatigue,
- tachycardie, détérioration de la capacité à réagir,
- nausées,
- exanème, prurit, urticaire (parfois avec fièvre), angio-œdème avec enfllement de la face, des membres, de la langue, de la glotte et/ou du larynx,
- augmentation du taux sérique de bilirubine et/ou des enzymes du foie cholestati-que hépatique,
- faiblesse,
- altération de la fonction rénale, augmentation de la créatinine sérique et de l'urée,
- conjonctivite,
- troubles de l'équilibre.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITION-EMENT EXTÉRIEUR.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 - Aïn Sebaâ
20250 Casablanca

TRIATEC®

1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Ramipril

Comprimé

sanofi aventis

Cette notice étant régulièrement remise à jour, il convient de la lire attentivement avant d'utiliser une nouvelle boîte. Pour toute question ne pas hésiter.

COMPOSITU

TRIATEC® 1

TRIATEC® 2

TRIATEC® 5

TRIATEC® P

Excipients (c
prégalatinisé,
fer jaune (pour

97,70

**FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS**

TRIATEC® 1,25 mg : comprimés dosés à 1,25 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 2,5 mg : comprimés dosés à 2,5 mg, boîte de 30.

TRIATEC® 5 mg : comprimés dosés à 5 mg, boîtes de 15 et 30.

TRIATEC® Protect 10 mg : comprimés de

TRIATEC® 2,5mg
30 Comprimés

INDICATIONS

- Hypertension artérielle.
- Insuffisance cardiaque.
- Réduction de la mortalité en cas d'infarctus aiguë d'un infarctus du myocarde.
- Néphropathie glomérulaire manifeste
- Début de néphropathie diabétique chez du type II et d'hypertension artérielle.
- Maladie vasculaire avec athérosclérose établie (avec ou sans diabète de type II) : prévention de l'infarctus du myocarde, de l'accident vasculaire cérébral ou des décès cardiovasculaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au ramipril, à un autre inhibiteur de l'enzyme de



6 118000 060185

ase

ête