

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-422115

NO = 24481

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : 157 Société :			
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : AKIF HANIA			
Date de naissance : 19/36			
Adresse :			
Tél. : 0663517968 Total des frais engagés : Dhs			

Cadre réservé au Médecin			
Docteur Abdelilah SAMI Professeur de Neurochirurgie 44, rue des hôpitaux (face aux urgences Ibn Rachid Maroc) - Casablanca Tél : 05 22 22 22 42			
Cachet du médecin :			
Date de consultation : 17.2.2020			
Nom et prénom du malade : AKIF HANIA Age:			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie :			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **ACCUEIL** Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/2000	2		30000	INP :   Dr Abdellah Sakkal Praticien de la rochimergie aux urgences Casablanca 22 42

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE SEMLALI Angle des Rues 11 et 1. Sid El Khadir Tél : 05.22.89.62.93	14/02/20	1509,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Participant	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	M I	I V	
CLINIQUE BAUD	05/22/2023	0	0	0	0	200,00

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur AMRANI HENCHI SAIDA

Pneumo - phtisiologue Maladies Respiratoires et Allergiques

Asthme, Rhinite, Tuberculose Ronflement et Apnées du Sommeil

Adultes et Enfants

Ex Médecin au CHU Ibn Rochd
Et Hôpital Moulay Youssef



الدكتورة عُمراني حنشي سعيدة

٢- اختصاصية

في أمراض الجهاز التنفسي

الضيقه ، داء السل

كبار و أطفال

طبيبة سابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد ومستشفى مولاي يوسف

الدار البيضاء، في ٠٩-٣-٢٠٢٠ Casablanca, le

198-Nov ARI D

843,000

9 uektoro

91° 2

PHARMACIE SEMLALI
n°83, Angle des Rues 11 et 1:
Sid El Khadir
Tel: 05.22.89.62.93

10,000 e 181 or 181

1

Flexo-shade

50

2018-01-11

S.V.

45,30

9

Next to me

95,50

BC

Boayne, Sel

A circular blue stamp with the letters 'S.V' at the top left and 'VITALISADA' in a stylized font across the center. Below this, the word 'Allergologique' is written, followed by 'S. GH25A' and 'MANCA' on the right, and the date '22 02' at the bottom right.

شارع ام الربيع - اقامة الفردوس - مجموعة 25 - الطابق السادس - الدار البيضاء - الهاتف : 02 02 89 22 05

Boulevard Oum Rabii, Résidence FIRDAOUS, Groupe H25 A, Rez de chaussée - Casablanca - Tél.: 05 22 89 02 02

Docteur Abdelillah SAMI

Professeur de Neurochirurgie
à la Faculté de Médecine de Casablanca
Spécialiste des Maladies du Cerveau
et de la Colonne Vertebrale
Diplômé de la Faculté de Médecine
de la Bretagne Occidentale - France



الدكتور عبد الله السامي

أستاذ في جراحة الدماغ
والأعصاب والعمود الفقري

حاصل على شهادة جراحة الدماغ
والأعصاب ببريطانيا الغربية بفرنسا

17.02.2020

Casablanca, le

الدار البيضاء، في

Mme AKIF Hnia

255,00 x 3.

1 ALYSE 75 MG

193,00 x 3.
1 comprimé le matin et le soir, pendant 3 mois.

2 S-CITAP 20MG


1 comprimé le soir, pendant 3 mois.

3 STILNOX 6.25 MG

1 comprimé au coucher, pendant 3 mois. en cas de besoin.

163,00.

4. Novozelar



Professeur Abdelillah SAMI

Docteur Abdelillah SAMI
Professeur de Neurochirurgie
4, rue des hôpitaux (face aux urgences
Ibn Rochd Morizgo) - Casablanca
Tél : 05 22 22 22 42

Docteur Abdelillah SAMI
Professeur de Neurochirurgie
4, rue des hôpitaux (face aux urgences
Ibn Rochd Morizgo) - Casablanca
Tél : 05 22 22 22 42

S-CITAP® 5mg, 10mg et 20mg



Escitalopram oxalate)

LOT : KE90064

PER : JUL 2021

PPV : 193 DH 00

ment l'intégralité de cette notice avant de prendre ce
us pourriez avoir besoin de la relire.

tre question, si vous avez un doute, demandez plus
médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à
quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être
nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet
indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à
votre pharmacien.

1. Composition du médicament:

Escitalopram (sous forme escitalopram oxalate).....5mg, 10mg ou 20mg
Mannitol, Cellulose microcristalline, Croscarmellose sodique, Amidon de maïs,
Stéarate de magnésium, Opadry blanche, Eau purifiée q.s.p 1 comprimé

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

L'escitalopram est un antidépresseur/inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine
(ISRS).

3. Forme et présentation

S-CITAP 5mg, comprimés pelliculés. Boîtes de 20 et 30.
S-CITAP 10mg, comprimés pelliculés. Boîtes de 20, 30 et 60.
S-CITAP 20mg, comprimés pelliculés. Boîtes de 20 et 30.

4. Indications thérapeutiques :

- Traitement des épisodes dépressifs majeurs (caractérisés).
- Traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie.
- Traitement du trouble « anxiété sociale » (phobie sociale).
- Traitement du trouble anxiété généralisée.
- Traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

5. Posologie :

POSOLOGIE

Respectez toujours strictement les consignes données par votre médecin. En cas de
doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Adultes

Dépression

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de
20 mg par jour.

Trouble panique

La posologie initiale de S-CITAP au cours de la première semaine de traitement est de
5 mg par jour en une prise, puis une augmentation à 10 mg par jour est effectuée. La
posologie pourra être encore augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20
mg par jour.

Trouble anxiété sociale

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. Votre médecin pourra diminuer la posologie à 5 mg par jour ou l'augmenter
jusqu'à un maximum de 20 mg par jour, selon votre réponse au traitement.

Trouble anxiété généralisée

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de
20 mg par jour.

Troubles obsessionnels compulsifs

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de
20 mg par jour.

nécessaire.

- Si vous avez une quantité de sodium dans le sang diminuée.
- Si vous avez tendance à saigner ou à avoir des bleus facilement.
- Si vous recevez un traitement par électrochocs.
- Si vous présentez une maladie coronarienne.

Veuillez noter

Certains patients maniaco-dépressifs peuvent développer une phase maniaque. Elle se
caractérise par des idées inhabituelles et rapidement changeantes, une joie inappropriée
et une suractivité physique. Si vous ressentez cela, contactez votre médecin.
Des symptômes tels qu'une agitation ou des difficultés à rester assis ou debout
tranquilllement, peuvent aussi survenir durant les premières semaines du traitement.
Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez ces symptômes.

Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des
idées d'auto-agression (agression envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations
peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de
médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de
traitement.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre
médecin ou allez directement à l'hôpital.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes
dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette
notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou
votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans

L'utilisation de S-CITAP est déconseillée chez les enfants et adolescents de moins de
18 ans. Néanmoins, il est possible que votre médecin décide de prescrire S-CITAP à
des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient. Le
patient devra faire l'objet d'une surveillance attentive pour détecter l'apparition de
comportements de type suicidaire (tentatives de suicide et idées suicidaires) et de type
hostile (principalement agressivité, comportement d'opposition et colère). Ces effets
indésirables ont été plus fréquemment observés au cours des études cliniques chez les
enfants et adolescents traités par antidépresseurs.

Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît
ou s'aggrave lors de la prise de S-CITAP par un patient de moins de 18 ans.

9. Interactions médicamenteuses :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un
médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Si vous prenez un des médicaments suivants, dites-le à votre médecin:

- "Inhibiteurs non sélectifs de la monoamine oxydase (IMAOs)", contenant comme
principes actifs: de la phénelzine, de l'iproniazide, de l'isocarboxazide, du nialamide et
de la tranylcypromine. Si vous avez pris un de ces médicaments, un délai de 14 jours
est nécessaire entre l'arrêt de ces médicaments et le début du traitement par S-CITAP.
Après l'arrêt de S-CITAP, un délai de 7 jours est nécessaire avant le début du traitement
par un de ces médicaments.
- "Inhibiteurs sélectifs réversibles de la MAO-A" contenant du moclobémide (utilisé
dans le traitement de la dépression).
- "Inhibiteurs irréversibles de la MAO-B", contenant de la sélegiline (utilisée dans le
traitement de la maladie de Parkinson). Ceux-ci augmentent le risque de survenue
d'effets indésirables.
- Le linézolide (un antibiotique).
- Le lithium (utilisé dans le traitement des troubles maniaco-dépressifs) et le
tryptophane.
- L'imipramine et la désipramine (tous deux utilisés dans le traitement de la
dépression).
- Le sumatriptan et médicaments similaires (utilisés dans le traitement de la migraine)
et le tramadol (utilisé contre les douleurs sévères). Ceux-ci augmentent le risque de
survenue d'effets indésirables.
- La cimétidine et l'oméprazole (utilisés dans le traitement des ulcères de l'estomac), la
fluvoxamine (antidépresseur) et la ticlopidine (utilisée pour réduire le risque d'attaque
cérébrale). Ceux-ci peuvent entraîner une augmentation des concentrations sanguines
en S-CITAP.
- Le millepertuis (*Hypericum perforatum* - une préparation à base de plantes utilisée
dans la dépression).

S-CITAP® 5mg, 10mg et 20mg



Escitalopram oxalate)

LOT : KE90064

PER : JUL 2021

PPV : 193 DH 00

ment l'intégralité de cette notice avant de prendre ce
us pourriez avoir besoin de la relire.

tre question, si vous avez un doute, demandez plus
médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à
quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être
nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet
indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à
votre pharmacien.

1. Composition du médicament:

Escitalopram (sous forme escitalopram oxalate).....5mg, 10mg ou 20mg
Mannitol, Cellulose microcristalline, Croscarmellose sodique, Amidon de maïs,
Stéarate de magnésium, Opadry blanche, Eau purifiée q.s.p 1 comprimé

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

L'escitalopram est un antidépresseur/inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine
(ISRS).

3. Forme et présentation

S-CITAP 5mg, comprimés pelliculés. Boîtes de 20 et 30.
S-CITAP 10mg, comprimés pelliculés. Boîtes de 20, 30 et 60.
S-CITAP 20mg, comprimés pelliculés. Boîtes de 20 et 30.

4. Indications thérapeutiques :

- Traitement des épisodes dépressifs majeurs (caractérisés).
- Traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie.
- Traitement du trouble « anxiété sociale » (phobie sociale).
- Traitement du trouble anxiété généralisée.
- Traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

5. Posologie :

POSOLOGIE

Respectez toujours strictement les consignes données par votre médecin. En cas de
doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Adultes

Dépression

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de
20 mg par jour.

Trouble panique

La posologie initiale de S-CITAP au cours de la première semaine de traitement est de
5 mg par jour en une prise, puis une augmentation à 10 mg par jour est effectuée. La
posologie pourra être encore augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20
mg par jour.

Trouble anxiété sociale

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. Votre médecin pourra diminuer la posologie à 5 mg par jour ou l'augmenter
jusqu'à un maximum de 20 mg par jour, selon votre réponse au traitement.

Trouble anxiété généralisée

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de
20 mg par jour.

Troubles obsessionnels compulsifs

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de
20 mg par jour.

nécessaire.

- Si vous avez une quantité de sodium dans le sang diminuée.
- Si vous avez tendance à saigner ou à avoir des bleus facilement.
- Si vous recevez un traitement par électrochocs.
- Si vous présentez une maladie coronarienne.

Veuillez noter

Certains patients maniaco-dépressifs peuvent développer une phase maniaque. Elle se
caractérise par des idées inhabituelles et rapidement changeantes, une joie inappropriée
et une suractivité physique. Si vous ressentez cela, contactez votre médecin.
Des symptômes tels qu'une agitation ou des difficultés à rester assis ou debout
tranquilllement, peuvent aussi survenir durant les premières semaines du traitement.
Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez ces symptômes.

Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des
idées d'auto-agression (agression envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations
peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de
médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de
traitement.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre
médecin ou allez directement à l'hôpital.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes
dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette
notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou
votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans

L'utilisation de S-CITAP est déconseillée chez les enfants et adolescents de moins de
18 ans. Néanmoins, il est possible que votre médecin décide de prescrire S-CITAP à
des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient. Le
patient devra faire l'objet d'une surveillance attentive pour détecter l'apparition de
comportements de type suicidaire (tentatives de suicide et idées suicidaires) et de type
hostile (principalement agressivité, comportement d'opposition et colère). Ces effets
indésirables ont été plus fréquemment observés au cours des études cliniques chez les
enfants et adolescents traités par antidépresseurs.

Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît
ou s'aggrave lors de la prise de S-CITAP par un patient de moins de 18 ans.

9. Interactions médicamenteuses :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un
médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Si vous prenez un des médicaments suivants, dites-le à votre médecin:

- "Inhibiteurs non sélectifs de la monoamine oxydase (IMAOs)", contenant comme
principes actifs: de la phénelzine, de l'iproniazide, de l'isocarboxazide, du nialamide et
de la tranylcypromine. Si vous avez pris un de ces médicaments, un délai de 14 jours
est nécessaire entre l'arrêt de ces médicaments et le début du traitement par S-CITAP.
Après l'arrêt de S-CITAP, un délai de 7 jours est nécessaire avant le début du traitement
par un de ces médicaments.
- "Inhibiteurs sélectifs réversibles de la MAO-A" contenant du moclobémide (utilisé
dans le traitement de la dépression).
- "Inhibiteurs irréversibles de la MAO-B", contenant de la sélegiline (utilisée dans le
traitement de la maladie de Parkinson). Ceux-ci augmentent le risque de survenue
d'effets indésirables.
- Le linézolide (un antibiotique).
- Le lithium (utilisé dans le traitement des troubles maniaco-dépressifs) et le
tryptophane.
- L'imipramine et la désipramine (tous deux utilisés dans le traitement de la
dépression).
- Le sumatriptan et médicaments similaires (utilisés dans le traitement de la migraine)
et le tramadol (utilisé contre les douleurs sévères). Ceux-ci augmentent le risque de
survenue d'effets indésirables.
- La cimétidine et l'oméprazole (utilisés dans le traitement des ulcères de l'estomac), la
fluvoxamine (antidépresseur) et la ticlopidine (utilisée pour réduire le risque d'attaque
cérébrale). Ceux-ci peuvent entraîner une augmentation des concentrations sanguines
en S-CITAP.
- Le millepertuis (*Hypericum perforatum* - une préparation à base de plantes utilisée
dans la dépression).

S-CITAP® 5mg, 10mg et 20mg



Escitalopram oxalate)

LOT : KE90064

PER : JUL 2021

PPV : 193 DH 00

ment l'intégralité de cette notice avant de prendre ce
us pourriez avoir besoin de la relire.

tre question, si vous avez un doute, demandez plus
médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à
quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être
nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet
indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à
votre pharmacien.

1. Composition du médicament:

Escitalopram (sous forme escitalopram oxalate).....5mg, 10mg ou 20mg
Mannitol, Cellulose microcristalline, Croscarmellose sodique, Amidon de maïs,
Stéarate de magnésium, Opadry blanche, Eau purifiée q.s.p 1 comprimé

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

L'escitalopram est un antidépresseur/inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine
(ISRS).

3. Forme et présentation

S-CITAP 5mg, comprimés pelliculés. Boîtes de 20 et 30.
S-CITAP 10mg, comprimés pelliculés. Boîtes de 20, 30 et 60.
S-CITAP 20mg, comprimés pelliculés. Boîtes de 20 et 30.

4. Indications thérapeutiques :

- Traitement des épisodes dépressifs majeurs (caractérisés).
- Traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie.
- Traitement du trouble « anxiété sociale » (phobie sociale).
- Traitement du trouble anxiété généralisée.
- Traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

5. Posologie :

POSOLOGIE

Respectez toujours strictement les consignes données par votre médecin. En cas de
doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Adultes

Dépression

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de
20 mg par jour.

Trouble panique

La posologie initiale de S-CITAP au cours de la première semaine de traitement est de
5 mg par jour en une prise, puis une augmentation à 10 mg par jour est effectuée. La
posologie pourra être encore augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20
mg par jour.

Trouble anxiété sociale

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. Votre médecin pourra diminuer la posologie à 5 mg par jour ou l'augmenter
jusqu'à un maximum de 20 mg par jour, selon votre réponse au traitement.

Trouble anxiété généralisée

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de
20 mg par jour.

Troubles obsessionnels compulsifs

La posologie habituellement recommandée de S-CITAP est de 10 mg par jour en une
prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de
20 mg par jour.

nécessaire.

- Si vous avez une quantité de sodium dans le sang diminuée.
- Si vous avez tendance à saigner ou à avoir des bleus facilement.
- Si vous recevez un traitement par électrochocs.
- Si vous présentez une maladie coronarienne.

Veuillez noter

Certains patients maniaco-dépressifs peuvent développer une phase maniaque. Elle se
caractérise par des idées inhabituelles et rapidement changeantes, une joie inappropriée
et une suractivité physique. Si vous ressentez cela, contactez votre médecin.
Des symptômes tels qu'une agitation ou des difficultés à rester assis ou debout
tranquilllement, peuvent aussi survenir durant les premières semaines du traitement.
Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez ces symptômes.

Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des
idées d'auto-agression (agression envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations
peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de
médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de
traitement.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre
médecin ou allez directement à l'hôpital.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes
dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette
notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou
votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans

L'utilisation de S-CITAP est déconseillée chez les enfants et adolescents de moins de
18 ans. Néanmoins, il est possible que votre médecin décide de prescrire S-CITAP à
des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient. Le
patient devra faire l'objet d'une surveillance attentive pour détecter l'apparition de
comportements de type suicidaire (tentatives de suicide et idées suicidaires) et de type
hostile (principalement agressivité, comportement d'opposition et colère). Ces effets
indésirables ont été plus fréquemment observés au cours des études cliniques chez les
enfants et adolescents traités par antidépresseurs.

Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît
ou s'aggrave lors de la prise de S-CITAP par un patient de moins de 18 ans.

9. Interactions médicamenteuses :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un
médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Si vous prenez un des médicaments suivants, dites-le à votre médecin:

- "Inhibiteurs non sélectifs de la monoamine oxydase (IMAOs)", contenant comme
principes actifs: de la phénelzine, de l'iproniazide, de l'isocarboxazide, du nialamide et
de la tranylcypromine. Si vous avez pris un de ces médicaments, un délai de 14 jours
est nécessaire entre l'arrêt de ces médicaments et le début du traitement par S-CITAP.
Après l'arrêt de S-CITAP, un délai de 7 jours est nécessaire avant le début du traitement
par un de ces médicaments.
- "Inhibiteurs sélectifs réversibles de la MAO-A" contenant du moclobémide (utilisé
dans le traitement de la dépression).
- "Inhibiteurs irréversibles de la MAO-B", contenant de la sélegiline (utilisée dans le
traitement de la maladie de Parkinson). Ceux-ci augmentent le risque de survenue
d'effets indésirables.
- Le linézolide (un antibiotique).
- Le lithium (utilisé dans le traitement des troubles maniaco-dépressifs) et le
tryptophane.
- L'imipramine et la désipramine (tous deux utilisés dans le traitement de la
dépression).
- Le sumatriptan et médicaments similaires (utilisés dans le traitement de la migraine)
et le tramadol (utilisé contre les douleurs sévères). Ceux-ci augmentent le risque de
survenue d'effets indésirables.
- La cimétidine et l'oméprazole (utilisés dans le traitement des ulcères de l'estomac), la
fluvoxamine (antidépresseur) et la ticlopidine (utilisée pour réduire le risque d'attaque
cérébrale). Ceux-ci peuvent entraîner une augmentation des concentrations sanguines
en S-CITAP.
- Le millepertuis (*Hypericum perforatum* - une préparation à base de plantes utilisée
dans la dépression).

الجرعة، طريقة الاستعمال، تردد الاد

الجرعة:
يأخذ هذا الدواء دائمًا بالضبط حسب توصيات الطبيب سوف يقرر الجرعة التي تنا

يؤخذ أليز®

من طريق الفم فقط.

الم الأعصاب المحيطي والمركيزي، الـ

تناول عدد الكبسولات التي حددها الطبيب

الجرعة المعتادة، والتي تم تعديليها من أجلـ

ـ طبيب سوف يخبرك إذا كنت في حاجة إلىـ

ـ سنتناول أليز® مرتين في اليوم، وهذه مرة فيـ

ـ في حال كنت ستناول أليز® ثلاث مرات فيـ

ـ في فترة ما بعد الظهر ومرة واحدة فيـ

ـ إذا كنت تشعر بأن تأثير أليز® قوي جداً أوـ

ـ إذا كنت متired كبير في السن (أكثر من 5ـ

ـ بالكلىـ

ـ طبيب قد يصف وقت أخذـ أو جرعة مختـ

طريقة الاستعمال:

ـ عن طريق الفمـ

ـ تبلغ الكبسولة كلها مع الماءـ

مدة العلاج:

ـ يجب الانتهاء من الوصفة الطبيةـ

وتيرة استعمال هذا الدواء:

ـ يجب مواصلة تناول أليز® حتى يخبرك طبيبـ

ـ لا تتوقف عن العلاج بأليز® ما لم يخبرك طـ

ـ تريجياً على مدى لا يقل عن أسبوعـ

ـ بعد إيقاف العلاج الطويل الأداء أو القصيرـ

ـ الآثار اضطرابات النوم، الصداع، الغثيانـ

ـ التشنحات العصبية، الكتابة، الألم، التعرـ

ـ أشد عندما يؤخذ أليز® لفترة طويلةـ

ـ إذا كان لديك أسلة أخرى حول استعمالـ

موانع الاستعمال:

ـ لا يجب أخذـ

ـ إذا كان لديك حساسية للبريكابالين أو لأـ

ـ إذا كنت في شكل، استشر طبيبـ أو الصيدـ

الآثار الجانبية:

ـ مثل جميع الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يـ

ـ الجميع بشكل منهجـ

الآثار الجانبية الشائعة جداً والتيـ

ـ أشخاص مشار إليها أدناهـ

ـ والدورة، التعب، الصداعـ

أليز®

بريكابالين

ـ 75، 150 و 300 ملـ، علىـ 56 كبسولةـ

- ـ يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة فيـ هذه النشرةـ عـنـيـةـ قـبـلـ اـسـتـخـدـامـ هـذـاـ دـوـاءـ.
- ـ اـحـفـظـ بـهـذـهـ النـشـرـةـ قـدـ تـحـتـاجـ إـلـىـ قـرـاءـتـهـ مـرـةـ أـخـرـيـ.
 - ـ إـذـاـ كـانـتـ لـدـيـكـ أـسـلـةـ إـسـتـشـارـيـ طـبـيـ أوـ الصـيـدـلـيـ.
 - ـ تـمـ وـصـفـ هـذـاـ دـوـاءـ لـكـ فـلـاـ تـطـهـرـ لـلـآـخـرـيـ فـقـدـ يـبـرـ بـهـ حـتـىـ إـذـاـ كـانـواـ يـعـانـونـ مـنـ نـفـسـ الـأـعـراـضـ
 - ـ الـتـيـ تـعـانـيـ مـنـهـاـ.
 - ـ إـذـاـ تـنـاقـمـ أـيـ مـنـ الـأـعـراـضـ الـجـانـبـيـةـ أـوـ لـاحـظـ أـيـ أـثـارـ جـانـبـيـةـ غـيـرـ مـرـدـجـةـ فـيـ هـذـهـ النـشـرـةـ، يـرـجـيـ
 - ـ إـعـلـامـ طـبـيـ أوـ الصـيـدـلـيـ.

التركيب المولائي:

ـ التـكـوـينـ النـوـعـيـ وـالـكـمـيـ مـنـ المـادـةـ الـفـعـالـةـ لـكـ جـرـعـةـ وـاحـدـةـ:

ـ المـادـةـ الـفـعـالـةـ هـيـ الـبـرـيـكـاـبـالـيـنـ، كـلـ كـبـسـوـلـةـ تـحـتـويـ عـلـىـ 25ـ مـلـ، 75ـ مـلـ، 150ـ مـلـ أـوـ 300ـ مـلـ مـنـ

ـ الـبـرـيـكـاـبـالـيـنـ.

المكونات الأخرى هي:

ـ سـلـيـلـوـنـ مـيـكـرـوـكـيـسـتـالـيـنـ (ـنـوـعـ 102ـ)، نـشـاـ النـرـةـ، التـلـكـ، سـتـرـاتـ الـمـغـنـيـسـيـوـمـ.

المجموعة الدوائية العلاجية:

ـ يـتـنـتـيـ أـلـيـزـ إـلـىـ فـتـةـ مـنـ الـأـدـوـيـةـ مـسـتـخـدـمـةـ لـعـلـاجـ الـصـرـعـ، الـأـلـمـ الـاعـتـالـ الـعـصـبـيـ وـاضـطـرـابـ الـقـلـقـ

ـ الـعـمـمـ لـدـيـ الـبـالـغـينـ.

دوعـيـ الاستـعـمالـ:

يـسـتـعـمـلـ فـيـ عـلـاجـ:

ـ الـأـلـمـ الـاعـتـالـ الـعـصـبـيـ الـمـرـكـزـيـ: يـسـتـخـدـمـ أـلـيـزـ لـعـلـاجـ الـأـلـمـ الـمـسـتـقـرـ النـاجـمـ عـنـ تـلـفـ

ـ الـأـعـصـابـ، حـالـاتـ مـرـضـيـ مـخـلـفـةـ مـثـلـ السـكـرـيـ أوـ الـقـوـاءـ الـمـنـطـقـيـ يـمـكـنـ أـنـ تـحـدـ الـأـلـمـ الـأـعـصـابـ

ـ الـطـرـفـيـ، وـيمـكـنـ وـصـفـ هـذـاـ الـأـلـمـ كـشـعـرـ بـالـحـرـارـةـ، حـرـقـ، الـأـلـمـ مـتـكـرـ، وـخـرـ، طـعـنـ، الـأـلـمـ حـادـ، تـشـنجـ،

ـ وـجـعـ، إـحـسـانـ بـوـخـرـ خـفـيفـ، تـخـدـرـ، وـتـمـلـ، يـمـكـنـ أـيـضـاـنـ تـرـيـبـتـ الـأـلـمـ الـأـعـصـابـ الـطـرـفـيـ وـالـمـرـكـزـيـ مـعـ

ـ تـغـيـرـاتـ فـيـ الـمـزـاجـ، وـاضـطـرـابـ الـنـوـمـ، التـعـبـ، وـيمـكـنـ أـيـضـاـنـ لـهـ تـأـثـيرـ عـلـىـ السـيـرـ الـصـحـيـ

ـ وـالـاجـتـمـاعـيـ وـنـوـعـةـ الـحـيـاةـ مـعـومـاـ.

ـ الـصـرـعـ: يـسـتـخـدـمـ أـلـيـزـ لـعـلـاجـ نوعـ مـعـينـ مـنـ الـصـرـعـ (ـنـوـياتـ الـجـزـئـيـةـ مـعـ أوـ بـدـونـ تعـيمـ ثـانـويـ) لـدـيـ

ـ الـبـالـغـينـ، طـبـيـبـ سـوـفـ يـصـفـ لـكـ أـلـيـزـ لـمـسـاـعـدـةـ فـيـ عـلـاجـ الـصـرـعـ عـنـدـكـ، يـبـحـثـ أـنـ تـأـخـذـ أـلـيـزـ بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ الـعـلـاجـ الـحـالـيـ الـسـيـطـرـةـ

ـ تـأـخـذـ أـلـيـزـ وـحـدـهـ، وـلـكـ يـنـبـغـيـ دـائـمـاـنـ أـيـضـاـنـ يـؤـخـذـ فـيـ تـرـكـيـبـةـ مـعـ أـنـوـيـةـ الـعـلـاجـ الـمـضـادـ لـالـصـرـعـ الـأـخـرـيـ.

ـ اـضـطـرـابـ الـقـلـقـ الـعـمـمـ: يـسـتـخـدـمـ أـلـيـزـ لـعـلـاجـ اـضـطـرـابـ الـقـلـقـ الـعـمـمـ. اـعـرـاقـ الـقـلـقـ الـعـمـمـ هـيـ الـقـلـقـ

ـ الـأـلـفـرـقـاتـ طـوـلـيـةـ وـقـلـقـ يـصـبـعـ الـسـيـطـرـةـ عـلـيـهـ. الـقـلـقـ الـعـمـمـ يـمـكـنـ أـيـضـاـنـ يـسـبـبـ الـأـرـقـ وـشـعـورـ

ـ بـالـإـثـارـةـ أـوـ الـعـصـبـيـ، وـالـشـعـورـ بـالـتـعـبـ بـسـرـعـةـ، صـعـوبـةـ الـتـرـكـيزـ أـوـ ضـعـفـ الـذـاـكـرـةـ، التـهـيـيـجـ وـالـتـوـرـ

الجرعة، طريقة الاستعمال، تردد الاد

الجرعة:
يأخذ هذا الدواء دائمًا بالضبط حسب توصيات الطبيب سوف يقرر الجرعة التي تنا

يؤخذ أليز®

من طريق الفم فقط.

الم الأعصاب المحيطي والمركيزي، الـ

تناول عدد الكبسولات التي حددها الطبيب

الجرعة المعتادة، والتي تم تعديليها من أجلـ

طبيب سوف يخبرك إذا كنت في حاجة إلىـ

ستتناول أليز® مرتين في اليوم، وهذه مرة فيـ

في حال كنت ستتناول أليز® ثلاث مرات فيـ

في فترة ما بعد الظهر ومرة واحدة فيـ

إذا كنت تشعر بأن تأثير أليز® قوي جداً أوـ

إذا كنت متired كبير في السن (أكثر من 5

بالكلى).

طبيب قد يصف وقت أخذـ أو جرعة مختـ

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفمـ

تبليغ الكبسولة كلها مع الماءـ

مدة العلاج:

يجب الانتهاء من الوصفة الطبيةـ

وتيرة استعمال هذا الدواء:

يجب مواصلة تناول أليز® حتى يخبرك طبيبـ

لا تتوقف عن العلاج بأليز® ما لم يخبرك طـ

تريجيا على مدى لا يقل عن أسبوعـ

بعد إيقاف العلاج الطويل الأداء أو القصيرـ

الآثار اضطرابات النوم، الصداع، الغثيانـ

التشنجات العصبية، الكتابة، الألم، التعرـ

أشد عندما يؤخذ أليز® لفترة طويلةـ

إذا كان لديك أسلة أخرى حول استعمالـ

موانع الاستعمال:

لا يجب أخذـ

إذا كان لديك حساسية للبريكابالين أو لأـ

إذا كنت في شكل، استشر طبيبـ أو الصيدـ

الآثار الجانبية:

مثل جميع الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يـ

الجميع يشكل منهجـ

الآثار الجانبية الشائعة جداً والتيـ

أشخاص مشار إليها أدناهـ

ـالدوخة، الخمول، الصداعـ

أليز®

بريكابالين

ـ 75، 150 و 300 ملـ، علىـ 56 كبسولة

- يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواءـ
- احفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرىـ
 - إذا كانت لديك أية أسلة، استشر طبيبـ أو الصيدـ
 - تم وصف هذا الدواء لك فلا تطهـ للأخرين فقد يضر بهـ حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراضـ التي تعاني منهاـ
 - إذا تفاقمـ أيـ منـ الأعراضـ الجانبـيةـ أوـ لاحظـ أيـ آثارـ جانبـيةـ غيرـ مدرجةـ فيـ هذهـ النشرـةـ، يرجـيـ إعلامـ طـبيبـ أوـ الصـيدـليـ.

التركيب المولائي:

الكتـونـينـ النـوعـيـ والـكمـيـ منـ المـادـةـ الفـعـالـةـ لـكـلـ جـرـعـةـ وـاحـدـةـ:

المـادـةـ الفـعـالـةـ هيـ البرـيكـابـالـينـ، كلـ كـبـسـولـةـ تحتـويـ عـلـىـ 25ـ مـلـ، 75ـ مـلـ، 150ـ مـلـ أوـ 300ـ مـلـ منـ البرـيكـابـالـينـ.

المكونات الأخرى هيـ:

سلـيلـونـ مـيكـوكـريـستـالـينـ (نـوعـ 102ـ)، نـشاـ النـزـةـ، التـلـكـ، سـترـاتـ المـغـنـيـسيـوـمـ.

المجموعة الدوائية العلاجية:

يـنـتـفـيـ أـليـزـ إـلـىـ فـتـةـ مـنـ الـأـدـوـيـةـ الـمـسـتـخـدـمـةـ لـعـلـاجـ الـصـرـعـ، الـأـلـمـ الـاعـتـالـ العـصـبـيـ وـاضـطـرـابـ الـقـلـقـ

الـعـمـمـ لـدـىـ الـبـالـغـينـ.

دوعـيـ الاستـعـمالـ:

يـسـتـعـمـلـ فـيـ عـلـاجـ:

الـأـلـمـ الـاعـتـالـ الـعـصـبـيـ الـمـحـيـطـيـ الـمـرـكـزـيـ: يـسـتـخـدـمـ أـليـزـ لـعـلـاجـ الـأـلـمـ الـمـسـتـقـرـ النـاجـمـ عـنـ تـلـفـ

الـأـعـصـابـ، حـالـاتـ مـرـضـيـ مـخـلـفـةـ مـخـلـفـةـ مـثـلـ السـكـريـ أوـ القـوـاءـ الـمـنـطـقـيـ يـمـكـنـ أنـ تـحـدـ الـأـلـمـ الـأـعـصـابـ

الـطـرـفـيـةـ، وـيمـكـنـ وـصـفـ هـذـاـ الـأـلـمـ كـشـعـرـ بـالـحـرـارـةـ، حـرـقـ، الـأـلـمـ مـتـكـرـ، وـخـرـ، طـعنـ، الـأـلـمـ حـادـ، تـشـنجـ، وـجـعـ، إـحـسـانـ بـوـخـرـ خـفـيفـ، تـخـدـرـ، وـتـمـلـيـ، يـمـكـنـ أـيـضاـ تـرـيـبـتـ الـأـلـمـ الـأـعـصـابـ الـطـرـفـيـةـ الـمـرـكـزـيـ مـعـ

تـغـيـرـاتـ فـيـ الـمـزـاجـ، وـاضـطـرـابـ النـومـ، التـعبـ، وـيمـكـنـ أـيـضاـ تـأـثـيرـ عـلـىـ السـيـرـ الصـحـيـ وـالـاجـتمـاعـيـ وـنوـعـيـةـ الـحـيـاةـ مـعـومـاـ.

الـصـرـعـ: يـسـتـخـدـمـ أـليـزـ لـعـلـاجـ نوعـ مـعـينـ مـنـ الـصـرـعـ (الـتـوـيـاتـ الـجـزـئـيـةـ مـعـ أوـ بـدـونـ تـعـيمـ ثـانـويـ) لـدـىـ

الـبـالـغـينـ، طـبـيـبـ سـوـفـ يـصـفـ لـكـ أـليـزـ لـمـسـاـعـدـةـ فـيـ عـلـاجـ الـصـرـعـ عـنـدـكـ بـيـعـ أنـ تـأـخـذـ أـليـزـ بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ الـعـلـاجـ الـحـالـيـ الـمـسـتـرـطـيـ تـأـخـذـ أـليـزـ وـحـدـهـ، وـلـكـ يـنـبـغـيـ دـائـمـاـ أـنـ يـؤـخـدـ فـيـ تـرـكـيـبـ مـعـ أـنـوـيـةـ الـعـلـاجـ الـمـضـادـ لـالـصـرـعـ الـأـخـرـيـ.

اضـطـرـابـ الـقـلـقـ الـعـمـعـ: يـسـتـخـدـمـ أـليـزـ لـعـلـاجـ اـضـطـرـابـ الـقـلـقـ الـعـمـعـ. اـضـطـرـابـ الـقـلـقـ الـعـمـعـ يـمـكـنـ أـيـضاـ أـنـ يـسـبـبـ الـأـرـقـ وـشـعـورـ

بـالـأـفـرـاقـاتـ الـفـوـقـيـةـ الـوـقـيـعـيـةـ، وـالـشـعـورـ بـالـتـبـعـ بـسـرـعـةـ، صـعـوبـةـ الـتـرـكـيزـ أوـ ضـعـفـ الـذـاـكـرـةـ، التـبـيـعـ وـالـتـوـرـ

الجرعة، طريقة الاستعمال، تردد الاد

الجرعة:
يأخذ هذا الدواء دائمًا بالضبط حسب توصيات الطبيب سوف يقرر الجرعة التي تنا

يؤخذ أليز®

من طريق الفم فقط.

الم الأعصاب المحيطي والمركيزي، الـ

تناول عدد الكبسولات التي حددها الطبيب

الجرعة المعتادة، والتي تم تعديليها من أجلـ

ـ طبيب سوف يخبرك إذا كنت في حاجة إلىـ

ـ سنتناول أليز® مرتين في اليوم، وهذه مرة فيـ

ـ في حال كنت ستناول أليز® ثلاث مرات فيـ

ـ في فترة ما بعد الظهر ومرة واحدة فيـ

ـ إذا كنت تشعر بأن تأثير أليز® قوي جداً أوـ

ـ إذا كنت متired كبير في السن (أكثر من 5ـ

ـ بالكلىـ

ـ طبيب قد يصف وقت أخذـ أو جرعة مختـ

ـ طريقة الاستعمالـ

ـ عن طريق الفمـ

ـ تبلغ الكبسولة كلها مع الماءـ

ـ مدة العلاجـ

ـ يجب الانتظار للوصفة الطبيةـ

ـ وتيرة استعمال هذا الدواءـ

ـ يجب مواصلة تناول أليز® حتى يخبرك طبيبـ

ـ لا تتوقف عن العلاج بأليز® ما لم يخبرك طـ

ـ تريجياً على مدى لا يقل عن أسبوعـ

ـ بعد إيقاف العلاج الطويل الأداء أو القصيرـ

ـ الآثار اضطرابات النوم، الصداع، الغثيانـ

ـ التشنحات العصبية، الكتابة، الألم، التعرـ

ـ أشد عندما يؤخذ أليز® لفترة طويلةـ

ـ إذا كان لديك أسلة أخرى حول استعمالـ

ـ مواطن الاستعمالـ

ـ لا يجب أخذـ

ـ إذا كان لديك حساسية للبريكابالين أو لأـ

ـ إذا كنت في شكل، استشر طبيبـ أو الصيدـ

ـ الآثار الجانبيةـ

ـ مثل جميع الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يـ

ـ الجميع بشكل منهجـ

ـ الآثار الجانبية الشائعة جداـ والتيـ

ـ أشخاص مشار إليها أدناهـ

ـ والدورة، التعب، الصداعـ

أليز®

بريكابالين

ـ 75، 150 و 300 ملـ، علىـ 56 كبسولةـ

- ـ يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواءـ
- ـ احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرىـ
- ـ إذا كانت لديك أية أسلة، استشر طبيبـ أو الصيدـ
- ـ تم وصف هذا الدواء لك فلا تتطهـ للأخرين فقد يضر بهـ حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراضـ التي تعانـ منهاـ
- ـ إذا تفاقـ أيـ منـ الأعراضـ الجانبـيةـ أوـ لاحـظـ أيةـ آثارـ جانبـيةـ غيرـ مـرـدـجـةـ فيـ هـذـهـ النـشـرـةـ يـرجـيـ إـعـالـمـ طـبـيـبـ أوـ الصـيـدـلـيـ

التركيب المولائيـ:

ـ التـكـوـينـ النـوعـيـ وـالـكمـيـ منـ المـادـةـ الفـعـالـةـ لـكـلـ جـرـعـةـ وـاحـدـةـ

ـ المـادـةـ الفـعـالـةـ هيـ البرـيكـابـالـينـ، كلـ كـبـسـولـةـ تحتـويـ عـلـىـ 25ـ مـلـ، 75ـ مـلـ، 150ـ مـلـ أوـ 300ـ مـلـ منـ البرـيكـابـالـينـ.

المكونات الأخرىـ هيـ:

ـ سـليـلوـنـ مـيكـوكـريـستـالـلـينـ (ـنوـعـ 102ـ)، نـشاـ النـرـةـ، التـلـكـ، سـترـاتـ المـغـنـيـسيـوـمـ.

المجموعة الدوائية العلاجيةـ:

ـ يـنـتـفـيـ أـليـزـ إـلـىـ فـتـةـ مـنـ الـأـدـوـيـةـ الـمـسـتـخـدـمـةـ لـعـلـاجـ الـصـرـعـ، الـأـلـمـ الـاعـتـالـ العـصـبـيـ وـاضـطـرـابـ الـقـلـقـ

ـ الـعـمـمـ لـدـىـ الـبـالـغـينـ.

دـوـاعـيـ الـعـسـتـعـمـالـ:

يـسـتـعـمـلـ فـيـ عـلـاجـ:

ـ الـأـلـمـ الـاعـتـالـ الـعـصـبـيـ الـمـحـيـطـيـ الـمـرـكـزـيـ: يـسـتـخـدـمـ أـليـزـ لـعـلـاجـ الـأـلـمـ الـمـسـتـقـرـ النـاجـمـ عـنـ تـلـفـ

ـ الـأـعـصـابـ، حـالـاتـ مـرـضـيـ مـخـلـفـةـ مـخـلـفـةـ مـثـلـ السـكـريـ أوـ الـقـوـاءـ الـمـنـطـقـيـ يـمـكـنـ أنـ تـحـدـ الـأـلـمـ الـأـعـصـابـ

ـ الـطـرـفـيـةـ، وـيمـكـنـ وـصـفـ هـذـاـ الـأـلـمـ كـشـعـرـ بـالـحـرـارـةـ، حـرـقـ، الـأـلـمـ مـتـكـرـ، وـخـرـ، طـنـ، الـأـلـمـ حـادـ، تـشـنجـ، وـجـعـ، إـحـسـانـ بـوـخـرـ خـفـيفـ، تـخـدـرـ، وـتـمـلـ، يـمـكـنـ أـيـضـاـ تـنـرـيـتـ الـأـلـمـ الـأـعـصـابـ الـمـحـيـطـيـ الـمـرـكـزـيـ مـعـ

ـ تـغـيـرـاتـ فـيـ الـمـزـاجـ، وـاضـطـرـابـ النـومـ، التـعبـ، وـيمـكـنـ أـيـضـاـ تـأـثـيرـ عـلـىـ السـيـرـ الصـحـيـ وـالـاجـتمـاعـيـ وـنوـعـةـ الـحـيـاةـ مـعـومـاـ.

ـ الـصـرـعـ: يـسـتـخـدـمـ أـليـزـ لـعـلـاجـ نوعـ مـعـينـ مـنـ الـصـرـعـ (ـنوـيـاتـ الـجـزـئـيـةـ مـعـ أوـ بـدـونـ تـعـيمـ ثـانـويـ) لـدـىـ

ـ الـبـالـغـينـ، يـبـلـيـبـ سـوـفـ يـصـفـ لـكـ أـليـزـ لـلـمـسـاـعـدـةـ فـيـ عـلـاجـ الـصـرـعـ عـنـدـكـ يـبـحـثـ أـنـ تـأـخـذـ أـليـزـ بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ الـعـلـاجـ الـحـالـيـ الـمـسـتـرـطـةـ

ـ تـأـنـاـولـ أـليـزـ وـحـدـهـ، وـلـكـ يـنـبـغـيـ دـائـمـاـ أـنـ يـؤـخـدـ فـيـ تـرـكـيـبـةـ مـعـ أـنـوـيـةـ الـعـلـاجـ الـمـضـادـةـ لـالـصـرـعـ الـأـخـرـيـ

ـ اـضـطـرـابـ الـقـلـقـ الـعـمـعـ: يـسـتـخـدـمـ أـليـزـ لـعـلـاجـ اـضـطـرـابـ الـقـلـقـ الـعـمـعـ. اـعـرـاقـ الـقـلـقـ الـعـمـعـ هـيـ الـقـلـقـ

ـ الـفـرـقـ اـفـرـقـاتـ طـوـلـيـةـ وـقـلـقـ يـصـبـعـ الـسـيـرـةـ عـلـيـهـ. الـقـلـقـ الـعـمـعـ يـمـكـنـ أـيـضـاـ أـنـ يـسـبـبـ الـأـرـقـ وـشـعـورـ

ـ بـالـإـثـارـةـ أـوـ الـعـصـبـيـةـ، وـالـشـعـورـ بـالـتـعبـ بـسـرـعـةـ، صـعـوبـةـ الـتـرـكـيزـ أـوـ ضـعـفـ الـذـاـكـرـةـ، التـهـيـيـعـ وـالـتـوـرـ

MONOZECLAR® 500 mg

Tablets à libération modifiée (aztreonam)

Maphar

Km 10, Route Côtière 111,

Q1 Zenata Ain sebaa Casablanca

Monozelar 500 mg cp pel

Im b10 mv

P.P.V : 163,40 DH



6 118001 183838

ment cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des effets indésirables.

Si vous avez des questions, interrogez votre pharmacien.

Si vous avez été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que MONOZECLAR et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MONOZECLAR
3. Comment prendre MONOZECLAR
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver MONOZECLAR
6. Informations supplémentaires

vous continuiez à prendre les comprimés pendant toute la durée prescrite par le médecin, faute de quoi l'infection pourrait ne pas être complètement traitée et le problème pourrait réapparaître.

Utilisation chez les enfants

Il est possible que ces comprimés ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans, car ils sont difficiles à avaler. Il est donc préférable d'utiliser des médicaments liquides chez les enfants. Votre médecin prescrira un autre médicament adapté à votre enfant.

Si vous oubliez de prendre MONOZECLAR

Si vous oubliez de prendre un comprimé de MONOZECLAR, prenez-le dès que vous y pensez. Ne prenez pas plus de comprimés sur une journée que votre médecin ne vous l'a prescrit.

Si vous avez pris plus de MONOZECLAR que vous n'auriez dû

Si vous prenez accidentellement plus de deux comprimés de MONOZECLAR sur une journée, ou si un enfant avale des comprimés par accident, consultez un médecin d'urgence, même en l'absence de symptômes ou de problèmes. Il est probable qu'un surdosage de MONOZECLAR provoque des vomissements et des douleurs d'estomac, et il existe un risque de réactions allergiques. Si vous avez pris trop de MONOZECLAR, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).

4. QU'EST-CE QUE MONOZECLAR ET DANS QUELLES

CITM Clinique BADR

37, Rue Al Alloussi Bourgogne

092 / TP:35630123/ ICE: 001326100000037

F A C T U R E

N° : 202000270
Du : 31/01/2020

Nom patient : Mme AKIF HNIA

Médecin prescripteur ; DrSAM

Examens	Cotation(Z)	Prix Dhs
SONDAGE	1	200,00
PHARMACIE	0	100,00
Total		300,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :
TROIS CENTS DIRHAMS

CITM CLINIQUE BADR
35, Rue EL Alloussi Bourgogne
Casablanca Fax: 05 22 43 22 86
Tél.: 0522 49 28 00/0522 63 84



URGENCE 24/24

مصحة بدر

REANIMATION MÉDICO - CHIRURGICALE
CHIRURGIE VISCÉRALE
COELIO CHIRURGIE
NEURO - CHIRURGIE
CHIRURGIE VASCULAIRE
CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE
CHIRURGIE UROLOGIQUE - LITHO TRYPSIE
CHIRURGIE OTO-RHINO - LARYNGOLOGIQUE
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE
CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE ET ORTHOPÉDIQUE

Docteur :

Casablanca, le 31.01.20

Mr AKIF HENIA, a été
admis au Dr Lachgar
le 31.01.2020 pour la
Vésicule Verte. Face à la

CITM CLINIQUE BADR
35 Rue El Aloussi Bourgogne Casa
Tél.: 05 22 49 28 00 / 80 / 82 / 84
Fax: 05 22 49 23 86