

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducation.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc. Siège : 136, Imm. Faraj Rta, Bouskoura Sidi Maarouf II, Casablanca. Tél : 05 22 58 30 15. Fax : 05 21 22 28 15. www.willismupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-479219

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 07724

Société : RAM

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom :

BOUJAMAA JILALI

Date de naissance :

01/01/1957

Adresse :

ESAA da 1 N° 26 Sidi MAAROUF ouled HADJ
20130 Casablanca

Tél : 0666824145

Total des frais engagés : 2739180

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Fouad BENNAN
CARDIOLOGUE
136, Imm. Faraj Rta, Bouskoura Sidi Maarouf II
Tél 05 22 58 30 15 - Casablanca
GSM 06 61 15 98 81

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

BOUJAMAA JILALI

Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

HTA MUPRAS

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :

13 MARS 2020

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant detaille des Honoraires	Cachet et signature du Medecin attestant le Paiement des Actes
-----------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	--

02/03/20
C2
ECU
electrodp
caie
09 MARS 2020
Dr. Fouad BENNANI
CARDIOLOGUE
136, Imm. Faraj Rte. Bouskoura Sidi Maârouf III
2583015 - Casablanca
Tél: 05 22 58 30 15
GSM 06 61 15 98 81

EXECUTION DES SOINS

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant detaille des Honoraires
--	------	---------------------------------

Pharmacie H. Bazwi A. Essaada N°262 0522 22 76 0522 Casablanca
02/03/20
320,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Designation des Coefficients	Montant des Honoraires
---	------	------------------------------	------------------------

LABORATOIRE STAGNINI 0522 33 52 19 0668 15 24 24
Tél: 0522 33 52 71 - CASA
Fax: 0522 33 52 71 - CASA
Rd Pt: Sidi Maârouf III

13/9/8
13/9/8
LABORATOIRE STAGNINI 0522 33 52 19 0668 15 24 24
Tél: 0522 33 52 71 - CASA
Fax: 0522 33 52 71 - CASA
Rd Pt: Sidi Maârouf III

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant detaille des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

D.D.F. PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE		CCEFFICIENT DES TRAVAUX									
		<p>H</p> <table border="1"> <tr> <td>05523412</td> <td>01433553</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>05523411</td> <td>01433553</td> </tr> </table> <p>B</p>		05523412	01433553	00000000	00000000	00000000	00000000	05523411	01433553	<p>MONTANTS DES SOINS</p>	
		05523412	01433553										
		00000000	00000000										
		00000000	00000000										
05523411	01433553												
<p>(Création, remont, adjonction)</p> <p>Functional Therapeutic, necessary to the protection</p>		<p>DEBUT D'EXECUTION</p>											
<p>DATE DU DEVIS</p>		<p>FIN D'EXECUTION</p>											
<p>DATE DE L'EXECUTION</p>		<p>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS</p>											
<p>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION</p>		<p>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION</p>											

Docteur Fouad Bennani

CARDIOLOGUE

Maladies du coeur et des vaisseaux
Spécialiste de la Faculté de Médecine de Rouen
Explorations Cardio-Vasculaires
Echocardiographie-Holter
Epreuves d'Effort
C.E.S Médecine du Sport

Expert Assermente au près des Tribunaux



تور فولاد بناني

اختصاصي في أمراض القلب
خريج كلية الطب بفرنسا
فحص القلب و الشرايين
الطب الرياضي

خبير محلف لدى المحاكم

Casablanca, le 02 MARS 2020

M. Boujamaa Tilali

106/70 x3

Co. ricard 150/12,5

14/1

Surveillance

matin

+ Co-Med2au

50/12,5

320/110

Dr. Fouad BENNANI
CARDIOLOGUE

136, Imm. Fara, Kle. Bouskoura Sidi Maarouf II
Tél: 05 22 58 30 15 - Casablanca
GSM 06 61 15 98 81

Pharmacie Hay
Bazw Am
Essaada I N° 202 - 5
0522 97 22 70/452
Casablanca
arouf
25,63

Durée du traitement :
à revoir après

إقامة فرج 136، طريق بوسكورة سيدي معروف III - الدار البيضاء

CABINET : 136, Immeuble FARAJ, Route Bouskoura - Sidi Maarouf III - Tél : 05 22 58 30 15 - Gsm : 06 61 15 98 81

CO-MEDZAR® 50/12.5mg et 100/25mg;
Comprimé pelliculé
Boîte de 30
Losartan potassique et hydrochlorothiazide

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CO-MEDZAR® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CO-MEDZAR® ?
3. Comment utiliser CO-MEDZAR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CO-MEDZAR® ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE CO-MEDZAR® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

CO-MEDZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (Losartan hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le Losartan hydrochlorothiazide agit sur ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

CO-MEDZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CO-MEDZAR® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais CO-MEDZAR® :

- Si vous êtes allergique au Losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Suppléments).
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamides (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibiotiques, certains médicaments). Si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin.
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre CO-MEDZAR® en début de grossesse).
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle.

Précautions d'emploi - mises en garde spéciales

Faites attention avec CO-MEDZAR® :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière avant de prendre CO-MEDZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

CO-MEDZAR® est contre-indiqué en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique "Grossesse").

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre CO-MEDZAR® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue.
- Si vous prenez des diurétiques.
- Si vous faites un régime sans sel.
- Si vous avez eu avec ou des vomissements importants et/ou des diarrhées.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque.
- Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique "Ne prenez jamais CO-MEDZAR®").
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avez un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale.
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine (douleur thoracique due au fait d'une mauvaise fonction cardiaque).
- Si vous avez une sténose des valves aortiques ou mitrales (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaississement du muscle cardiaque).
- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez de la goutte.
- Si vous avez eu avec ou des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant des douleurs des articulations, un rash cutané et de la fièvre (pupus érythémateux disséminé).
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium.
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale ou si vous allez faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale que vous prenez du Losartan potassique et de l'hydrochlorothiazide.
- Si vous avez une hyperaldostéronisme primaire (un syndrome associé à une augmentation de la sécrétion d'aldostérone suite à une anomalie des glandes surrénales).
- Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskirine.

Enfants et adolescents

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de CO-MEDZAR® chez les enfants. Par conséquent, CO-MEDZAR® ne doit pas être donné aux enfants.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans CO-MEDZAR® peuvent interagir avec d'autres médicaments.

Les préparations à base de lithium ne doivent pas être prises simultanément avec CO-MEDZAR®. Des précautions particulières (telles que contrôles sanguins) peuvent être nécessaires si vous prenez simultanément de la lithium et CO-MEDZAR®.

Il est aussi important pour votre médecin de savoir si vous prenez :

- D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine,
- Des stéroïdes,
- Des médicaments pour le traitement du cancer,
- Des antalgiques,
- Des médicaments pour le traitement d'infections longues,
- Des médicaments contre l'arthrose.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.



3. COMMENT PRENDRE CO-MEDZAR®
Instructions pour un bon usage
Sans objet.

Posologie. Mode et/ou voie(s) d'administration. Fréquence d'administration.

Posologie

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute. Votre fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre CO-MEDZAR®.

Hypertension

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est de prendre CO-MEDZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou sécable à 1 comprimé par jour (soit 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou sécable à 1 comprimé par jour, soit 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé ou sécable à 1 comprimé par jour).

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou sécable :

En cas de surdosage, vous devez immédiatement consulter votre médecin ou votre pharmacien. Les symptômes les plus fréquents sont :

• une chute de la pression sanguine, des palpitations, un rash cutané et une déshydratation.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou sécable :

Essayez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou sécable à la dose suivante et prenez la dose suivante au moment habituel le lendemain.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'être responsable d'effets indésirables.

Si vous ressentez l'un des effets suivants, arrêtez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou sécable et consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Les effets indésirables les plus fréquents sont :

• une réaction allergique grave (urticaire cutanée, démangeaisons, gonflement des lèvres, de la gorge ou de la langue).

• C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'un patient sur 10 000 mais moins d'un patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin d'un traitement.

• Si vous ressentez l'un des effets suivants, arrêtez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou sécable et consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous ressentez l'un des effets suivants, arrêtez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou sécable et consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous ressentez l'un des effets suivants, arrêtez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou sécable et consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous ressentez l'un des effets suivants, arrêtez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou sécable et consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous ressentez l'un des effets suivants, arrêtez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou sécable et consultez votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous ressentez l'un des effets suivants, arrêtez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou sécable et consultez votre médecin ou votre pharmacien.

CO-MEDZAR® 50/12.5mg et 100/25mg;
Comprimé pelliculé
Boîte de 30
Losartan potassique et hydrochlorothiazide

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CO-MEDZAR® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CO-MEDZAR® ?
3. Comment utiliser CO-MEDZAR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CO-MEDZAR® ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE CO-MEDZAR® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

CO-MEDZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (Losartan hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le Losartan hydrochlorothiazide agit sur ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

CO-MEDZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CO-MEDZAR® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais CO-MEDZAR® :

- Si vous êtes allergique au Losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Suppléments).
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamides (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibiotiques, certains médicaments). Si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin.
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous avez une faible teneur en potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre CO-MEDZAR® en début de grossesse).
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle.

Précautions d'emploi - mises en garde spéciales

Faites attention avec CO-MEDZAR® :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière avant de prendre CO-MEDZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

CO-MEDZAR® est contre-indiqué en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique "Grossesse").

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre CO-MEDZAR® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue.
- Si vous prenez des diurétiques.
- Si vous faites un régime sans sel.
- Si vous avez eu avec ou des vomissements importants et/ou des diarrhées.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque.
- Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique "Ne prenez jamais CO-MEDZAR®").
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avez un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale.
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine (douleur thoracique due au fait d'une mauvaise fonction cardiaque).
- Si vous avez une sténose des valves aortiques ou mitrales (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaississement du muscle cardiaque).
- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez de la goutte.
- Si vous avez eu avec ou des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant des douleurs des articulations, un rash cutané et de la fièvre (pupus érythémateux disséminé).
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium.
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale ou si vous allez faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale que vous prenez du Losartan potassique et de l'hydrochlorothiazide.
- Si vous avez une hyperaldostéronisme primaire (un syndrome associé à une augmentation de la sécrétion d'aldostérone suite à une anomalie des glandes surrénales).
- Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskine.

Enfants et adolescents

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de CO-MEDZAR® chez les enfants. Par conséquent, CO-MEDZAR® ne doit pas être donné aux enfants.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans CO-MEDZAR® peuvent interagir avec d'autres médicaments.

Les préparations à base de lithium ne doivent pas être prises simultanément avec CO-MEDZAR®. Des précautions particulières (telles que contrôles sanguins) peuvent être nécessaires si vous prenez simultanément de la lithium et CO-MEDZAR®.

Il est aussi important pour votre médecin de savoir si vous prenez :

- D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine,
- Des stéroïdes,
- Des médicaments pour le traitement du cancer,
- Des antalgiques,
- Des médicaments pour le traitement d'infections longues,
- Des médicaments contre l'arthrose.

• Les médicaments contre l'asthme peuvent interférer avec l'effet de CO-MEDZAR®.



3. COMMENT PRENDRE CO-MEDZAR®
Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie. Mode et/ou voie(s) d'administration. Fréquence d'administration.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute. Votre fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre CO-MEDZAR®.

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est de prendre CO-MEDZAR® 50 mg/12.5 mg, comprimé pelliculé ou scellable à 1 comprimé par jour (soit 1 comprimé par jour de 2 comprimés par jour de CO-MEDZAR® 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé ou scellable).

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou scellable :

En cas de surdosage, vous devez immédiatement consulter votre médecin ou votre pharmacien. Les symptômes les plus fréquents sont la chute de la pression sanguine, des palpitations, un rash cutané et une déshydratation.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé ou scellable :

Essayez de prendre CO-MEDZAR® quotidiennement tel que prescrit, de dose double et prenez la dose suivante au moment habituel le lendemain.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables. Cependant, la plupart des effets indésirables sont bénins et disparaissent d'eux-mêmes.

Si vous ressentez l'un des effets suivants, arrêtez de prendre CO-MEDZAR® et contactez votre médecin ou votre pharmacien.

urgences de l'hôpital le plus proche :

• Une réaction allergique grave (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement des lèvres, de la langue ou de la gorge).

C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'un patient sur 10 000 mais moins d'un patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin d'un traitement.

Dr. Fouad BENNANI
CARDIOLOGUE

136, Imm. Faraj Rte. Bouskoura Sidi Maarouf III
Tél 05 22.58.30 15 - Casablanca
GSM 06 61 15 98 81

BILAN BIOLOGIQUE

Le :

02 MARS 2020

Nom / Prénom :

Benjamin Tila

Age :

Sexe : M ☐ F ☐

◆ **Groupe sanguin**

- ☐ Groupe
- ☐ Rhésus
- ☐ RAI
- ☐ Phénotype Rhésus
- ☐ Coombs Indirect
- ☐ Coombs direct

◆ **Hématologie/infectiologie**

- ☒ NFS
- ☒ Plaquette
- ☐ Electrophorèse de l'hémoglobine
- ☐ Réticulocytes
- ☐ VS
- ☐ CRP
- ☐ Procalcitonine

◆ **Bilan d'hémostase**

- ☐ TP
- ☐ INR
- ☐ TCK
- ☐ Fibrinogène
- ☐ D-Dimères

◆ **Bilan lipidique**

- ☒ Cholestérol total
- ☒ Cholestérol HDL
- ☒ Cholestérol LDL
- ☒ Triglycérides

◆ **Bilan glycémique**

- ☐ Glycémie à jeun
- ☐ Hyperglycémie provoquée
- ☐ Hémoglobine glyquée

◆ **Dr. Fouad BENNANI**
CARDIOLOGUE

136, Imm. Faraj Rte. Bouskoura Sidi Maarouf III
Tél 05 22.58.30 15 - Casablanca
GSM 06 61 15 98 81

Autres :

◆ **Ionogramme sanguin**

- ☐ Na+
- ☐ K+
- ☐ Cl-
- ☐ Calcium
- ☐ Réserve Alcaline
- ☐ Phosphore
- ☐ Magnésium
- ☐ Magnésium érythrocytaire
- ☐ Protéines
- ☐ Acide urique

◆ **Ionogramme urinaire**

- ☐ Diurèse
- ☐ Na+
- ☐ K+
- ☐ Ca
- ☐ Calcium
- ☐ Phosphore
- ☐ Urée

◆ **Fonction rénale**

- ☒ Urée
- ☒ Créatinine
- ☐ Clairance de la créatinine
- ☐ Protéinurie des 24h

◆ **Fonction hépatique et pancréatique**

- ☒ ASAT
- ☒ ALAT
- ☐ Phosphatase alcaline
- ☐ Gamma GT
- ☐ Bilirubine libre et conjuguée
- ☐ 5' Nucléotidase
- ☐ Amylase
- ☐ Lipase
- ☐ Electrophorèse des protéines

◆ **Examen des urines**

- ☐ ECBU
- ☐ ATB gramme
- ☐ Test de grossesse

◆ **Bilan hormonal**

- ☐ Prolactine
- ☐ FSH
- ☐ Estradiol
- ☐ BHCg
- ☐ T3
- ☐ T4
- ☐ TSH us

◆ **Sérologie et immunologie**

- ☐ VDRL
- ☐ TPHA
- ☐ Hépatite A
- ☒ Hépatite B:
 - ☐ Antigène Hbs
 - ☐ Antigène Hbe
 - ☐ Anticorps Anti Hbc
 - ☐ Anticorps Anti Hbs
 - ☐ Anticorps Anti Hbe
- ☐ Hépatite C
- ☐ ASLO

◆ **Examen des selles**

- ☐ Coprologie
- ☐ Parasitologie

◆ **Divers**

- ☒ PSA
- ☐ Phosphatase acide
- ☐ Vitamine D
- ☐ CPK
- ☐ Troponines
- ☐ BNP
- ☐ Pro BNP

TOTAL

Laboratoire d'Analyses Médicales

Sidi Maarouf

Facture

Casablanca, le 05/03/2020

Dossier N°: 050320-042 du: 05/03/2020

Médecin Dr : BENNANI

Patient :Mr BOUJAMAA Jilali

Analyse	Valeur en B	Montant
HEMOGRAMME : NFS + PLQ	80	107,20
CHOLESTEROL TOTAL	30	40,20
HDL-CHOLESTEROL	50	67,00
LDL- CHOLESTEROL	50	67,00
TRIGLYCERIDES	50	67,00
HEMOGLOBINE GLYQUEE A1C	100	134,00
UREE	30	40,20
CREATININE	30	40,20
SGOT/ASAT aspartate aminotransférase	50	67,00
SGPT/ALAT alanine-aminotransférase :	50	67,00
SEROLOGIE HEPATITE B: Antigène HBs	120	160,80
PSA Total	300	402,00
GLYCEMIE A JEUN	30	40,20
Prélèvement sang veineux	1	20,00
Total :		1 319,80

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
ICE. N°: 001681692000016
IF. N°: 40606866 - TP. N°: 36159885
CNSS. N°: 986124 - RC. N°: 410236

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
Tél.: 05 22 55 0668 15 24 24
Fax: 05 22 55 0668 15 24 24
Sidi Maarouf - Casablanca - Maroc



مختبر التحليلات الطبية سيدي معروف

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SIDI MAAROUF

Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie

Dr. Ghizlane HADDIOUI
Médecin Biologiste

Casablanca, le 05/03/2020

Code Patient : 14-04857

Compte rendu d'analyses

Dossier N° : 050320-042 Pvt du: 05/03/2020 10:22

Nom : Mr BOUJAMAA Jilali

Demandé par Dr : BENNANI



Page : 1/4

ANALYSES D'HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME : NFS + PLQ
(SYSMEX XS 500i)

Valeurs Usuelles

Antériorité

Globules rouges	:	4,94	10 ⁶ /mm ³	(4,2 - 5,8)	4,83 (03/07/19)
Hémoglobine	:	14,70	g/dl	(12,5 - 18)	14,20 (03/07/19)
Hématocrite	:	42,60	%	(40 - 52)	42,50 (03/07/19)
VGM	:	86,23	fL	(80 - 95)	87,99 (03/07/19)
TCMH	:	29,76	pg	(27 - 33)	29,40 (03/07/19)
CCMH	:	34,51	g/dl	(32 - 36)	33,41 (03/07/19)
Globules blancs	:	5020	/mm ³	(4000 - 10000)	5410 (03/07/19)
Formule sanguine	:				
Neutrophiles	:	26,3 %	1320 /mm ³	(1500 - 7000)	1109 (03/07/19)
Lymphocytes	:	55,4 %	2781 /mm ³	(1000 - 4000)	3349 (03/07/19)
Monocytes	:	13,5 %	678 /mm ³	(40 - 1200)	649 (03/07/19)
Eosinophiles	:	4,4 %	221 /mm ³	(Inférieur à 400)	271 (03/07/19)
Basophiles	:	0,4 %	20 /mm ³	(Inférieur à 150)	32 (03/07/19)
Plaquettes	:	120000	/mm ³	(150000 - 400000)	162000 (03/07/19)

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
Dr G HADDIOUI
Médecin Biologiste
Rd. Pt Sidi Maarouf - Casablanca
Tél: 0522 33 52 09 / 0668 15 24 24
Fax: 0522 33 52 71



مختبر التحليلات الطبية سيدي معروف

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SIDI MAAROUF

Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie

Dr. Ghizlane HADDIOU
M. BOUJAMAA Jilali

Dossier N° : 050320-042

Page : 2/4

ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)


GLYCEMIE A JEUN
(Méthode enzymatique à l'hexokinase)

: 1,07 g/l
5,89 mmol/l

Valeurs Usuelles

(0,7 - 1,1)
(3,85 - 6,05)

Antériorité



HÉMOGLOBINE GLYQUÉE :
(HPLC D10-Biorad)

: 6,2 %

(4,5 - 6,3)

5,8 (03/07/19)

6,0 (06/05/19)

Les valeurs usuelles sont de 4,5 à 6,3 % lorsque les glycémies sont normales.
Les études ont montré que le diabète est :

- * bien équilibré lorsque le taux est inférieur à 6,5 %
- * moyennement lorsqu'il est entre 6,5 et 7,5 %
- * mal équilibré au-delà de 8 %

UREE

(Technique enzymatique à l'uréase UV))

: 0,22 g/l
3,67 mmol/l

(0,15 - 0,5)
(2,5 - 8,33)

0,34 (03/07/19)

0,23 (14/12/17)

0,38 (26/05/15)

CREATININE

(Tech enzymatique colorimétrique)

: 7,43 mg/l
65,76 µmol/l

(6 - 13)
(53,1 - 115,05)

9,84 (03/07/19)

7,40 (14/12/17)

9,10 (26/05/15)

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
Dr G HADDIOU
Médecin Biologiste
Rd.Pt Sidi Maarouf - Casablanca
Tél: 0522 33 52 09 / 0668 15 24 24
Fax: 0522 33 52 71



مختبر التحليلات الطبية سيدي معروف

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SIDI MAAROUF

Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie

Dr. Ghizlane HADDIOUI

Médecin Biologiste

Mr BOUJAMAA Jilali

Dossier N° : 050320-042

Page : 4/4

ANALYSES D'IMMUNOLOGIE-SEROLOGIE

SEROLOGIE HEPATITE B: Antigène HBs

(Tech. immunoenzymatique, Access2 Beckman Coulter)

Résultat : POSITIF

Titre : 1012,86

Interprétation:

< 1,20 : Négatif
> ou = 1,20 : Positif

Résultat contrôlé

MARQUEURS PROSTATIQUES

PSA Total

(Technique immunoenzymatique Access2 Beckman Coulter)

: 2,30 ng/ml

Valeurs Usuelles

Antériorité

1,88 (03/07/19)

1,63 (14/12/17)

Valeurs usuelles

< à 40 ans : 0.21 - 1.75 ng/ml
40 à 49ans : 0.27 - 4.00 ng/ml
50 à 59ans : 0.27 - 4.00ng/ml
60 à 69ans : 0.22 - 6.20 ng/ml
> à 69 ans : 0.21 - 6.80 ng/ml

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
Dr. GHADDIOUI
Médecin Biologiste
Rd.Pt Sidi Maarouf - Casablanca
Tél: 0522 33 52 09 / 0668 15 24 24
Fax: 0522 33 52 71



مختبر التحليلات الطبية سيدي معروف

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SIDI MAAROUF

Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie

Dr. Ghizlane HADDIOUI

Médecin Biologiste

Mr BOUJAMAA Jilali

Dossier N° : 050320-042

Page : 3/4

ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)

CHOLESTEROL TOTAL
(Tech enzymatique colorimétrique au CHOD)


: 1,62 g/l
4,18 mmol/l

Valeurs Usuelles

(Inférieur à 2,2)

(Inférieur à 5,16)

Antériorité



Suivi de CHOLESTEROL TOTAL

HDL-CHOLESTEROL
(Dosage enzymatique direct oxydase/PEG)

: 0,49 g/l
1,25 mmol/l

(Supérieur à 0,4)

(Supérieur à 1,05)

0,44 (03/07/19)

0,44 (14/12/17)

0,51 (21/10/14)

LDL-CHOLESTEROL

(calcul: formule de Friedwald pour les valeurs de triglycérides < 3,4 g/l)

: 0,92 g/l
2,36 mmol/l

(Inférieur à 1,5)

(Inférieur à 3,89)

0,89 (03/07/19)

0,90 (14/12/17)

1,12 (21/10/14)

Valeurs souhaitables du LDL-Cholestérol (g/l) en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire*
Selon l'AFSSAPS:

- Présence de 0 à 1 facteur de risque

: LDL < 1.6

- Présence de 2 facteurs de risque ou plus

: LDL < 1.3

- Présence d'antécédents de maladies cardiovasculaires

: LDL < 1

*Selon l'AFSSAPS, les facteurs de risque sont : l'âge, les antécédents familiaux de maladie coronaire précoce, le tabagisme, l'HTA, diabète type de type 2 et HDL < 0.40g/l

TRIGLYCERIDES
(Enzymatique)

: 1,03 g/l
1,17 mmol/l

(Inférieur à 1,5)

(Inférieur à 1,71)

0,84 (03/07/19)

1,12 (14/12/17)

0,63 (21/10/14)

SGOT/ASAT aspartate-aminotransférase

(Tech. cinétique IFCC)

: 40 UI/l

(Inférieur à 40)

47 (14/12/17)

SGPT/ALAT alanine-aminotransférase :

(Techn. cinétique IFCC)

: 37 UI/l

(Inférieur à 45)

63 (14/12/17)

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
Dr G. HADDIOUI
Médecin Biologiste
Rd. Pt. Sidi Maarouf - Casablanca
Tél: 0522 33 52 09 / 0668 15 24 24
Fax: 0522 33 52 71

Docteur Fouad Bennani

CARDIOLOGUE

136 ,Im.Faraj ,Rte Bouskoura

Sidi Maarouf III . CASA

05 .22.58.30.13/15

ICE : 001868613000059

Casa le 09/03/2020

NOTE D'HONORAIRE

Je soussignée, **Dr. FOUAD BENNANI**, Médecin cardiologue, certifié

Avoir reçu de Mr BOUJAMAA JILALI

La somme de MILLE CENT DIRHAMS pour

CONSULTATION+ECG= 300.00DHS

LE 02/03/2020

ECHODOPPLER CARDIAQUE=800.00DHS

SOIT UN TOTAL DE 1100.00 DIRHAMS

Dr. FOUAD BENNANI

Cardiologue

Dr. Fouad BENNANI
CARDIOLOGUE
136, Imm. Faraj Rte. Bouskoura Sidi Maarouf III
Tél. 05-22.58.30.15 - Casablanca
GSM 06-61-15-98-81



Casablanca, le : 09 /03 //2020

COMPTE RENDU D'ÉCHOCARDIOGRAPHIE DOPPLER COULEUR

MR BOUJAMAA JILALI

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

HTA-MRECORDIALGIES

COMPTE RENDU :

- *Ventricule gauche : de taille normale. DTD= 56 mm DTS= 34 mm
FR=39 %*
- *Cinétique segmentaire et globale du VG est homogène (FE estimée à 69 %).*
- *Absence d'Hypertrophie des parois du Ventricule gauche.*
- *Oreillette gauche non dilatée. S.OG= 16 CM2 libre de thrombus par voie trans-thoracique .*
- *Valves mitrales souples d'ouverture normale , et appareil sous valvulaire non calcifié. IM minime.*
- *Sigmoïdes aortiques souples, de cinétique et d'ouverture normales, absence d'insuffisance aortique au doppler couleur et pas de rétrécissement aortique.*
- *La racine de l'aorte ascendante non dilatée.*
- *Flux tricuspide normal.*
- *Les dimensions des cavités cardiaques droites sont normales, avec une fonction VD conservée. TAPSE= 25 mm.*
- *Les valves pulmonaires ont une écho-structure normale.*
- *Le péricarde est sec et fin .*

CONCLUSION :

- **LES CAVITES CARDIAQUES SONT DE TAILLE NORMALES.**
- **LA FONCTION SYSTOLIQUE GLOBALE DU VG EST PRESERVEE.**
- **ABSENCE D'HVG.**
- **LA FONCTION SYSTOLIQUE GLOBALE DU VD EST CORRECTE .**

Dr. Fouad BENNANI
CARDIOLOGUE

136, Imm. Faraj Rte. Bouskoura Sidi Maarouf III
Tél. 05 22.58.30 15 - Casablanca
GSM 06 61 15 98 81

Dr. F.BENNANI
Cardiologue

Dr. Fouad BENNANI
CARDIOLOGUE

136, Imm. Faraj Rte. Bouskoura Sidi Maarouf III
Tél. 05 22.58.30 15 - Casablanca
GSM 06 61 15 98 81

20/ 3/ 2 9:07 1.6s FC=60
35/50Hz 10mm/mV 25mm/s



20/ 3/ 2 9:07 1.6s FC=62
35/50Hz 10mm/mV 25mm/s



ECG: M

Dr. Fouad BENNANI
CARDIOLOGUE
136 km Faraj Rte. Bouskoura Sidi Maarouf III
Tél 05 22 58 30 15 - Casablanca
GSM 06 61 15 98 81

20 / 3 / 2 9:06 1.6s FC=63
35/50Hz 10mm/mV 25mm/s



20 / 3 / 2 9:06 1.6s FC=57
35/50Hz 10mm/mV 25mm/s

