

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/03/20	£		2000 Dhs	Dr. Abdellah LAKMAL Chirurgien Urologue 291, Bd. El Fida Casablanca Tél 022 83 37 86

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie Nationale DIOURI 306, Bd. El Fida - CASABLANCA 022.28.12.96</i>	09/10/88	815,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F		DETERMINATION DU COEFFICIENT		

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Chirurgien Urologue ,

Maladies et chirurgie des Reins, des Voies

Urinaires et Génitales

Exploitations et Chirurgie Endoscopique

Impuissance Sexuellement et Stérilité Masculine

Maladies Sexuellement Transmissibles

Circoncision et Enuresie chez l'enfant

Echographie

Ancien Chirurgien des Hôpitaux Militaires



طبيب مختص في :

أمراض وجراحة الكلى المسالك البولية
والتناسلية

فحص وجراحة المسالك البولية بالمنظار
العقم والعجز الجنسي عند الرجل

الأمراض التناسلية
الختان والتبيؤ الإرادي عند الطفل

الفحص بالصدى الصوتي

جراح اختصاصي سابق بالمستشفيات العسكرية

Casablanca Le :

09/03/2020

ALGHAFI
el Nekki

89.00x3
- Votre - 200 > SV
an / T rd 201

117.00x9
- Invasion V 25 SV
an x265 rd 3 mos

62.70x2
- Angin - ver nn SV
an ca 5 x 2/5 rd 3 mos

✓ 815.60

Pharmacie Nationale
DIOURI
396, Bd. El Fida - CASABLANCA
Tél. 022.28.12.96

Dr. Abdellah LAKMAL
Chirurgien Urologue
291, Bd EL Fida Casablanca
Tel: 0522 83 37 86

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



47,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre Proviron.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne. Si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez une réaction allergique, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme d'androgène (hormone masculine).

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement suffisamment d'androgènes (hormones masculines).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à des taux insuffisants d'hormones masculines (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes-cibles qui dépendent des hormones masculines.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans Proviron (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



47,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne. Si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez une réaction allergique, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme d'androgène (hormone masculine).

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement suffisamment d'androgènes (hormones masculines).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à des taux insuffisants d'hormones masculines (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes-cibles qui dépendent des hormones masculines.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans Proviron (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



47,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre Proviron.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne. Si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez une réaction allergique, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme d'androgène (hormone masculine).

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement suffisamment d'androgènes (hormones masculines).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à des taux insuffisants d'hormones masculines (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes-cibles qui dépendent des hormones masculines.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans Proviron (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



47,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre Proviron.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne. Si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez une réaction allergique, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme d'androgène (hormone masculine).

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement suffisamment d'androgènes (hormones masculines).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à des taux insuffisants d'hormones masculines (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes-cibles qui dépendent des hormones masculines.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans Proviron (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



47,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne. Si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez une réaction allergique, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme d'androgène (hormone masculine).

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement suffisamment d'androgènes (hormones masculines).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à des taux insuffisants d'hormones masculines (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes-cibles qui dépendent des hormones masculines.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans Proviron (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



47,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne. Si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez une réaction allergique, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme d'androgène (hormone masculine).

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement suffisamment d'androgènes (hormones masculines).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à des taux insuffisants d'hormones masculines (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes-cibles qui dépendent des hormones masculines.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans Proviron (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



47,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre Proviron.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne. Si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez une réaction allergique, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme d'androgène (hormone masculine).

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement suffisamment d'androgènes (hormones masculines).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à des taux insuffisants d'hormones masculines (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes-cibles qui dépendent des hormones masculines.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans Proviron (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



47,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne. Si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez une réaction allergique, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme d'androgène (hormone masculine).

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement suffisamment d'androgènes (hormones masculines).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à des taux insuffisants d'hormones masculines (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes-cibles qui dépendent des hormones masculines.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans Proviron (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



47,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre Proviron.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne. Si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez une réaction allergique, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme d'androgène (hormone masculine).

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement suffisamment d'androgènes (hormones masculines).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à des taux insuffisants d'hormones masculines (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes-cibles qui dépendent des hormones masculines.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans Proviron (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

arginine veyron

Arginine chlorhydrate

FORME ET PRÉSENTATIONS :

Solution buvable :

Flacons de 125 ml et 250 ml.

Ampoules buvables de 5 ml, boîte de 20.

COMPOSITION :

Solution buvable

- Flacon :

Chlorhydrate de L(+) Arginine

Excipient qsp

- Ampoule buvable :

Chlorhydrate de L (+) Arginine

Excipient qsp

Excipient à effet notoire : Parahydroxybenzoate de sodium

PROPRIETES :

Antiasthénique et hépatotrope : apport d'acide aminé.

INDICATIONS :

Utilisé dans :

- Le traitement symptomatique de l'asthénie fonctionnelle.
- Le traitement des symptômes fonctionnels d'activité spécifique actuellement démontrée.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas administrer en cas d'obstruction des voies respiratoires graves;

- En cas de diabète ou de régime hypoglucidique,

- En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, ...

EFFETS INDESIRABLES :

Risque de diarrhée à forte dose.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

Comme pour tout traitement antiasthénique, la prescription sera de courte durée.

A diluer avec de l'eau.

Adultes :

La posologie varie de 3 à 6 g par jour, soit 3 à 6 ampoules buvables ou 1 à 2 cuillères à soupe de solution buvable en flacon.

Enfants : 2 à 3 ampoules buvables par jour.

Nourrissons : 1 ampoule buvable par jour.

Solution
buvable

Arginine
Veyron

NOVOPHARMA
UT.AV
MINI 22
LOT 547
P.P.V
62-70

LABORATOIRES PIERRE FABRE MÉDICAMENT

Fabriqué par les laboratoires Novopharma

arginine veyron

Arginine chlorhydrate

FORME ET PRÉSENTATIONS :

Solution buvable :

Flacons de 125 ml et 250 ml.

Ampoules buvables de 5 ml, boîte de 20.

COMPOSITION :

Solution buvable

- Flacon :

Chlorhydrate de L(+) Arginine

Excipient qsp

- Ampoule buvable :

Chlorhydrate de L (+) Arginine

Excipient qsp

Excipient à effet notoire : Parahydroxybenzoate de sodium

PROPRIETES :

Antiasthénique et hépatotrope : apport d'acide aminé.

INDICATIONS :

Utilisé dans :

- Le traitement symptomatique de l'asthénie fonctionnelle.
- Le traitement des symptômes fonctionnels d'activité spécifique actuellement démontrée.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas administrer en cas d'obstruction des voies respiratoires graves;

- En cas de diabète ou de régime hypoglucidique,

- En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, ...

EFFETS INDESIRABLES :

Risque de diarrhée à forte dose.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

Comme pour tout traitement antiasthénique, la prescription sera de courte durée.

A diluer avec de l'eau.

Adultes :

La posologie varie de 3 à 6 g par jour, soit 3 à 6 ampoules buvables ou 1 à 2 cuillères à soupe de solution buvable en flacon.

Enfants : 2 à 3 ampoules buvables par jour.

Nourrissons : 1 ampoule buvable par jour.

Solution
buvable

Arginine
Veyron

NOVOPHARMA
UT.AV
MINI 22
LOT 547
P.P.V
62-70

LABORATOIRES PIERRE FABRE MÉDICAMENT

Fabriqué par les laboratoires Novopharma



Pfizer

89,00

COMPOSITION QUALITATIVE ET C

Doxycycline monohydratée
Quantité correspondant à doxycycline anti
Excipient : stéarate de magnésium, silice
pour un comprimé sécable de

FORME ET PRÉSENTATION

Comprimé sécable, boîte de 8 comprimés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antibiotiques de la famille des tétracyclines.
(J : anti-infectieux).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Infections à germes sensibles aux tétracyclines, dans leurs manifestations respiratoires, génitales, urinaires, oculaires ou générales.

Acné.

ATTENTION !**DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie au tétracycline ;
- l'emploi de ce médicament est à éviter chez l'enfant de moins de huit ans (risque de coloration permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire) ;
- association avec les rétinoïdes administrés par voie orale (médicaments utilisés dans certaines maladies de la peau).

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ pendant les deuxième et troisième trimestres de votre grossesse.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En raison des risques de sensibilisation à la lumière, il est conseillé d'éviter de s'exposer directement au soleil et aux rayons ultraviolets pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées, à type de rougeur.

Prendre les comprimés au cours des repas.

Prévenir votre médecin en cas d'insuffisance rénale ou hépatique (foie).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament doit être administré à distance des antiacides et des sels de fer (par exemple à deux heures d'intervalle).

L'association avec les rétinoïdes par voie orale est contre-indiquée.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant le premier trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant les deuxième et troisième trimestres de votre grossesse.

Si votre médecin vous prescrit ce médicament, l'allaitement est déconseillé.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT (POSÉLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION)

Posologie : Se conformer à la prescription du médecin traitant.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

LOT N°: 2-9418

UT.AV: 0 2 2 P.P.V 8 9 0 0

09366050/4



Pfizer

89,00

COMPOSITION QUALITATIVE ET C

Doxycycline monohydratée
Quantité correspondant à doxycycline anti
Excipient : stéarate de magnésium, silice
pour un comprimé sécable de

FORME ET PRÉSENTATION

Comprimé sécable, boîte de 8 comprimés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antibiotiques de la famille des tétracyclines.
(J : anti-infectieux).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Infections à germes sensibles aux tétracyclines, dans leurs manifestations respiratoires, génitales, urinaires, oculaires ou générales.

Acné.

ATTENTION !**DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie au tétracycline ;
- l'emploi de ce médicament est à éviter chez l'enfant de moins de huit ans (risque de coloration permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire) ;
- association avec les rétinoïdes administrés par voie orale (médicaments utilisés dans certaines maladies de la peau).

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ pendant les deuxième et troisième trimestres de votre grossesse.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En raison des risques de sensibilisation à la lumière, il est conseillé d'éviter de s'exposer directement au soleil et aux rayons ultraviolets pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées, à type de rougeur.

Prendre les comprimés au cours des repas.

Prévenir votre médecin en cas d'insuffisance rénale ou hépatique (foie).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament doit être administré à distance des antiacides et des sels de fer (par exemple à deux heures d'intervalle).

L'association avec les rétinoïdes par voie orale est contre-indiquée.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant le premier trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant les deuxième et troisième trimestres de votre grossesse.

Si votre médecin vous prescrit ce médicament, l'allaitement est déconseillé.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT (POSÉOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION)

Posologie : Se conformer à la prescription du médecin traitant.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

LOT N°: 2-9418

UT.AV: 0 2 2 P.P.V 8 9 0 0

09366050/4



Pfizer

89,00

COMPOSITION QUALITATIVE ET C

Doxycycline monohydratée
Quantité correspondant à doxycycline anti
Excipient : stéarate de magnésium, silice
pour un comprimé sécable de

FORME ET PRÉSENTATION

Comprimé sécable, boîte de 8 comprimés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antibiotiques de la famille des tétracyclines.
(J : anti-infectieux).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Infections à germes sensibles aux tétracyclines, dans leurs manifestations respiratoires, génitales, urinaires, oculaires ou générales.

Acné.

ATTENTION !**DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie au tétracycline ;
- l'emploi de ce médicament est à éviter chez l'enfant de moins de huit ans (risque de coloration permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire) ;
- association avec les rétinoïdes administrés par voie orale (médicaments utilisés dans certaines maladies de la peau).

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ pendant les deuxième et troisième trimestres de votre grossesse.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En raison des risques de sensibilisation à la lumière, il est conseillé d'éviter de s'exposer directement au soleil et aux rayons ultraviolets pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées, à type de rougeur.

Prendre les comprimés au cours des repas.

Prévenir votre médecin en cas d'insuffisance rénale ou hépatique (foie).

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament doit être administré à distance des antiacides et des sels de fer (par exemple à deux heures d'intervalle).

L'association avec les rétinoïdes par voie orale est contre-indiquée.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant le premier trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant les deuxième et troisième trimestres de votre grossesse.

Si votre médecin vous prescrit ce médicament, l'allaitement est déconseillé.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT (POSÉLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION)

Posologie : Se conformer à la prescription du médecin traitant.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

LOT N°: 2-9418

UT.AV: 0 2 2 P.P.V 8 9 0 0

09366050/4