

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

ND: 25 170

Déclaration de Maladie : N° P19-0019698

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2405 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KAHLI Abdellah

Date de naissance : 15/11/53

Adresse : Lot OMARIA Rue 37 N° 17 Aïn Chok CASA

Tél. : 06 69 70 16 44

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 2, 5, 2020

Nom et prénom du malade : MAOUHOUB

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Diabète







En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/01/2020	CS		500	DAIKOU A DOCTOR MOGUE 2021-06-14 RAH 15-10-2021 A RETE
14/01/2020	CS		250	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	10/03/2019	88,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DR. KADIR BILAL 0522 52 52 29</i>	03/03/20	B360 Fr	500 DH



AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	$ \begin{array}{r rr} H & 25533412 & 21433552 \\ \hline D & 00000000 & 00000000 \\ & 00000000 & 00000000 \\ & 35533411 & 11433553 \\ \hline B & & \\ G & & \end{array} $ <p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur MIKOU Abdelhaq

Diplômé de la faculté de Médecine de Toulouse

Spécialiste en

Endocrinologie - Diabète

Maladies de la nutrition

الدكتور ميكو عبد الحق

خريج كلية الطب بتولوز

اختصاصي في

أمراض الغدد، مرض السكر

السمنة وأمراض الكوليسترول

بالموعد

Obésité - Maigreur - Maladies du Cholestérol

- Goitre -

Sur Rendez-vous

Membre de :

- SFD

Société Francophone du Diabète

- EASD

Association Européenne pour l'Etude du Diabète

- MGSD

Groupe Méditerranéen pour l'Etude du Diabète

Casablanca, le 10 MARS 2020

Mikou Abdhaq

60,40



Amarel 2mg

1x10

BD

28,0

Shampooing 100ml

1x2



T.

88,40



Dr MIKOU A.
ENDOCRINOLOGIE DIABÈTE
39, BD. RAHAL EL MESKINI - CASA
TEL: 05 22 31 16 30 - FAX: 05 22 31 06 74

39, شارع رحال المسكيني - الطابق (2) - الدار البيضاء - الهاتف (عيادة): 05 22 31 16 30 - هاتف و فاكس: 74 : 06 05 22 31 16 30
39, Bd Rahal El Meskini - 2^{ème} étage - Casablanca - Tél. : 05 22 31 16 30 - Tel./Fax : 05 22 31 06 74
e-mail:famillemikou@gmail.com

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride

Comprimé

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la quantité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIME ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfamethoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et rideau musculaire) ;

- en cas de coma diabétique ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déhydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modifiés
- prise d'alcool
- fonctions
- maladie
- si vous avez une maladie de la thyroïde
- consommation de tabac
- prise de certains médicaments

• si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement. Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesses.
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angine de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter : un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine) ;
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et longiques (tétracyclines, chloramphénicol, fluconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques, tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

AMAREL 2MG

CP B30

P.P.V : 60DH40



REF : 962000
LOT : 96031

**Emprise pelliculé, boîte de 30
de metformine.**

À cette notice avant de prendre
ent les informations sur l'acidose
que **« Avertissement et précautions »**,
car besoin de la relire.
demander votre médecin ou votre

llement prescrit. Ne le donner jamais à
métformine identiques, cela pourrait lui
est indésirable, parlez-en à votre médecin
ne aussi à tout effet indésirable qui ne
se. Voir rubrique 4.

LOT 191918
EXP 12/2022
PPV 28.00DH

ng, comprimé pelliculé et dans quels cas

connaitre avant de prendre
pelliculé ?
SE 1000mg, comprimé pelliculé ?
éventuels ?

AGE 1000 mg, comprimé pelliculé ?

SE 1000mg, comprimé pelliculé ET DANS

Formine. C'est un médicament utilisé pour
la classe de médicaments appelés les

par le pancréas et permettant à votre
cre) qui est dans le sang. Votre corps utilise
gic ou le stocke pour l'utiliser plus tard.
tre pancréas ne produit pas suffisamment
s capable d'utiliser correctement l'insuline
ux de glucose élevé dans votre sang.
ser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un

GLUCOPHAGE

niveau aussi normal que possible.
Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de GLUCOPHAGE à long terme
permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au
diabète. Glucophage est associé à une stabilité pondérale ou une
modeste perte de poids.

GLUCOPHAGE est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (Aussi appelé «
diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice
physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin ; il est
particulièrement utilisé chez les patients en surpoids.

Les patients adultes pourront prendre GLUCOPHAGE seul ou avec d'autres
médicaments contre le diabète (des médicaments à avaler ou de l'insuline).
Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre
GLUCOPHAGE seul ou avec l'insuline.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE
PRENDRE GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé ?**

Contre-indications

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres
composants contenus dans ce médicament (voir « Ce que contient
GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé ») dans la rubrique 6.

- Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux (débit de filtration

glomérulaire inférieur à 45 mL/min).

- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une
hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées,
de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou
d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une
accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et
qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus
particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde.
Une envie de dormir ou une halèine ayant une odeur fruitée inhabituelle.

- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une
diarrhée persistante ou sévère ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée.
La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous
mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons
ou des bronches, ou une infection des reins.

Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui
peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir à Avertissements et
précautions).

- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si
vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves
problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des
difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène
des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir «

Avertissement et précautions »).

- Si vous consommez beaucoup d'alcool.

Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de
commencer à prendre ce médicament.

VEUILZ DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN SI :

- Vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait
nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre
circulation sanguine.

- Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure.

Vous devez arrêter de prendre GLUCOPHAGE un certain temps avant et
après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin
décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement
pendant cette rénovation.

Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Précautions d'emploi ; mise en garde spéciales

Avertissement et précautions

VEUILZ NOTER LE RISQUE PARTICULIÈRE SUivant L'ACIDOSIS LACTIQUE
GLUCOPHAGE peut provoquer une complication très rare, mais très grave
appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas
correctement. Le risque de développer une acidose lactique est également
accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de
consommation d'alcool, de perte de liquides organiques (déshydratation)
liée à des fortes diarrhées ou à des vomissements, de problèmes hépatiques
et d'affections médicales dans lesquelles une partie du corps est privée
d'oxygène (telles que maladies cardiaques aiguës graves).

Il est important de respecter la prise de votre traitement, des règles
diététiques et la pratique d'un exercice physique régulier car cela peut
réduire le risque d'acidose lactique.

L'acidose lactique peut apparaître de manière subtile et les symptômes être
non spécifique comme des vomissements, des maux de ventre (douleurs
abdominales) avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général
avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Parmi les autres
symptômes, on peut noter une baisse de la température corporelle et du
rythme cardiaque. Si vous ressentez ce ou ces symptômes, vous devez
consulter immédiatement un médecin car l'acidose lactique peut conduire à
un coma. Arrêtez tout de suite de prendre GLUCOPHAGE et contactez
immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

GLUCOPHAGE à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre
dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez GLUCOPHAGE en
même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent
engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémants,
l'insuline, les méglitinides), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez
des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une
augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des
troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger
quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Interactions avec d'autres médicaments.

Autre médicament et GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé.

Si vous devez recevoir une injection de produit de contraste à base d'iode
dans votre circulation sanguine, par exemple pour un examen
radiographique ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage
un certain temps avant l'examen et au moins 48 heures après l'examen (voir «
Veillez à demander conseil à votre médecin » ci-dessus).

Prévez votre médecin si vous prenez Glucophage en même temps que
l'un des médicaments suivants. Il pourra alors être nécessaire de contrôler
plus souvent votre glycémie ou d'ajuster la dose de Glucophage :

- Diurétiques (utilisés pour éliminer une partie de l'eau de l'organisme en
augmentant la production d'urine).

- Agonistes des récepteurs bêta-2 adrénergiques comme le salbutamol ou la
terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).

- Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des
inflammations sévères de la peau ou l'asthme).

- Autre médicaments utilisés pour traiter le diabète.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avec
récentement pris, ou pourrez prendre tout autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons

GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons.
Ne consommez pas d'alcool pendant que vous prenez ce médicament.
L'alcool peut augmenter les risques d'acidose lactique, particulièrement si
votre foie est défaillant ou si vous êtes en sous-nutrition. Ceci s'applique
également aux médicaments contenant de l'alcool.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement
Pendant la grossesse, vous avez besoin d'insuline pour traiter votre diabète.
Informez votre médecin si vous êtes enceinte, pensez l'être ou prévoyez de
l'être, afin qu'il/elle puisse modifier votre traitement.

Ce médicament n'est pas recommandé si vous allaitez votre enfant ou si
vous avez l'intention de le faire.

Sportifs

Sans objet.

Sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

GLUCOPHAGE à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie.

Docteur MIKOU Abdelhaq

Diplômé de la faculté de Médecine de Toulouse

Spécialiste en

Endocrinologie - Diabète

Maladies de la nutrition

Obésité - Maigreur - Maladies du Cholestérol

- Goitre -

Sur Rendez-vous

Membre de :

- SFD

Société Francophone du Diabète

- EASD

Association Européenne pour l'Etude du Diabète

- MGSD

Groupe Méditerranéen pour l'Etude du Diabète

Casablanca, le

الدكتور ميكو عبد الحق

خريج كلية الطب بتولوز

اختصاصي في

أمراض الغدد، مرض السكر

السمنة و أمراض الكوليسترول

بالموعد

2-3-2012

Mikou Hous Nafat

Obesite
Hypertension
Diabète
Maladie de Cholst. & Triglycerides
Folliculite

MIKOU A.
ENDOCRINOLOGIE DIABETE
39, BD. RAHAL EL MESKINI - CASA
Tél. : 05 22 31 16 30 - Tél./Fax : 05 22 31 06 74
e-mail: famillemikou@gmail.com

39، شارع رحال المسكيني - الطابق (2) - الدار البيضاء - الهاتف (عيادة) : 05 22 31 16 30 - هاتف و فاكس : 05 22 31 06 74
39, Bd Rahal El Meskini - 2^{ème} étage - Casablanca - Tél. : 05 22 31 16 30 - Tél./Fax : 05 22 31 06 74
e-mail:famillemikou@gmail.com



الدكتور (الناور) محمد

• أخصائي في التحاليلات الطبية

مختبر التحاليلات الطبية بانورامايك

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostique Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris V
Ex. Attaché des Hôpitaux de France

Dossier ouvert le : 03/03/20..

Prélèvement effectué à 09:07

Mme MAOUHOUB NAJAT
Docteur ABDELHAK MIKOU
Dossier N° :20C204

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE COMPLETE

				Valeurs de référence	
				(Femme Adulte)	
HEMATOCRITE	: 37,4	%			35 - 47
HEMOGLOBINE	: 13,5	g/100			12 - 16
GLOBULES ROUGES	: 4,19	M/mm ³			4 - 5,4
CONSTANTES ERYTHROCYTAIRES					
V.G.M.	: 89	fl			85 - 100
T.G.M.	: 32	pg			27 - 33
C.C.M.H.	: 36	%			31 - 36
* GLOBULES BLANCS	: 10 520	/mm ³			4000 - 10000
FORMULE LEUCOCYTAIRE					
* P. NEUTROPHILES (PNN)	: 43,9	%	soit	4 618	/mm ³ 50 - 70 %
P. EOSINOPHILES (PNE)	: 1,2	%	soit	126	/mm ³ 2500 - 7125 /mm ³
P. BASOPHILES (PNB)	: 0,6	%	soit	63	/mm ³ 1 - 3 % 50 - 285 /mm ³
* LYMPHOCYTES	: 45,9	%	soit	4 829	/mm ³ < 1 % 25 - 40 %
MONOCYTES	: 8,4	%	soit	884	/mm ³ 1000 - 3800 /mm ³ 3 - 10 %
PLAQUETTES	: 328 000	/mm ³			150 - 665 /mm ³ 150000 - 400000

BIOCHIMIE

* GLYCEMIE (à jeûn)	: 1,83	g/l		0,7 - 1,1
Soit :	10,20	mmol/l		3,9 - 6,1

HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE : 7,60 %

Technique HPLC(BIORAD D-10)

Interpretation des résultats selon la standardisation du NGSP

- HbA1c entre 4 et 6 % : intervalle non diabétique normale
- HbA1c inférieur à 6,5 % : excellent équilibre glycémique(DNID)
- HbA1c inférieur à 7 % : excellent équilibre glycémique(DID)
- HbA1c supérieur à 7 % : action corrective suggérée

LABORATOIRE PANORAMIQUE
D'ANALYSES MEDICALES
Dr. KADIRI Mohamed
Tél : 05 22 52 29 61 / 05 22 87 50 47

شارع بانورامايك، زاوية شارع 2 مارس - عين الشق - الدار البيضاء
197, Bd Panoramique, Angle Bd 2 Mars - Ain Chock - Casablanca

الفاكس : 05 22 52 26 59 | الهاتف : 05 22 52 29 61 | Fax : 05 22 87 50 47

Patente : 34033937 - LE : 51360060 - CNSS : 6070445 - ICF : 201711573



مختبر التحاليل الطبية بانوراميك

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

الدكتور (الناور) محمد
أخصائي في التحاليل الطبية

Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostique Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris V
Ex. Attaché des Hôpitaux de France

Dossier ouvert le : 03/03/20.
Prélèvement effectué à 09:07

Mme MAOUHOUB NAJAT
Docteur ABDELHAK MIKOU
Dossier N° :20C204

EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE(EAL)

CHOLESTEROL TOTAL	:	1,95	g/l	< 2,2
	Soit :	5,03	mmol/l	< 5,676
TRIGLYCERIDES	:	1,07	g/l	0,4 - 1,65
	Soit :	1,22	mmol/l	0,46 - 1,88
CREATININE	:	8,16	mg/l	5 - 11
	Soit :	72	μmol/l	44,25 - 97,35
UREE	:	0,29	g/l	0,1 - 0,5
	Soit :	4,83	mmol/l	1,67 - 8,33

LABORATOIRE PANORAMIQUE
D'ANALYSES MEDICALES
Dr. KADIRI
Biologiste
Tél. : 05 22 52 29 61 / 05 22 87 50 47



(الدكتور (النواري) محمد
أخصائي في التحاليل الطبية

مختبر التحاليل الطبية بانوراميك

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostique Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris
Ex. Attaché des Hôpitaux de France

Facture N° : 11609
Casablanca le 3 mars 2020
A l'attention de : **Mme MAOUHOUB NAJAT**

Analyses :

Numération formule complète -----	B	80
Glycémie (a jeun) -----	B	30
Hémoglobine glycosylée -----	B	100
Cholestérol total -----	B	30
Triglycérides -----	B	60
Créatinine sanguine -----	B	30
Urée -----	B	30

Prélèvements :

Sang----- Pc 1,5

Total dossier : 500,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Cinq Cents Dirhams

LABORATOIRE PANORAMIQUE
D'ANALYSES MEDICALES
Dr. KADIRI Mohamed
Tél : 05 22 52 29 61