

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Optique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº P19- 0044118

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2176 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : R.A.M BOUCHAIB

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR. APPADIM AZZEDINE
Cardiologue

Date de consultation : 12/03/2020

Nom et prénom du malade : Rami Boulaib Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : HTN

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie Nº P19-044118

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/03/2016	Acte	15 CC	250,00	Le Médecin a été payé pour les actes mentionnés ci-dessus.

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <i>[Handwritten signature over the stamp]</i>	12.03.2022	753,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553
	B

(Création, remont, adjonction)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'E

وصفة
ORDONNANCE

LOT : 20E008
PER : 07/2021

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70


6 118001 081189

le 12/3/2021

Mr Rami Bouchnib

84,80 x 3

M Dugue S

35,7 x 3

Kundegic

97,60 x 3

Cambodia

99,00

ades 2

= 53,30

~~S.V~~

Att du 03 mn)

LOT : 20E008
PER : 07/2021

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70


6 118001 081189



LOT : 19E003
PER : 04/2021

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70


6 118001 081189

Dr. ABBAS M. MAZZEDINE
Cardiologue

PREZAR®

Losartan 50 mg

Comprimé pelliculé sécable, Boîtes de 14 et 30

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même pourra lui être nécessaire.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans la notice ou à votre pharmacien.

Composition du médicament :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium,

ET OYL-S-28908 (white)

Liste des excipients à effet notable : Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de la substance P (SP), qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs, vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale, une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

Indications thérapeutiques :

PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie $\geq 0,5\text{ g}/\text{j}$ (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'angiotsénosynthétase (IEC - médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaississement du ventricule gauche, PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration:

Veuillez toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Tous les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable sans l'avoir de votre médecin.

Veuillez toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrira, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha-bloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation du losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

Contre-indications :

- Ne prenez jamais PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable :
 - Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
 - Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois [Il est également préférable de grossesse - voir rubrique "Grossesse"].
 - Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
 - Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous l'alcérolisez.

Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir

l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable si vous le sentez.

Allergie sévère (éruption cutanée, démangeaisons, urticaire ou à respirer).

Cardiopathie grave pouvant survenir chez plus d'un patient sur 1000.

Les suivants ont été rapportés avec PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable :

ession artérielle (particulièrement après doses élevées de diurétiques),

les liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle.

dans le sang (hypoglycémie), dans le sang (hyperkaliémie),

à fonction rénale, y compris insuffisance rénale, nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

réduite dans le sang, de la créatinine et du potassium.

autres :

maux de tête, Troubles du sommeil,

Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

Essoufflement (dyspnée),

Douleurs abdominales, Constipations opiniâtres,

Diarrhée, Nausées,

Vomissements, Éruption (urticaire),

Démodécoses (prurit),

Éruption cutanée, Gonflement localisé (œdème),

Toux.

Rares :

Hypersensibilité, Angio-oedème,

Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite) incluant purpura, Endoumeissement ou piqûrement (paresthesies),

Évanouissement (syncope),

Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

Atteinte cérébrale (AVC),

Inflammation du foie (hépatite),

Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALT), qui peut être

Fréquence indéterminée :

Diminution du nombre de plaquettes, Migraine,

Anomalies de la fonction hépatique, Douleurs musculaires et articulaires,

Syndrome pseudo-grippal, Douleur dorsale et infection urinaire,

Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (de la coloration de la peau), Impuissance,

Inflammation du pancréas (pancréatite), Toux bas de dos dans le sang (hypotonie),

Dépression, Sensation générale de malaise, Tintement, bourdonnement, grondement ou cloquement dans les oreilles, Troubles du goût (dysguesie).

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés.

Mises en garde spéciales et Précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes suspecté d'être) enceinte ou si vous êtes déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte ou si vous êtes allaitant. Il est important d'enlever votre médicament avant de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

Si vous avez déjà eu un angio-oedème (gonflement du visage, des yeux, de la bouche ou de la gorge),

Si vous avez eu des vomissements importants ou des diarrhées,

Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent la

sais) sans pourtant conduire à une perte importante de liquide et de

PREZAR®

Losartan 50 mg

Comprimé pelliculé sécable, Boîtes de 14 et 30

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même pourra lui être nécessaire.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans la notice ou à votre pharmacien.

Composition du médicament :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium,

ET OYL-S-28908 (white)

Liste des excipients à effet notable : Lactose.

Classe pharmaco-thérapeutique :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de la substance P (SP), qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs, vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale, une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

Indications thérapeutiques :

PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie $\geq 0,5\text{ g}/\text{j}$ (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'angiotsénosynthétase (IEC - médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaississement du ventricule gauche, PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration:

Veuillez toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Tous les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable sans l'avoir de votre médecin.

Veuillez toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable aussi longtemps que votre médecin vous le prescrira, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha-bloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable).

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation du losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

Contre-indications :

- Ne prenez jamais PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable :
 - Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
 - Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois [Il est également préférable de grossesse - voir rubrique "Grossesse"].
 - Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
 - Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous l'alcérolisez.

Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir

l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable si vous le sentez.

Allergie sévère (éruption cutanée, démangeaisons, urticaire ou à respirer).

Cardiopathie grave pouvant survenir chez plus d'un patient sur 1000.

Les suivants ont été rapportés avec PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable :

ession artérielle (particulièrement après doses élevées de diurétiques),

les liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle.

dans le sang (hypoglycémie), dans le sang (hyperkaliémie),

à fonction rénale, y compris insuffisance rénale, nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

réduite dans le sang, de la créatinine et du potassium

transferts :

maux de tête, Troubles du sommeil,

Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

Essoufflement (dyspnée),

Douleurs abdominales, Constipations opiniâtres,

Diarrhée, Nausées,

Vomissements, Éruption (urticaire),

Démodécoses (prurit),

Éruption cutanée, Gonflement localisé (œdème),

Toux.

Rares :

Hypersensibilité, Angio-oedème,

Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite) incluant purpura, Endoumeissement ou piqûres (paresthesies),

Évanouissement (syncope),

Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

Atteinte cérébrale (AVC), Inflammation du foie (hépatite),

Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALT), qui peut être importante.

Fréquence indéterminée :

Diminution du nombre de plaquettes, Migraine,

Anomalies de la fonction hépatique, Douleurs musculaires et articulaires,

Syndrome pseudo-grippal, Douleur dorsale et infection urinaire, Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

Douleur musculaire inexplicable avec des urines fortes (de la peau), Impuissance,

Inflammation du pancréas (pancréatite), Taux bas de sodium dans le sang (hypotonie),

Dépression, Sensation générale de malaise, Tintement, bourdonnement, grondement ou cloquement dans les oreilles, Troubles du goût (dysguesie).

Les effets indésirables chez les enfants sont identiques à ceux rapportés.

Mises en garde spéciales et Précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes suspecté d'être) enceinte ou si vous êtes déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois [Il est également préférable de grossesse - voir rubrique "Grossesse"].

Il est important d'éviter votre médicament avant de prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

Si vous avez déjà eu un angio-oedème (gonflement du visage, des yeux, de la tête ou de la gorge),

Si vous avez eu des vomissements importants ou des diarrhées,

Si vous prenez des diurétiques (médicaments qui augmentent la perte d'eau)

et de la sueur.

OEDES® 20 mg

Microgranules gastro-résistants en gélules

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
- Si l'un des effets indésirables n'a pas été mentionné dans la liste ci-dessous, il peut toutefois être présent.

DÉNOMINATION DÉJÀ CONNUE :

OEDES® 20 mg

COMPOSITION :

Chaque gélule contient :

Excipients : qsp 1 g

FORME PHARMACEUTIQUE :

Microgranules gastro-résistants en gélule

CLASSE PHARMACOLOGIQUE :

Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule contient une substance appelée oméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications :

Adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcèreuse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- œsophagite érosive ou ulcéратive symptomatique par reflux gastro-œsophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

Enfant à partir de 1 an :

- œsophagite érosive ou ulcératrice symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Contre-indications :

Ne prenez jamais Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule:

- En cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

LOT 191337

EXP 04/2022

PPV 99.00 DH