

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Alali Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Alali Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tel : 05 20 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie
Nº P19- 0045942

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Matricule : 1467

26682
Société : RAM - MUPRAS

Actif Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MOUIMEN BRAHIM

Date de naissance : 01.06.1954

Adresse : NR.121 lot. DLD. HARES HAY Moulay Rachid
Casa

Tél. : 0664941231

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 29/04/2020

Nom et prénom du malade : MOUIMEN BRAHIM Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Corona

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa

Le : 29/04/2020

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie

Nº P19-045942

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 1467

Nom de l'adhérent(e) : MOUIMEN

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/11/2020	51 CCG	51	250,-	Dr. Mohamed AITAOUI Cardiologue France Ville - Oasi Tel: 0522980706

250,-

AIRES
Cachet et signature du Médecin
attestant le Paiement des Arres

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	29/4/2020	1419,70

1419, 70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MÉDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORL.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
	25533412
	00000000
D	
	00000000
	35533411
	11433553

[Création, remont, adjonction] Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



مصحة أمراض القلب الدار البيضاء - الوازيس CLINIQUE Cardiologique Casa-Oasis

Cardiologie / Cardiologie Interventionnelle / Radiologie Vasculaire Interventionnelle

Chirurgie Cardio Vasculaire et Thoracique

Coro-Scanner / 128 barrettes

1 23/04/2022.

الدكتور محمد علاوي

Dr. Mohamed ALLAOUI

CARDIOLOGUE

DES de Cardiologie
et

Pathologie Vasculaire
de la Faculté
de

Médecine de PARIS

Ancien Interne
des

Hôpitaux de NANCY

Membre de la Société
Française de Cardiologie

نـ Asmaa Benhici

(278.00x3) SV

1). Cofaxix

15

(57.80x3) 148

2). Torve 10

15

(58.10x3) 148

3). Lopid 5

15

(49.50x3) 148

4). Nonotil 2

15

89.50

5). Diflaz

15

148 4 25 (مـ سـ)
(ـ سـ مـ سـ).

T = 1419.70

Dr. Mohamed ALLAOUI

20, Rue France Ville - Oasis
Casa - Tél: 0522 98 07 06

20, Rue France Ville - Oasis
CASA - OASIS
CLINIQUE CARDIOLOGIQUE
Tél: 0522 98 07 06 / 0522 98 07 06 / 0522 98 07 06

20, زنقة فرنس فيل - الوازيس - الدار البيضاء 20000 CASABLANCA

Tél. : 05 22 98 75 75 / 05 22 98 07 06 / 05 22 99 49 72 - Fax : 05 22 98 83 25 - GSM : 06 72 29 45 14 - 06 72 29 47 13 - 06 72 29 48 72

E-mail : clinique_cardiologique@hotmail.com - Patente : 34788311 - C.N.S.S : 7379622 - I.F. : 01006967 - I.C.E : 001750502000084

N° Cpte : 190 780 21211 430 4969 0009 74 Banque Centrale Populaire - Casablanca



MONONITRIL®

5-mononitrate d'isosorbide

COMPOSITIONS

- Mononitril 20 mg

Iosorbid (DCI) 5-mononitrate

Excipients q.s.

- Mononitril 40 mg

Iosorbid (DCI) 5-mononitrate

Excipients q.s.

FORMES ET PRESENTATIONS :

- Comprimés sécables à 20 mg : Etuis de 20 et 60 comprimés sous plaquettes

- Comprimés sécables à 40 mg : Etui de 60 comprimés sous plaquettes thé

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Dérivé nitré.

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires AFRIC-PHAR

Zone Industrielle, Ouest Aïn Harouda, Route Régionale N°322 (ex R.S 111) Km 12.400 Aïn Haroud

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- Traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.
- Traitement adjuvant de l'insuffisance cardiaque gauche.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de :

• Chez tout patient traité par un dérivé nitré, sous quelque forme que ce soit, on ne doit pas prescrire de sildénafil tant que le patient est sous l'action du dérivé nitré.

En cas de traitement par sildénafil, les dérivés nitrés sont contre-indiqués sous quelque forme que ce soit. En particulier, il convient d'avertir tout patient coronarien de ce que, s'il présente au cours de l'acte sexuel des douleurs angineuses, il ne devra en aucun cas prendre un dérivé nitré d'action immédiate.

• De même chez le patient sans antécédent coronarien présentant un premier épisode angineux au cours de l'activité sexuelle, il convient de rechercher par l'interrogatoire la prise éventuelle de sildénafil (le plus souvent dans l'heure précédent l'activité sexuelle) et si tel est le cas de s'abstenir de tout traitement nitré.

D'une façon générale, d'après les données disponibles, le délai à respecter avant d'administrer un dérivé nitré à un patient exposé au sildénafil peut être estimé à un minimum de 24 heures.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE

- La posologie efficace devra être atteinte progressivement en raison du risque d'hypotension artérielle et de céphalées chez certains sujets.
- La posologie quotidienne doit être ajustée en fonction de l'efficacité et de la tolérance du patient.
- En cas d'utilisation à doses élevées, il est recommandé de ne pas arrêter brutalement le traitement.

Ne pas utiliser après la date de prescription mentionnée sur la boîte et sur les plaquettes thermoformées après la mention « EXP ». La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

CARDENTIEL 1,25mg, CARDENSIEL 2,5mg : A conserver à une température ne dépassant pas + 25°C

CARDENTIEL 5mg, CARDENSIEL 10mg : A conserver à une température ne dépassant pas + 30°C

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

que contient Cardensiel ?

CARDENSIEL 1,25mg, comprimé pelliculé :

La substance active est :

Fumarate de Bisoprolol : 1,25 mg Pour un comprimé pelliculé.

Excipients :

Noyau du comprimé : silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, amidon de maïs prégelatinisé, cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

Pelliculage : diméthicone, talc, macrogol 400, dioxyde de titane (E 171), hypromellose.

CARDENSIEL 2,5mg, comprimé pelliculé sécable :

La substance active est :

Fumarate de Bisoprolol : 2,5 mg Pour un comprimé pelliculé sécable

Excipients :

Noyau du comprimé : silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, amidon de maïs, cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

Pelliculage : diméthicone, macrogol 400, dioxyde de titane (E 171), hypromellose.

CARDENSIEL 5 mg, comprimé pelliculé sécable :

La substance active est :

Fumarate de Bisoprolol : 5 mg Pour un comprimé pelliculé sécable

Excipients :

Noyau du comprimé : silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, cellulose microcristalline, amidon de maïs, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

Pelliculage : oxyde de fer jaune (E 172), diméthicone, macrogol 400, dioxyde de titane (E 171), hypromellose.

CARDENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable :

La substance active est :

Fumarate de Bisoprolol : 10 mg Pour un comprimé pelliculé sécable

Excipients :

Noyau du comprimé : silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, cellulose microcristalline, amidon de maïs, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

Pelliculage : oxyde de fer jaune (E 172), oxyde de fer rouge (E 172), diméthicone, macrogol 400, dioxyde de titane (E 171), hypromellose.

Qu'est-ce que Cardensiel et contenu de l'emballage extérieur ?

	couleur du comprimé	forme du comprimé
Cardensiel 1,25 mg comprimé pelliculé	blanc	rond
Cardensiel 2,5 mg comprimé pelliculé sécable	blanc	cœur
Cardensiel 5 mg comprimé pelliculé sécable	blanc jaunâtre	cœur
Cardensiel 10 mg comprimé pelliculé sécable	orange pâle-orange clair	cœur

Le comprimé sécable peut être divisé en deux-demi-doses égales. (Pour Cardensiel 2,5 mg, 5 mg, et 10 mg).

Le médicament se présente en boîte de 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium).

Condition de Prescription et de délivrance :

Liste I.

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.

Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et en médecine interne.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché et Distributeur au Maroc :

Cooper Pharma, 41 Rue Mohamed Diouri, Casablanca, Maroc


Sous licence de :

Merck Santé s.a.s 37, rue Saint-Romain 69379 Lyon cedex 08

Fabricant :

Merck KGaA, Frankfurter Strasse, 250, 64293 Darmstadt, Allemagne.

Date de mise à jour du texte 09/2015.



FORMES ET PRESENTATION:

TORVA 10, comprimés enrobés dosés à 10 mg, boîtes de 15 et de 30.
TORVA 20, comprimés enrobés dosés à 20 mg, boîtes de 15 et de 30.

COMPOSITION:

- TORVA 10

Atorvastatine (sous forme calcique trihydratée).

Excipients q.s.p

- TORVA 20

Atorvastatine (sous forme calcique trihydratée).

Excipients q.s.p

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant, inhibiteur de l'HMG Co-A réductase (C10AA05 : s)

INDICATIONS :

Ce médicament est prescrit dans certaines formes d'hypercholestérolémies lorsque les activités du régime alimentaire n'ont pas permis d'abaisser le taux de cholestérol dans le sang.

Il est préconisé également dans certaines formes d'hypercholestérolémies familiales lorsqu'un régime.

L'utilisation de ce médicament doit être accompagnée avec un régime alimentaire assidu.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

-Hypersensibilité à l'un des constituants,

-Maladies du foie,

-Femme enceinte ou qui allait (cf. Grossesse/Allaitement).

-En cas d'association avec, Itraconazole, kétocanazole, antiprotéases (cf Interactions).

-Sauf avis contraire de votre médecin : en cas d'association avec les fibrates (cf Interactions).

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

Dans le traitement des hypercholestérolémies, respecter scrupuleusement le régime prescrit par votre médecin, Un bilan hépatique doit être effectué avant et pendant le traitement.

En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin,

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Précautions d'emploi :

Prévenez votre médecin en cas de :

Consommation d'alcool,

Antécédents hépatiques,

Désir de grossesse ou d'allaitement.

Excipient à effet notoire : lactose.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments et notamment avec l'Itraconazole, le Kétoconazole, les Antiprotéases et les Fibrates, signalez systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

Ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez immédiatement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'administration de ce médicament pendant l'allaitement est contre-indiquée.

POSOLOGIE :

La posologie usuelle est de 10 mg/jour, voire 20 mg/jour, dans les hypercholestérolémies modérées.

Des posologies plus élevées peuvent être nécessaires dans les formes sévères, notamment dans les formes familiales homozygotes.

La dose maximale recommandée est de 80 mg.

Ce médicament est prescrit en association avec le régime (cf Indications), en prise unique à tout moment de la journée, indépendamment des repas.

VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

Sur le plan clinique :

Les effets indésirables sont généralement discrets et transitoires : troubles digestifs (constipation, ballonnement, mauvaise digestion, douleurs abdominales, nausées, diarrhée), maux de tête, fatigue, insomnie, réactions allergiques.

Plus rarement, des crampes ou des douleurs musculaires ont été rapportées,

En cas d'atteinte musculaire (faiblesse, douleur ou élévation de certaines enzymes musculaires), contactez immédiatement votre médecin.

Sur le plan biologique :

Les effets indésirables biologiques les plus fréquents sont :

Une élévation de certaines enzymes du foie,

Diminution du nombre des plaquettes,

Modification du taux du sucre dans le sang.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE :

Il n'existe aucun traitement spécifique en cas de surdosage. La prise en charge doit être symptomatique.

En cas d'absorption excessive d'Atorvastatine, consulter un médecin immédiatement.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 30°C sans dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

LISTE I

Fabriqué par les Laboratoires NOVOPHARMA

Sous licence

The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co.

LOT : 1087
PER : 01/2022
PPV : 57,80 DPH

LOT : 1087
PER : 01/2022
PPV : 57,80 DPH

LOT : 1087
PER : 01/2022
PPV : 57,80 DPH

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétysalicylique

SANOFI

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1.
Ain sebaâ Casablanca
CoPlavix 75mg/100mg
b30 cp
P.P.V : 278,00 DH



5 118001 082018

Si vous souffrez d'une maladie grave du foie.

Si vous êtes enceinte.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1.
Ain sebaâ Casablanca
CoPlavix 75mg/100mg
b30 cp
P.P.V : 278,00 DH



5 118001 082018

Si vous souffrez d'une coagulation favorisant des hémorragies internes (saignement au sein d'un tissu, d'un organe ou d'une

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1.
Ain sebaâ Casablanca
CoPlavix 75mg/100mg
b30 cp
P.P.V : 278,00 DH



5 118001 082018

Si vous souffrez d'une maladie utilisée pour traiter votre maladie.

Si vous avez de la goutte.

Si vous buvez de l'alcool, en raison du risque accru de saignement ou de lésions gastro-intestinales.

Si vous avez une maladie appelée déficit en glucose-6-phosphate déhydrogénase (ou déficit en G6PD), en raison du risque de développer une forme particulière d'anémie (globules rouges dans le sang en faible quantité).

Pendant la prise de CoPlavix :

Vous devez avertir votre médecin :

Si une intervention chirurgicale est programmée (y compris dentaire).

Si vous souffrez de douleurs à l'estomac ou de douleurs abdominales, ou si vous avez des saignements dans l'estomac ou dans l'intestin (selles rouges ou noires).

Vous devez aussi avertir votre médecin immédiatement si vous présentez une maladie (appelée purpura thrombopénique thrombotique ou PTT) incluant fièvre et bleus sous la peau, pouvant apparaître comme des petites têtes d'épingles rouges, accompagné ou non de fatigue extrême inexplicable, confusion, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").

Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, l'arrêt du saignement peut demander plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez généralement rien constater d'anormal. Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez en avertir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4).

Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens sanguins.

associant asthme, écoulement nasal et

adie actuellement responsable d'un re de l'estomac ou un saignement dans

tie grave des reins.

mestre de grossesse.

en garde spéciales :

ONS

ies ci-dessous s'applique à votre cas, eci avant de prendre CoPlavix : rague tel que :

voquer un saignement interne (comme

la coagulation favorisant des hémorragies internes (saignement au sein d'un tissu, d'un organe ou d'une

ntre.

gicale récente (y compris dentaire).

cale (y compris dentaire) prévue dans les

is une artère de votre cerveau (accident je) survenu dans les sept derniers jours.

des reins ou du foie.

d'asthme ou de réactions allergiques,

tout médicament utilisé pour traiter votre maladie.

si vous avez de la goutte.

si vous buvez de l'alcool, en raison du risque accru de saignement ou de lésions gastro-intestinales.

si vous avez une maladie appelée déficit en glucose-6-phosphate déhydrogénase (ou déficit en G6PD), en raison du risque de développer une forme particulière d'anémie (globules rouges dans le sang en faible quantité).

Pendant la prise de CoPlavix :

Vous devez avertir votre médecin :

Si une intervention chirurgicale est programmée (y compris dentaire).

Si vous souffrez de douleurs à l'estomac ou de douleurs abdominales, ou si vous avez des saignements dans l'estomac ou dans l'intestin (selles rouges ou noires).

Vous devez aussi avertir votre médecin immédiatement si vous présentez une maladie (appelée purpura thrombopénique thrombotique ou PTT) incluant fièvre et bleus sous la peau, pouvant apparaître comme des petites têtes d'épingles rouges, accompagné ou non de fatigue extrême inexplicable, confusion, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").

Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, l'arrêt du saignement peut demander plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez généralement rien constater d'anormal. Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez en avertir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4).

Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens sanguins.

Enfants et adolescents

CoPlavix n'est pas destiné à l'enfant ou à l'adolescent de moins de 18 ans. Il y a un possible lien entre l'acide acétysalicylique et la survenue d'un syndrome de Reye quand des médicaments contenant de l'acide acétysalicylique sont administrés chez les enfants ou les adolescents présentant une infection virale. Le syndrome de Reye est une maladie très rare pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

Autres médicaments et CoPlavix

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Certains médicaments peuvent exercer une influence sur l'utilisation de CoPlavix ou vice-versa.

Vous devez informer avec précision votre médecin si vous prenez :

- des médicaments qui peuvent augmenter votre risque de saignement tels que que :
 - des anticoagulants oraux (médicaments utilisés pour diminuer la coagulation du sang),
 - de l'acide acétysalicylique ou un autre anti-inflammatoire non stéroïde, médicament utilisé habituellement pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations,
 - de l'héparine ou tout autre médicament injectable utilisé pour diminuer la coagulation du sang,
 - de la ticlopidine, un autre antiagrégant plaquettaire,
 - un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (incluant notamment la fluoxétine ou la fluvoxamine), médicament utilisé habituellement dans le traitement de la dépression,
 - de l'oméprazole ou de l'ésoméprazole pour des maux d'estomac,
 - du méthotrexate, un médicament utilisé dans le traitement d'une maladie grave des articulations (polyarthrite rhumatoïde) ou une maladie de la peau (psoriasis),
 - de l'acétazolamide, médicament utilisé pour traiter le glaucome (tension oculaire augmentée), l'épilepsie ou pour augmenter le débit urinaire,
 - du probénécide, de la benzboromarone ou de la sulfapyridine, qui sont des médicaments utilisés dans le traitement de la goutte,
 - du fluconazole ou du voriconazole, qui sont des médicaments utilisés dans le traitement d'infections fongiques,
 - de l'efavirenz ou du ténofovir, médicaments utilisés pour traiter les infections au VIH (virus de l'immunodéficience humaine),
 - de l'acide valproïque, du valproate ou de la carbamazépine, médicaments pour le traitement de certaines formes d'épilepsie,
 - le vaccin contre la varicelle, médicament utilisé pour prévenir la varicelle ou le zona, dans les 6 semaines précédant la prise de DuoPlavix, ou si vous avez la varicelle ou un zona actif (voir la section 2 "Les enfants et les adolescents"),
 - de moclobémide, pour le traitement de la dépression,
 - de la repaglinide, médicament utilisé pour traiter le diabète,
 - du paclitaxel, médicament utilisé pour traiter un cancer.

Vous devez arrêter tout autre traitement à base de clopidogrel pendant la prise de CoPlavix.

Une utilisation occasionnelle d'acide acétysalicylique (pas plus de 1000 mg sur une période de 24 heures) ne devrait généralement pas poser de problèmes, mais une utilisation prolongée dans d'autres circonstances doit être discutée avec votre médecin ou votre pharmacien.



مصحة أمراض القلب الدار البيضاء - الوازيس CLINIQUE Cardiologique Casa-Oasis

Cardiologie / Cardiologie Interventionnelle / Radiologie Vasculaire Interventionnelle
Chirurgie Cardio Vasculaire et Thoracique
Coro-Scanner / 128 barrettes

Casablanca, le 29 Avril 2020

Mr MOUMEN Brahim

FACTURE N 1192/2020

Arrêtée la présent facture à la somme de :
Deux cent cinquante dirhams (250,00,00dhs)

Dr. Mohamed ALLAOUI
Cardiologue
20, Rue France Ville - Oasis
Casa - Tel: 0522 98 07 06

ID:
D-naiss
ans,

MEHDI
BRAIM

29-Avr-2020 12:15:53

Fréq. Card. 70 BPM
Int PR: 167 ms
Dur.ORS 122 ms
QT/QTc 379/400 ms
Axes P-R-T 57 31 -47

TA. 160/90

CLINIQUE CARDIOLOGIQUE
CASA - OASIS
20, Rue de France 91160 OASIS - CASA
Tél: 01 60 98 07 66 - fax: 01 60 98 83 25

