

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

N° P19-0027896

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : (815) 815

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Saïdi

Abdelhafid

Date de naissance : 18/01/1936

Adresse : 86 Rue A. M. Ben Yakkach, 70000

CASABLANCA

Tél. 0522 23 25 17

Total des frais engagés : 1734,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 05/05/2020

Nom et prénom du malade : Saïdi Abdelhafid Age: 84

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : hépatite sclérique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 05/05/2020

Signature de l'adhérent(e) :



VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie

N° P19-027896

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/05/2020		G		 دكتور حمدي

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	05/05/20	1734,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan clinique.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

A 3D grid diagram with 10 columns and 8 rows. The vertical axis is labeled 'H' at the top, the horizontal axis is labeled 'D' on the left, and the depth axis is labeled 'G' on the right. The grid is composed of small circles, with some circles containing numbers (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) and others containing letters (e.g., 'Y', 'V'). The grid is arranged in a staggered pattern, with the first column having 8 rows and the subsequent columns having 7 rows each.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

PROFESSEUR DRISS JAMIL

Maladies de l'appareil Digestif

Foie - Estomac - Intestins

Endoscopie digestive - Echographie

Proctologie Medico-Chirurgicale

Membre de la société Française de coloproctologie

Membre de la société Française d'endoscopie Digestive

casablanca le, 05/05/2020


SAIDI Abdelhafid

289,60x6



TEFOVIR 300

1 comprimé le matin, pendant 6 mois



PROFESSEUR DRISS JAMIL
Maladies du Foie et de l'Appareil Digestif
201, Bd d'Anfa - Casablanca
Tel: 05 22 94 62 62 / 0522 94 61 61

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate



Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce⁺ prendre ce médicament car elle contient importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la⁺ Si vous avez toute autre question, si vous avez u⁺ d'informations à votre médecin ou à votre pharmaci⁺ Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne⁺ JAMAIS u⁺ quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B l'*ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B chronique, une infection par le VHB (virus de l'hépatite B). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans.

Vous pourrez être traité par TEOFIVR Pharma 5 pour une infection au VHB

• Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une maladie du foie, y compris une hépatite chronique B ou C et traités par des médicaments antirétroviraux présentent un risque plus élevé de complications hépatiques sévères et potentiellement fatales. Si vous avez une maladie du foie, votre médecin évaluera avec attention le traitement qui vous a été adapté. Si vous avez des antécédents de maladie du foie, votre médecin, vous prescrira des tests de surveillance de votre fonction hépatique.

Attention aux infections. Si vous présentez une infection par le VIH avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou agraver les symptômes d'inflammation ou d'infection existante dès que vous commencez votre traitement par TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, **veuillez en informer votre médecin immédiatement.**

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds puis remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour voir si un traitement est nécessaire.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez des patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, *Comment prendre TEOFIVR Pharma 5*.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

• **N'arrêtez pas de prendre les médicaments anti-VIH** prescrits par votre médecin lorsque vous commencez le traitement par TEOFIVR Pharma 5 si vous êtes infecté(e) à la fois par le VHB et le VIH.

Ne prenez pas TEOFIVR Pharma 5 si vous prenez déjà d'autres

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate



Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce⁺ prendre ce médicament car elle contient importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la⁺ Si vous avez toute autre question, si vous avez u⁺ d'informations à votre médecin ou à votre pharmaci⁺ Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne⁺ JAMAIS u⁺ quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B l'*ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B chronique, une infection par le VHB (virus de l'hépatite B). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans.

Vous pourrez être traité par TEOFIVR Pharma 5 pour une infection au VHB

• Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une maladie du foie, y compris une hépatite chronique B ou C et traités par des médicaments antirétroviraux présentent un risque plus élevé de complications hépatiques sévères et potentiellement fatales. Si vous avez une maladie du foie, votre médecin évaluera avec attention le traitement qui vous a été adapté. Si vous avez des antécédents de maladie du foie, votre médecin, vous prescrira des tests de surveillance de votre fonction hépatique.

Attention aux infections. Si vous présentez une infection par le VIH avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou agraver les symptômes d'inflammation ou d'infection existante dès que vous commencez votre traitement par TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, **veuillez en informer votre médecin immédiatement.**

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds puis remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour voir si un traitement est nécessaire.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez des patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, *Comment prendre TEOFIVR Pharma 5*.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

• **N'arrêtez pas de prendre les médicaments anti-VIH** prescrits par votre médecin lorsque vous commencez le traitement par TEOFIVR Pharma 5 si vous êtes infecté(e) à la fois par le VHB et le VIH.

Ne prenez pas TEOFIVR Pharma 5 si vous prenez déjà d'autres

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate



Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce⁺ prendre ce médicament car elle contient importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la⁺ Si vous avez toute autre question, si vous avez u⁺ d'informations à votre médecin ou à votre pharmaci⁺ Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne⁺ JAMAIS u⁺ quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B l'*ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B chronique, une infection par le VHB (virus de l'hépatite B). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans.

Vous pourrez être traité par TEOFIVR Pharma 5 pour une infection au VHB

• Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une maladie du foie, y compris une hépatite chronique B ou C et traités par des médicaments antirétroviraux présentent un risque plus élevé de complications hépatiques sévères et potentiellement fatales. Si vous avez une maladie du foie, votre médecin évaluera avec attention le traitement qui vous a été adapté. Si vous avez des antécédents de maladie du foie, votre médecin, vous prescrira des tests de surveillance de votre fonction hépatique.

Attention aux infections. Si vous présentez une infection par le VIH avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou agraver les symptômes d'inflammation ou d'infection existante dès que vous commencez votre traitement par TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, **veuillez en informer votre médecin immédiatement.**

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds puis remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour voir si un traitement est nécessaire.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez des patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, *Comment prendre TEOFIVR Pharma 5*.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

• **N'arrêtez pas de prendre les médicaments anti-VIH** prescrits par votre médecin lorsque vous commencez le traitement par TEOFIVR Pharma 5 si vous êtes infecté(e) à la fois par le VHB et le VIH.

Ne prenez pas TEOFIVR Pharma 5 si vous prenez déjà d'autres

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate



Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce⁺ prendre ce médicament car elle contient importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la⁺ Si vous avez toute autre question, si vous avez u⁺ d'informations à votre médecin ou à votre pharmaci⁺ Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne⁺ JAMAIS u⁺ quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B l'*ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B chronique, une infection par le VHB (virus de l'hépatite B). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans.

Vous pourrez être traité par TEOFIVR Pharma 5 pour une infection au VHB

• Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une maladie du foie, y compris une hépatite chronique B ou C et traités par des médicaments antirétroviraux présentent un risque plus élevé de complications hépatiques sévères et potentiellement fatales. Si vous avez une maladie du foie, votre médecin évaluera avec attention le traitement qui vous a été adapté. Si vous avez des antécédents de maladie du foie, votre médecin, vous prescrira des tests de surveillance de votre fonction hépatique.

Attention aux infections. Si vous présentez une infection par le VIH avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou agraver les symptômes d'inflammation ou d'infection existante dès que vous commencez votre traitement par TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, **veuillez en informer votre médecin immédiatement.**

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds puis remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour voir si un traitement est nécessaire.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez des patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, *Comment prendre TEOFIVR Pharma 5*.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

• **N'arrêtez pas de prendre les médicaments anti-VIH** prescrits par votre médecin lorsque vous commencez le traitement par TEOFIVR Pharma 5 si vous êtes infecté(e) à la fois par le VHB et le VIH.

Ne prenez pas TEOFIVR Pharma 5 si vous prenez déjà d'autres

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate



Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce⁺ prendre ce médicament car elle contient importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la⁺ Si vous avez toute autre question, si vous avez u⁺ d'informations à votre médecin ou à votre pharmaci⁺ Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne⁺ JAMAIS u⁺ quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B l'*ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B chronique, une infection par le VHB (virus de l'hépatite B). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans.

Vous pourrez être traité par TEOFIVR Pharma 5 pour une infection au VHB

• Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une maladie du foie, y compris une hépatite chronique B ou C et traités par des médicaments antirétroviraux présentent un risque plus élevé de complications hépatiques sévères et potentiellement fatales. Si vous avez une maladie du foie, votre médecin évaluera avec attention le traitement qui vous a été adapté. Si vous avez des antécédents de maladie du foie, votre médecin, vous prescrira des tests de surveillance de votre fonction hépatique.

Attention aux infections. Si vous présentez une infection par le VIH avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou agraver les symptômes d'inflammation ou d'infection existante dès que vous commencez votre traitement par TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, **veuillez en informer votre médecin immédiatement.**

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds puis remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour voir si un traitement est nécessaire.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez des patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, *Comment prendre TEOFIVR Pharma 5*.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

• **N'arrêtez pas de prendre les médicaments anti-VIH** prescrits par votre médecin lorsque vous commencez le traitement par TEOFIVR Pharma 5 si vous êtes infecté(e) à la fois par le VHB et le VIH.

Ne prenez pas TEOFIVR Pharma 5 si vous prenez déjà d'autres

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate



Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce⁺ prendre ce médicament car elle contient importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la⁺ Si vous avez toute autre question, si vous avez u⁺ d'informations à votre médecin ou à votre pharmaci⁺ Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne⁺ JAMAIS u⁺ quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B l'*ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B chronique, une infection par le VHB (virus de l'hépatite B). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans.

Vous pourrez être traité par TEOFIVR Pharma 5 pour une infection au VHB

• Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une maladie du foie, y compris une hépatite chronique B ou C et traités par des médicaments antirétroviraux présentent un risque plus élevé de complications hépatiques sévères et potentiellement fatales. Si vous avez une maladie du foie, votre médecin évaluera avec attention le traitement qui vous a été adapté. Si vous avez des antécédents de maladie du foie, votre médecin, vous prescrira des tests de surveillance de votre fonction hépatique.

Attention aux infections. Si vous présentez une infection par le VIH avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou agraver les symptômes d'inflammation ou d'infection existante dès que vous commencez votre traitement par TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, **veuillez en informer votre médecin immédiatement.**

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds puis remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour voir si un traitement est nécessaire.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez des patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, *Comment prendre TEOFIVR Pharma 5*.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

• **N'arrêtez pas de prendre les médicaments anti-VIH** prescrits par votre médecin lorsque vous commencez le traitement par TEOFIVR Pharma 5 si vous êtes infecté(e) à la fois par le VHB et le VIH.

Ne prenez pas TEOFIVR Pharma 5 si vous prenez déjà d'autres