

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Sons générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

26665

Matricule : 815

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : SAIDI ABDELLAH

18/01/1936

Date de naissance :

Adresse : 86 Rue Al Nazzal Dabiq

CASABLANCA

Tél. : 2522237517

Total des frais engagés : 22.63,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : SARNOURI YOUSSEF Age : 72

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 05/05/2020

Signature de l'adhérent(e) : Dr. Saidi Abdellah

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie Nº P19-046902

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 815

Nom de l'adhérent(e) : SAIDI

Total des frais engagés : 22.63,40

Date de dépôt : 05/05/2020

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/09/2010	Acte de soins	1	200	DR. C. CHIR Hôpital Sainte-Justine Signature : Dr. C. CHIR Hôpital Sainte-Justine Date : 13/09/2010

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie du Jura TAHRI JOUETI Rachid 29, Bis Rue Oussama Benou Zaid Assilanca - Tél.: 05-22-25-0	04/05/20	1963,40

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

#### **VOLET ADHERENT**



\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION**

# Docteur Hayat NAJIH

## Cardiologue

Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca  
Ancien interne à l'hôpital de la Timone à Marseille  
Ancien interne du CHU Ibn Rochd de Casablanca  
Diplômée en Echocardiographie de l'Université Bordeaux Segalen  
Diplômée en cardiologie pédiatrique de l'Université Paris Descartes  
Diplômée en imagerie vasculaire de l'Université Paris Sud



# الدكتورة حياة ناجي

## اختصاصية في أمراض القلب والشرايين

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

طبيبة داخلية سابقاً مستشفى مارسيليا بفرنسا

طبيبة داخلية سابقاً مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

حاصلة على شهادة فحص القلب بالصدى من جامعة بوردو بفرنسا

حاصلة على شهادة فحص الشرايين والأوعية بالصدى من جامعة باريس

حاصلة على شهادة أمراض القلب للأطفال من كلية الطب بباريس

Casablanca, le :

04/05/2009

1176,00 Ban koutki tchahoue

994,00 X 4

1 - Covam 100ml : Igfij bouch. 68,90 X 4

(1) - Rudec 111,5ml : Igfij bouch. 418,40 X 4

(3) - Sectol 400ml : Igfij bouch. 1046,60 X 4  
93,40

(4) - Zytlopin 100ml : Igfij le fl. 46,70 X 2

1963,92 (4 ml's)

Bd. Afghanistan, Derb Houria, Bloc 225, N°1, 2ème Etage, Hay Hassani, Casablanca

شارع أفغانستان، درب الحرية، بلوك 225، رقم 1، الطابق الثاني، الحي الحسني، الدار البيضاء

Tél. : 05 22 90 70 51 - GSM : 06 62 69 23 99



Pharmacie du Jura  
TAHRI JOUTEI Rachid  
128 Bis Rue Oussema Benou Zaid  
Casablanca - Tél. : 05 22 25 34 41

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### Enfants et adolescents

Sans objet

**Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Evitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitaline),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques),
- bêpéril (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphenoxilat (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparfloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),

ou du galactose (maladies héréditaires rares).

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### Enfants et adolescents

Sans objet

**Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Evitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitaline),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques),
- bêpéril (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphenoxilat (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparfloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),

ou du galactose (maladies héréditaires rares).

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### Enfants et adolescents

Sans objet

**Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Evitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitaline),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques),
- bêpéril (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphenoxilat (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparfloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),

ou du galactose (maladies héréditaires rares).

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### Enfants et adolescents

Sans objet

**Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Evitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitaline),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques),
- bêpéril (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphenoxilat (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparfloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),

ou du galactose (maladies héréditaires rares).



# ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement ce médicament car elle contient :

- Gardez cette notice, vous
- Si vous avez d'autres questions, contactez votre pharmacien ou
- Ce médicament vous a été donné à d'autres personnes. Il peut être identique aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

LOT 191661  
EXP 07 2023  
PPV 46.70 DH

avant de prendre ce médicament pour vous.  
Informations à votre médecin

Ne le donnez pas à des personnes qui ont des signes de leur maladie

vous remarquez un effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à

Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
- Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
- Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Avertissements et précautions :**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.

**Avez des problèmes de thyroïde.**

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbature (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol.

Si vous passez

**Autres**

Informations

pourriez

- Aspirin

- Théop

- Médic

- Vidara

- Didan

- Antibio

- Médic

- Médic

presseu

- Médic

- Médic

comme

diurétiq

- Médic

- warfarin

- Tout a

Veuillez

récemmen

sans or

Grosse

Si vous

planifiez

avant d

L'utilisa

médecin

En rais

conseill

**Condui**

Dans des

ments,

conduis

**Liste de**

Si votre

contacte

L'utilisa

intolérar

malabsor

**3. COM**

Veillez à

de votre

doute.

Les com

repas.

**Posolo**

La poso

urique.

Les pos

Vous co

cas éch

Si vous

médecin

les pris

semaine

devra êt

**Utilisat**

Les pos

**Mode e**

Voie ora

Les com

repas.



 SECTRAL®

#### **Acébutolol**

[www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)

104,60



## Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés et dans quels cas sont-ils utilisés ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
  3. Comment prendre SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
  7. Informations supplémentaires.

## **1. QU'EST-CE QUE SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?**

#### **(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)**

**Classe pharmacothérapeutique : BÊTA-BLOQUANT,  
SELECTIF**

**SELECTIF.**  
Ces médicaments sont des bêta-bloquants. Ils diminuent certains effets (dits effets bêta) du système sympathique de la régulation cardiovasculaire.

Ces médicaments sont préconisés dans :

- l'hypertension artérielle,
  - certains troubles du rythme cardiaque,
  - la prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine d'effort,

Sectral 200 mg :

- ## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE**

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à

# SECTRAL®

Acébutolol

Comprimés pelliculés

104,60



## Dans cette notice :

- Qu'est-ce que SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés et dans quels cas sont-ils utilisés ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
- Comment prendre SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
- Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

### (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Classe pharmacothérapeutique : BÊTA-BLOQUANT, SELECTIF.

Ces médicaments sont des bêta-bloquants. Ils diminuent certains effets (dits effets bêta) du système sympathique de la régulation cardiovasculaire.

Ces médicaments sont préconisés dans :

- l'hypertension artérielle,
- certaines troubles du rythme cardiaque,
- la prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine d'effort,

SECTRAL 200 mg :

- le traitement au long cours après infarctus du myocarde.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à

certains s-  
ment.

### Ne prenez pas ce comprimé si :

- asthme,
- ves, dans une maladie mentale,
- insuffisance (défaillance) cardiaque ou pulmonaire,
- choc cardiaque,
- blocs de conduction de degrés II et III, cardiaques,
- angor, monothérapie,
- maladie de bradycardie (ralentissement),
- phénomènes, dans une symétrie artérielle,
- phéochromopathie, médullo-surrénale, une hypertension artérielle,
- hypotension artérielle,
- hypersensibilité, antécédents de réaction allergique,
- allaitement, association,
- si vous avez ou avez eu la présence d'une tumeur de la prostate.

**Vous ne devriez pas prendre ce comprimé si :**

général, (médicament).

### Faites attention à ce comprimé si :

- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certaines substances, à certains médicaments.
- Ces médicaments peuvent être déclencheurs d'intolérances, d'effets secondaires ou d'un syndrome de maladie de Raynaud.

# SECTRAL®

Acébutolol

Comprimés pelliculés

104,60



## Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés et dans quels cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
7. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

### (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Classe pharmacothérapeutique : BÊTA-BLOQUANT, SELECTIF.

Ces médicaments sont des bêta-bloquants. Ils diminuent certains effets (dits effets bêta) du système sympathique de la régulation cardiovasculaire.

Ces médicaments sont préconisés dans :

- l'hypertension artérielle,
- certains troubles du rythme cardiaque,
- la prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine d'effort,

Sectral 200 mg :

- le traitement au long cours après infarctus du myocarde.
- ## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à

certains s-  
ment.

### Ne pren- comprim-

• asthme  
ves, dans  
maladie  
ment),

• insuffis  
(défaillan-  
traitemen-  
• choc ca-  
• blocs  
degrés no-  
cardiaqua-

• angor  
monothé-  
• maladi-  
• bradyca-  
(ralentiss-  
• phéno-  
ques, da-  
symétriq-  
artériels)

• phéoch-  
médullo-  
une hypé-

• hypote-  
• hyperse-  
• antécé-  
réaction

• allaiter-  
• associa-  
• si vous

Vous ne  
général,  
(médicam-

Faites at-  
mg, com-

Mises en s-

Si votre n-  
certaines  
médicam-

Ces médi-  
est décl-  
intoléram-  
un syndr-

NE AMAL-

# SECTRAL®

Acébutolol

Comprimés pelliculés

104,60



## Dans cette notice :

- Qu'est-ce que SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés et dans quels cas sont-ils utilisés ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
- Comment prendre SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?
- Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

### (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Classe pharmacothérapeutique : BÊTA-BLOQUANT, SELECTIF.

Ces médicaments sont des bêta-bloquants. Ils diminuent certains effets (dits effets bêta) du système sympathique de la régulation cardiovasculaire.

Ces médicaments sont préconisés dans :

- l'hypertension artérielle,
- certaines troubles du rythme cardiaque,
- la prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine d'effort,

SECTRAL 200 mg :

- le traitement au long cours après infarctus du myocarde.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SECTRAL 200 mg et SECTRAL 400 mg, comprimés pelliculés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à

certains s-  
ment.

### Ne prenez pas ce comprimé si :

- asthme,
- ves, dans une maladie mentale,
- insuffisance (défaillance) cardiaque ou pulmonaire,
- choc cardiaque,
- blocs de conduction de degrés II et III, cardiaques,
- angor, monothérapie,
- maladie de bradycardie (ralentissement),
- phénomènes, dans une symétrie artérielle,
- phéochromopathie, médullo-surrénale, une hypertension artérielle,
- hypotension artérielle,
- hypersensibilité, antécédents de réaction allergique,
- allaitement, association,
- si vous avez ou avez eu la présence d'une tumeur de la prostate.

**Vous ne devriez pas prendre ce comprimé si :**

général, (médicament).

**Faites attention à ce comprimé si :**

Mises en garde : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à

certaines substances.

médicament.

Ces médicaments peuvent être déclencheurs d'intolérance.

un syndrome de l'angine de poitrine.

# **COVERAM® 5 mg / 5 mg**

Péridopril arginine / Amlodipine

# **COVERAM® 10 mg / 5 mg**

Péridopril arginine / Amlodipine

# **5 mg / 10 mg**

Comprimés  
e / Amlodipine

# **10 mg / 10 mg**

Comprimés  
e / Amlodipine

Veuillez Lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. (Cf. «Quels sont les effets indésirables possibles ?»)

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que COVERAM, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COVERAM, comprimé ?
3. Comment prendre COVERAM, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COVERAM, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1-QU'EST-CE QUE COVERAM, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et inhibiteurs calciques

Code ATC : C09BB04

COVERAM, comprimé est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle et/ou dans le traitement de la maladie coronaire stable (une maladie où l'alimentation du cœur en sang est réduite ou bloquée).

Les patients qui prennent déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amlopipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM, comprimé qui contient les deux principes actifs.

COVERAM, comprimé est une association de deux principes actifs, péridopril et amlopipine.

Le péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). L'amlopipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour exerciser le sang dans les vaisseaux.

Il existe également des informations importantes pour vous.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, parlez à votre médecin ou à votre infirmier/ère. Si vous êtes allaitante, parlez à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui éventuels ?)

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre COVERAM, comprimé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de COVERAM, comprimé. COVERAM, comprimé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

### **Allaitement**

Il a été démontré que l'amlopipine est excrétée dans le lait maternel en petites quantités. Informez votre médecin si vous allez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. COVERAM, comprimé est déconseillé aux femmes qui allaitent et votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

COVERAM, comprimé peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Si avec le traitement, vous ne vous sentez pas bien, si vous avez la tête qui tourne, si vous vous sentez faible ou fatigué, ou si vous présentez des maux de tête, vous ne devez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines et contactez votre médecin immédiatement.

### **COVERAM, comprimé contient du lactose monohydraté**

Si votre médecin vous a informé que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **3. COMMENT PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de

# **COVERAM® 5 mg / 5 mg**

Péridopril arginine / Amlodipine

# **COVERAM® 10 mg / 5 mg**

Péridopril arginine / Amlodipine

# **5 mg / 10 mg**

Comprimés  
e / Amlodipine

# **10 mg / 10 mg**

Comprimés  
e / Amlodipine

Veuillez Lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. (Cf. «Quels sont les effets indésirables possibles ?»)

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que COVERAM, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COVERAM, comprimé ?
3. Comment prendre COVERAM, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COVERAM, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1-QU'EST-CE QUE COVERAM, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et inhibiteurs calciques

Code ATC : C09BB04

COVERAM, comprimé est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle et/ou dans le traitement de la maladie coronaire stable (une maladie où l'alimentation du cœur en sang est réduite ou bloquée).

Les patients qui prennent déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amlopipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM, comprimé qui contient les deux principes actifs.

COVERAM, comprimé est une association de deux principes actifs, péridopril et amlopipine.

Le péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). L'amlopipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour exercer le sang dans les vaisseaux.

Il existe également des informations importantes pour vous.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, parlez à votre médecin ou à votre infirmier/ère. Il peut arriver que certains médicaments soient危害的 pour la femme enceinte ou pour son enfant. Il peut également arriver que certains médicaments soient危害的 pour les personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Parlez à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. (Cf. «Quels sont les effets indésirables possibles ?»)

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre COVERAM, comprimé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de COVERAM, comprimé. COVERAM, comprimé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

## **Allaitement**

Il a été démontré que l'amlopipine est excrétée dans le lait maternel en petites quantités. Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. COVERAM, comprimé est déconseillé aux femmes qui allaitent et votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

## **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Coveram, comprimé peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Si avec le traitement, vous ne vous sentez pas bien, si vous avez la tête qui tourne, si vous vous sentez faible ou fatigué, ou si vous présentez des maux de tête, vous ne devez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines et contactez votre médecin immédiatement.

## **COVERAM, comprimé contient du lactose monohydraté**

Si votre médecin vous a informé que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## **3. COMMENT PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de

# **COVERAM® 5 mg / 5 mg**

Péridopril arginine / Amlodipine

# **COVERAM® 10 mg / 5 mg**

Péridopril arginine / Amlodipine

# **5 mg / 10 mg**

Comprimés  
e / Amlodipine

# **10 mg / 10 mg**

Comprimés  
e / Amlodipine

Veuillez Lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. (Cf. «Quels sont les effets indésirables possibles ?»)

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que COVERAM, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COVERAM, comprimé ?
3. Comment prendre COVERAM, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COVERAM, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1-QU'EST-CE QUE COVERAM, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et inhibiteurs calciques

Code ATC : C09BB04

COVERAM, comprimé est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle et/ou dans le traitement de la maladie coronaire stable (une maladie où l'alimentation du cœur en sang est réduite ou bloquée).

Les patients qui prennent déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amlopipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM, comprimé qui contient les deux principes actifs.

COVERAM, comprimé est une association de deux principes actifs, péridopril et amlopipine.

Le péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). L'amlopipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour exerciser le sang dans les vaisseaux.

Il existe également des informations importantes pour vous.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, parlez à votre médecin ou à votre infirmier/ère. Si vous êtes allaitante, parlez à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui éventuels ?)

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre COVERAM, comprimé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de COVERAM, comprimé. COVERAM, comprimé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

### **Allaitement**

Il a été démontré que l'amlopipine est excrétée dans le lait maternel en petites quantités. Informez votre médecin si vous allez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. COVERAM, comprimé est déconseillé aux femmes qui allaitent et votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

COVERAM, comprimé peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Si avec le traitement, vous ne vous sentez pas bien, si vous avez la tête qui tourne, si vous vous sentez faible ou fatigué, ou si vous présentez des maux de tête, vous ne devez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines et contactez votre médecin immédiatement.

### **COVERAM, comprimé contient du lactose monohydraté**

Si votre médecin vous a informé que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **3. COMMENT PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de

# **COVERAM® 5 mg / 5 mg**

Péridopril arginine / Amlodipine

# **COVERAM® 10 mg / 5 mg**

Péridopril arginine / Amlodipine

# **5 mg / 10 mg**

Comprimés  
e / Amlodipine

# **10 mg / 10 mg**

Comprimés  
e / Amlodipine

Veuillez Lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. (Cf. «Quels sont les effets indésirables possibles ?»)

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que COVERAM, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COVERAM, comprimé ?
3. Comment prendre COVERAM, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COVERAM, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1-QU'EST-CE QUE COVERAM, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et inhibiteurs calciques

Code ATC : C09BB04

COVERAM, comprimé est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle et/ou dans le traitement de la maladie coronaire stable (une maladie où l'alimentation du cœur en sang est réduite ou bloquée).

Les patients qui prennent déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amlopipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM, comprimé qui contient les deux principes actifs.

COVERAM, comprimé est une association de deux principes actifs, péridopril et amlopipine.

Le péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). L'amlopipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour exerciser le sang dans les vaisseaux.

Il existe également des informations importantes pour vous.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, parlez à votre médecin ou à votre infirmier/ère. Si vous êtes allaitante, parlez à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui éventuels ?)

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre COVERAM, comprimé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de COVERAM, comprimé. COVERAM, comprimé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

### **Allaitement**

Il a été démontré que l'amlopipine est excrétée dans le lait maternel en petites quantités. Informez votre médecin si vous allez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. COVERAM, comprimé est déconseillé aux femmes qui allaitent et votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

COVERAM, comprimé peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.




Si avec le traitement, vous ne vous sentez pas bien, si vous avez la tête qui tourne, si vous vous sentez faible ou fatigué, ou si vous présentez des maux de tête, vous ne devez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines et contactez votre médecin immédiatement.

### **COVERAM, comprimé contient du lactose monohydraté**

Si votre médecin vous a informé que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **3. COMMENT PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de



2020-05-04 14:36

ID:barkouki  
Nom:  
Taille: \_\_\_\_ cm  
FC \_\_\_\_ bp.ms  
Intervalle PR \_\_\_\_ ms  
Durée P \_\_\_\_ ms  
Durée QRS \_\_\_\_ ms  
Durée T \_\_\_\_ ms  
QT/QTc \_\_\_\_ ms  
Axe P/QRS/T \_\_\_\_ de.m  
R(V5)/S(V1) \_\_\_\_ m  
R(V5)+S(V1) \_\_\_\_ m  
<<Conclusions>>  
Dévia. ax. gche  
IM antéros. anci  
\*\*Le rapport doi  
Médecin \_\_\_\_\_