

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

litions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

entaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

0 Réclamation : contact@mupras.com

0 Prise en charge : pec@mupras.com

0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº P19- 0049676

Optique Autres *VO 28/06*

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : *6711* Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : *ARAJ - ABDALLAH*

Date de naissance : *13.08.59*

Adresse : *158, lot Agadiria Casablanca*

Tél. : *0673.381638* Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

*D.C.A.H. TADLAOUI
Chirurgie Générale
Chirurgie Gynécologique
12 Bd. d'Anfa - Casablanca*

Date de consultation : *28.05.2020*

Nom et prénom du malade : Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *Casablanca*

Signature de l'adhérent(e) : *B*

Le : *02/06/20*

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/05/2015	Acte de Gynécologie	1/1	Quotidien	DR. A.H. TADDI Chirurgie Générale et d'Anfa - Casablanca

CHAMPS
naillé
res Cachet et signature du
attestant le Paiement

A.H. TADDÉO
Chirurgie Générale
Bd. d'Anfa - Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE IBN TAIMIYA FOULOUS Abdeillah Docteur en Pharmacie 19 Lot Al Aqsa 0522 10 00 00	26/03/2020	114,20

PHARMACIE IBN TAIMIA
FOULOUS Abderrahim
Docteur en Pharmacie
19 Lot Al Adarissa Sidi
0522 33 52 25

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES D'AFNA Tél: 05 22 22 11 52 - Fax: 05 22 18 37</i>	29/05/20	B 930 P 1,5 + B 100	12 66,20 DH Laboratoire D'analyses médicales D'afna 1 LAB 45, Beau 130,00 DH A 130,00 DH 22 22 11 52 - FAX: 05 22 18 37

INSTITUT NATIONAL D'ANALYSES MÉTALLIQUES
D'AFRIQUE DU NORD
Casablanca

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

Docteur A. H. TADLAOUI
CHIRURGIE GÉNÉRALE, GYNÉCOLOGIQUE

& COELIOCHIRURGIE
Ex. Assistant du C.H.U Averroès

الدكتور عبد الفتاح التلاوي
مساعد سابق بالمركز الصحي الجامعي ابن رشد

الجراحة العامة- جراحة الأمراض النسوية
الجراحة بالكاميرا

12, Boulevard d'ANFA (Place Verdun)
T : 27-66-40 & 27-48-20 Fax : 27-66-40
Patente N° 35507242
Expert auprès des Tribunaux

الهاتف 27.48.20 - 27.66.40

شارع أنفا الدار البيضاء 12

CASABLANCA le

26 Mai 2020

الدار البيضاء في

Mr Araf Aldallal
53 M Relaxol 143/15
30, P x 2 a S 12g Aspegic 1000 dr Sahl el
114, 70 114, 70

Dr. A.H. TADLAOUI
Chirurgie Générale
Chirurgie Gynéologique
12, Bd. d'Anta - Casablanca

صيدلية ابن تيمية
PHARMACIE IBN TAIMIA
FOULOUS Abderrahim
Docteur en Pharmacie
N° 119 Lot Al Adarissa Sidi Maârouf
Tél: 0522 33 52 25 Casablanca

Si on n'aime pas toucher les gens, les écouter, si on n'a pas le désir de les rendre heureux, est-on Médecin ?

Relaxol® 500mg /2mg

Paracétamol/ thiocolchicoside

comprimé

SANOFI

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. • Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE Relaxol ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Relaxol ?

Ne prenez jamais RELAXOL dans les cas suivants : • Si vous êtes allergique au thiocolchicoside et/ou au paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6). • Si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte. • Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception. • Si vous allaitez.

• Insuffisance hépatocellulaire ou si vous avez une maladie grave du foie. • Enfants de moins de 16 ans.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec RELAXOL :

Mises en garde spéciales : Utiliser avec précaution en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions. La survenue de crise convulsive impose l'arrêt du traitement.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir rubrique « Posologie »).

Précautions d'emploi : En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.

En cas de douleurs d'estomac, de nausées, de vomissements, prévenez votre médecin.

Respectez rigoureusement les doses et la durée du traitement décrites à la rubrique 3. Vous ne devez pas utiliser ce médicament à une dose plus élevée (soit

8 comprimés de Relaxol) ou pour une durée dépassant 7 jours. Ceci est dû au fait que les produits formés dans votre organisme lorsque vous prenez du thiocolchicoside à des doses élevées peuvent provoquer des lésions sur certaines cellules (nombre abnormal de chromosomes). Cela a été mis en évidence lors d'études chez l'animal et d'études en laboratoire. Chez l'homme, ce type de lésions cellulaires est un facteur de risque de cancer, d'altération de la fertilité masculine et peut-être dangereux pour un enfant à naître. Parlez-en avec votre médecin si vous avez plus de questions.

Votre médecin vous renseignera sur toutes les mesures relatives à une contraception efficace et sur les risques potentiels d'une grossesse.

La durée du traitement est limitée à 7 jours consécutifs.

Avant de débuter un traitement par ce médicament, vérifier que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol.

La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du fonctionnement du foie. Prévenez votre médecin : • Si vous pesez moins de 50 kg. • Si vous avez une maladie du foie ou maladie gravis des reins. • Si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment. • Si vous souffrez de déshydratation. • Si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des maladies de longue durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d'une hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteints de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée. En cas de sevrage récent d'un alcoolisme chronique, le risque d'atteinte hépatique est majoré.

En cas d'hépatite virale aiguë, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

En cas de problème de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation, Relaxol, comprimé doit être utilisé avec précaution.

Enfants et adolescents : N'administrez pas ce médicament à des enfants ou des adolescents âgés de moins de 16 ans pour des raisons de sécurité.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments : Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang ou un dosage de la glycémie.

Ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez un surdosage.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou AVK), la prise de paracétamol aux doses maximales (4 g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance surveillance régulière biologiques dont notamment

PER.:04
01/09/2012

RELAXOL 500MG/2MG
CP B20

P.P.V : 53DH10



6 118000 060833

us prenez simultanément des
ax de cholestérol dans le sang
à 2 prises).

• Étamol, un traitement par
de présenter une acidose
génération de la fréquence

des médicaments potentiellement toxiques pour le foie. • Des médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les médicaments antiépileptiques (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, topiramate). • De la rifampicine (un antibiotique). • En même temps de l'alcool. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Relaxol peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

Grossesse, allaitement et fertilité

Ne prenez pas ce médicament : • si vous êtes enceinte, pourriez tomber

ASPÉGIC 1G / Adultes

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a/ Dénomination :

ASPÉGIC ADULTES 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

b/ Composition :

ACETYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 1800,00 mg
(Quantité correspondante en acide acétylsalicylique) 1000,00 mg

Excipients : glycine, arôme mandarine (contenant du lactose), glycyrrhizate d'ammonium, pour un sachet-dose de 2046,00 mg.

c/ Forme pharmaceutique et présentation :

Poudre pour solution buvable en sachet-dose, boîtes de 10 et 20.

d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et dans le traitement de certaines affections rhumatismales chez l'adulte (à partir de 15 ans).

3- ATTENTION !

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Vous ne devez jamais utiliser ASPÉGIC ADULTES 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, dans les cas suivants : • allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée), pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des reins, • maladie grave du cœur, • traitement par le

méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine, • traitement avec des anticoagulants oraux, et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, notamment dans le traitement des affections rhumatismales, de la fièvre ou des douleurs (cf. rubrique « Interactions médicamenteuses et autres interactions »).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales

• En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments, • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins, • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine, • En conséquence : - en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin, • L'aspirine ne doit être utilisée qu'après consultation d'un autre médecin.

• en cas de traitement contre-indiqué (cas de d'ulcères, de hémorragies, d'antécédent d'hémorragie des reins ou de maladie de l'asthme, etc.), • en cas de grossesse (cas de grossesse révolue), • en cas de maladie de l'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque l'aspirine est utilisée à de fortes doses, - des anticoagulants oraux, et en

PERIODIQUEMENT
12/01/2001
ASPEGIC 1G
SACHETS B10
P.P.V : 30DH80

6 118000 061883





ASPEGIC 1G / Adultes

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a/ Dénomination :

ASPEGIC ADULTES 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

b/ Composition :

ACETYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 1800,00 mg
 (Quantité correspondante en
 acide acétylsalicylique) 1000,00 mg

Excipients : glycine, arôme mandarine (contenant du lactose), glycyrrhizate d'ammonium, pour un sachet-dose de 2046,00 mg.

c/ Forme pharmaceutique et présentation :

Poudre pour solution buvable en sachet-dose, boîtes de 10 et 20.

d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIOUDES ET ANTIPYRÉTIQUES

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et dans le traitement de certaines affections rhumatismales chez l'adulte (à partir de 15 ans).

3- ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

You ne devez jamais utiliser ASPEGIC ADULTES 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, dans les cas suivants : • allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée), pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des reins, • maladie grave du cœur, • traitement par le

méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine, • traitement avec des anticoagulants oraux, et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, notamment dans le traitement des affections rhumatismales, de la fièvre ou des douleurs (cf. rubrique « Interactions médicamenteuses et autres interactions »).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales

- En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments.
 - En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins, • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine, • En conséquence : - en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin, • L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin :

en • en
 ca: iatisme, • en
 rot des globules
 des : tu provoquer
 d'a: ges, • en cas
 d'he uodénium,
 des as de maladie
 6 118000 061083

aspecic 1g
 sachets b10

P.P.V : 30DH80

6 118000 061083

assume : la survenue de crise
 d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie
 aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans
 ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles
 abondantes, • en cas de traitement par : - d'autres
 anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque l'aspirine est
 utilisée à de fortes doses, - des anticoagulants oraux, et en



لُجْنَةِ الْتَّحْلِيَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ أَنْفَا

Laboratoire d'Analyses Médicales d'Anfa
LABO - ANFA



Mohamed SAFRAOUI

Pharmacie Biologiste

Diplômé de l'Université de Toulouse
des spécialités d'Hématologie Immunologie
et Bactériologie et Microbiologie

Nom du patient: **Mr ARAJ ABDALLAH**

André ARAJ, né le 19/01/1960 à Tunis



Référence: **OFAH4910** 01C7498

محمد الصمودي

صيدلي احيانى

اختصاصي في التحاليلات الطبية

خريج جامعة تولوز

مساعد سابق بمستشفيات فرنسا

Sur prescription du : **Docteur TADLAOUI ABDELFATTAH**

NOTE D'HONORAIRES

ANALYSES EXECUTEES LE : 01/06/2020

SUR PRESCRIPTION DU DOCTEUR : TADLAOUI ABDELFATTAH

POUR M : MR ARAJ ABDALLAH

TOTAL A PAYER : 130.00 DH

(CENT TREnte DIRHAMS)

(le laboratoire a encaissé la dite somme)

Casablanca le: 01/06/2020

Laboratoire D'analyses Médicales D'anfa
LABO - ANFA
45, Boulevard d'Anfa - Casablanca
Tél: 0522 22 11 62 - Fax: 05 22 18 37

Docteur A. H. TADLAOUI
CHIRURGIE GÉNÉRALE, GYNÉCOLOGIQUE

الدكتور عبد الفتاح ح. التدلاوي
مساعد سابق بالمركز الصحي الجامعي ابن رشد

& COELIOCHIRURGIE
Ex. Assistant du C.H.U Averroès

الجراحة العامة- جراحة الأمراض النسوية
الجراحة بالكاميرا

12, Boulevard d'ANFA (Place Verdun)
☎ : 27-66-40 & 27-48-20 Fax : 27-66-40
Patente N° 35507242
Expert auprès des Tribunaux

27.48.20 - 27.66.40 الهاتف

CASABLANCA le

01.06.2000

شارع أنفا الدار البيضاء 12

الدار البيضاء في

M. R. ARAFI ABDAHLAH

— MFS

Laboratoire D'analyses Médicales D'anfa
LAAM - ANFA
45, Boulevard d'Anfa - Casablanca
Tél: 0522 22 11 32 - Fax: 05 22 18 37

Dr. A. H. TADLAOUI
Chirurgie Générale
Chirurgie Gynéologique
2, Bd. d'Anfa - Casablanca

Si on n'aime pas toucher les gens, les écouter, si on n'a pas le désir de les rendre heureux, est-on Médecin ?

Docteur A. H. TADLAOUI
CHIRURGIE GÉNÉRALE, GYNÉCOLOGIQUE

الدكتور عبد الفتاح التدلاوي
مساعد سابق بالمركز الصحي الجامعي ابن رشد

& COELIOCHIRURGIE
Ex. Assistant du C.H.U Averroès

الجراحة العامة - جراحة الأمراض النسوية
الجراحة بالكاميرا

12, Boulevard d'ANFA (Place Verdun)

ت 27-66-40 & 27-48-20 Fax : 27-66-40

Patente N° 35507242

Expert auprès des Tribunaux

الهاتف 27.48.20 - 27.66.40

شارع انفا الدار البيضاء 12

CASABLANCA le

28.05.2020

الدار البيضاء في

Mr Araf Abdallah

NFS VS CRP

Créteil

Hôpital

PSA Hôpital

TBO-TGP 66T

A. lymph

Lipiodol Thiotropon

ABONNEMENT
SIDI MAAROUF
T.S.I.: 05.12.33.209
IF: 40603866 - T.P.: 56139885
CNSS: 9861924 - RG: 449229

Dr.A.H. TADLAOUI
Chirurgie Générale
Chirurgie Gynécologique
Casablanca

Si on n'aime pas toucher les gens, les écouter, si on n'a pas le désir de les rendre heureux, est-on Médecin ?

Laboratoire d'Analyses Médicales
Sidi Maarouf

Facture

Casablanca, le 29/05/2020

Dossier N°: 290520-027 du: 29/05/2020

Médecin Dr: TADLAOUI A H

Patient :Mr ARAJ Abdellah

Analyse	Valeur en B	Montant
SGOT/ASAT aspartate aminotransférase	50	67,00
HEMOGRAMME : NFS + PLQ	80	107,20
VITESSE DE SEDIMENTATION	30	40,20
CRP : PROTEINE-C REACTIVE	100	134,00
HEMOGLOBINE GLYQUEE A1C	100	134,00
CREATININE	30	40,20
ACIDE URIQUE	30	40,20
CHOLESTEROL TOTAL	30	40,20
LIPIDES TOTAUX	30	40,20
TRIGLYCERIDES	50	67,00
SGPT/ALAT alanine-aminotransférase :	50	67,00
GGT (Gamma glutamyl transférase)	50	67,00
PSA Total	300	402,00
Prélèvement sang veineux	1	20,00
	Total :	<u>1 266,20</u>

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
N°: 001631692003016
TÉL: 0606866 - TÉL: 36159885
CNSS: N°: 986124 - RC: 410238

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
Tél: 0523 335 202
IF: 40600020 - TÉL: 36159885
CNSS: 9861924 - RC: 410238



مُجَبِّرًا بِالْخَلْبَاتِ الْطَّيْبَةِ . أَنْفَا

Laboratoire d'Analyses Médicales d'Anfa
LABO - ANFA

Mohamed SAFFRAOUI
Pharmacien Biogiste
Diplômé de l'Université de Toulouse
des Spécialités d'Hématologie Immunologie
et Bactériologie Virologie Clinique
Ancien Assistant des Hôpitaux de France

مُحَمَّد أَصْفَارِي
صَدِيقِي أَحْيَانِي
الْمُتَعَلِّمُونَ

Casablanca le: 01/06/2020

Nom du patient: **Mr. ARAJ ABDALLAH**

Référence: 0FAH4910 01C7498

Prélèvement du: 01/06/2020

Sur prescription du : **Docteur TADLAOUI ABDELFATTAH**

HEMATOLOGIE

Numeration globulaire formule plaquettes ABACUS 380

Analyses	Résultats	Normes
HEMOGLOBINE	: 16.0	13 à 18 g/100ml
HEMATOCRITE	: 48	40 à 54 %
GLOBULES ROUGES	: 5.380 000	4.5 à 5.5 milli/mm3
V.G.M	: 89.	76 à 96 μ 3
T.C.M.H	: 30.	27 à 32 pg
C.C.M.H	: 33.	32 à 36 %
GLOBULES BLANCS	: 3.470	4.000 à 10.000 /mm3
Polynucléaires Neutrophiles	: 58 %	
Soit	: 2013./mm3	2500 à 7500 /mm3
Eosinophiles	: 4 %	
Soit	: 139. /mm3	0 à 400 /mm3
Basophiles	: 0 %	
Soit	: 0. /mm3	0 à 400 /mm3
Lymphocytes	: 33 %	
Soit	: 1145./mm3	1500 à 4000 /mm3
Monocytes	: 5 %	
Soit	: 174. /mm3	50 à 800 /mm3
THROMBOCYTES	: 274.000/mm3	150.000 à 400.000

Laboratoire D'analyses Biologiques D'anfa
LABO ANFA
45, Boulevard d'Anfa - Casablanca
Tél: 0522 22 11 62 - Fax: 05 22 18 37



مختبر التحاليل الطبية سيدى ماروف

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SIDI MAAROUF

Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie

Dr. Ghizlane HADDIOUI
Médecin Biologiste

Mr ARAJ Abdellah

Dossier N° : 290520-027

Page : 2/3

ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)

			Valeurs Usuelles	Antériorité
CRP : PROTEINE-C REACTIVE (Tech. Immunoturbidimétrique)	:	7,06 mg/l	(Inférieur à 6)	0,80 (14/10/19)
HÉMOGLOBINE GLYQUÉE : (HPLC D10-Biorad)	:	7,8 %	(4,5 - 6,3)	9,4 (14/10/19) 8,3 (06/03/19) ~~~

Les valeurs usuelles sont de 4,5 à 6,3 % lorsque les glycémies sont normales.
Les études ont montré que le diabète est :

- * bien équilibré lorsque le taux est inférieur à 6,5 %
- * moyennement lorsqu'il est entre 6,5 et 7,5 %
- * mal équilibré au-delà de 8 %

CREATININE (Tech enzymatique colorimétrique)	:	8,06 mg/l 71,33 µmol/l	(6 - 13) (53,1 - 115,05)	
ACIDE URIQUE (Dosage enzymatique à l'uricase)	:	48 mg/l 285,60 µmol/l	(25 - 65) (148,75 - 386,75)	42 (14/10/19)
CHOLESTEROL TOTAL (Tech enzymatique colorimétrique au CHOD)	:	2,21 g/l 5,70 mmol/l	(Inférieur à 2,2) (Inférieur à 5,16)	
LIPIDES TOTAUX	:	7,24 g/l	(4 - 7)	
TRIGLYCERIDES (Enzymatique)	:	1,82 g/l 2,07 mmol/l	(Inférieur à 1,5) (Inférieur à 1,71)	
SGOT/ASAT aspartate-aminotransférase (Tech. cinétique FCC)	:	24 UI/l	(Inférieur à 40)	
SGPT/ALAT alanine-aminotransférase : (Techn. cinétique IFCC)	:	31 UI/l	(Inférieur à 45)	
GGT (Gamma glutamyl transférase) (Tech. cinétique (IFCC))	:	44 UI/l	(Inférieur à 60)	

MARQUEURS PROSTATIQUES

		Valeurs Usuelles	Antériorité
PSA Total (Technique immunoenzymatique Access2 Beckman Coulter)	:	3,71 ng/ml	3,63 (06/03/19)

Valeurs usuelles

< à 40	ans	: 0.21 - 1.75 ng/ml
40 à 49ans		: 0.27 - 4.00 ng/ml
50 à 59ans		: 0.27 - 4.00ng/ml
60 à 69ans		: 0.22 - 6.20 ng/ml
> à 69	ans	: 0.21 - 6.80 ng/ml

*LABORATOIRE SIDI MAAROUF
Dr G HADDIOUI
Médecin Biologiste
Rdpt Sidi Maarouf - Casablanca
0522 33 52 09 / 0668 15 24 24
0522 33 52 71*



مختبر التحاليل الطبية سيدى مهروف

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SIDI MAAROUF

Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie

Dr. Ghizlane HADDIOUI
Médecin Biologiste

Casablanca, le 11/06/2020
Code Patient : 14-00334

Compte rendu d'analyses

Dossier N° : 290520-027 **Pvt du:** 29/05/2020 10:47
Nom : Mr ARAJ Abdellah
Demandé par Dr : TADLAOUI A H



Page : 1/3

ANALYSES D'HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME : NFS + PLQ (SYSMEX XS 500i)

			Valeurs Usuelles	Antériorité
Globules rouges	:	5,75	10 ⁶ /mm ³	(4,2 - 5,8) 5,32 (14/10/19)
Hémoglobine	:	18,00	g/dl	(12,5 - 18) 16,70 (14/10/19)
Hématocrite	:	48,80	%	(40 - 52) 45,00 (14/10/19)
VGM	:	84,87	fL	(80 - 95) 84,59 (14/10/19)
TCMH	:	31,30	pg	(27 - 33) 31,39 (14/10/19)
CCMH	:	36,89	g/dl	(32 - 36) 37,11 (14/10/19)
Globules blancs	:	4930	/mm ³	(4000 - 10000) 4190 (14/10/19)
Formule sanguine	:			
Neutrophiles	:	48,1 %	2371 /mm ³	(1500 - 7000) 1730 (14/10/19)
Lymphocytes	:	34,5 %	1701 /mm ³	(1000 - 4000) 1601 (14/10/19)
Monocytes	:	13,8 %	680 /mm ³	(40 - 1200) 620 (14/10/19)
Eosinophiles	:	3 %	148 /mm ³	(Inférieur à 400) 210 (14/10/19)
Basophiles	:	0,6 %	30 /mm ³	(Inférieur à 150) 29 (14/10/19)
Plaquettes	:	303000	/mm ³	(150000 - 400000) 270000 (14/10/19)

VITESSE DE SEDIMENTATION

(Technique de Westergreen : VES-Matic 20 de Diesse)

Première heure	:	11 mm	(Inférieur à 20)	5 (14/10/19)
----------------	---	-------	--------------------	--------------

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
 Dr G HADDIOUI
 Médecin Biologiste
 Rd.Pt Sidi Maarouf - Casablanca
 Tél: 0522 33 52 09 / 0668 15 24 24
 Fax: 0522 33 52 71