

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



ND: 29687

Déclaration de Maladie : N° P19-0017221

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6787 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : Ayad Mohamed Date de naissance : 01/05/56
Adresse : Salma 2 Rue 16 Taz N° 5 Cas
Tél. : 0605858995 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 18/06/2020

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Cas Le : 22/06/2020

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/06/2020	Ca		3000 Dh	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie ESSA-EGH M. PHARMACIEN Salma II Rue 18 R 44 Sidi Ouhman - Casablanca Tél 33-23-74	18/06/2020	158,90
PARAPHARMACIE - PARIS Rue de la République 27-25 40 35 Tél 33-1-40-35	18.06.2020	620,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur SIHAM IDRISSE ABOULAHJOUL

Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie
et Maladies Métaboliques

Diplômée de Paris:

Diplôme de Formation Médicale Spécialisée Endocrinologie et Métabolisme

Diplôme de Thyroïdologie

Diplôme de Nutrition et Diététique

Capacité de traitement par pompe à insuline, Insulinothérapie fonctionnelle

Diabète - Cholestérol - Hypertension artérielle - Hyper et hypocalcémie

Hormones - troubles et retard de croissance et de puberté

Thyroïde - Goitre - Hypophyse - Surrénales

Trouble du cycle menstruel - Stérilité du couple

Obésité - Régimes personnalisés - Maigreur

Prise en charge nutritionnelle après chirurgie bariatrique

Conseils diététiques : femme enceinte, sujet âgé, sportif

الدكتور سهام الإدريسي أبو لحجول

إختصاصية في علم الغدد، وداء السكري
وأعراض الأيض

حاصلة من كلية الطب بباريس على :

دبلوم التخصص الطبي في علم الغدد وأمراض الأيض

دبلوم في علم الغدة الدرقية

دبلوم في علم التغذية

قدرة المعالجة بواسطة مضخة الأنسولين

داء السكري - الكوليسترول - ارتفاع ضغط الدم - فرط ونقص

الكالسيوم في الدم - الهرمونات - اضطرابات وتأخر النمو والبلوغ

الغدة الدرقية - النخامية - الكظرية

اضطرابات الحيض - العقم عند الزوجين

السمنة - الحمية - النحافة

المشورة الغذائية: للنساء الحوامل لكبار السن والرياضيين

18 juin 2020

Casablanca, Le
Mme LEMKHANAT NAIMA

13,40 x 5
LEVOTHYROX 50 1 cp / jour du lundi au mercredi le matin. 30 min
avant le repas, 3 mois

6,80 x 5
LEVOTHYROX 25 µG 1 cp et demi / jour du lundi au mercredi le matin 30 min avant le
repas, 3 mois

LEVOTHYROX 100 : 1 cp / jour jeudi au Dimanche 3 mois

20 x 2
GLUCOPHAGE 500 MG 0 - 1 - 0 après les repas pendant 3 mois

56,30
D-CURE FORTE 100 000 1 ampoule (à mettre dans un yaourt) tous les 15 jours pdt 1 mois
et demi

MAGMINE 1 cp / jour le soir au coucher pendant 2 Mois

Bandelettes 198,90

1 x 6 jours
4 x 80,00 = 320,00
0 x 150,00 = 300,00

49, Avenue 2 Mars (angle Victor Hugo) - Immeuble les Roseaux - 2ème étage, N°8 (près du Lycée Mohammed V) - Casablanca

E-mail : dr.sihamidrisi@gmail.com البيضاء (قرب ثانوية محمد الخامس) - رقم 8 الطابق 2 - شارع 2 مارس زاوية فيكتور هوغو -

Tél.: (+212) 5 222 222 41 - GSM : (+212) 6 15 53 74 27 - Fax : (+212) 5 22 22 44 48 - ICE: 001697508000075

صيدال المصالح
ESAA-EGH M. PHARMACEN
Bld Othman - Casablanca
Tél. 23-88-74

PARAPHARMACIE
PARA-PARIS
Rue 3 N° 5 Doha Khalid CASA.
TEL./FAX. 0522 55 40 55

**PARAPHARMACIE
PARA - PARIS**

Rue 3 N° 5 Derb Khalid CASA.
TEL/FAX: 0522 55 40 55

CASA Le 18.06.2020

Facture N° 1108051

Mr. MELCHANKHANAT
NAIMA

Quantité	Désignation	Prix	Total
02	Boite Boendelets Bionne & Co.	150,00	300,00
04	Boite Boendelets Bionne & Co.	80,00	320,00
			620,00
I.C.E. : 001716042000080 PARAPHARMACIE PARA - PARIS Rue 3 N° 5 Derb Khalid CASA. TEL/FAX: 0522 55 40 55			

- Comment prendre GLUCOPHAGE 500mg, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver GLUCOPHAGE 500mg, comprimé pelliculé ?
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE 500mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

GLUCOPHAGE contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

Indications Thérapeutiques

L'insuline est une hormone produite par le pancréas et permettant à votre corps de récupérer le glucose (sucre) qui est dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie ou le stocke pour l'utiliser plus tard. Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. GLUCOPHAGE aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, la prise de GLUCOPHAGE à long terme permet également d'aider à limiter les risques de complications associées au diabète. GLUCOPHAGE est associé à une stabilité pondérale ou une modeste perte de poids.

GLUCOPHAGE est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin ; il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids.

Les patients adultes pourront prendre GLUCOPHAGE seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète (des médicaments à avaler ou de l'insuline). Les enfants de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre GLUCOPHAGE seul ou avec l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GLUCOPHAGE 500mg, comprimé pelliculé ?

Contre-indications

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE 500mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir « Ce que contient GLUCOPHAGE 500mg, comprimé pelliculé » dans la rubrique 6)
 - Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux (débit de filtration glomérulaire inférieur à 45 mL/min).
 - Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde. Une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle.
 - Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère ou si vous avez vomé plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
 - Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins.
- Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).
- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aigüe ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir «

consommation d'alcool, de perte de liquides organiques (déshydratation) liée à de fortes diarrhées ou à des vomissements, de problèmes hépatiques et d'affections médicales dans lesquelles une partie du corps est privée d'oxygène (telles que les maladies cardiaques aigües graves). Il est important de respecter la prise de votre traitement, des règles diététiques et la pratique d'un exercice physique régulier car cela peut réduire le risque d'acidose lactique.

L'acidose lactique peut apparaître de manière subtile et les symptômes éte non spécifique comme des vomissements, des maux de ventre (douleurs abdominales) avec crampes musculaire, une sensation de mal-être général avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Parmi les autres symptômes, on peut noter une baisse de la température corporelle et du rythme cardiaque. Si vous ressentez l'un de ces symptômes. Vous devez consulter immédiatement un médecin car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre GLUCOPHAGE et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

GLUCOPHAGE à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez GLUCOPHAGE en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiant, l'insuline, les mégilénites), il y a une risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Interactions avec d'autres médicaments.

Autre médicament et GLUCOPHAGE 500mg, comprimé pelliculé.

Si vous devez recevoir une injection de produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine, par exemple pour un examen radiographique ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant l'examen et au moins 48 heures après l'examen (voir « Veuillez à demander conseil à votre médecin » ci-dessus).

Prévenez votre médecin si vous prenez GLUCOPHAGE en même temps que l'un des médicaments suivants. Il pourra alors être nécessaire de contrôler plus souvent votre glycémie ou d'ajuster la dose de Glucophage :

- Diurétiques (utilisés pour éliminer une partie de l'eau de l'organisme en augmentant la production d'urine).
 - Agonistes des récepteurs bêta-2 adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
 - Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).
 - Autre médicaments utilisés pour traiter le diabète.
- Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris, ou pourriez prendre tout autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons

GLUCOPHAGE

Ne consommez pas

l'alcool

avant et

après votre

foi

également

Utilisez

Grosses

Pendant

Informez

l'être, affir

Ce médic

vous av

Sportifs

Sans obje

Effets su

Conduite

GLUCOPH

20,80

PPV :

LOT :

EXP :

56,30 DM
19K13/B
11/2021

D-CURE[®] AMPOULE



6 118001 320080





6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335

Merck Serono



نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس[®] قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليكَ
- وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليكَ. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟

رى



611 800110201 3

Levothyrox[®] 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160333

للقطع وما هي حالات استعماله؟

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات واستخدام الآلات

Merck Serono



نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس[®] قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟

رى



611 800110201 3

Levotyrox[®] 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160333

للقطع وما هي حالات استعماله؟

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية وأخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات واستخدام الآلات

Merck Serono



نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس[®] قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليكَ
- وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليكَ. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟

رى



611 800110201 3

Levothyrox[®] 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160333

للقطع وما هي حالات استعماله؟

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية وأخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات واستخدام الآلات

Merck Serono



نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس[®] قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليكَ
- وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليكَ. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟

رى



611 800110201 3

Levothyrox[®] 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160333

للقطع وما هي حالات استعماله؟

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات واستخدام الآلات

Merck Serono



نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس[®] قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟

رى



611 800110201 3

Levotyrox[®] 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160333

للقطع وما هي حالات استعماله؟

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات واستخدام الآلات

Rightest™ GS300 BLOOD GLUCOSE TEST STRIP INSERT

Intended Use

The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System is used by individuals with diabetes. It's for checking on glucose levels of whole blood from capillary. Capillary blood can be sampled from the fingertip, palm and forearm. It's as an aid in management of diabetes at home and clinical sites.

Rightest™ Blood Glucose Test Strips are intended for testing outside the body (*in vitro* diagnostic use) (For self-testing) only.


The **Rightest™** System tests the capillary blood and provides results equivalent to a laboratory instrument (plasma equivalent)

- The **Rightest™** Blood Glucose Test Strip GS300 is designed for use only with the **Rightest™** Blood Glucose Meter GM300.

- The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System includes Meter, Test Strips, Smart Code Key, Check Key, Control Solutions, Lancing Device and Lancets.

Test Procedure

REFER TO THE **Rightest™** USER'S MANUAL FOR MORE DETAILED INFORMATION.



Smart Code Key Installation


- 1) With the Meter off, follow ① and ② direction to put the new Smart Code Key into the track on code key base.
- 2) Push down the Smart Code Key until it snaps into the Smart Code Key base.

Preparing the Lancing Device

- 1) Hold the depth adjustable cap in one hand and hold the hub in the other hand. Bend the cap towards the down side, until a gap appears between the cap and hub.
- 2) Pull the cap and hub off in opposite directions, remove the cap.
- 3) Insert a new disposable lancet firmly into lancet carrier.
- 4) Twist off and set aside the protective cover of the disposable lancet.
- 5) Replace the depth adjustable cap.
- 6) Choose a depth of penetration by rotating the top portion of the depth adjustable cap until the setting depth matches the window. Settings are based on skin type "I" for soft or thin skin; "II" for average skin; "III" for thick or calloused skin.
- 7) Hold the hub in one hand and pull on the plunger in the other hand. The device will be cocked. Release the plunger, it will automatically move back to its original position near the hub.



Performing a Test



- 1) Wash and dry your hands. Take one strip from the vial. Close the vial.
- 2) Insert the strip into the strip port on meter with the indication symbol and stops. The meter will turn on automatically.
- 3) Make sure the code number on the meter screen matches the code number on the test strip vial.
- 4) When you see the first drop of blood, touch the side of your finger to the side of the meter.
- 5) Gently squeeze your finger to get a blood sample. Our meter only needs a small drop of blood.

Sample Size Example

1.0 μ L 1.4 μ L

Alternative site test

- To perform a test on the forearm, see the clear cap on the lancing device. To install, see the Instructions for the lancing device.
- To increase the blood flow, massage the puncture area of palm or forearm for a few seconds.



BIONIME
Blood Glucose Test Strip



LOT

2020-12-08
211911002



BIONIME
Blood Glucose Test Strip

25 PCS (a vial of 25)

GS300



Rightest™ GS300 BLOOD GLUCOSE TEST STRIP INSERT

Intended Use

The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System is used by individuals with diabetes. It's for checking on glucose levels of whole blood from capillary. Capillary blood can be sampled from the fingertip, palm and forearm. It's as an aid in management of diabetes at home and clinical sites.

Rightest™ Blood Glucose Test Strips are intended for testing outside the body (*in vitro* diagnostic use) (For self-testing) only.


The **Rightest™** System tests the capillary blood and provides results equivalent to a laboratory instrument (plasma equivalent)

- The **Rightest™** Blood Glucose Test Strip GS300 is designed for use only with the **Rightest™** Blood Glucose Meter GM300.

- The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System includes Meter, Test Strips, Smart Code Key, Check Key, Control Solutions, Lancing Device and Lancets.

Test Procedure

REFER TO THE **Rightest™** USER'S MANUAL FOR MORE DETAILED INFORMATION.



Smart Code Key Installation


- 1) With the Meter off, follow ① and ② direction to put the new Smart Code Key into the track on code key base.
- 2) Push down the Smart Code Key until it snaps into the Smart Code Key base.

Preparing the Lancing Device

- 1) Hold the depth adjustable cap in one hand and hold the hub in the other hand. Bend the cap towards the down side, until a gap appears between the cap and hub.
- 2) Pull the cap and hub off in opposite directions, remove the cap.
- 3) Insert a new disposable lancet firmly into lancet carrier.
- 4) Twist off and set aside the protective cover of the disposable lancet.
- 5) Replace the depth adjustable cap.
- 6) Choose a depth of penetration by rotating the top portion of the depth adjustable cap until the setting depth matches the window. Settings are based on skin type "I" for soft or thin skin; "II" for average skin; "III" for thick or calloused skin.
- 7) Hold the hub in one hand and pull on the plunger in the other hand. The device will be cocked. Release the plunger, it will automatically move back to its original position near the hub.



Performing a Test



- 1) Wash and dry your hands. Take one strip from the vial. Close the vial.
- 2) Insert the strip into the strip port on meter with the indication symbol and stops. The meter will turn on automatically.
- 3) Make sure the code number on the meter screen matches the code number on the test strip vial.
- 4) When you see the first drop of blood, touch the side of your finger to the side of the meter.
- 5) Gently squeeze your finger to get a blood sample. Our meter only needs a small drop of blood.

Sample Size Example

1.0 μ L 1.4 μ L

Alternative site test

- To perform a test on the forearm, see the clear cap on the lancing device. To install, see the Instructions for the lancing device.
- To increase the blood flow, massage the puncture area of palm or forearm for a few seconds.



BIONIME
Blood Glucose Test Strip



LOT

2020-12-08
211911002



BIONIME
Blood Glucose Test Strip

25 PCS (a vial of 25)

GS300



Rightest™ GS300 BLOOD GLUCOSE TEST STRIP INSERT

Intended Use

The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System is used by individuals with diabetes. It's for checking on glucose levels of whole blood from capillary. Capillary blood can be sampled from the fingertip, palm and forearm. It's as an aid in management of diabetes at home and clinical sites.

Rightest™ Blood Glucose Test Strips are intended for testing outside the body (*in vitro* diagnostic use) (For self-testing) only.


The **Rightest™** System tests the capillary blood and provides results equivalent to a laboratory instrument (plasma equivalent)

- The **Rightest™** Blood Glucose Test Strip GS300 is designed for use only with the **Rightest™** Blood Glucose Meter GM300.

- The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System includes Meter, Test Strips, Smart Code Key, Check Key, Control Solutions, Lancing Device and Lancets.

Test Procedure

REFER TO THE **Rightest™** USER'S MANUAL FOR MORE DETAILED INFORMATION.



Smart Code Key Installation


- 1) With the Meter off, follow ① and ② direction to put the new Smart Code Key into the track on code key base.
- 2) Push down the Smart Code Key until it snaps into the Smart Code Key base.

Preparing the Lancing Device

- 1) Hold the depth adjustable cap in one hand and hold the hub in the other hand. Bend the cap towards the down side, until a gap appears between the cap and hub.
- 2) Pull the cap and hub off in opposite directions, remove the cap.
- 3) Insert a new disposable lancet firmly into lancet carrier.
- 4) Twist off and set aside the protective cover of the disposable lancet.
- 5) Replace the depth adjustable cap.
- 6) Choose a depth of penetration by rotating the top portion of the depth adjustable cap until the setting depth matches the window. Settings are based on skin type "I" for soft or thin skin; "II" for average skin; "III" for thick or calloused skin.
- 7) Hold the hub in one hand and pull on the plunger in the other hand. The device will be cocked. Release the plunger, it will automatically move back to its original position near the hub.



Performing a Test



- 1) Wash and dry your hands. Take one strip from the vial. Close the vial.
- 2) Insert the strip into the strip port on meter with the indication symbol and stops. The meter will turn on automatically.
- 3) Make sure the code number on the meter screen matches the code number on the test strip vial.
- 4) When you see the first drop of blood, touch the side of your finger to the side of the meter.
- 5) Gently squeeze your finger to get a blood sample. Our meter only needs a small drop of blood.

Sample Size Example

1.0 μ L 1.4 μ L

Alternative site test

- To perform a test on the forearm, see the Instructions for the lancing device.
- To increase the blood flow, massage the puncture area of palm or forearm for a few seconds.



BIONIME
Blood Glucose Test Strip



LOT

2020-12-08
211911002



BIONIME
Blood Glucose Test Strip

25 PCS (a vial of 25)

GS300



Rightest™ GS300 BLOOD GLUCOSE TEST STRIP INSERT

Intended Use

The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System is used by individuals with diabetes. It's for checking on glucose levels of whole blood from capillary. Capillary blood can be sampled from the fingertip, palm and forearm. It's as an aid in management of diabetes at home and clinical sites.

Rightest™ Blood Glucose Test Strips are intended for testing outside the body (*in vitro* diagnostic use) (For self-testing) only.


The **Rightest™** System tests the capillary blood and provides results equivalent to a laboratory instrument (plasma equivalent)

- The **Rightest™** Blood Glucose Test Strip GS300 is designed for use only with the **Rightest™** Blood Glucose Meter GM300.

- The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System includes Meter, Test Strips, Smart Code Key, Check Key, Control Solutions, Lancing Device and Lancets.

Test Procedure

REFER TO THE **Rightest™** USER'S MANUAL FOR MORE DETAILED INFORMATION.



Smart Code Key Installation


- 1) With the Meter off, follow ① and ② direction to put the new Smart Code Key into the track on code key base.
- 2) Push down the Smart Code Key until it snaps into the Smart Code Key base.

Preparing the Lancing Device

- 1) Hold the depth adjustable cap in one hand and hold the hub in the other hand. Bend the cap towards the down side, until a gap appears between the cap and hub.
- 2) Pull the cap and hub off in opposite directions, remove the cap.
- 3) Insert a new disposable lancet firmly into lancet carrier.
- 4) Twist off and set aside the protective cover of the disposable lancet.
- 5) Replace the depth adjustable cap.
- 6) Choose a depth of penetration by rotating the top portion of the depth adjustable cap until the setting depth matches the window. Settings are based on skin type "I" for soft or thin skin; "II" for average skin; "III" for thick or calloused skin.
- 7) Hold the hub in one hand and pull on the plunger in the other hand. The device will be cocked. Release the plunger, it will automatically move back to its original position near the hub.



Performing a Test



- 1) Wash and dry your hands. Take one strip from the vial. Close the vial.
- 2) Insert the strip into the strip port on meter with the indication symbol and stops. The meter will turn on automatically.
- 3) Make sure the code number on the meter screen matches the code number on the test strip vial.
- 4) When you see the first drop of blood, touch the side of your finger to the side of the meter.
- 5) Gently squeeze your finger to get a blood sample. Our meter only needs a small drop of blood.

Sample Size Example

1.0 μ L 1.4 μ L

Alternative site test

- To perform a test on the forearm, use the clear cap on the lancing device. To install, see the Instructions for the lancing device.
- To increase the blood flow, massage the puncture area of palm or forearm for a few seconds.



BIONIME
Blood Glucose Test Strip



LOT

2020-12-08
211911002



BIONIME
Blood Glucose Test Strip

25 PCS (a vial of 25)

GS300



Rightest™ GS300 BLOOD GLUCOSE TEST STRIP INSERT

Intended Use

The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System is used by individuals with diabetes. It's for checking on glucose levels of whole blood from capillary. Capillary blood can be sampled from the fingertip, palm and forearm. It's as an aid in management of diabetes at home and clinical sites.

Rightest™ Blood Glucose Test Strips are intended for testing outside the body (*in vitro* diagnostic use) (For self-testing) only.


The **Rightest™** System tests the capillary blood and provides results equivalent to a laboratory instrument (plasma equivalent)

- The **Rightest™** Blood Glucose Test Strip GS300 is designed for use only with the **Rightest™** Blood Glucose Meter GM300.

- The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System includes Meter, Test Strips, Smart Code Key, Check Key, Control Solutions, Lancing Device and Lancets.

Test Procedure

REFER TO THE **Rightest™** USER'S MANUAL FOR MORE DETAILED INFORMATION.



Smart Code Key Installation


- 1) With the Meter off, follow ① and ② direction to put the new Smart Code Key into the track on code key base.
- 2) Push down the Smart Code Key until it snaps into the Smart Code Key base.

Preparing the Lancing Device

- 1) Hold the depth adjustable cap in one hand and hold the hub in the other hand. Bend the cap towards the down side, until a gap appears between the cap and hub.
- 2) Pull the cap and hub off in opposite directions, remove the cap.
- 3) Insert a new disposable lancet firmly into lancet carrier.
- 4) Twist off and set aside the protective cover of the disposable lancet.
- 5) Replace the depth adjustable cap.
- 6) Choose a depth of penetration by rotating the top portion of the depth adjustable cap until the setting depth matches the window. Settings are based on skin type "I" for soft or thin skin; "II" for average skin; "III" for thick or calloused skin.
- 7) Hold the hub in one hand and pull on the plunger in the other hand. The device will be cocked. Release the plunger, it will automatically move back to its original position near the hub.



Performing a Test



- 1) Wash and dry your hands. Take one strip from the vial. Close the vial.
- 2) Insert the strip into the strip port on meter with the indication symbol and stops. The meter will turn on automatically.
- 3) Make sure the code number on the meter screen matches the code number on the test strip vial.
- 4) When you see the first drop of blood, touch the side of your finger to the side of the meter.
- 5) Gently squeeze your finger to get a blood sample. Our meter only needs a small drop of blood.

Sample Size Example

1.0 μ L 1.4 μ L

Alternative site test

- To perform a test on the forearm, see the Instructions for the lancing device.
- To increase the blood flow, massage the puncture area of palm or forearm for a few seconds.



BIONIME
Blood Glucose Test Strip



LOT

2020-12-08
211911002



BIONIME
Blood Glucose Test Strip

25 PCS (a vial of 25)

GS300



Rightest™ GS300 BLOOD GLUCOSE TEST STRIP INSERT

Intended Use

The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System is used by individuals with diabetes. It's for checking on glucose levels of whole blood from capillary. Capillary blood can be sampled from the fingertip, palm and forearm. It's as an aid in management of diabetes at home and clinical sites.

Rightest™ Blood Glucose Test Strips are intended for testing outside the body (*in vitro* diagnostic use) (For self-testing) only.


The **Rightest™** System tests the capillary blood and provides results equivalent to a laboratory instrument (plasma equivalent)

- The **Rightest™** Blood Glucose Test Strip GS300 is designed for use only with the **Rightest™** Blood Glucose Meter GM300.

- The **Rightest™** Blood Glucose Monitoring System includes Meter, Test Strips, Smart Code Key, Check Key, Control Solutions, Lancing Device and Lancets.

Test Procedure

REFER TO THE **Rightest™** USER'S MANUAL FOR MORE DETAILED INFORMATION.



Smart Code Key Installation


- 1) With the Meter off, follow ① and ② direction to put the new Smart Code Key into the track on code key base.
- 2) Push down the Smart Code Key until it snaps into the Smart Code Key base.

Preparing the Lancing Device

- 1) Hold the depth adjustable cap in one hand and hold the hub in the other hand. Bend the cap towards the down side, until a gap appears between the cap and hub.
- 2) Pull the cap and hub off in opposite directions, remove the cap.
- 3) Insert a new disposable lancet firmly into lancet carrier.
- 4) Twist off and set aside the protective cover of the disposable lancet.
- 5) Replace the depth adjustable cap.
- 6) Choose a depth of penetration by rotating the top portion of the depth adjustable cap until the setting depth matches the window. Settings are based on skin type "I" for soft or thin skin; "II" for average skin; "III" for thick or calloused skin.
- 7) Hold the hub in one hand and pull on the plunger in the other hand. The device will be cocked. Release the plunger, it will automatically move back to its original position near the hub.



Performing a Test



- 1) Wash and dry your hands. Take one strip from the vial. Close the vial.
- 2) Insert the strip into the strip port on meter with the indication symbol and stops. The meter will turn on automatically.
- 3) Make sure the code number on the meter screen matches the code number on the test strip vial.
- 4) When you see the first drop of blood, touch the side of your finger to the side of the meter.
- 5) Gently squeeze your finger to get a blood sample. Our meter only needs a small drop of blood.

Sample Size Example

1.0 μ L 1.4 μ L

Alternative site test

- To perform a test on the forearm, see the Instructions for the lancing device.
- To increase the blood flow, massage the puncture area of palm or forearm for a few seconds.



BIONIME
Blood Glucose Test Strip



LOT

2020-12-08
211911002



BIONIME
Blood Glucose Test Strip

25 PCS (a vial of 25)

GS300

