

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



ND = 29634

Déclaration de Maladie : N° P19- 0002450

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 21166

Société

Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : Mme SOUSSI Souha

Date de naissance : 1954


Adresse : 30, Rue etinoumey, les Roya EL SARRAT Bourgogne

Tél. : 06.68.97.1004

Total des frais engagés : 3928,75 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 15/04/2020

Nom et prénom du malade : Soussi Souha

Age : 66 ans

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint


A. CUCUIL

Nature de la maladie : Scleroderme

Enfant

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
٢٠١٧/٤/٢٣	G Consultation D-consultation CCG+14%	٥٠ ٦٠ ٦٠	٣٠٠ / ٣٠٠	الدكتور رشيد العبدلي Dr.Rachid LAKAKI Médecine Internat Bab Al Yam Hospital, Makkah - Saudi Arabia Date: 23/04/2017 Signature: Dr. Rachid Lakaki

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE DU PERIGORD 22 RUE DE LA REPUBLIQUE 24300 BERGERAC TÉL : 05 24 26 00 39 FAX : 05 24 26 01 19	15/14/2020	2875,75

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553



[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الدكتور رشيد العراقي
DOCTEUR RACHID LARAKI

ANCIEN RÉSIDENT DU COLLÈGE DE MÉDECINE
DES HÔPITAUX DE PARIS

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE À LA FACULTÉ DE
PARIS VI (PITIÈ SALPÉTRIÈRE)

MÉDECINE INTERNE

le 15/4/20

re Saïdi Saïd

81,00 Fibrocard 240 1fl le neti-

79,16 Acard 50 (= losartan) 1fl le S.A.R
13,40 x 11

Glycine 11, (SV)

24,9 x 4 Artimax 1g 3fl, (SV)

49,60 x 2 D Core F 1A-7 / 3 (SV)

40,50 x 3 Tardyfon 20 1fl (SV) 15jan/mar

204,- Gafrex 75 1gr 1j fl (SV)

108,65 Abut

D Vescane 7 يكع 7 (SV)

28/3/975



الدكتور رشيد العراقي
Dr Rachid LARAKI
Médecin Interne
400, Bd Brahim Roudani - Casablanca - 20330
Tél : 05 22 98 16 69 - Fax : 05 22 98 14 07

400 شارع إبراهيم الروదاني، المعارف - 20330 الدار البيضاء

الفاكس : 05 22 98 14 07 - الهاتف : 05 22 98 16 69

rlarak.iinterniste@gmail.com

DOCTEUR RACHID LARAKI

Ancien Résident du Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris
Ancien Chef de Clinique à la Faculté de Paris VI (Pitié-Salpêtrière)

MÉDECINE INTERNE

Note d'honoraires

Mme Soussi Saida

Casablanca, le 15/04/2020

Acte	Montant
Consultation spécialisée en médecine interne	500,00 DH
Examen des urines bandelette Cybow 10	50,00 DH
Dynamap + SpO2	150,00 DH
ECG multiparamétrique + Scope	350,00 DH
Total	1050,00 DH

Arrêtée la présente note d'honoraires à la somme de 1 050,00 DH
(Mille Cinquante dirhams)

الدكتور رشيد العراقي

Dr Rachid LARAKI

Médecine Interne

400, Bd Brahim Roudani, Maarif - 20330 Casablanca
Tél. : 05 22 98 16 69 - Fax : 05 22 98 14 07



Losartan (DCI) potassique 50 mg
Boîtes de 14 et 28 Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave OU Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT : 191592

UT AV : 11/2021

PPV : 79,00 DH

d'action centrale) ainsi que les diabétiques couramment appelés « gitazones ».

osartan une fois par jour (1 comprimé) chaque semaine, 25 mg par jour (1 comprimé), 100 mg par jour (2 comprimés) jusqu'à la dose maximale de 150 mg par exemple, 3 comprimés.

de ACARD 50 mg.

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

Administration

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par ACARD 50 mg, comprimé pelliculé sans avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais ACARD 50 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la composition).
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ACARD, comprimé pelliculé en début de grossesse).
- si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'lisinopril.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Description des effets indésirables.

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant. Arrêtez de prendre ACARD et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la gorge qui peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).
- Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'1 patient sur 10 000 mais moins d'1 patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation. Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec Losartan :

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

- étourdissements.
- baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perte d'eau excessive, patients en insuffisance cardiaque sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques).
- effet orthostatique lié à la dose tel que diminution de la pression artérielle lors du passage de la position couchée à la position assise.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- somnolence. • maux de tête. • troubles du sommeil. • sensations d'accélération du rythme cardiaque (palpitations).
- douleur dans la poitrine (angine de poitrine). • essoufflement (dyspnée).
- douleurs abdominales. • constipation opiniâtre. • diarrhée. • nausées. • vomissements. • éruption (urticaire).
- démangeaisons (prurit). • éruption cutanée. • gonflement localisé (œdème). • toux.

Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :

- hypersensibilité • angioédème. • engourdissement ou picotements (paresthesies). • attaque cérébrale (AVC).
- évanoissement (syncope). • battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire).
- inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant purpura de Henoch-Schönlein). • inflammation du foie (hépatite).
- élévation du taux de l'alanine amino-transférase (ALT), qui

COMPOSITION:

Losartan (DCI) potassique 50 mg
Excipients : cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium dihydraté, silice colloïdale anhydre, croscarmellose sodique, talc, stéarate de magnésium, opadry blanc q.s. p 1 comprimé pelliculé.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE:

Le losartan (ACARD) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

ACARD 50 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- pour traiter les adultes, et les enfants et adolescents de 6 à 18 ans, ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie $\geq 0,5\text{ g/jour}$ (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC, médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. ACARD 50 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (indication LIFE).

POSOLOGIE, MODE ETIQUETAGE VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de ACARD 50 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre ACARD 50 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé d'ACARD 50 mg). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés d'ACARD 50 mg).

Si vous avez l'impression que l'effet d'ACARD est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants et adolescents

Enfants âgés de moins de 6 ans

ACARD n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Enfants et adolescents (6 à 18 ans)

La dose habituelle d'initiation chez les patients dont le poids corporel est compris entre 20 et 50 kg est de 0,7 mg de losartan par kg, une fois par jour (jusqu'à 25 mg d'ACARD). Le médecin peut augmenter la dose si votre pression artérielle n'est pas contrôlée.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé d'ACARD 50 mg). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés d'ACARD 50 mg) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les



Losartan (DCI) potassique 50 mg
Boîtes de 14 et 28 Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave OU Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT : 191592

UT AV : 11/2021

PPV : 79,00 DH

d'action centrale) ainsi que les diabétiques couramment appelés « gitazones ».

osartan une fois par jour (1 comprimé) chaque semaine, 25 mg par jour (1 comprimé), 100 mg par jour (2 comprimés) jusqu'à la dose maximale de 150 mg par exemple, 3 comprimés.

de ACARD 50 mg.

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

Administration

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par ACARD 50 mg, comprimé pelliculé sans avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais ACARD 50 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la composition).
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ACARD, comprimé pelliculé en début de grossesse).
- si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'lisinopril.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Description des effets indésirables.

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant. Arrêtez de prendre ACARD et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la gorge qui peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).
- Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'1 patient sur 10 000 mais moins d'1 patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation. Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec Losartan :
- Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :
 - étourdissements.
 - baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perte d'eau excessive, patients en insuffisance cardiaque sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques).
 - effet orthostatique lié à la dose tel que diminution de la pression artérielle lors du passage de la position couchée à la position assise.

• faiblesse.

• fatigue.

• trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie).

• trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie).

• modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale.

• réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie).

• élévation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le serum des patients en insuffisance cardiaque.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

• somnolence. • maux de tête. • troubles du sommeil. • sensations d'accélération du rythme cardiaque (palpitations).

• douleur dans la poitrine (angine de poitrine). • essoufflement (dyspnée) et

• douleurs abdominales. • constipation opiniâtre. • diarrhée. • nausées. • vomissements. • éruption (urticaire).

• démangeaisons (prurit). • éruption cutanée. • gonflement localisé (œdème). • toux.

Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :

• hypersensibilité. • angioédème. • engourdissement ou picotements (paresthesies). • attaque cérébrale (AVC).

• évanoissement (syncope). • battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire).

• inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant purpura de Henoch-Schönlein). • inflammation du foie (hépatite).

• élévation du taux de l'alanine amino-transférase (ALT), qui

COMPOSITION:

Losartan (DCI) potassique 50 mg

Excipients : cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium dihydraté, silice colloïdale anhydre, croscarmellose sodique, talc, stéarate de magnésium, opadry blanc q.s. p 1 comprimé pelliculé.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE:

Le losartan (ACARD) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

ACARD 50 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

• pour traiter les adultes, et les enfants et adolescents de 6 à 18 ans, ayant une pression artérielle élevée (hypertension).

• pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie $\geq 0,5\text{ g/jour}$ (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.

• pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC, médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.

• chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. ACARD 50 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (indication LIFE).

POSOLOGIE, MODE ETIQUETAGE VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de ACARD 50 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre ACARD 50 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé d'ACARD 50 mg). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés d'ACARD 50 mg).

Si vous avez l'impression que l'effet d'ACARD est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants et adolescents

Enfants âgés de moins de 6 ans

ACARD n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Enfants et adolescents (6 à 18 ans)

La dose habituelle d'initiation chez les patients dont le poids corporel est compris entre 20 et 50 kg est de 0,7 mg de losartan par kg, une fois par jour (jusqu'à 25 mg d'ACARD). Le médecin peut augmenter la dose si votre pression artérielle n'est pas contrôlée.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé d'ACARD 50 mg). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés d'ACARD 50 mg) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les



Losartan (DCI) potassique 50 mg
Boîtes de 14 et 28 Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave OU Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT : 191592

UT AV : 11/2021

PPV : 79,00 DH

d'action centrale) ainsi que les diabétiques couramment appelés « gitazones ».

osartan une fois par jour (1 comprimé) chaque semaine, 25 mg par jour (1 comprimé), 100 mg par jour (2 comprimés) jusqu'à la dose maximale de 150 mg par exemple, 3 comprimés.

de ACARD 50 mg.

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

Administration

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par ACARD 50 mg, comprimé pelliculé sans avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais ACARD 50 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la composition).
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ACARD, comprimé pelliculé en début de grossesse).
- si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'lisinopril.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Description des effets indésirables.

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant. Arrêtez de prendre ACARD et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la gorge qui peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).
- Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'1 patient sur 10 000 mais moins d'1 patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation. Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec Losartan :
- Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :
 - étourdissements.
 - baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perte d'eau excessive, patients en insuffisance cardiaque sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques).
 - effet orthostatique lié à la dose tel que diminution de la pression artérielle lors du passage de la position couchée à la position assise.

• faiblesse.

• fatigue.

• trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie).

• trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie).

• modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale.

• réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie).

• élévation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le serum des patients en insuffisance cardiaque.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

• somnolence. • maux de tête. • troubles du sommeil. • sensations d'accélération du rythme cardiaque (palpitations).

• douleur dans la poitrine (angine de poitrine). • essoufflement (dyspnée) et

• douleurs abdominales. • constipation opiniâtre. • diarrhée. • nausées. • vomissements. • éruption (urticaire).

• démangeaisons (prurit). • éruption cutanée. • gonflement localisé (œdème). • toux.

Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :

• hypersensibilité. • angioédème. • engourdissement ou picotements (paresthesies). • attaque cérébrale (AVC).

• évanoissement (syncope). • battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire).

• inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant purpura de Henoch-Schönlein). • inflammation du foie (hépatite).

• élévation du taux de l'alanine amino-transférase (ALT), qui

COMPOSITION:

Losartan (DCI) potassique 50 mg
Excipients : cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium dihydraté, silice colloïdale anhydre, croscarmellose sodique, talc, stéarate de magnésium, opadry blanc q.s. p 1 comprimé pelliculé.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE:

Le losartan (ACARD) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

ACARD 50 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- pour traiter les adultes, et les enfants et adolescents de 6 à 18 ans, ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie $\geq 0,5\text{ g/jour}$ (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC, médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. ACARD 50 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (indication LIFE).

POSOLOGIE, MODE ETIQUETAGE VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de ACARD 50 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre ACARD 50 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de ACARD 50 mg). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de ACARD 50 mg).

Si vous avez l'impression que l'effet d'ACARD est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants et adolescents

Enfants âgés de moins de 6 ans

ACARD n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Enfants et adolescents (6 à 18 ans)

La dose habituelle d'initiation chez les patients dont le poids corporel est compris entre 20 et 50 kg est de 0,7 mg de losartan par kg, une fois par jour (jusqu'à 25 mg de ACARD). Le médecin peut augmenter la dose si votre pression artérielle n'est pas contrôlée.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de ACARD 50 mg). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de ACARD 50 mg) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les



Losartan (DCI) potassique 50 mg
Boîtes de 14 et 28 Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave OU Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT : 191592

UT AV : 11/2021

PPV : 79,00 DH

d'action centrale) ainsi que les diabétiques couramment appelés « gitazones ».

osartan une fois par jour (1 comprimé) chaque semaine, 25 mg par jour (1 comprimé), 100 mg par jour (2 comprimés) jusqu'à la dose maximale de 150 mg par exemple, 3 comprimés.

de ACARD 50 mg.

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

Administration

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par ACARD 50 mg, comprimé pelliculé sans avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais ACARD 50 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la composition).
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ACARD, comprimé pelliculé en début de grossesse).
- si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'lisinopril.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Description des effets indésirables.

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant. Arrêtez de prendre ACARD et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la gorge qui peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).
- Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'1 patient sur 10 000 mais moins d'1 patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation. Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec Losartan :

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

- étourdissements.
- baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perte d'eau excessive, patients en insuffisance cardiaque sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques).
- effet orthostatique lié à la dose tel que diminution de la pression artérielle lors du passage de la position couchée à la position assise.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- somnolence. • maux de tête. • troubles du sommeil. • sensations d'accélération du rythme cardiaque (palpitations).
- douleur dans la poitrine (angine de poitrine). • essoufflement (dyspnée).
- douleurs abdominales. • constipation opiniâtre. • diarrhée. • nausées. • vomissements. • éruption (urticaire).
- démangeaisons (prurit). • éruption cutanée. • gonflement localisé (œdème). • toux.

Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :

- hypersensibilité • angioédème. • engourdissement ou picotements (paresthesies). • attaque cérébrale (AVC).
- évanoissement (syncope). • battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire).
- inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant purpura de Henoch-Schönlein). • inflammation du foie (hépatite).
- élévation du taux de l'alanine amino-transférase (ALT), qui

COMPOSITION:

Losartan (DCI) potassique 50 mg
Excipients : cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium dihydraté, silice colloïdale anhydre, croscarmellose sodique, talc, stéarate de magnésium, opadry blanc q.s.p 1 comprimé pelliculé.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE:

Le losartan (ACARD) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

ACARD 50 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- pour traiter les adultes, et les enfants et adolescents de 6 à 18 ans, ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie $\geq 0,5\text{ g/jour}$ (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC, médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. ACARD 50 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (indication LIFE).

POSOLOGIE, MODE ETIQUETAGE VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de ACARD 50 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre ACARD 50 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé d'ACARD 50 mg). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés d'ACARD 50 mg).

Si vous avez l'impression que l'effet d'ACARD est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants et adolescents

Enfants âgés de moins de 6 ans

ACARD n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Enfants et adolescents (6 à 18 ans)

La dose habituelle d'initiation chez les patients dont le poids corporel est compris entre 20 et 50 kg est de 0,7 mg de losartan par kg, une fois par jour (jusqu'à 25 mg d'ACARD). Le médecin peut augmenter la dose si votre pression artérielle n'est pas contrôlée.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé d'ACARD 50 mg). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés d'ACARD 50 mg) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les



Losartan (DCI) potassique 50 mg
Boîtes de 14 et 28 Comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave OU Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT : 191592

UT AV : 11/2021

PPV : 79,00 DH

d'action centrale) ainsi que les diabétiques couramment appelés « gitazones ».

osartan une fois par jour (1 comprimé) chaque semaine, 25 mg par jour (1 comprimé), 100 mg par jour (2 comprimés) jusqu'à la dose maximale de 150 mg par exemple, 3 comprimés.

de ACARD 50 mg.

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est habituellement associé à un diurétique (médicament qui augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un digitalique (médicament qui aide le cœur à fonctionner plus efficacement) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou les patients de plus de 75 ans. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients ayant une insuffisance hépatique grave.

Administration

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par ACARD 50 mg, comprimé pelliculé sans avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais ACARD 50 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la composition).
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ACARD, comprimé pelliculé en début de grossesse).
- si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'lisinopril.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Description des effets indésirables.

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant. Arrêtez de prendre ACARD et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la gorge qui peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).
- Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'1 patient sur 10 000 mais moins d'1 patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence ou d'une hospitalisation. Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec Losartan :

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

- étourdissements.
- baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perte d'eau excessive, patients en insuffisance cardiaque sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques).
- effet orthostatique lié à la dose tel que diminution de la pression artérielle lors du passage de la position couchée à la position assise.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- somnolence. • maux de tête. • troubles du sommeil. • sensations d'accélération du rythme cardiaque (palpitations).
- douleur dans la poitrine (angine de poitrine). • essoufflement (dyspnée).
- douleurs abdominales. • constipation opiniâtre. • diarrhée. • nausées. • vomissements. • éruption (urticaire).
- démangeaisons (prurit). • éruption cutanée. • gonflement localisé (œdème). • toux.

Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :

- hypersensibilité • angioédème. • engourdissement ou picotements (paresthesies). • attaque cérébrale (AVC).
- évanoissement (syncope). • battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire).
- inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant purpura de Henoch-Schönlein). • inflammation du foie (hépatite).
- élévation du taux de l'alanine amino-transférase (ALT), qui

COMPOSITION:

Losartan (DCI) potassique 50 mg
Excipients : cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium dihydraté, silice colloïdale anhydre, croscarmellose sodique, talc, stéarate de magnésium, opadry blanc q.s. p 1 comprimé pelliculé.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE:

Le losartan (ACARD) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

ACARD 50 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- pour traiter les adultes, et les enfants et adolescents de 6 à 18 ans, ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie $\geq 0,5\text{ g/jour}$ (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC, médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. ACARD 50 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (indication LIFE).

POSOLOGIE, MODE ETIQUETAGE VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la dose appropriée de ACARD 50 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre ACARD 50 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Patients adultes hypertendus

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé d'ACARD 50 mg). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés d'ACARD 50 mg).

Si vous avez l'impression que l'effet d'ACARD est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants et adolescents

Enfants âgés de moins de 6 ans

ACARD n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Enfants et adolescents (6 à 18 ans)

La dose habituelle d'initiation chez les patients dont le poids corporel est compris entre 20 et 50 kg est de 0,7 mg de losartan par kg, une fois par jour (jusqu'à 25 mg d'ACARD). Le médecin peut augmenter la dose si votre pression artérielle n'est pas contrôlée.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé d'ACARD 50 mg). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés d'ACARD 50 mg) en fonction de la réponse tensionnelle.

Tous les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les

FIBROCARD®

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
mg Gélule de minigranules à libération prolongée
rapamil.

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

LOT 18F29/A 2

EXP 06 2022

PPV 81.00 DH

ACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg

ACOTHERAPEUTIQUE :

ioniste du calcium.

hypertension artérielle.

pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONSEILS :

Poser au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés.

ARTICULIERES :

meilleur traitant en cas de :

d'autres médicaments,

tement,

du cœur ou maladie du foie,

ement des reins

S :

ilité physico-chimique n'est connue à ce jour.

AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

meilleur si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'autres médicaments pour le rythme du cœur et de l'alpha-methyldopa.

Tous les autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

AS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

conseiller pendant les 3 premiers mois.

FIBROCARD®

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
mg Gélule de minigranules à libération prolongée
rapamil.

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

LOT 18F29/A 2

EXP 06 2022

PPV 81.00 DH

ACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg

ACOTHERAPEUTIQUE :

ioniste du calcium.

hypertension artérielle.

pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONSEILS :

Poser au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés.

ARTICULIERES :

meilleur traitant en cas de :

d'autres médicaments,

tement,

du cœur ou maladie du foie,

ement des reins

S :

ilité physico-chimique n'est connue à ce jour.

AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

meilleur si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'autres médicaments pour le rythme du cœur et de l'alpha-methyldopa.

Tous les autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

AS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

conseiller pendant les 3 premiers mois.

FIBROCARD®

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
mg Gélule de minigranules à libération prolongée
rapamil.

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

LOT 18F29/A 2

EXP 06 2022

PPV 81.00 DH

ACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg

ACOTHERAPEUTIQUE :

ioniste du calcium.

hypertension artérielle.

pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONSEILS :

Poser au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés.

ARTICULIERES :

meilleur traitant en cas de :

d'autres médicaments,

tement,

du cœur ou maladie du foie,

ement des reins

S :

ilité physico-chimique n'est connue à ce jour.

AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

meilleur si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'autres médicaments pour le rythme du cœur et de l'alpha-methyldopa.

Tous les autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

AS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

conseiller pendant les 3 premiers mois.

FIBROCARD®

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
mg Gélule de minigranules à libération prolongée
rapamil.

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

LOT 18F29/A 2

EXP 06 2022

PPV 81.00 DH

ACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg

ACOTHERAPEUTIQUE :

ioniste du calcium.

hypertension artérielle.

pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONSEILS :

Poser au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés.

ARTICULIERES :

meilleur traitant en cas de :

d'autres médicaments,

tement,

du cœur ou maladie du foie,

ement des reins

S :

ilité physico-chimique n'est connue à ce jour.

AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

meilleur si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'autres médicaments pour le rythme du cœur et de l'alpha-methyldopa.

Tous les autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

AS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

conseiller pendant les 3 premiers mois.

FIBROCARD®

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
mg Gélule de minigranules à libération prolongée
rapamil.

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

LOT 18F29/A 2

EXP 06 2022

PPV 81.00 DH

ACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg

ACOTHERAPEUTIQUE :

ioniste du calcium.

hypertension artérielle.

pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONSEILS :

Poser au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés.

ARTICULIERES :

meilleur traitant en cas de :

d'autres médicaments,

tement,

du cœur ou maladie du foie,

ement des reins

S :

ilité physico-chimique n'est connue à ce jour.

AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

meilleur si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'autres médicaments pour le rythme du cœur et de l'alpha-methyldopa.

D'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

AS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

conseiller pendant les 3 premiers mois.

FIBROCARD®

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
mg Gélule de minigranules à libération prolongée
rapamil.

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

LOT 18F29/A 2

EXP 06 2022

PPV 81.00 DH

ACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg

ACOTHERAPEUTIQUE :

ioniste du calcium.

hypertension artérielle.

pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONSEILS :

Poser au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés.

ARTICULIERES :

meilleur traitant en cas de :

d'autres médicaments,

tement,

du cœur ou maladie du foie,

ement des reins

S :

ilité physico-chimique n'est connue à ce jour.

AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

meilleur si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'autres médicaments pour le rythme du cœur et de l'alpha-methyldopa.

Tous les autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

AS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

conseiller pendant les 3 premiers mois.

FIBROCARD®

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
mg Gélule de minigranules à libération prolongée
rapamil.

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

LOT 18F29/A 2

EXP 06 2022

PPV 81.00 DH

ACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg

ACOTHERAPEUTIQUE :

ioniste du calcium.

hypertension artérielle.

pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONSEILS :

Poser au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés.

ARTICULIERES :

meilleur traitant en cas de :

d'autres médicaments,

tement,

du cœur ou maladie du foie,

ement des reins

S :

ilité physico-chimique n'est connue à ce jour.

AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

meilleur si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'autres médicaments pour le rythme du cœur et de l'alpha-methyldopa.

Tous les autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

AS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

conseiller pendant les 3 premiers mois.

FIBROCARD®

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
mg Gélule de minigranules à libération prolongée
rapamil.

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

LOT 18F29/A 2

EXP 06 2022

PPV 81.00 DH

ACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg

ACOTHERAPEUTIQUE :

ioniste du calcium.

hypertension artérielle.

pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONSEILS :

Poser au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés.

ARTICULIERES :

meilleur traitant en cas de :

d'autres médicaments,

tement,

du cœur ou maladie du foie,

ement des reins

S :

ilité physico-chimique n'est connue à ce jour.

AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

meilleur si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'autres médicaments pour le rythme du cœur et de l'alpha-methyldopa.

D'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

AS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

conseiller pendant les 3 premiers mois.

FIBROCARD®

mg Gélule de minigranules à libération prolongée
mg Gélule de minigranules à libération prolongée
rapamil.

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

mg Gélules de minigranules à libération prolongée
rapamil

LOT 18F29/A 2

EXP 06 2022

PPV 81.00 DH

ACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg

mg Gélule de minigranules à libération prolongée

contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg

ACOTHERAPEUTIQUE :

ioniste du calcium.

hypertension artérielle.

pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONSEILS :

Poser au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés.

ARTICULIERES :

meilleur traitant en cas de :

d'autres médicaments,

tement,

du cœur ou maladie du foie,

ement des reins

S :

ilité physico-chimique n'est connue à ce jour.

AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

meilleur si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'autres médicaments pour le rythme du cœur et de l'alpha-methyldopa.

Tous les autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

AS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

conseiller pendant les 3 premiers mois.

ARTIMAX®

Forme et présentation :
Pilulier de 45 comprimés

Composition :

Poudre de carapace de crustacé, acide ascorbique, manganèse, extrait sec de prêle, magnésium, gluconate de magne-

ARTIMAX®

Confort et Soupless^e
Articulaire

LOT 19242/FC5
08/2022 PPC 249,00

Matière Première

Poudre de carapace de crustacé
Poudre de cartilage de poisson
Extrait sec de prêle
Acide ascorbique (Vitamine C)
Manganèse

Propriétés

Propriétés	Quantité mg	Min %
Glucosamine	1200 mg	99 %
Chondroïtine	90 mg	99 %
Prêle	80,1 mg	99 %
Manganèse	2,1 mg	99 %

*Apport Journalier recommandé

Propriétés Nutritionnelles :

Artimax® associe les bienfaits de cinq ingrédients actifs pour soulager et renforcer les articulations.

Le **Glucosamine** et la **Chondroïtine** à 1500 mg et 1200 mg permettent de restaurer les fonctions articulaires.

La **prêle** apporte de la silice permettant la reminéralisation et l'amélioration de la souplesse des tendons.

La **vitamine C** intervient dans la formation du collagène pour assurer la fonction normale des cartilages et des os.

Le **manganèse** contribue à la formation normale de tissus conjonctifs dont le cartilage des articulations.

Conseils d'utilisation :

1 Comprimé à avaler trois fois par jour.

Se référer à la prescription médicale.

Précautions d'emploi :

Contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des composants.

Ne peut être utilisé par la femme enceinte et allaitante.

Fabriqué par Laboratoires Strapharm

Distribué par Ramo-Pharm

ARTIMAX®

Forme et présentation :
Pilulier de 45 comprimés

Composition :

Poudre de carapace de crustacé, acide ascorbique, manganèse, extrait sec de prêle, magnésium, gluconate de magne-

ARTIMAX®

Confort et Soupless^e
Articulaire

LOT 19242/FC5
08/2022 PPC 249,00

Matière Première

Poudre de carapace de crustacé
Poudre de cartilage de poisson
Extrait sec de prêle
Acide ascorbique (Vitamine C)
Manganèse

Propriétés

Propriétés	Quantité mg	Min %
Glucosamine	1200 mg	99 %
Chondroïtine	90 mg	99 %
Prêle	80,1 mg	99 %
Manganèse	2,1 mg	99 %

*Apport Journalier recommandé

Propriétés Nutritionnelles :

Artimax® associe les bienfaits de cinq ingrédients actifs pour soulager et renforcer les articulations.

Le **Glucosamine** et la **Chondroïtine** à 1500 mg et 1200 mg permettent de restaurer les fonctions articulaires.

La **prêle** apporte de la silice permettant la reminéralisation et l'amélioration de la souplesse des tendons.

La **vitamine C** intervient dans la formation du collagène pour assurer la fonction normale des cartilages et des os.

Le **manganèse** contribue à la formation normale de tissus conjonctifs dont le cartilage des articulations.

Conseils d'utilisation :

1 Comprimé à avaler trois fois par jour.

Se référer à la prescription médicale.

Précautions d'emploi :

Contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des composants.

Ne peut être utilisé par la femme enceinte et allaitante.

Fabriqué par Laboratoires Strapharm

Distribué par Ramo-Pharm

ARTIMAX®

Forme et présentation :
Pilulier de 45 comprimés

Composition :

Poudre de carapace de crustacé, acide ascorbique, manganèse, extrait sec de prêle, magnésium, gluconate de magne-

ARTIMAX®

Confort et Soupless^e
Articulaire

LOT 19242/FC5
08/2022 PPC 249,00

Matière Première

Poudre de carapace de crustacé
Poudre de cartilage de poisson
Extrait sec de prêle
Acide ascorbique (Vitamine C)
Manganèse

Propriétés

Propriétés	Quantité mg	Min %
Glucosamine	1200 mg	99 %
Chondroïtine	90 mg	99 %
Prêle	80,1 mg	99 %
Manganèse	2,1 mg	99 %

*Apport Journalier recommandé

Propriétés Nutritionnelles :

Artimax® associe les bienfaits de cinq ingrédients actifs pour soulager et renforcer les articulations.

Le **Glucosamine** et la **Chondroïtine** à 1500 mg et 1200 mg permettent de restaurer les fonctions articulaires.

La **prêle** apporte de la silice permettant la reminéralisation et l'amélioration de la souplesse des tendons.

La **vitamine C** intervient dans la formation du collagène pour assurer la fonction normale des cartilages et des os.

Le **manganèse** contribue à la formation normale de tissus conjonctifs dont le cartilage des articulations.

Conseils d'utilisation :

1 Comprimé à avaler trois fois par jour.

Se référer à la prescription médicale.

Précautions d'emploi :

Contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des composants.

Ne peut être utilisé par la femme enceinte et allaitante.

Fabriqué par Laboratoires Strapharm

Distribué par Ramo-Pharm

ARTIMAX®

Forme et présentation :
Pilulier de 45 comprimés

Composition :

Poudre de carapace de crustacé, acide ascorbique, manganèse, extrait sec de prêle, magnésium, gluconate de magne-

ARTIMAX®

Confort et Soupless^e
Articulaire

LOT 19242/FC5
08/2022 PPC 249,00

Matière Première

Poudre de carapace de crustacé
Poudre de cartilage de poisson
Extrait sec de prêle
Acide ascorbique (Vitamine C)
Manganèse

Propriétés

Propriétés	Quantité mg	Min %
Glucosamine	1200 mg	99 %
Chondroïtine	90 mg	99 %
Prêle	80,1 mg	99 %
Manganèse	2,1 mg	99 %

*Apport Journalier recommandé

Propriétés Nutritionnelles :

Artimax® associe les bienfaits de cinq ingrédients actifs pour soulager et renforcer les articulations.

Le **Glucosamine** et la **Chondroïtine** à 1500 mg et 1200 mg permettent de restaurer les fonctions articulaires.

La **prêle** apporte de la silice permettant la reminéralisation et l'amélioration de la souplesse des tendons.

La **vitamine C** intervient dans la formation du collagène pour assurer la fonction normale des cartilages et des os.

Le **manganèse** contribue à la formation normale de tissus conjonctifs dont le cartilage des articulations.

Conseils d'utilisation :

1 Comprimé à avaler trois fois par jour.

Se référer à la prescription médicale.

Précautions d'emploi :

Contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des composants.

Ne peut être utilisé par la femme enceinte et allaitante.

Fabriqué par Laboratoires Strapharm

Distribué par Ramo-Pharm

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique d'expérience et leader dans l'innovation alimentaires. Chaque produit Vita est fabriqué par des experts pour aider efficacement à assurer son propre métabolisme.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de fonctionnalités y compris des informations et réponses aux questions fréquentes.

Nous réfléchissons

Vous y trouverez également



Osteocare 30 CP
PVC : 108,65 DH

Ut Av : 31/03/2022 Lot : 211417AA

IPHABIOTICS

5 061265244683 >

Jointace®

La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. La gamme comprend :

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapeutiques.

Cardioace®

Vitabiotics®
la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poissons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.

Osteocare®

Vitabiotics®

La science au profit de la meilleure ossature



Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume Uni. Contenant les apports journaliers idoine en Calcium, en Magnésium et en vitamine D3 avec une association de co-facteurs essentiels pour le maintien de la santé des os.

- Seulement 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium qu'un demi-litre de lait.
- Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible et datée d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Également disponible sous forme de comprimés effervescents, de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique d'expérience et leader dans l'innovation alimentaires. Chaque produit Vita est développé par des experts pour aider efficacement à assurer son propre métabolisme.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de fonctionnalités y compris des informations et réponses aux questions fréquentes.

Nous réfléchissons

Vous y trouverez également



Osteocare 30 CP
PVC : 108,65 DH

Ut Av : 31/03/2022 Lot : 211417AA

IPHABIOTICS

5 061265244683 >

Jointace®

La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. La gamme comprend :

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapeutiques.

Cardioace®

Vitabiotics®

la progression en cardio-vasculaire



ORIGINAL

PLUS

Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poissons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.

Osteocare®

Vitabiotics®

La science au profit de la meilleure ossature



Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume-Uni. Contenant les apports journaliers idoine en Calcium, en Magnésium et en vitamine D3 avec une association de co-facteurs essentiels pour le maintien de la santé des os.

- Seulement 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium qu'un demi-litre de lait.
- Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible et datée d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Également disponible sous forme de comprimés effervescents, de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique d'expérience et leader dans l'innovation alimentaires. Chaque produit Vita est conçu par des experts pour aider efficacement à assurer son propre métabolisme.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de fonctionnalités y compris des informations et réponses aux questions fréquentes.

Nous réfléchissons

Vous y trouverez également



Osteocare 30 CP
PVC : 108,65 DH

Ut Av : 31/03/2022 Lot : 211417AA

IPHABIOTICS

5 061265244683 >

Jointace®

La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. La gamme comprend :

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapeutiques.

Cardioace®

Vitabiotics®

la progression en cardio-vasculaire



ORIGINAL

PLUS

Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poissons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.

Osteocare®

Vitabiotics®

La science au profit de la meilleure ossature



Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume-Uni. Contenant les apports journaliers idoine en Calcium, en Magnésium et en vitamine D3 avec une association de co-facteurs essentiels pour le maintien de la santé des os.

- Seulement 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium qu'un demi-litre de lait.
- Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible et datée d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Également disponible sous forme de comprimés effervescents, de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.

GAPREX® 25 mg, 75 mg et 150 mg

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules

Prégabalin

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de l'
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, il peut être nocif, même si les signes de leur maladie /
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous avez des réactions allergiques, consultez votre pharmacien ou votre médecin.

LOT 19C010
EXP 09/22
PPV 204DH00

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que GAPREX® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GAPREX ?
3. Comment prendre GAPREX® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GAPREX® ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GAPREX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité:

GAPREX appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte (Code ATC: N03AX16).

Indications thérapeutiques :

Douleurs neuropathiques: GAPREX est indiqué dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l'adulte.

Epilepsie: GAPREX est indiqué chez l'adulte en association dans le traitement des crises épileptiques avec ou sans généralisation secondaire.

Trouble Anxieux Généralisé : GAPREX est indiqué dans le traitement du Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GAPREX ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre-indications :

Ne prenez jamais GAPREX :

Si vous êtes allergique à la prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec GAPREX :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre GAPREX.

Quelques patients prenant GAPREX ont fait état de symptômes évocateurs d'une réaction allergique, s'agissant d'un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge ainsi que d'un rash diffus. Contactez immédiatement votre médecin si vous présentez l'une de ces réactions.

GAPREX a été associé à des étourdissements et de la somnolence, pouvant augmenter la survenue de blessures accidentelles (chutes) chez les patients âgés. Vous devez par conséquent être prudent lorsque vous vous déplacez et faire attention aux objets qui pourraient tomber ou vous blesser. Ce que vous soyez habitué aux éventuels effets que le médicament pourrait produire.

Ce médicament peut faire apparaître une vision trouble ou une perte de la vue ou d'autres modifications de la vue, la plupart desquelles étant transitoires. Informez immédiatement votre médecin si vous présentez une quelconque modification de votre vision.

Une adaptation des médicaments utilisés en cas de diabète peut être nécessaire chez certains patients diabétiques qui ont pris du poids lors d'un traitement sous prégabaline.

Certains effets indésirables peuvent être plus fréquents, notamment la somnolence, car les patients présentant une lésion de la moelle épinière peuvent recevoir d'autres médicaments, destinés à traiter la douleur ou la spasticité, qui ont des effets indésirables similaires à ceux de la prégabaline, dont la sévérité peut être augmentée lorsque ces traitements sont pris en même temps.

Des cas d'insuffisance cardiaque ont été rapportés chez certains patients prenant ce médicament. Certains patients étaient pour la plupart âgés et présentaient des problèmes cardiovasculaires. Avant de prendre ce médicament, vous devez informer votre médecin si vous avez déjà eu des maladies cardiaques dans le passé.

Des cas d'insuffisance rénale ont été rapportés chez certains patients prenant du GAPREX. Si au cours de votre traitement par ce médicament, vous observez une diminution de votre miction, vous devez informer votre médecin car l'arrêt de votre traitement peut améliorer ces troubles.

Un petit nombre de personnes traitées avec des antiépileptiques tels que GAPREX ont eu des idées suicidaires ou autodestructrices. Si de telles pensées venaient à apparaître, à tout moment, contactez immédiatement votre médecin.

Des problèmes gastro-intestinaux peuvent apparaître (p.ex. constipation, transit intestinal bloqué, paralysie) lorsque GAPREX est utilisé avec d'autres médicaments pouvant entraîner une constipation (comme certaines classes de médicaments contre la douleur). Informez votre médecin si vous souffrez de constipation, en particulier si vous êtes sujet à ce problème.

Enfants « et adolescents »

La sécurité d'emploi et l'efficacité chez les enfants et les adolescents (moins de 18 ans) n'a pas été établie.

La prégabaline ne doit donc pas être utilisée dans cette population.

Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre d'autres médicaments.

GAPREX et d'autres médicaments peuvent avoir un effet l'un sur l'autre (il s'agit d'une interaction). Avec certains autres médicaments, ce médicament peut potentier les effets indésirables observés avec ces médicaments, y compris l'insuffisance respiratoire et le coma. L'intensité des étourdissements, de la somnolence et de la diminution de la concentration peut être augmentée si GAPREX est pris avec d'autres médicaments contenant :

de l'oxycodone (utilisé pour traiter la douleur) ;

du lorazépam (utilisé pour traiter l'anxiété) ;

de l'alcool.

319334

6 118001 103041

Tardyferon® 80mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA

41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca

Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI



PPV : 40.50 DH

319334

6 118001 103041

Tardyferon® 80mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA

41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca

Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI



PPV : 40.50 DH

319334

6 118001 103041

Tardyferon® 80mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA

41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca

Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI



PPV : 40.50 DH

COLCHICINE OPOCALCIUM® 1 mg, comprimé sécable (DCI colchicine cristallisée)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de santé. Il est destiné à être pris sous surveillance médicale.
- Si l'un des effets indésirables devient trop gênant, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

PPV :

N° LOT :

13,40 |

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Substance active :

Colchicine cristallisée

Excipients : saccharose, stéarate de magnésium, tensioactif, colorant.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose, saccharose.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ :

Antigoutteux Anti-inflammatoire Code ATC MO4AC01

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est préconisé dans :

- le traitement et la prévention des crises de goutte.
- la maladie périodique.
- la maladie de Behçet.
- autres accès aigus microcristallins.

POSOLOGIE :

Instructions pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice. Si vous avez des questions, contactez votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Accès aigu de goutte

Les prises de COLCHICINE OPOCALCIUM par comprimé ou par demi-comprimé doivent être réalisées avec une dose totale quotidienne de 1 mg de colchicine (1 comprimé sécable) par prise.

En cas de traitement précoce, des posologies faibles de 1 mg à 2 mg de colchicine doivent être utilisées. Les jours suivants, 1mg de colchicine (en l'absence de facteur de risque de surdosage) ou 2mg peuvent être prescrits. Dans certains cas, des posologies supérieures peuvent exceptionnellement être prescrites. Ne jamais dépasser 3mg de colchicine le 1er jour de traitement, réparties dans la journée, 2mg les 2ème et 3ème jours de traitement, réparties dans la journée, 1mg le 4ème jour de traitement et les jours suivants.

En cas de diarrhées, prenez rapidement contact avec votre médecin. Une diminution de la dose ou un arrêt du traitement peut être nécessaire.

Prophylaxie des accès aigus de goutte/autre accès aigus microcristallins/Maladie de Behçet : 1 mg de colchicine par jour.

Réduire la posologie à 0,5mg de colchicine (1/2 comprimé) en cas de diarrhée.

Maladie périodique :

Adulte

1 mg à 2 mg de colchicine par jour.

Votre médecin peut augmenter la posologie par palier de 0,5 mg (1/2 comprimé) jusqu'à un maximum de 2mg/jour en fonction de la réponse clinique et biologique.

Enfant

0,5 mg à 2 mg/jour de colchicine (1/2 à 2 comprimés) en une ou deux prises. La posologie sera adaptée en fonction de la réponse clinique.

La posologie de colchicine sera augmentée par votre médecin de façon progressive.

Mode et voie d'administration :

Viale orale.

Fréquence d'administration :

Ce médicament doit être administré de préférence au moment des repas.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1mg, comprimé sécable :

• Si vous êtes allergique (Hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants du médicament mentionnés dans la rubrique composition.

• Si vous avez une Maladie rénale grave. (Défaillance du fonctionnement du rein)

• Si vous avez une Maladie grave du foie. (Défaillance du fonctionnement du foie)

• Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (l'exception de la spiramycine).

EN CAS DE DOUCEUR, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS INDESIRABLES

Description des effets indésirables :

COLCHICINE OPOCALCIUM® 1 mg, comprimé sécable (DCI colchicine cristallisée)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de santé. Il est destiné à être pris sous surveillance médicale.
- Si l'un des effets indésirables devient trop gênant, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

PPV :

N° LOT :

13,40 |

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Substance active :

Colchicine cristallisée

Excipients : saccharose, stéarate de magnésium, tensioactif, colorant.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose, saccharose.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ :

Antigoutteux Anti-inflammatoire Code ATC MO4AC01

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est préconisé dans :

- le traitement et la prévention des crises de goutte.
- la maladie périodique.
- la maladie de Behçet.
- autres accès aigus microcristallins.

POSOLOGIE :

Instructions pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice. Si vous avez des questions, contactez votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Accès aigu de goutte

Les prises de COLCHICINE OPOCALCIUM par comprimé ou par demi-comprimé doivent être réalisées avec une dose totale quotidienne de 1 mg de colchicine (1 comprimé sécable) par prise.

En cas de traitement précoce, des posologies faibles de 1 mg à 2 mg de colchicine doivent être utilisées. Les jours suivants, 1mg de colchicine (en l'absence de facteur de risque de surdosage) ou 2mg peuvent être prescrits. Dans certains cas, des posologies supérieures peuvent exceptionnellement être prescrites. Ne jamais dépasser 3mg de colchicine le 1er jour de traitement, réparties dans la journée, 2mg les 2ème et 3ème jours de traitement, réparties dans la journée, 1mg le 4ème jour de traitement et les jours suivants.

En cas de diarrhées, prenez rapidement contact avec votre médecin. Une diminution de la dose ou un arrêt du traitement peut être nécessaire.

Prophylaxie des accès aigus de goutte/autre accès aigus microcristallins/Maladie de Behçet : 1 mg de colchicine par jour.

Réduire la posologie à 0,5mg de colchicine (1/2 comprimé) en cas de diarrhée.

Maladie périodique :

Adulte

1 mg à 2 mg de colchicine par jour.

Votre médecin peut augmenter la posologie par palier de 0,5 mg (1/2 comprimé) jusqu'à un maximum de 2mg/jour en fonction de la réponse clinique et biologique.

Enfant

0,5 mg à 2 mg/jour de colchicine (1/2 à 2 comprimés) en une ou deux prises. La posologie sera adaptée en fonction de la réponse clinique.

La posologie de colchicine sera augmentée par votre médecin de façon progressive.

Mode et voie d'administration :

Viale orale.

Fréquence d'administration :

Ce médicament doit être administré de préférence au moment des repas.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1mg, comprimé sécable :

• Si vous êtes allergique (Hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants du médicament mentionnés dans la rubrique composition.

• Si vous avez une Maladie rénale grave. (Défaillance du fonctionnement du rein)

• Si vous avez une Maladie grave du foie. (Défaillance du fonctionnement du foie)

• Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (l'exception de la spiramycine).

EN CAS DE DOUCEUR, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS INDESIRABLES

Description des effets indésirables :

COLCHICINE OPOCALCIUM® 1 mg, comprimé sécable (DCI colchicine cristallisée)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de santé. Il est destiné à être pris sous surveillance médicale.
- Si l'un des effets indésirables devient trop gênant, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

PPV :

N° LOT :

13,40 |

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Substance active :

Colchicine cristallisée

Excipients : saccharose, stéarate de magnésium, tensioactif, colorant.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose, saccharose.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ :

Antigoutteux Anti-inflammatoire Code ATC MO4AC01

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est préconisé dans :

- le traitement et la prévention des crises de goutte.
- la maladie périodique.
- la maladie de Behçet.
- autres accès aigus microcristallins.

POSOLOGIE :

Instructions pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice. Si vous avez des questions, contactez votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Accès aigu de goutte

Les prises de COLCHICINE OPOCALCIUM par comprimé ou par demi-comprimé doivent être réalisées avec une dose totale quotidienne de 1 mg de colchicine (1 comprimé sécable) par prise.

En cas de traitement précoce, des posologies faibles de 1 mg à 2 mg de colchicine doivent être utilisées. Les jours suivants, 1mg de colchicine (en l'absence de facteur de risque de surdosage) ou 2mg peuvent être prescrits. Dans certains cas, des posologies supérieures peuvent exceptionnellement être prescrites. Ne jamais dépasser 3mg de colchicine le 1er jour de traitement, réparties dans la journée, 2mg les 2ème et 3ème jours de traitement, réparties dans la journée, 1mg le 4ème jour de traitement et les jours suivants.

En cas de diarrhées, prenez rapidement contact avec votre médecin. Une diminution de la dose ou un arrêt du traitement peut être nécessaire.

Prophylaxie des accès aigus de goutte/autre accès aigus microcristallins/Maladie de Behçet : 1 mg de colchicine par jour.

Réduire la posologie à 0,5mg de colchicine (1/2 comprimé) en cas de diarrhée.

Maladie périodique :

Adulte

1 mg à 2 mg de colchicine par jour.

Votre médecin peut augmenter la posologie par palier de 0,5 mg (1/2 comprimé) jusqu'à un maximum de 2mg/jour en fonction de la réponse clinique et biologique.

Enfant

0,5 mg à 2 mg/jour de colchicine (1/2 à 2 comprimés) en une ou deux prises. La posologie sera adaptée en fonction de la réponse clinique.

La posologie de colchicine sera augmentée par votre médecin de façon progressive.

Mode et voie d'administration :

Viale orale.

Fréquence d'administration :

Ce médicament doit être administré de préférence au moment des repas.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1mg, comprimé sécable :

• Si vous êtes allergique (Hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants du médicament mentionnés dans la rubrique composition.

• Si vous avez une Maladie rénale grave. (Défaillance du fonctionnement du rein)

• Si vous avez une Maladie grave du foie. (Défaillance du fonctionnement du foie)

• Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (l'exception de la spiramycine).

EN CAS DE DOUCEUR, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS INDESIRABLES

Description des effets indésirables :

COLCHICINE OPOCALCIUM® 1 mg, comprimé sécable (DCI colchicine cristallisée)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de santé. Il est destiné à être pris sous surveillance médicale.
- Si l'un des effets indésirables devient trop gênant, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

PPV :

N° LOT :

13,40 |

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Substance active :

Colchicine cristallisée

Excipients : saccharose, stéarate de magnésium, tensioactif, colorant.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose, saccharose.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ :

Antigoutteux Anti-inflammatoire Code ATC MO4AC01

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est préconisé dans :

- le traitement et la prévention des crises de goutte.
- la maladie périodique.
- la maladie de Behçet.
- autres accès aigus microcristallins.

POSOLOGIE :

Instructions pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice. Si vous avez des questions, contactez votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Accès aigu de goutte

Les prises de COLCHICINE OPOCALCIUM par comprimé ou par demi-comprimé doivent être réalisées avec une dose totale quotidienne de 1 mg de colchicine (1 comprimé sécable) par prise.

En cas de traitement précoce, des posologies faibles de 1 mg à 2 mg de colchicine doivent être utilisées. Les jours suivants, 1mg de colchicine (en l'absence de facteur de risque de surdosage) ou 2mg peuvent être prescrits. Dans certains cas, des posologies supérieures peuvent exceptionnellement être prescrites. Ne jamais dépasser 3mg de colchicine le 1er jour de traitement, réparties dans la journée, 2mg les 2ème et 3ème jours de traitement, réparties dans la journée, 1mg le 4ème jour de traitement et les jours suivants.

En cas de diarrhées, prenez rapidement contact avec votre médecin. Une diminution de la dose ou un arrêt du traitement peut être nécessaire.

Prophylaxie des accès aigus de goutte/autre accès aigus microcristallins/Maladie de Behçet : 1 mg de colchicine par jour.

Réduire la posologie à 0,5mg de colchicine (1/2 comprimé) en cas de diarrhée.

Maladie périodique :

Adulte

1 mg à 2 mg de colchicine par jour.

Votre médecin peut augmenter la posologie par palier de 0,5 mg (1/2 comprimé) jusqu'à un maximum de 2mg/jour en fonction de la réponse clinique et biologique.

Enfant

0,5 mg à 2 mg/jour de colchicine (1/2 à 2 comprimés) en une ou deux prises. La posologie sera adaptée en fonction de la réponse clinique.

La posologie de colchicine sera augmentée par votre médecin de façon progressive.

Mode et voie d'administration :

Viale orale.

Fréquence d'administration :

Ce médicament doit être administré de préférence au moment des repas.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1mg, comprimé sécable :

• Si vous êtes allergique (Hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants du médicament mentionnés dans la rubrique composition.

• Si vous avez une Maladie rénale grave. (Défaillance du fonctionnement du rein)

• Si vous avez une Maladie grave du foie. (Défaillance du fonctionnement du foie)

• Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (l'exception de la spiramycine).

EN CAS DE DOUCEUR, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS INDESIRABLES

Description des effets indésirables :

COLCHICINE OPOCALCIUM® 1 mg, comprimé sécable (DCI colchicine cristallisée)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de santé. Il est destiné à être pris sous surveillance médicale.
- Si l'un des effets indésirables devient trop gênant, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

PPV :

N° LOT :

13,40 |

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Substance active :

Colchicine cristallisée

Excipients : saccharose, stéarate de magnésium, tensioactif, colorant.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose, saccharose.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ :

Antigoutteux Anti-inflammatoire Code ATC MO4AC01

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est préconisé dans :

- le traitement et la prévention des crises de goutte.
- la maladie périodique.
- la maladie de Behçet.
- autres accès aigus microcristallins.

POSOLOGIE :

Instructions pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice. Si vous avez des questions, contactez votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Accès aigu de goutte

Les prises de COLCHICINE OPOCALCIUM par comprimé ou par demi-comprimé doivent être réalisées avec une dose totale quotidienne de 1 mg de colchicine (1 comprimé sécable) par prise.

En cas de traitement précoce, des posologies faibles de 1 mg à 2 mg de colchicine doivent être utilisées. Les jours suivants, 1mg de colchicine (en l'absence de facteur de risque de surdosage) ou 2mg peuvent être prescrits. Dans certains cas, des posologies supérieures peuvent exceptionnellement être prescrites. Ne jamais dépasser 3mg de colchicine le 1er jour de traitement, réparties dans la journée, 2mg les 2ème et 3ème jours de traitement, réparties dans la journée, 1mg le 4ème jour de traitement et les jours suivants.

En cas de diarrhées, prenez rapidement contact avec votre médecin. Une diminution de la dose ou un arrêt du traitement peut être nécessaire.

Prophylaxie des accès aigus de goutte/autre accès aigus microcristallins/Maladie de Behçet : 1 mg de colchicine par jour.

Réduire la posologie à 0,5mg de colchicine (1/2 comprimé) en cas de diarrhée.

Maladie périodique :

Adulte

1 mg à 2 mg de colchicine par jour.

Votre médecin peut augmenter la posologie par palier de 0,5 mg (1/2 comprimé) jusqu'à un maximum de 2mg/jour en fonction de la réponse clinique et biologique.

Enfant

0,5 mg à 2 mg/jour de colchicine (1/2 à 2 comprimés) en une ou deux prises. La posologie sera adaptée en fonction de la réponse clinique.

La posologie de colchicine sera augmentée par votre médecin de façon progressive.

Mode et voie d'administration :

Viale orale.

Fréquence d'administration :

Ce médicament doit être administré de préférence au moment des repas.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1mg, comprimé sécable :

• Si vous êtes allergique (Hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants du médicament mentionnés dans la rubrique composition.

• Si vous avez une Maladie rénale grave. (Défaillance du fonctionnement du rein)

• Si vous avez une Maladie grave du foie. (Défaillance du fonctionnement du foie)

• Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (l'exception de la spiramycine).

EN CAS DE DOUCEUR, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS INDESIRABLES

Description des effets indésirables :

COLCHICINE OPOCALCIUM® 1 mg, comprimé sécable (DCI colchicine cristallisée)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de santé. Il est destiné à être pris sous surveillance médicale.
- Si l'un des effets indésirables devient trop gênant, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Exp :

PPV :

N° LOT :

13,40 |

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Substance active :

Colchicine cristallisée

Excipients : saccharose, stéarate de magnésium, tensioactif, colorant.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose, saccharose.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ :

Antigoutteux Anti-inflammatoire Code ATC MO4AC01

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est préconisé dans :

- le traitement et la prévention des crises de goutte.
- la maladie périodique.
- la maladie de Behçet.
- autres accès aigus microcristallins.

POSOLOGIE :

Instructions pour un bon usage

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice. Si vous avez des questions, contactez votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Accès aigu de goutte

Les prises de COLCHICINE OPOCALCIUM par comprimé ou par demi-comprimé doivent être réalisées avec une dose totale quotidienne de 1 mg de colchicine (1 comprimé sécable) par prise.

En cas de traitement précoce, des posologies faibles de 1 mg à 2 mg de colchicine doivent être utilisées. Les jours suivants, 1mg de colchicine (en l'absence de facteur de risque de surdosage) ou 2mg peuvent être prescrits. Dans certains cas, des posologies supérieures peuvent exceptionnellement être prescrites. Ne jamais dépasser 3mg de colchicine le 1er jour de traitement, réparties dans la journée, 2mg les 2ème et 3ème jours de traitement, réparties dans la journée, 1mg le 4ème jour de traitement et les jours suivants.

En cas de diarrhées, prenez rapidement contact avec votre médecin. Une diminution de la dose ou un arrêt du traitement peut être nécessaire.

Prophylaxie des accès aigus de goutte/autre accès aigus microcristallins/Maladie de Behçet : 1 mg de colchicine par jour.

Réduire la posologie à 0,5mg de colchicine (1/2 comprimé) en cas de diarrhée.

Maladie périodique :

Adulte

1 mg à 2 mg de colchicine par jour.

Votre médecin peut augmenter la posologie par palier de 0,5 mg (1/2 comprimé) jusqu'à un maximum de 2mg/jour en fonction de la réponse clinique et biologique.

Enfant

0,5 mg à 2 mg/jour de colchicine (1/2 à 2 comprimés) en une ou deux prises. La posologie sera adaptée en fonction de la réponse clinique.

La posologie de colchicine sera augmentée par votre médecin de façon progressive.

Mode et voie d'administration :

Viale orale.

Fréquence d'administration :

Ce médicament doit être administré de préférence au moment des repas.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1mg, comprimé sécable :

• Si vous êtes allergique (Hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants du médicament mentionnés dans la rubrique composition.

• Si vous avez une Maladie rénale grave. (Défaillance du fonctionnement du rein)


• Si vous avez une Maladie grave du foie. (Défaillance du fonctionnement du foie)

• Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (l'exception de la spiramycine).


EN CAS DE DOUCEUR, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS INDESIRABLES

Description des effets indésirables :



PPV: 49,60 DH
LOT: 20C02
EXP: 03/2023



PPV: 49,60 DH
LOT: 20C02
EXP: 03/2023

Nom Pat. : سمير سعيد





No Pat. :
Né :
Age :
Sexe :
Taille :
Poids :
PA :
Med. :
Rem. :

RR : 75 mmHg
P : 110 ms
PQ : 118 ms
QRS : 192 ms
QT : 82 ms
QTc : 348 ms
PR : 419 ms

Axes:
P : 32 °
QRS : 22 °
T : 92 °

10 mm/mV

الدكتور رشيد لارaki
Dr Rachid LARAKI
Medecin Interniste
130 Casablanca
Tunisie : 05 22 94 1555 - 05 22 94 1556
Fax : 05 22 94 1556



10 mm/s 25 mm/s

0.05-35 Hz F50

SBS

AT-10 E 4.02

Art. No. 2.157.012

Dr. Rachid LARAKI

Nom Pat. :		I	II	III	aVR	aVL	aVF	V1	V2	V3	V4	V5	V6
No Pat. :		(mV)	(mV)	(mV)	(mV)	(mV)	(mV)	(mV)	(mV)	(mV)	(mV)	(mV)	(mV)
Né :	-	0.16	0.17	-0.06	-0.15	0.10	0.10	-0.15	-0.07	0.07	0.08	0.08	-
Age :	Qd	-	-	-	-1.33	-	-	-1.32	-	-	-	-	-
Sexe :	Qd	(mV)	1.51	1.19	0.08	-	-	0.68	-	-	-	-	-
Taille :	Rd	(mV)	60	82	14	-	-	0.92	0.45	-	0.84	0.76	1.68
Poids :	Sd	(mV)	-	-	-0.40	-	-	0.48	0.40	-	0.22	1.38	1.42
PA:	R'd	(mV)	-	-	-	-	-	-0.10	-0.04	-	-1.47	-1.09	-0.44
Med.:	S'd	(mV)	-	-	-	-	-	0.36	-	-	-	0.28	0.20
Rem.:	S'd	(mV)	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	0.20	-
Di :	J'	(mV)	-0.04	0.04	0.09	-	-	-0.06	0.07	0.10	0.08	0.12	0.01
	JT	(mV)	-0.03	0.06	0.10	-	-	-0.06	0.08	0.14	0.16	0.18	0.02
	T'	(mV)	-0.07	0.37	0.43	-	-	-0.15	-0.24	0.40	0.32	0.49	0.22
	T,	(mV)	0.06	0.08	0.02	-	-	0.02	0.05	-0.01	0.01	0.02	0.02

