

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Optaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Matricule : 1009 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : BAAMIM Abdellah

Date de naissance : 01/01/1980

Adresse : 235 Bd YQB El Mansour Rosedee Al Fak

im B12 App 605 Etage 2000

Tél : 06 70 57 20 01 Total des frais engagés : 1759,00 Dhs

Cachet du médecin :



Date de consultation : 09/06/2020

Nom et prénom du malade : B. BAAMIM Abdellah Age : 30 ans

Lien de parenté : Lui-même 26 JUN 2020 Conjoint Enfant

Nature de la maladie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : ACQUEUIL

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le 19 Juin 2020 Le 19 Juin 2020

Signature de l'adhérent(e) : BAAMIM Abdellah

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
9.5.20	CTRLV		250 DA	Dr. Nouad DRIQUECH Cardiologue 161/0522840910 - 061/0662901911

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE NOUR KABDOUSSA 10B Avenue Bd. Sidi Abdellah Casablanca 10000 Tél. : 05 22 16 89 11</i>	<i>9/05/2020</i>	<i>1509.00</i>

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICALS

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				
$ \begin{array}{r} H \quad 25533412 \quad 21433552 \\ D \quad 00000000 \quad 00000000 \\ \hline B \quad 00000000 \quad 00000000 \\ \quad 35533411 \quad 11433553 \end{array} $				
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
Montants des soins				
Date du devis				
Date de l'exécution				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

Docteur Mouad CRIQUECH

Spécialiste
Maladies du cœur et des vaisseaux



الدكتور معاد كريشك

اختصاصي
في أمراض القلب و الشرايين

Casablanca le : 09/05/2020

Mr BAANTAR ABDELOUAHAB

165,50

1 - ATACAND 16 MG

6

1 comprimé par jour

50
x 2

2 - ZOTROL 50mg

1/4 comprimé 2 fois par jour

68,80
3 - FLUDEX 1,5 LP

68,93
1 comprimé par jour

4 moiflox 1cp x 2

80,00

74,80

Docteur Mouad CRIQUECH
Cardiologue
262 Bd. Yaâcoub El Mansour - Casablanca
Tél: 0522 94 09 10 GSM: 0662 80 19 75

993,00

206,40

160,10

149,60

traitement de 3 mois

Docteur Mouad CRIQUECH
Cardiologue
262 Bd. Yaâcoub El Mansour - Casablanca
Tél: 0522 94 09 10 GSM: 0662 80 19 75

1809,00

PHARMACIE
KABBA
103 Avenue Hassan II
et Bd. Sidi Abdellah
741 00 Casablanca

FLUDEX® ID

INDAPAMIDE 1,5 MG

30 comprimé pelliculé à libération P

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1-QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pelliculé à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif. L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée:

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux bas de potassium dans le sang.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde.

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilité.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de l'app ou un syndrome de malabsorption.

sorption du glucose ou du galactose immature

Enfants et adolescents

Sans objet

Autres médicaments prolongée

Informez votre médecin pourriez prendre tout au Eitez de prendre FLUDEX en raison du risque d'au Si vous prenez l'un des précautions d'emploi p

- médicaments utilisés droquinidine, disopyramide
- médicaments utilisés anxiété, schizophrénie roleptiques),
- bêpridil (utilisé pour dans la poitrine),
- cisapride, diphémanil (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),
- halofantrine (antiparasitaire utilisé pour traiter certains types de paludisme),
- pentamidine (utilisée pour traiter certains types de pneumonie),
- mizolastine (utilisé pour traiter les réactions allergiques comme le rhume des foins),
- anti-inflammatoires non-stéroïdiens pour soulager la douleur (ex : ibuprofène) ou fortes doses d'acide acétylsalicylique,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque),
- amphotéricine B par injection (médicaments antifongiques),
- corticostéroïdes oraux utilisés pour traiter divers troubles : asthme sévère et arthrite rhumatoïde,
- laxatifs stimulants,
- baclofène (pour traiter la raideur musculaire survenant de maladie comme la sclérose multiple),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte)
- diurétiques épargneurs de potassium (amiloride, spironolactone, triamterène),
- metformine (pour traiter le diabète),
- produits de contrastes iodés (utilisés pour les examens aux rayons X),
- comprimés de calcium ou autres suppléments calciques,
- ciclosporine, tacrolimus ou autres immunosupresseurs utilisés suite à une transplantation d'organe, pour le traitement de maladies auto-immunes ou de maladies rhumatisantes ou dermatologiques graves,
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn).

FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée avec des aliments et boissons

Sans objet

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Lorsqu'une grossesse est planifiée ou confirmée, un traitement alternatif doit être initié dès que possible.

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être.

Le principe actif est excrété dans le lait maternel. L'allaitement est déconseillé si vous prenez ce médicament.

Sportifs

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

- Comprimés pelliculés dosés à 250 mg de ciprofloxacine (s.f. de chlorhydrate) : Boîtes de 10 et 20.
- Comprimés pelliculés dosés à 500 mg de ciprofloxacine (s.f. de chlorhydrate) : Boîtes de 2, 10 et 20.

COMPOSITION :

- PROFLOX 250 mg Comprimés :
Ciprofloxacine 250 mg
Excipients QSP 1 comprimé

- PROFLOX 500 mg Comprimés :
Ciprofloxacine 500 mg
Excipients QSP 1 comprimé

PROPRIÉTÉS :

Antibiotique de la famille des fluoroquinolones.

INDICATIONS :

PROFLOX® est indiqué dans le traitement des infections à germes sensibles, notamment :

- Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram -.
- Exacerbations de bronchopneumopathie chronique obstructive;
- Infections bronchopulmonaires en cas de mucoviscidose ou de bronchectasie;
- Pneumonie
- Otite moyenne chronique purulente et Otite maligne externe.

• Exacerbation aigüe de sinusite chronique, en particulier due à des bactéries à Gram -.

• Infections urinaires.

• Utérine et cervicite gonococciques.

• Orchit-épididymite y compris les infections dues à *Neisseria gonorrhoeae*.

Lorsque les infections de l'appareil génital citées ci-dessus sont suspectées ou confirmées à *Neisseria gonorrhoeae*, il est particulièrement important de la résistance locale de cette bactérie à la ciprofloxacine et de confirmer sa sensibilité à l'antibiotique par des tests microbiologiques.

• Infections gastro-intestinales (par exemple, diarrhée du voyageur).

• Infections intra-abdominales.

• Infections de la peau et des parties molles dues à des bactéries à Gram -.

• Infections osté-articulaires.

• Traitement des infections et prophylaxie anti-infectieuse chez les patients neutropéniques.

• Prophylaxie des infections invasives à *Neisseria meningitidis*.

• Maladie du charbon (prophylaxie après exposition et traitement curatif).

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des excipients.

- Administration concomitante de ciprofloxacine et de tizanidine.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSÉOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

La poséologie et la durée du traitement seront définies selon la sévérité de la maladie et de l'évolution clinique et bactériologique.

Se conformer strictement à la prescription du médecin.

Sauf prescription contraire, les doses recommandées sont les suivantes :

- Infections respiratoires (selon sévérité et germe responsable) : 2 comprimés à 250 mg à 2 comprimés à 500 mg/jour.

- Infections urinaires :

• Aigües, non compliquées : 2 comprimés à 125 mg/à 1 ou 2 comprimés à 250 mg/jour.

• Cystite chez la femme non ménopausée : dose unique de 250 mg/jour.

• Compliquées : 2 comprimés à 250 mg/à 2 comprimés à 500 mg/jour.

- Gonorrhée :

• Extrагénitale : 2 comprimés à 125 mg/jour.

• Aigue, non compliquée : dose unique de 250 mg/jour.

- Diarrhée : 1 à 2 comprimés à 500 mg/jour.

- Autres infections : 2 comprimés à 500 mg/jour.

- Infections particulièrement sévères, mettant en jeu le pronostic vital, p.ex.-pneumonie à streptocoques : infections récurrentes en cas de mucoviscidose, infections ostéo-articulaires, Septicémie et péritonite. La posologie est : 2 x 750 mg/jour (soit 1 comprimé à 500 mg + 1 comprimé à 250 mg) 2 fois par jour. En particulier en présence de souches de *Pseudomonas*, *Staphylococcus* ou streptocoques.

Sujets âgés :

Chez les sujets âgés, la dose doit être aussi faible que possible, en tenant compte de la sévérité de l'infection et de la clairance de la créatinine.

Modus d'administration :

Voie orale. Prendre les comprimés entiers, avec un verre d'eau.

STADES :

Des cas d'insuffisance rénale aiguë réversibles ont été rapportés en cas d'ingestion volontaire massive.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

• Risque de cristallurie en présence d'urine à pH neutre ou alcalin.

• En raison du risque de la photosensibilisation, éviter l'exposition au soleil et aux rayonnements ultra-violets pendant le traitement.

• Les tendinites, rarement observées, peuvent parfois conduire à une rupture touchant plus particulièrement le tendon d'Achille, pour laquelle la corteforisation. L'apparition de signes de tendinite demande donc un arrêt du traitement.

L'ADMINISTRATION DE LA CIPROFLOXACINE PEUT DIMINUER LA VIGILANCE, IL CONVIENT DONC D'AVERTIR LES CONDUCTEURS DE VEHICULES D'EMPLOI

Utiliser PROFLOX® avec prudence que :

• Les patients atteints de myasthénie.

• Les patients ayant des antécédents de convulsions ou des facteurs prédisposant à la survenue de convulsions.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : il est préférable d'éviter l'utilisation de la ciprofloxacine pendant la grossesse.

Allaitement : la ciprofloxacine ne doit pas être utilisée pendant l'allaitement.

PROFLOX® est un médicament : Ne pas laisser à la portée des enfants. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

• Antagonismes nécessaires pour l'absorption d'emploi :

• Sucralfate : favorise (seul) diminution de l'absorption digestive de la ciprofloxacine. Prendre le sucralfate à distance des fluoroquinolones (plus d'1h).

• Théophyllines : augmentation de la théophyllinémie avec risque de surdose en théophylline. Surveillance clinique et éventuellement de la théophyllinémie.

• Anticoagulant oraux (décrit pour la warfarine) : augmentation de l'effet de l'anticoagulant oral et du risque hémorragique. Contrôle plus fréquent de la prothrombine.

• Panssements gastro-intestinaux (sels, oxydes et hydroxydes de magnésium, d'aluminium et de calcium) : diminution de l'absorption digestive des fluoroquinolones (plus de 4 heures si possible).

Association à prendre en compte :

• Caféine : augmentation des taux de caféine dans l'organisme.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFECTS INDESIRABLES :

Les effets indésirables sont variables de nature et d'intensité selon l'âge, l'état physio-pathologique des patients et selon les médications associées au traitement.

En cas d'apparition d'effets indésirables, adapter la poséologie ou interrompre immédiatement le traitement et prévenir votre médecin ou votre pharmacien.

Signalez à votre médecin ou votre pharmacien tout autre effet indésirable non mentionné dans cette notice.

- Infections et infestations : peu fréquent : surinfections mycotiques - rare : colite associée aux antibiotiques (potentiellement fatale dans de très rares cas).

- Anémies hémolytiques et du système lymphatique : peu fréquent : éosinophilie - rare : leucopénie, anémie, neutropénie, hyperleucocytose, thrombocytopenie, thrombocytémie - Très rare : anémie aplasique, agranulocytose, pancytopenie, aplasie médullaire.

- Affections du système immunitaire : Rare : réaction allergique, œdème de Quincke - Très rare : réaction anaphylactique, choc anaphylactique.

- Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : anorexie - Rare : hyperglycémie.

- Affections psychiatriques : Peu fréquent : hyperactivité psychomotrice/agitation - Rare : confusion et désorientation, réactions d'anxiété, rêves anormaux, dépression, hallucinations - Très rare : réactions psychotiques.

- Affections du système nerveux : Peu fréquent : céphalées, étourdissements, troubles du sommeil, dysgraphie - Rare : parésie hémiphtalmique, dysesthesie, flatulences - Très rare : pancréalgie.

- Très rare : migraine, trouble de la coordination, trouble de la marche, troubles de l'olfaction, hypertension intracrânienne - Fréquence indéterminée : neuropathie périphérique.

- Affections oculaires : Rare : troubles de la vision - Très rare : distorsion de la vision des couleurs.

- Affections de l'oreille et du labyrinth : Rare : acouphènes, surdité/altération de l'audition.

- Affections cardiaques : Rare : tachycardie - Fréquence indéterminée : arrhythmie ventriculaire, allongement de l'intervalle QT, torsades de pointes.

- Affections vasculaires : Rare : vasodilatation, hypotension, syncope - Très rare : vasculaire.

- Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Rare : dyspnée.

- Affections gastro-intestinales : Fréquent : nausées, diarrhée - Peu fréquent : vomissements, douleurs gastro-intestinales et abdominales, dyspepsie, flatulences - Très rare : pancréalgie.

- Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : élévation des transaminases, élévation de la bilirubine - Rare : insuffisance hépatique, ictere, hépatite - Très rare : nécrose hépatique.

- Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : réaction cutanée, prurit, urticaire - Rare : réactions de photosensibilité - Très rare : pétéchies, érythème polymorphe, érythème nivalis, syndrome de Stevens-Johnson, Syndrome de Lyell.

- Affections musculosquelettiques et systémiques, y compris affections osseuses : Peu fréquent : douleurs musculosquelettiques, arthralgie - Rare : myalgie, arthrite, augmentation du tonus musculaire et crampes - Très rare : faiblesses, tendinites, rupture de tendons.

- Affections du rein et des voies urinaires : Peu fréquent : dysfonctionnement rénal - Rare : insuffisance rénale, hématurie, cristallurie, néphrite tubulo-interstitielle.

- Troubles généraux et anormales au site d'administration : Peu fréquent : asthénie, fièvre - Rare : œdèmes, sudation (hyperhidrose).

- Investigations : Peu fréquent : élévation des phosphatases alcalines - Rare : anomalie du taux de prothrombine, élévation de l'amylasémie.

Liste I - Délivré uniquement sur ordonnance.

- PROFLOX® 250 mg - Boîte de 10 : AMM N° 137DMP/21/NNP - PROFLOX® 250 mg - Boîte de 20 : AMM N° 137DMP/21/NNP

- PROFLOX® 500 mg - Boîte de 2 : AMM N° 136DMP/21/NNP - PROFLOX® 500 mg - Boîte de 10 : AMM N° 107DMP/21/NNP

- PROFLOX® 500 mg - Boîte de 20 : AMM N° 138DMP/21/NNP

Révision : octobre 2012.

PROFLOX®

Ciprofloxacin 250 mg - 500 mg

PROFLOX®
Ciprofloxacin 500 mg
Boîte de 10 comprimés

P.P.V. : 80,00 DH
6 118000 191056

PROFLOX®
Ciprofloxacin 500 mg
Boîte de 10 comprimés

P.P.V. : 80,00 DH
6 118000 191056

PROFLOX®
Ciprofloxacin 500 mg
Boîte de 10 comprimés

P.P.V. : 74,80 DH
6 118000 191056

G LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALENICA
Z.I. Ouled Saleh - Casablanca - Maroc

ATACAND® 4 mg, comprimé sécable ATACAND® 8 mg, comprimé sécable ATACAND® 16 mg, comprimé sécable

Candésartan cilexétol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ATACAND®, comprimé sécable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATACAND®, comprimé sécable ?
3. Comment prendre ATACAND®, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ATACAND®, comprimé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATACAND®, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Votre médicament s'appelle ATACAND®. Le principe actif est le candésartan cilexétol. Il appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Il agit en relâchant et en dilatant vos vaisseaux sanguins, ce qui aide à abaisser votre pression artérielle. Il aide également votre cœur à pomper plus facilement le sang vers toutes les parties de votre corps.

Ce médicament est utilisé pour :



- traiter la pression artérielle élevée (hypertension) chez les adultes
- traiter l'adulte insuffisant cardiaque avec une fonction musculaire du cœur diminuée, en association avec des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) ou lorsque les IEC ne peuvent pas être utilisés (les IEC sont un groupe de médicaments utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ATACAND®, comprimé sécable ?


Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ATACAND®, comprimé sécable :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au candésartan cilexétol ou à l'un des autres composants contenus dans ATACAND® (voir rubrique 6).
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ATACAND® en début de grossesse (voir rubrique « Grossesse »).
- si vous souffrez d'une maladie sévère du foie ou d'une cholestase (problème d'obstruction des voies biliaires qui empêche la bile de sortir de la vésicule biliaire).



doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois.



L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Utilisation chez les enfants



Il n'y a pas d'expérience concernant l'administration d'ATACAND® chez les enfants (de moins de 18 ans). ATACAND® ne doit donc pas être utilisé chez les enfants.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. ATACAND® peut modifier l'action d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'action d'ATACAND®. Si vous prenez certains médicaments, votre médecin pourrait avoir besoin de réaliser des examens sanguins de temps en temps.

Veuillez informer votre médecin si vous utilisez en particulier l'un des médicaments suivants :

- Autres médicaments qui aident à abaisser votre pression artérielle, tels que les bêta-bloquants, le diazoxide et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), par exemple l'enalapril, le captopril, le lisinopril ou le ramipril.
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), tels que l'ibuprofène, le naproxène, le diclofénac, le célocoxib ou l'étoricoxib (médicaments contre la douleur et l'inflammation).
- Acide acétylsalicylique (si vous prenez plus de 3 g par jour) (médicament contre la douleur et l'inflammation).
- Suppléments de potassium ou substituts du sel contenant du potassium (médicaments qui augmentent le taux de potassium dans le sang).
- Héparine (un médicament destiné à fluidifier le sang).
- Comprimés favorisant l'élimination de l'eau (diurétiques).
- Lithium (un médicament utilisé en cas de problèmes de santé mentale).



ne SOMO VT307.007