

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com  
 0 Prise en charge : pec@mupras.com  
 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

*14/03/2014*  
La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° W19-501206

*ND: 29982*

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **3465**

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

**KACHT YAMNA**

Date de naissance :

Adresse : **n° 2 RUE 962 SALAM AGADIR**

Tél. : **06 6217 0748**

Total des frais engagés : **12307 Dhs**

Cadre réservé au Médecin

**Dr. MOUSTAOURAF Zouhair**  
Spécialiste en Endocrinologie  
Diabétologie et Nutrition  
57, rue de Marrakech (Q. I.) AGADIR

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : **KACHT YAMNA** Age : **1959**

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

**DYSTHYROIDIE**


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **AGADIR**

Signature de l'adhérent(e) :



VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie

N° W19-501206

Remplissez ce volet, découpez-le et conservez-le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : **3456**

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
1/10/2012			800,00	INP : 04045120

### EXÉCUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie de Belkacem Ben Zidane N° 13 Rue Hay El Salam Hay Essalam - AGADIR Tél : 05 28 84 33 84	13/10/2012	740,70

Cachet et signature du Pharmacien ou du Laboratoire	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
L'ANALYSES MEDICALS D'ANALYSES MEDICALS Pharmacien Biologiste Tel: 05 28 84 33 84 / Fax: 0528 84 33 84 E-mail: laboelallali@gmail.com	13/10/2012	B. 250	250,00

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'O.D.F.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				11111111


### O.D.F PROTHESES DENTAIRES



### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
G		
B		

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Moustadraf Zouhair

Spécialiste en Endocrinologie  
Diabétologie et Nutrition



الدكتور مستضروف زهير

أخصائي في أمراض الغدد  
داء السكري و التغذية

Sur Rendez-vous

بالموعد

Agadir, Le : 14/03/20

N°  
Kacht Yamma

جثة

levotlrox 5mg



6.80 Dhs

1cr / jour

levotlrox 25mg



0.0.10.3

x 2

1cr / jour

1.5.0

Xyzall 1cr

1cr / jour



NE Eucarbon 1



2ug

16.60 Dhs

NE2 loqured 0.7g



1mg

Moins

Rebs raps

carrot



RDV Le :

140.7

Pharmacie RAJAA  
Dr. Belkacem EL MARZOUI  
N° 13 Rue Abderrahmane Ben Zid -

57، زنقة الحاج أخنوش (زنقة مراكش سابقاً)، الحي الصناعي، أكادير - الهاتف: 05 28 84 82 83 - 06 24 19 11 00

57, rue Haj Akhenouch, (Ex Rue de Marrakech) - Q.I Agadir - Tél. 05 28 84 82 83 - 06 24 19 11 00

NP: 042049973

**LABORATOIRE EL ALLALI ANALYSES MÉDICALES**

**Dr MOHAMED AZIZ EL ALLALI**

**61 bis Rue de Marrakech**

**80020 AGADIR**

**Tél: 05.28.84.33.84 Fax: 05.28.82.87.58**

**I.C.E: 001702973000057 INPE: 043060623**

**I.F: 76143330**

---

**"FACTURE NO" : 2001671**

ND:140320 022

NP:80415

**Analyses effectuées le .. : 14/03/20**

**Pour ..... : Mm KACHT YAMNA**

**Sur prescription du .... : Dr MOUSTADRAF ZOUHAIR**

TSH TSH us

B 250

**Total Prélèvements : 15,00**

**Total des B : 250**

**Total Dossier : 290,00 Dirhams**

*LABORATOIRE Dr. EL ALLALI  
D'ANALYSES MÉDICALES  
Pharmacien Biologiste  
Tél: 05 28 84 33 84 / fax: 0528 82 87 58  
E-mail: laboelallali@gmail.com*

Dr. Moustadraf Zouhair

Spécialiste en Endocrinologie  
Diabétologie et Nutrition

14/03/16

N° - KACHT YAMNA

LABORATOIRE DR. EL ALLALI  
D'ANALYSES MEDICALES  
Pharmacien Biologiste  
tél: 05 28 84 33 84 / Fax: 0528 82 87 58  
E-mail: labelallali@gmail.com

TSH

LABORATOIRE DR. EL ALLALI  
D'ANALYSES MEDICALES  
Pharmacien Biologiste  
tél: 05 28 84 33 84 / Fax: 05 28 84 33 84  
Dr. MOUSTAFA RAP Zouhair  
Spécialiste en Endocrinologie  
Diabétologie et Nutrition  
57, Rue de Marrakech (Q.I.) Agadir



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.



Dichlorhydrate  
de Lévorcétilizine  
**5 mg**, comprimé pelliculé

- La substance active est : dichlorhydrate de lévorcétilizine ..... 5 mg pour un comprimé pelliculé
- Les autres composants sont :

Comprimé nu : cellulose microcristalline, lactose monohydraté, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium (464), dioxyde de titane (E 171), macrogol 400]

1.  
Ce  
anti  
• L  
• La  
• L  
LOT 191998 1  
EXP 09 2023

45,20

PPV 45 20



Dichlorhydrate de Lévorcétilizine\*



**Xyzall 5 mg**  
14 comprimés pelliculés Non remboursable AMO



6 118000 021582

D'une façon générale, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?  
né pelliculé, boîte de 14 et 28. XYZALL est un médicament  
tômes associés à l'allergie, tels que :  
y compris les atteintes oculaires (conjonctivite allergique) ;

LE PRENDRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé  
S ETRE UTILISE dans les cas suivants :  
le substance chimique apparentée, ou à l'un des autres

### XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé

ins de 6 ans car il n'existe pas encore de dosage adapté.  
émie, de syndrome de malabsorption du glucose et du  
(ulques rares), en raison de la présence de lactose dans

être réduite en fonction de la gravité de votre maladie.

n d'alcool en même temps que XYZALL. Chez certains  
ine et d'alcool pourrait avoir des effets sur le système  
(apparenté) n'aït jamais montré une augmentation

ue sur les conseils de votre médecin.



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.



Dichlorhydrate  
de Lévorcétilizine  
**5 mg**, comprimé pelliculé

- La substance active est : dichlorhydrate de lévorcétilizine ..... 5 mg pour un comprimé pelliculé
- Les autres composants sont :

Comprimé nu : cellulose microcristalline, lactose monohydraté, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium (464), dioxyde de titane (E 171), macrogol 400]

1.  
Ce  
anti  
• L  
• La  
• L  
LOT 191998 1  
EXP 09 2023

45,20

PPV 45 20



Dichlorhydrate de Lévorcétilizine\*



**Xyzall 5 mg**  
14 comprimés pelliculés Non remboursable AMO



6 118000 021582

D'une façon générale, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?  
né pelliculé, boîte de 14 et 28. XYZALL est un médicament  
tômes associés à l'allergie, tels que :  
y compris les atteintes oculaires (conjonctivite allergique) ;

LE PRENDRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé  
S ETRE UTILISE dans les cas suivants :  
le substance chimique apparentée, ou à l'un des autres

### XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé

ins de 6 ans car il n'existe pas encore de dosage adapté.  
émie, de syndrome de malabsorption du glucose et du  
(ulques rares), en raison de la présence de lactose dans

être réduite en fonction de la gravité de votre maladie.

n d'alcool en même temps que XYZALL. Chez certains  
ine et d'alcool pourrait avoir des effets sur le système  
(apparenté) n'aït jamais montré une augmentation

ue sur les conseils de votre médecin.



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.



Dichlorhydrate  
de Lévoctirizine

5 mg, comprimé pelliculé

- La substance active est : dichlorhydrate de lévocétirizine ..... 5 mg pour un comprimé pelliculé

- Les

Comp.

Pellicu

## 1. QU'

Ce médi  
anti-allé

- La rhin
- La rhin
- L'urtica

INFO  
'ZALL

vous i  
rosat  
us s

s.  
al


cin

boîte.

LOT 191998 2

EXP 09 2023

PPV 90 50



Xyzall 5 mg  
28 comprimés pelliculés

Non remboursable AMM



6 118000 021599

N 11080000000000

EPEL 12/13

avance pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.  
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout

silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium,  
oxyde de titane [E 171], macrogol 400]

## ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

La boîte de 14 et 28 XYZALL est un médicament  
associé à l'allergie, tels que :  
les atteintes oculaires (conjonctivite allergique) ;

**PRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé**  
**UTILISE dans les cas suivants :**

ce chimique apparentée, ou à l'un des autres

mg, comprimé pelliculé

car il n'existe pas encore de dosage adapté.  
syndrome de malabsorption du glucose et du  
es), en raison de la présence de lactose dans

ite en fonction de la gravité de votre maladie.

en même temps que XYZALL. Chez certains  
lcool pourrait avoir des effets sur le système  
enté) n'ait jamais montré une augmentation



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.



Dichlorhydrate  
de Lévoctirizine

5 mg, comprimé pelliculé

- La substance active est : dichlorhydrate de lévocétirizine ..... 5 mg pour un comprimé pelliculé

- Les

Comp.

Pellicu

## 1. QU'

Ce médi  
anti-allé

- La rhin
- La rhin
- L'urtica

INFO  
'ZALL

vous i  
rosat  
us s

s.  
al


cin

boîte.

LOT 191998 2

EXP 09 2023

PPV 90 50



Xyzall 5 mg  
28 comprimés pelliculés

Non remboursable AMM



6 118000 021599

N 11080000000000

EPEL 12/13

avance pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.  
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout

silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium,  
oxyde de titane [E 171], macrogol 400]

## ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

La boîte de 14 et 28 XYZALL est un médicament  
associé à l'allergie, tels que :  
les atteintes oculaires (conjonctivite allergique) ;

**PRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé**  
**UTILISE dans les cas suivants :**

ce chimique apparentée, ou à l'un des autres

mg, comprimé pelliculé

car il n'existe pas encore de dosage adapté.  
syndrome de malabsorption du glucose et du  
es), en raison de la présence de lactose dans

ite en fonction de la gravité de votre maladie.

en même temps que XYZALL. Chez certains  
lcool pourrait avoir des effets sur le système  
enté) n'ait jamais montré une augmentation



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.



Dichlorhydrate  
de Lévoctirizine

5 mg, comprimé pelliculé

- La substance active est : dichlorhydrate de lévocétirizine ..... 5 mg pour un comprimé pelliculé

- Les

Comp.

Pellicu

## 1. QU'

Ce médi  
anti-allé

- La rhin
- La rhin
- L'urtica

INFO  
'ZALL

vous i  
rosat  
us s

s.  
al


cin

boîte.

LOT 191998 2

EXP 09 2023

PPV 90 50



Xyzall 5 mg  
28 comprimés pelliculés

Non remboursable AMM



6 118000 021599

N 11080000000000

EPEL 12/13

avance pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.  
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout

silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium,  
oxyde de titane [E 171], macrogol 400]

## ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

La boîte de 14 et 28 XYZALL est un médicament  
associé à l'allergie, tels que :  
les atteintes oculaires (conjonctivite allergique) ;

**PRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé**  
**UTILISE dans les cas suivants :**

ce chimique apparentée, ou à l'un des autres

mg, comprimé pelliculé

car il n'existe pas encore de dosage adapté.  
syndrome de malabsorption du glucose et du  
es), en raison de la présence de lactose dans

ite en fonction de la gravité de votre maladie.

en même temps que XYZALL. Chez certains  
lcool pourrait avoir des effets sur le système  
enté) n'ait jamais montré une augmentation

# LOCAPRED® 0,1%

Désonide 0,1%

Crème Voie cutanée

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez à personne d'autre.

Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

## ■ COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Désonide

LOCAPRED 0,1%

CRÈME T/5G

P.P.V : 160H60



6 118000 010951

15 g

100 mg/g

</div

# LOCAPRED® 0,1%

Désonide 0,1%

Crème Voie cutanée

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez à personne d'autre.

Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

## ■ COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Désonide

LOCAPRED 0,1%

CRÈME T/5G

P.P.V : 160H60



6 118000 010951

15 g

100 mg/5g

100 mg/15g

100 mg

اع، اطلب المزيد  
للتوصيات

## INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

# LEVOTHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne d'autre.
- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### Interactions avec les aliments et les boissons

#### Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être informé au début ou à la fin de votre traitement.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie au début ou au cours de votre grossesse.



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335

ceinte

ou

اع، اطلب المزيد  
للتوصيات

## INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

# LEVOTHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne d'autre.
- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### Interactions avec les aliments et les boissons

#### Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être informé au début ou à la fin de votre traitement.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie au début ou au cours de votre grossesse.



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335

ceinte

ou

اع، اطلب المزيد  
للتوصيات

## INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

# LEVOTHYROX® comprimé sécable

### Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre patient.

#### Interactions avec les aliments et les boissons

##### Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être informé au début ou à la fin de votre traitement.

##### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement  
Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie au début ou au cours de votre grossesse.



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335

ceinte  
in ou

اع، اطلب المزيد  
للتوصيات

## INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

# LEVOTHYROX® comprimé sécable

### Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre patient.

#### Interactions avec les aliments et les boissons

##### Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être informé au début ou à la fin de votre traitement.

##### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement  
Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie au début ou au cours de votre grossesse.



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335

ceinte  
in ou

اع، اطلب المزيد  
للتوصيات

## INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

# LEVOTHYROX® comprimé sécable

### Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre patient.

#### Interactions avec les aliments et les boissons

##### Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être informé au début ou à la fin de votre traitement.

##### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement  
Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie au début ou au cours de votre grossesse.



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335

ceinte  
in ou

اع، اطلب المزيد  
للتوصيات

## INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

# LEVOTHYROX® comprimé sécable

### Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre patient.

#### Interactions avec les aliments et les boissons

##### Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être informé au début ou à la fin de votre traitement.

##### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement  
Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie au début ou au cours de votre grossesse.



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335

ceinte  
in ou

اع، اطلب المزيد  
للتوصيات

## INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

# LEVOTHYROX® comprimé sécable

### Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre patient.

#### Interactions avec les aliments et les boissons

##### Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être informé au début ou à la fin de votre traitement.

##### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement  
Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie au début ou au cours de votre grossesse.



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335

ceinte

ou

اع، اطلب المزيد  
للتوصيات

## INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

# LEVOTHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne d'autre.
- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### Interactions avec les aliments et les boissons

#### Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être informé au début ou à la fin de votre traitement.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie au début ou au cours de votre grossesse.



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335

ceinte  
in ou

اع، اطلب المزيد  
للتوصيات

## INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Merck Serono

# LEVOTHYROX® comprimé sécable

### Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre patient.

#### Interactions avec les aliments et les boissons

##### Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être informé au début ou à la fin de votre traitement.

##### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement  
Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, consultez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie au début ou au cours de votre grossesse.



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7862160335

ceinte  
in ou

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes dont les symptômes et la maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. Cet effet indésirable n'a pas été mentionné dans cette notice. Voir rubrique "Effets indésirables".

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Ce médicament est classé dans la classe pharmacothérapeutique des préparations thyroïdiennes.

Indications thérapeutiques : Il est préconisé dans les situations suivantes :

- les hypothyroïdies (insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde),
- circonstances associées ou non à une hypothyroïdie où il est nécessaire de freiner la sécrétion de TSH (hormone qui stimule la glande thyroïde).



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg.

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes dont les symptômes et la maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. Cet effet indésirable n'a pas été mentionné dans cette notice. Voir rubrique "Effets indésirables".

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Ce médicament est classé dans la classe pharmacothérapeutique des préparations thyroïdiennes.

Indications thérapeutiques : Il est préconisé dans les situations suivantes :

- les hypothyroïdies (insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde),
- circonstances associées ou non à une hypothyroïdie où il est nécessaire de freiner la sécrétion de TSH (hormone qui stimule la glande thyroïde).



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg.

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes dont les symptômes et la maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. Cet effet indésirable n'a pas été mentionné dans cette notice. Voir rubrique "Effets indésirables".

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Ce médicament est classé dans la classe pharmacothérapeutique des préparations thyroïdiennes.

Indications thérapeutiques : Il est préconisé dans les situations suivantes :

- les hypothyroïdies (insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde),
- circonstances associées ou non à une hypothyroïdie où il est nécessaire de freiner la sécrétion de TSH (hormone qui stimule la glande thyroïde).



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg.

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes dont les symptômes et la maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. Cet effet indésirable n'a pas été mentionné dans cette notice. Voir rubrique "Effets indésirables".

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Ce médicament est classé dans la classe pharmacothérapeutique des préparations thyroïdiennes.

Indications thérapeutiques : Il est préconisé dans les situations suivantes :

- les hypothyroïdies (insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde),
- circonstances associées ou non à une hypothyroïdie où il est nécessaire de freiner la sécrétion de TSH (hormone qui stimule la glande thyroïde).



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg.

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes dont les symptômes et la maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. Cet effet indésirable n'a pas été mentionné dans cette notice. Voir rubrique "Effets indésirables".

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Ce médicament est classé dans la classe pharmacothérapeutique des préparations thyroïdiennes.

Indications thérapeutiques : Il est préconisé dans les situations suivantes :

- les hypothyroïdies (insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde),
- circonstances associées ou non à une hypothyroïdie où il est nécessaire de freiner la sécrétion de TSH (hormone qui stimule la glande thyroïde).



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg.

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes dont les symptômes et la maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. Cet effet indésirable n'a pas été mentionné dans cette notice. Voir rubrique "Effets indésirables".

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Ce médicament est classé dans la classe pharmacothérapeutique des préparations thyroïdiennes.

Indications thérapeutiques : Il est préconisé dans les situations suivantes :

- les hypothyroïdies (insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde),
- circonstances associées ou non à une hypothyroïdie où il est nécessaire de freiner la sécrétion de TSH (hormone qui stimule la glande thyroïde).



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg.

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

spécialement développée pour répondre à ces critères.

### Composition

**MEBO** est originaire de plantes naturelles comestibles. Elle est composée de 0.25% de  $\beta$ -Sitostérol comme étant le principe actif majeur. La base de la pommade est constituée d'huile de Sésame et de la Cire d'abeille.

### Mode d'action

**MEBO** agit en:

- Fournissant un optimum d'humidité physiologique nécessaire à la régénération et à la réparation.
- Provoquant un effet anti-inflammatoire et réduisant cependant l'œdème et l'érythème.
- Crément une atmosphère défavorable à la colonisation bactérienne et fongique.
- Isolant et protégeant les extrémités nerveuses exposées et lésées produisant cependant un effet analgésique.
- Fournissant une nutrition locale pour les cellules de fond lésées.
- Liquéfiant les tissus nécrotiques.
- Isolant et protégeant les plaies du milieu ambiant mais en même temps en conservant un drainage ainsi qu'un échange gazeux efficace.
- Réduisant la perte de fluide (brûlures).
- Absorbant la chaleur résiduelle de
- Activant l'épithérialisation dans acceptable.

### Indications

**MEBO** a été utilisé avec succès

suivantes:

- Brûlures de premier degré, où le suintement et la cicatrisation sont remarquables,
- Les brûlures de second degré surmatiques ou infectées, appliquée proprement, une greffe tendre une couche d'un film protecteur sur la plaie et la régénération aura lieu à l'abri des agents extérieurs et des tissus pileux dermiques et des tissus conjonctifs.
- Les brûlures de troisième degré, où la douleur et activer le débridement et la débridement nécrotiques dans le but de préparer la cicatrisation.
- Le site donneur, pour redonner de la peau et activer la cicatrisation.
- Les plaies chroniques, y compris celles de la



# HYZAAR® 50 mg/12,5 mg

## Comprimé pelliculé

### Losartan potassique et hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

#### 1. QU'EST-CE QU'HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

HYZAAR est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels du corps.

HYZAAR est indiqué dans les cas où l'augmentation de la pression artérielle est due à une hypertension (pression dans les artères) ou à une insuffisance rénale (fonctionnement des reins).

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a indiqué de prendre ce médicament,

Ne prenez jamais HYZAAR si :

- si vous êtes allergique au losartan ou aux autres composants de ce médicament;
- si vous êtes allergique aux thiazidiques, certains antibiotiques et certains médicaments contre les maladies de peau (demandez à votre médecin);
- si votre fonction hépatique est défaillante;
- si vous avez un faible taux de cholestérol dans le sang qui ne peuvent pas être corrigés par un régime sans sel;
- si vous souffrez de goutte;
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (ne prenez pas HYZAAR en début de grossesse);
- si votre fonction rénale est gravement atteinte;
- si vous souffrez de diabète ou d'une maladie cardiaque destinée à réduire la pression artérielle.

Faites attention avec Hyzaar 50 mg/12,5 mg. Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière pour prendre ce médicament.

#### HYZAAR :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. HYZAAR est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique "Grossesse").

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre HYZAAR :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, ou des difficultés pour respirer;
- si vous prenez des diurétiques;
- si vous faites un régime sans sel;
- si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées;
- si vous avez une insuffisance cardiaque;
- si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 "Ne prenez jamais HYZAAR").

LOT R029043 1

EXP 08 2021

PPV 156.70 DH

HYZAAR 50/12,5 mg  
28 comprimés pelliculés

Remboursé



6 118000 290100

# HYZAAR® 50 mg/12,5 mg

## Comprimé pelliculé

### Losartan potassique et hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

#### 1. QU'EST-CE QU'HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

HYZAAR est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels du corps.

HYZAAR est indiqué dans les cas où l'augmentation de la pression artérielle est due à une hypertension (pression dans les artères) ou à une insuffisance rénale (fonctionnement des reins dégradé).

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a indiqué de prendre ce médicament,

Ne prenez jamais HYZAAR si :

- si vous êtes allergique au losartan ou aux autres composants de ce médicament;
- si vous êtes allergique aux thiazidiques, certains antibiotiques et certains médicaments (demandez à votre médecin);
- si votre fonction hépatique est dégradée;
- si vous avez un faible taux de cholestérol dans le sang qui ne peuvent pas être corrigés par un régime sans sel;
- si vous souffrez de goutte;
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (ne prenez pas HYZAAR en début de grossesse);
- si votre fonction rénale est très dégradée;
- si vous souffrez de diabète ou d'hypertension artérielle (si ce médicament est destiné à réduire la pression artérielle);

Faites attention avec Hyzaar 50 mg/12,5 mg. Adressez-vous à votre médecin, si vous prenez ce médicament.

#### HYZAAR :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. HYZAAR est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique "Grossesse").

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre HYZAAR :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue;
- si vous prenez des diurétiques;
- si vous faites un régime sans sel;
- si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées;
- si vous avez une insuffisance cardiaque;
- si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 "Ne prenez jamais HYZAAR").

Hyzaar 50 mg/12,5 mg est un médicament de prescription dans les pharmacies, confondre avec d'autres médicaments.

LOT R029043 1

EXP 08 2021

PPV 156.70 DH

HYZAAR 50/12,5 mg  
28 comprimés pelliculés



6 118000 290100

# HYZAAR® 50 mg/12,5 mg

## Comprimé pelliculé

### Losartan potassique et hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

#### 1. QU'EST-CE QU'HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

HYZAAR est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels du corps.

HYZAAR est indiqué dans les cas où l'augmentation de la pression artérielle est due à une hypertension (pression dans les artères) ou à une insuffisance rénale (fonctionnement des reins dégradé).

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a indiqué de prendre ce médicament,

Ne prenez jamais HYZAAR si :

- si vous êtes allergique au losartan ou aux autres composants de ce médicament;
- si vous êtes allergique aux thiazidiques, certains antibiotiques et certains médicaments (demandez à votre médecin);
- si votre fonction hépatique est dégradée;
- si vous avez un faible taux de cholestérol dans le sang qui ne peuvent pas être corrigés par un régime sans sel;
- si vous souffrez de goutte;
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (ne prenez pas HYZAAR en début de grossesse);
- si votre fonction rénale est très dégradée;
- si vous souffrez de diabète ou d'hypertension artérielle (HTA) et que ce médicament est destiné à réduire la pression artérielle.

Faites attention avec Hyzaar 50 mg/12,5 mg. Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière pour obtenir des informations supplémentaires sur ce médicament.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. HYZAAR est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique "Grossesse"). Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre HYZAAR :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, ou des difficultés pour respirer;
- si vous prenez des diurétiques;
- si vous faites un régime sans sel;
- si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées;
- si vous avez une insuffisance cardiaque;
- si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 "Ne prenez jamais HYZAAR").

LOT R029043 1

EXP 08 2021

PPV 156.70 DH

HYZAAR 50/12,5 mg  
28 comprimés pelliculés

Remboursé



6 118000 290100

La notice a été imprimée au débordement dans les deux dernières pages, confondant la page 2 avec la page 1.

# HYZAAR® 50 mg/12,5 mg

## Comprimé pelliculé

### Losartan potassique et hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

#### 1. QU'EST-CE QU'HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

HYZAAR est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels du corps.

HYZAAR est indiqué dans les cas où l'augmentation de la pression artérielle est due à une hypertension (pression dans les artères) ou à une insuffisance rénale (fonctionnement des reins).

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a indiqué de prendre ce médicament,

Ne prenez jamais HYZAAR si :

- si vous êtes allergique au losartan ou aux autres composants de ce médicament;
- si vous êtes allergique aux thiazidiques, certains antibiotiques et certains médicaments contre les maladies de peau (demandez à votre médecin);
- si votre fonction hépatique est défaillante;
- si vous avez un faible taux de cholestérol dans le sang qui ne peuvent pas être corrigés par un régime sans sel;
- si vous souffrez de goutte;
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (ne prenez pas HYZAAR en début de grossesse);
- si votre fonction rénale est très mauvaise (grave);
- si vous souffrez de diabète ou d'hypertension artérielle (hypertension artérielle est destiné à réduire la pression artérielle).

Faites attention avec Hyzaar 50 mg/12,5 mg. Adressez-vous à votre médecin, si vous prenez HYZAAR :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. HYZAAR est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique "Grossesse"). Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre HYZAAR :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue;
- si vous prenez des diurétiques;
- si vous faites un régime sans sel;
- si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées;
- si vous avez une insuffisance cardiaque;
- si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 "Ne prenez jamais HYZAAR").

LOT R029043 1

EXP 08 2021

PPV 156.70 DH

HYZAAR 50/12,5 mg  
28 comprimés pelliculés

Remboursé



6 118000 290100

La notice est destinée à être délivrée dans les pharmacies confiées à l'ordre des pharmaciens.

# HYZAAR® 50 mg/12,5 mg

## Comprimé pelliculé

### Losartan potassique et hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

#### 1. QU'EST-CE QU'HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

HYZAAR est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels du corps.

HYZAAR est indiqué dans les cas où l'augmentation de la pression artérielle est due à une hypertension (pression sanguine élevée).

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a indiqué de prendre ce médicament,

Ne prenez jamais HYZAAR si :

- si vous êtes allergique au losartan ou aux autres composants de ce médicament;
- si vous êtes allergique aux thiazidiques, certains antibiotiques et certains médicaments (demandez à votre médecin);
- si votre fonction hépatique est défaillante;
- si vous avez un faible taux de cholestérol dans le sang qui peuvent pas être corrigés par un régime sans sel;
- si vous souffrez de goutte;
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (ne prenez pas HYZAAR en début de grossesse);
- si votre fonction rénale est gravement atteinte;
- si vous souffrez de diabète ou d'une maladie cardiaque destiné à réduire la pression artérielle.

Faites attention avec Hyzaar 50 mg/12,5 mg. Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière si vous prenez HYZAAR :

- Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. HYZAAR est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique "Grossesse"). Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre HYZAAR :
- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue;
  - si vous prenez des diurétiques;
  - si vous faites un régime sans sel;
  - si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées;
  - si vous avez une insuffisance cardiaque;
  - si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 "Ne prenez jamais HYZAAR").

LOT R029043 1

EXP 08 2021

PPV 156.70 DH

HYZAAR 50/12,5 mg  
28 comprimés pelliculés

Remboursé



6 118000 290100

La notice a été imprimée sur une feuille de papier de couleur jaune, contenant des informations sur les effets secondaires et les contre-indications.

**Composition :** ..... par comprimé  
Charbon végétal pulvérisé ..... 180 mg  
Extrait sec de rhubarbe ..... 25 mg  
Feuilles de séné ..... 105 mg  
Soufre purifié ..... 50 mg

Excipients : q.s.

**Effet notoire :** Succharose

**Indications, Contre-indications, Posologies**

& Précautions d'emploi : Lire la notice à l'intérieur.

Demandez l'avis du médecin ou du pharmacien en cas de problèmes liés à l'utilisation du médicament.

**NE PAS LAISSER À LA PORTEE ET LA VUE DES ENFANTS.**

Conserver dans le conditionnement original à l'abri de la lumière.

المرجعية : كوبه كافيه  
السugar: كوبه كافيه  
السكرز: السكرز  
البرجر: فراغ نور تغيرات معروفة  
البرجر: فراغ نور انتظام الاستعمال  
البرجر: فراغ نور الشفاعة بالقطن.  
البرجر: لستير؛ الطبيب أو المسندي في حالة حدوث مشكل مرتبطة بكلفة استبدل البرجر.  
يعطى بعدها عن مقتول و من أصل الطبل.  
يعطى في علاجه الخارجي والإصلي، لم يعرى عن الفتوه.

198443  
03/16

# EUCARBON®

Charbon végétal pulvérisé  
Extrait sec de rhubarbe,  
Feuilles de séné  
Soufre purifié

**Voie orale**

**30 comprimés**

**Lot:**  
**EXP:**  
**PPV:**

**32,00**

**Composition :** ..... par comprimé  
Charbon végétal pulvérisé ..... 180 mg  
Extrait sec de rhubarbe ..... 25 mg  
Feuilles de séné ..... 105 mg  
Soufre purifié ..... 50 mg

Excipients : q.s.

**Effet notoire :** Succharose

**Indications, Contre-indications, Posologies**

& Précautions d'emploi : Lire la notice à l'intérieur.

Demandez l'avis du médecin ou du pharmacien en cas de problèmes liés à l'utilisation du médicament.

**NE PAS LAISSER À LA PORTEE ET LA VUE DES ENFANTS.**

Conserver dans le conditionnement original à l'abri de la lumière.

المرجعية : كوبه كافيه  
السugar: كوبه كافيه  
السكرز: السكرز  
البرجر: فراغ نور تغيرات معروفة  
البرجر: فراغ نور انتظام الاستعمال  
البرجر: فراغ نور الشفاعة بالقطن.  
البرجر: لستير؛ الطبيب أو المسندي في حالة حدوث مشكل مرتبطة بكلفة استبدل البرجر.  
يعطى بعدها عن مقتول و من أصل الطبل.  
يعطى في علاجه الخارجي والإصلي، لم يعرى عن الفضوه.

198443  
03/16

# EUCARBON®

Charbon végétal pulvérisé  
Extrait sec de rhubarbe,  
Feuilles de séné  
Soufre purifié

**Voie orale**

**30 comprimés**

**Lot:**  
**EXP:**  
**PPV:**

32,00



# Laboratoire EL ALLALI

Dr.Mohamed Aziz EL ALLALI

Pharmacien Biologiste - Bruxelle - Belgique

Diplôme Universitaire "Qualité" - Bordeaux - France

الجودة صراع المستقبل  
La qualité est le combat d'avenir

Vos résultats sur l'application :  
"Labo EL ALLALI"

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

# مختبر التحاليل العلالي

الدكتور محمد عزيز العلالي  
صيدلاني إنجياني - جامعة بروكسل - بلجيكا  
شهادة جامعية - "جودة" - بوردو - فرنسا

05 28 84 33 84  
07 67 37 80 41

[www.laboeallali.com](http://www.laboeallali.com)  
[laboeallali@gmail.com](mailto:laboeallali@gmail.com)

N°Dossier: 140320 022

Patient : Mme KACHT YAMNA

Sexe F DN: 01/01/1959 (61 ans) ND: 80415

Médecin : Dr. MOUSTADRAF ZOUHAIR


42

Prélèvement Effectué au laboratoire le 14/03/2020 à 10h40  
Examens créés le 14/03/2020 à 09h39  
Résultat Final édité le 16/03/2020 à 07h58

Page : 1 / 1

## HORMONOLOGIE

TSHus 2,48 µUI/ml 0.27 à 4.20 29/08/19 : 1.78  
(Tech Elèctrochimiluminescence/e411)



Tous les résultats sont validés par Dr. EL ALLALI

LABORATOIRE Dr. EL ALLALI  
D'ANALYSES MEDICALES  
Pharm. 05 28 84 33 84 / Fax: 05 28 82 87 58  
Tél: 05 28 84 33 84 / Mail: laboeallali@gmail.com

Dr. M. A. EL ALLALI