

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## cique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

Nº P19- 067294

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : ..... 32 ..... Société : ..... N° 30178 .....

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ..... WADEH .....

WADEH med

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade : ..... Age : .....

Lien de parenté :  Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....

### VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie Nº P19-067294

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : .....

Nom de l'adhérent(e) : .....

Total des frais engagés : .....

Date de dépôt : .....

# Conditions Générales

## POUR LE PRATICIEN

L'acte médical est désigné par l'une des mentions suivantes :

- = Consultation au Cabinet du médecin omnipraticien
  - = Consultation au Cabinet par le médecin spécialiste ou qualifié (autre que le médecin neuro-psychiatre)
  - = Consultation au Cabinet par le neuro-psychiatre
  - = Visite de jour au domicile du malade par le médecin
  - = Visite de nuit au domicile du malade par le médecin
  - = Visite du dimanche par le médecin au domicile du malade
  - = Visite de jour au domicile du malade par un spécialiste qualifié
  - = Acte de pratique médicale courrant et de petite chirurgie
  - = Actes de chirurgie et de spécialistes
- SF** = Actes pratiqués par la sage femme et relevant de sa compétence
  - SFI** = Soins infirmiers pratiqués par la sage femme
  - AMM** = Actes pratiqués par le masseur ou le kinésithérapeute
  - AMI** = Actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière
  - AP** = Actes pratiqués par un orthophoniste
  - AMY** = Actes pratiqués par un aide-orthophoniste
  - R-Z** = Electro - Radiologie
  - B** = Analyses

## POUR L'ADHERENT

La mutuelle ne participe aux frais résultant de certains actes que si après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge.

Pour les actes soumis à cette formalité, le malade est tenu, avant l'exécution de ces actes d'adresser au service de la Mutuelle une demande d'entente préalable remplie et signée par son médecin traitant.

Ce bulletin doit mentionner les raisons pour lesquelles l'application de tel acte ou tel traitement est proposé pour permettre au médecin contrôleur de donner son accord ou de présenter ses observations

Le bulletin d'entente préalable peut être demandé auprès du service Mutuelle, il sera remis sous pli confidentiel au médecin contrôleur dûment rempli par le médecin traitant.

## LES ACTES SOUMIS A ACCORD PREALABLE

HOSPITALISATION EN CLINIQUE

HOSPITALISATION EN HOPITAL

HOSPITALISATION EN SANATORIUM OU REVENTORIUM

SEJOUR EN MAISON DE REPOS

LES ACTES EFFECTUES EN SERIE, il s'agit d'actes répétés en plusieurs séances ou actes obaux comportant un ou plusieurs échelonnements dans le temps.

- LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES

- L'ORTHOPEDIE

- LA REEDUCATION

- LES ACCOUCHEMENTS

- LES CURES THERMALES

- LA CIRCONCISION

- LE TRANSPORT EN AMBULANCE

## EN CAS D'URGENCE

Les actes d'urgence échappant à la procédure d'entente préalable, l'intéressé doit évenir dans les 24 heures le Service Mutuelle qui donnera ou non son accord

Cette feuille complétée par le praticien, à l'occasion de chaque visite ou l'exécution de chaque ordonnance médicale ne doit être utilisée que pour un seul malade

DATE DE DEPOT

AEROPORT CASA ANFA  
CASABLANCA

TEL : 05 22 91 26 46 / 2648 / 2649 / 2857 / 2883

FAX / 05 22 91 26 52

TELEX / 3998 MUT

E-mail : mupras@RoyalAirMaroc.co.ma



**M U P R A S**

Mutuelle de Prévoyance et d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

**FEUILLE DE SOINS MU 016598**

### A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Nom & Prénom : WADEH Mohamed

Matricule : 532 Fonction : Retraité Poste :

Adresse : Inara 1 Rue 5 n°11 Anchoek Casab

Tél. : 0522 21 1133 Signature Adhérent : [Signature]

### A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

Nom & Prénom du patient : WADEH Age

Lien de parenté avec l'adhérent : Adhérent  Conjoint  Enfant

Date de la première visite du médecin :

Nature de la maladie : cas Diopathie hypertensive art. is

S'il s'agit d'un accident : causes et circonstances

A CASA, le 08/10/12

Durée d'utilisation 3 mois

Signature [Signature] Date 16/02/2013  
Email : lafayate.mupras@royalairmaroc.com  
Tél. : 0522 27 25 90 Centre 16/02/2013  
DOSSIER FONCTIONNEL TAGMOUTIK

**VOLET ADHERENT**

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	21/6/2020	1460,60

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et Signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et Signature du praticien	Dates des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des s

Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX

# CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO VASCULAIRES

**Docteur TAGMOUTI Fouad**

SPECIALISTE DES MALADIES  
DU COEUR ET DES VAISSEAUX

Diplôme d'Etat de la Faculté de Médecine de Lyon  
Membre de la société Française et Européenne de Cardiologie

Sur Rendez-vous

الدكتور التكموتي فؤاد

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

خريج كلية الطب بليون

عضو الجمعية الفرنسية والأوروبية لأمراض القلب  
بالموعد

Casablanca, le

8/6/2005

WADDEH. Rehmed

14.5.2003

Pizotar 100.

SV

60.000<sup>3</sup>

Lodoz -

SV

sup

+

lh

Ratis

14.5.2003

Hypenium.

sup

SV

15.5.2003

Amp 10.

Step

31.3.2003

Zylocric

SV

34.6.2003

LAfidi X

sup

SV

SV

sup

lh

Ratis

th

lh

lh

lh

lh

lh

lh

14.6.2003

21, Avenue Lahcen Ouidder Résidence Germaine 3 - Casablanca

Tél.: C. 0522.22.20/91 / 0522.26.75.14 - Fax.: 0522.27.75.90 - Email : tagfouad@hotmail.com



**Sportifs**

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

**Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients**

Sodium (pour la forme injectable).  
Lactose (pour la forme comprimé).

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT****Posologie****Forme orale :**

La posologie est adaptée selon l'indication et la gravité de l'affection.

**Adulte :****- Hypertension artérielle:**

La posologie initiale recommandée est de 20 mg de furosemide par jour (le matin).

En cas d'efficacité insuffisante, on peut :

- soit augmenter les doses à 40 mg.
- soit associer un autre antihypertenseur.

La posologie du furosemide peut être augmentée au-delà de 40 mg en cas d'altération de la fonction rénale.  
Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique.

**- modérées : ½ à 1 comprimé à 40 mg de furosemide par jour.****- importants :**

2 à 3 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 1 ou 2 prises,  
3 à 4 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 2 prises.

**Enfant :**

Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique, la posologie quotidienne est de 1 à 2 mg/kg de poids corporel, répartie en 1 à 2 prises.

**Forme injectable :****Adulte :**

Selon l'indication intraveineuse le r

**Enfant et nourri****SE CONFORMER**

à la posologie varie de 2 à 3 ampoules par jour par voie

**OPTION MEDICALE DANS TOUS LES CAS.**

**LASILIX 40MG  
20CP SEC  
P.P.V :34DH60**

**1180000 060468**

**Fréquence et**

Se conformer si

**Durée du trait**

Se conformer

**Conduite à t**

Prévenir imm

**MENT, DE  
ISER UN**

*au faire),  
on,*

*insuffisant  
ctase pour*

*association  
s).*

*sang avec  
galactosé-  
(maladies*

*La posologie initiale recommandée est de 20 mg de furosemide par jour (le matin).  
En cas d'efficacité insuffisante, on peut :*

- soit augmenter les doses à 40 mg.*
- soit associer un autre antihypertenseur.*

*La posologie du furosemide peut être augmentée au-delà de 40 mg en cas d'altération de la fonction rénale.  
Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique.*

**- modérées : ½ à 1 comprimé à 40 mg de furosemide par jour.****- importants :**

*2 à 3 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 1 ou 2 prises,  
3 à 4 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 2 prises.*

*Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique, la posologie quotidienne est de 1 à 2 mg/kg de*

*poids corporel, répartie en 1 à 2 prises.*

*la posologie varie de 2 à 3 ampoules par jour par voie*

**LASILIX 40MG  
20CP SEC  
P.P.V :34DH60**

**1180000 060468**

*nte ou voie intramusculaire.  
n médicale.*

*n médicale.*

**icament doit être administré :**

*en médicale.*

*en médicale.*

**Prévenir imm**

**Sportifs**

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

**Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients**

Sodium (pour la forme injectable).  
Lactose (pour la forme comprimé).

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT****Posologie****Forme orale :**

La posologie est adaptée selon l'indication et la gravité de l'affection.

**Adulte :****- Hypertension artérielle:**

La posologie initiale recommandée est de 20 mg de furosemide par jour (le matin).

En cas d'efficacité insuffisante, on peut :

- soit augmenter les doses à 40 mg.
- soit associer un autre antihypertenseur.

La posologie du furosemide peut être augmentée au-delà de 40 mg en cas d'altération de la fonction rénale.  
Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique.

**- modérées : ½ à 1 comprimé à 40 mg de furosemide par jour.****- importants :**

2 à 3 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 1 ou 2 prises,  
3 à 4 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 2 prises.

**Enfant :**

Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique, la posologie quotidienne est de 1 à 2 mg/kg de poids corporel, répartie en 1 à 2 prises.

**Forme injectable :****Adulte :**

Selon l'indication intraveineuse le r

**Enfant et nourri****SE CONFORMER**

à la posologie varie de 2 à 3 ampoules par jour par voie

**OPTION MEDICALE DANS TOUS LES CAS.**

**LASILIX 40MG  
20CP SEC  
P.P.V :34DH60**

**1180000 060468**

**Fréquence et**

Se conformer si

**Durée du trait**

Se conformer

**Conduite à t**

Prévenir imm

**MENT, DE  
ISER UN**

*au faire),  
on,*

*insuffisant  
ctase pour*

*association  
s).*

*sang avec  
galactosé-  
(maladies*

*La posologie initiale recommandée est de 20 mg de furosemide par jour (le matin).  
En cas d'efficacité insuffisante, on peut :*

- soit augmenter les doses à 40 mg.*
- soit associer un autre antihypertenseur.*

*La posologie du furosemide peut être augmentée au-delà de 40 mg en cas d'altération de la fonction rénale.  
Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique.*

**- modérées : ½ à 1 comprimé à 40 mg de furosemide par jour.****- importants :**

*2 à 3 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 1 ou 2 prises,  
3 à 4 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 2 prises.*

*Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique, la posologie quotidienne est de 1 à 2 mg/kg de*

*poids corporel, répartie en 1 à 2 prises.*

*la posologie varie de 2 à 3 ampoules par jour par voie*

**LASILIX 40MG  
20CP SEC  
P.P.V :34DH60**

**1180000 060468**

*nte ou voie intramusculaire.  
n médicale.*

*n médicale.*

**icament doit être administré :**

*en médicale.*

*en médicale.*

**Prévenir imm**

**Sportifs**

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

**Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients**

Sodium (pour la forme injectable).  
Lactose (pour la forme comprimé).

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT****Posologie****Forme orale :**

La posologie est adaptée selon l'indication et la gravité de l'affection.

**Adulte :****- Hypertension artérielle:**

La posologie initiale recommandée est de 20 mg de furosemide par jour (le matin).

En cas d'efficacité insuffisante, on peut :

- soit augmenter les doses à 40 mg.
- soit associer un autre antihypertenseur.

La posologie du furosemide peut être augmentée au-delà de 40 mg en cas d'altération de la fonction rénale.  
Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique.

- modérées :  $\frac{1}{2}$  à 1 comprimé à 40 mg de furosemide par jour.

**Importants :**

2 à 3 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 1 ou 2 prises,  
3 à 4 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 2 prises.

**Enfant :**

Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique, la posologie quotidienne est de 1 à 2 mg/kg de poids corporel, répartie en 1 à 2 prises.

**Forme injectable :****Adulte :**

Selon l'indication intraveineuse le r

**Enfant et nourri**

Voie intraveineu

**SE CONFORMER**

**LASILIX 40MG  
20CP SEC  
P.P.V :34DH60**

**1180000 060468**

**220Z 90-07-01  
100361 : 101**

**OPTION MEDICALE DANS TOUS LES CAS.**

la posologie varie de 2 à 3 ampoules par jour par voie

intraveineuse.

nte ou voie intramusculaire.

médicale.

n médicale.

**icament doit être administré :**



**Prévenir imm**

*au faire),  
on,*

*insuffisant  
ctase pour*

*association  
s).*

*sang avec  
galactosé-  
(maladies*

*de votre*

*ment si  
TT AUTRE*

*de votre*

*ment, DE  
ISER UN*

**Sportifs**

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

**Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients**

Sodium (pour la forme injectable).  
Lactose (pour la forme comprimé).

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT****Posologie****Forme orale :**

La posologie est adaptée selon l'indication et la gravité de l'affection.

**Adulte :****- Hypertension artérielle:**

La posologie initiale recommandée est de 20 mg de furosemide par jour (le matin).  
En cas d'efficacité insuffisante, on peut :  
- soit augmenter les doses à 40 mg.  
- soit associer un autre antihypertenseur.  
La posologie du furosemide peut être augmentée au-delà de 40 mg en cas d'altération de la fonction rénale.

**Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique :**

- modérées : ½ à 1 comprimé à 40 mg de furosemide par jour.

**Importants :**

2 à 3 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 1 ou 2 prises,  
3 à 4 comprimés à 40 mg de furosemide par jour en 2 prises.

**Enfant :**

Œdèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique, la posologie quotidienne est de 1 à 2 mg/kg de poids corporel, répartie en 1 à 2 prises.

**Forme injectable :****Adulte :**

Selon l'indication intraveineuse l'enfant et l'adulte

**Enfant et nourrisson****Se conformer**

Mode et voie d'administration si l'autre

LASILIX 40MG  
20CP SEC  
P.P.V : 34DH60

1180000 060468

2202 90-07-01  
100361 : 101

OPTION MEDICALE DANS TOUS LES CAS.

la posologie varie de 2 à 3 ampoules par jour par voie

intraveineuse lente ou voie intramusculaire.

Le médicament doit être administré :

de votre

de votre

de votre

Fréquence et Durée du traitement

Se conformer Se conformer

Conduite à tenir Prévenir immédiatement

MENT, DE  
ISER UN





# زيلوريك® أقراص 100

Durée du traitement

Dans tous les cas  
**Si vous avez pris**  
Prévenez immédiatement avec vos médecins.

- ut diminuer et ils pourront
- avez récemment pris ou

35. phénytoïne  
la varicelle  
H

inologique (immunosup-

l'hypertension artérielle  
le (angiotensine) ou des

oagulants), comme la

si vous prenez, avez  
médicaments obtenus  
plantes.

insez être enceinte ou  
édecin ou pharmacien

seul avis contraire de votre

ce médicament dans le lait maternel, il est donc  
ZYLORIC, comprimé au cours de l'allaitement.

## utilisation de machines

que de ce médicament peut entraîner des étourdissements, ses problèmes de coordination. Si c'est le cas, ne pas d'outils ou de machines.

## notoire: Lactose.

que vous aviez une intolérance à certains sucre, avant de prendre ce médicament.  
est déconseillée chez les patients présentant une

un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de

du galactose (maladies héréditaires rares).

## ZYLORIC, comprimé?

ne médicament en suivant exactement les indications de prendre ce médicament.  
Vérifiez auprès de votre médecin en cas de

avalés entiers, avec un grand verre d'eau après les

est fonction des résultats du taux sanguin en acide urées sont comprises entre 100 et 900 mg par jour.  
lement avec une faible dose, qui sera augmentée, le

otre fonction hépatique ou rénale est réduite, votre  
ire une dose plus faible ou vous demander d'espacer  
si vous êtes traité(e) par dialyse deux ou trois fois par  
jour, vous prescrire une dose de 300 ou 400 mg qui  
lement après votre dialyse.

(âges de moins de 15 ans)

ion compris entre 100 à 400 mg par jour.

**Si vous oubliez de prendre la pilule**  
Prenez-la dès qu'au moment de prendre la dose double pour que la pilule soit absorbée.  
**Si vous arrêtez de prendre la pilule**  
N'arrêtez pas de prendre la pilule.  
Si vous avez d'autre chose d'information

## 4. QUELS SONT

Comme tous les effets indésirables peuvent être rencontrés dans le monde.

**Si vous présentez immédiatement** spécialiste ou de Hypersensibilité

Les signes peuvent être fréquents (peu fréquents) ou de

Desquamation de la bouche, et frissons

• Très rarement, une douleur dans la tête, et sensation

• Rêves (peuvent à

• Toux, et crachats

• Réactions d'hyper

• Tous changements

• Saignements aux

• Un choc anaphylactique

• Si vous ressentez

• Peu fréquents (peu

• Douleur de l'estomac

• Anormales au niveau

• Rapidement possibles

• Fièvre (température

• Présence de sa

• Taux élevés de cholestérol

• Sentiment généralement

يتربيت على هذه النشرة بأكمله.  
معلومات تهمكم  
احتياطات تجاه النشرة قد تختلف إلى  
إذا كانت بهذه المنشورة قد تختلف إلى  
الصيغة الأخرى أو المرض( المرض)  
لقد أخذت هذه الدواعي بمشكل شديد  
إذا أنت من مسناها لا يزال قد تسبب  
غير متذمرين في هذه النشرة. حدث عن  
غير متذمرين في هذه النشرة. حدث عن

محظوظ عليه النشرة:  
1. ما هو زيلوريك أقراص وما هي الحالات  
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل  
3. كيف أتمكن من استعمال زيلوريك أقراص فيها  
4. ما هي التأثيرات الجانبية في المنسوج  
5. كيف يجب حفظ غيرها زيلوريك؟  
6. معلومات إضافية

ما هو زيلوريك أقراص وما هي الحالات  
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل  
3. كيف أتمكن من استعمال زيلوريك؟  
4. ما هي التأثيرات الجانبية في المنسوج  
5. كيف يجب حفظ غيرها زيلوريك؟  
6. معلومات إضافية

ما هو زيلوريك أقراص وما هي الحالات  
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل  
3. كيف أتمكن من استعمال زيلوريك؟  
4. ما هي التأثيرات الجانبية في المنسوج  
5. كيف يجب حفظ غيرها زيلوريك؟  
6. معلومات إضافية

ما هو زيلوريك أقراص وما هي الحالات  
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل  
3. كيف أتمكن من استعمال زيلوريك؟  
4. ما هي التأثيرات الجانبية في المنسوج  
5. كيف يجب حفظ غيرها زيلوريك؟  
6. معلومات إضافية

ما هو زيلوريك أقراص وما هي الحالات  
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل  
3. كيف أتمكن من استعمال زيلوريك؟  
4. ما هي التأثيرات الجانبية في المنسوج  
5. كيف يجب حفظ غيرها زيلوريك؟  
6. معلومات إضافية

ما هو زيلوريك أقراص وما هي الحالات  
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل  
3. كيف أتمكن من استعمال زيلوريك؟  
4. ما هي التأثيرات الجانبية في المنسوج  
5. كيف يجب حفظ غيرها زيلوريك؟  
6. معلومات إضافية

ما هو زيلوريك أقراص وما هي الحالات  
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل  
3. كيف أتمكن من استعمال زيلوريك؟  
4. ما هي التأثيرات الجانبية في المنسوج  
5. كيف يجب حفظ غيرها زيلوريك؟  
6. معلومات إضافية

ما هو زيلوريك أقراص وما هي الحالات  
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل  
3. كيف أتمكن من استعمال زيلوريك؟  
4. ما هي التأثيرات الجانبية في المنسوج  
5. كيف يجب حفظ غيرها زيلوريك؟  
6. معلومات إضافية

ما هو زيلوريك أقراص وما هي الحالات  
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل  
3. كيف أتمكن من استعمال زيلوريك؟  
4. ما هي التأثيرات الجانبية في المنسوج  
5. كيف يجب حفظ غيرها زيلوريك؟  
6. معلومات إضافية

ما هو زيلوريك أقراص وما هي الحالات  
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل  
3. كيف أتمكن من استعمال زيلوريك؟  
4. ما هي التأثيرات الجانبية في المنسوج  
5. كيف يجب حفظ غيرها زيلوريك؟  
6. معلومات إضافية

Bamboo 773.854.07.15

2013 年度 第二回 課題研究会  
「課題研究会の実施と評議会の運営」

0000  
0000

75.20

לעומת מושג זה, מושג זה מושג אחר:

A photograph of a prescription slip from Cooper Pharma. The slip is white with blue and black text. At the top right is the company logo 'COOPER PHARMA' with a blue square containing a white 'C'. Below the logo is the address '41, Rue Mohamed Bourguiba, 2011 CASABLANCA'. The main text of the prescription is in French and includes: 'TITRE : Un adolescent souffrant de crises d'asthme', 'CONTENU : 100 comprimés', 'DOSAGE : 2 comprimés par jour', 'EFFETS : Soulage les crises d'asthme', and 'EXPIRATION : 01/03/2013'. There is also a note at the bottom left: 'Ce médicament est à proscrire dans les cas de déshydratation modérée ou importante'. The background of the image shows a dark, textured surface.



Bamboo 773.854.07.15

2013 年度 第二回 課題研究会  
「課題研究会」の実施と評議会の開催について  
- 事務局による報告書 -

75,20 ₪  
לכבוד ינאי ור' ברוך בירב;  
ר' ברוך  
ר' ברוך;  
לכבוד ינאי ור' ברוך בירב (וילנא)  
ר' ברוך (וילנא);

**COOPER PHARMA**

41, rue Mohamed Bourguiba 20110 CASABLANCA  
T +212 32 20 00 00 - F +212 32 20 00 01  
www.cooperpharma.com

This is a medicine used which treats your heart and the consumption contraindicated by the physician.  
Medicament is a product which treats your heart and the consumption contraindicated by the physician.  
Do not open or use this medicine until prescribed by a doctor.

DO NOT USE THIS MEDICAMENT OUT OF EACH OF CHILDREN.

DO NOT USE THIS MEDICAMENT OUT OF EACH OF CHILDREN.

# PREZAR® 100 mg

## Losartan

Comprimé pelliculé. Boîte de 28

### Intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Si vous avez besoin de la re lire,

si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre

personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de  
journée lui être nocif.

Il devient grave si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette  
l'avis ou à votre pharmacien.

MENT :

LOSARTAN PUTATION 100 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose

sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II.

L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

• Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).

• Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie > 0,5 g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.

• Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC: médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par l'IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.

• Chez les patients présentant une hypertension et un épaississement du ventricule gauche. PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

### POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

### PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

### PATIENTS ADULTES INSUFFISANTS CARDIAQUES

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

### PATIENTS ADULTES INSUFFISANTS RÉNAUX

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est recommandé (il augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un diurétique.

**Posologie chez les groupes de patients particuliers**

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier pour les patients traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients âgés. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients sous dialyse.

### CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

• Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.

• Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également prescrit sous forme de comprimé pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").

• Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.

• Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérite contenante de l'aliskiren.

### EFFECTS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible de provoquer des effets indésirables, mais pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

• Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démagogie) peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs patients. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

**Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :**

• Étouffements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise), qui peut être importante et/ou durable et/ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques.

• Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la tension artérielle lors de la position assise,

• Faiblesses,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale et/ou échoprécipitation,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang (nephrotoxicité),

• Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Somnolence,

• Maux de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Essoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

• Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

• Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite) incluant les artères et les veines,

• Engourdissement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

• Attaque cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui peut être importante et/ou durable,

• Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base de l'expérience clinique),

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (cystinose),

• Impuissance,

• Inflammation du pancréas (pancréatite),

• Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement,

• Troubles du goût (dysgueuse),

# PREZAR® 100 mg

## Losartan

Comprimé pelliculé. Boîte de 28

### Intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Si vous avez besoin de la re lire,

si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre

personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de  
journée lui être nocif.

Il devient grave si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette  
l'avis ou à votre pharmacien.

MENT :

LOSARTAN PUTATION 100 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie > 0,5 g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC: médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par l'IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Ces les patients présentant une hypertension et un épaississement du ventricule gauche. PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

### POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

### PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

### PATIENTS ADULTES INSUFFISANTS CARDIAQUES

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est associé au diurétique (qui aide à augmenter le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un diabète (qui aide à améliorer l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

### Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier pour les patients traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients âgés. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients âgés de plus de 75 ans.

### CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres comprimés.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable de ne pas prendre de comprimé pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérite contenante de l'aliskiren.

### EFFECTS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible de provoquer des effets indésirables, mais pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

• Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démagogie) peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer). Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs patients. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Étourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise), qui peut être importante et/ou entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle lors de la position assise,

• Faiblesses,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale et/ou échoprénalie,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang (nephrotoxicité),

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles de la sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitation),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Essoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite) incluant les artères et les veines,

• Engourdissement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation atriale),

• Attaque cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui peut être élevé dans les urines,

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base de l'expérience clinique) :

- Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (cystinose),

• Impuissance,

• Inflammation du pancréas (pancréatite),

• Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement,

• Troubles du goût (dysgueuse),



# PREZAR® 100 mg

## Losartan

Comprimé pelliculé Boîte de 28

### Intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Si vous avez besoin de la re lire,

si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre

personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de  
jour lui être nocif.

Il devient grave si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette  
lecon ou à votre pharmacien.

MENT :

LOSARTAN PUTATION 100 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie > 0,5 g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC: médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par l'IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaississement du ventricule gauche. PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

### POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

### PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiants, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

### Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan est associé au diurétique (qui aide à augmenter le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un diabète (qui aide à améliorer l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

### Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier pour les patients traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients âgés. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients de moins de 18 ans.

### CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres comprimés.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable de ne pas prendre de comprimé pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérite contenante de l'aliskiren.

### EFFECTS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible de provoquer des effets indésirables, mais pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démagogie, œdème de Quincke) peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).
- Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs patients.
- Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :
- Étourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise), qui peut être importante et/ou durable,
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle lors de la position assise,
- Faiblesses,
- Fatigue,

- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
- Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,
- Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),
- Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium.

- Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :
- Somnolence,
- Mauve de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitation),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Éruption (urticaire),
- Démangeaisons (prurit),
- Éruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux.

- Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité,
- Angio-oedème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite) incluant les artères et les veines,
- Engourdissement ou picotements (paresthesies),
- Évanouissement (syncope),
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation atriale),
- Attaque cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui peut être importante et/ou durable.

- Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base de l'expérience clinique)

- Diminution du nombre de plaquettes,
- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,

- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (cystourie),
- Impuissance,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),

- Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement,

- Troubles du goût (dysgueuse).



- si vous allaitez ou si vous avez l'intention d'allaiter :
- si vous avez l'intention de vous exposer au soleil ou aux rayonnements UV artificiels, étant donné que certains patients ont présenté une éruption cutanée après exposition au soleil. Dans ce cas, vous devez protéger votre peau pendant le traitement par Lodoz.
- si vous constatez une baisse soudaine de votre acuité visuelle ou si vous ressentez une douleur oculaire dans les heures voire les semaines après l'initiation du traitement, vous devez en informer immédiatement votre médecin. Un glaucome aigu à angle fermé (trouble touchant les yeux) non traité peut conduire à une perte définitive de la vision.
- Si vous souffrez d'une maladie pulmonaire chronique ou d'asthme moins sévère, vous devez informer immédiatement votre médecin si vous commencez à éprouver de nouvelles difficultés respiratoires, une toux, une respiration sifflante après l'exercice, etc. pendant la prise de LODOZ.

#### Tests supplémentaires

L'hydrochlorothiazide agit en influençant l'équilibre sel-eau de l'organisme. Votre médecin le vérifiera régulièrement. Ces contrôles sont particulièrement importants si vous présentez d'autres affections susceptibles de s'aggraver si l'équilibre hydroélectrolytique est perturbé. Votre médecin voudra également vérifier de temps en temps les concentrations de lipides, d'acide urique ou de glucose dans votre sang.

Il n'est pas recommandé d'associer ce médicament avec du lithium utilisé dans le traitement de certains troubles psychiatriques, ou avec des médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension, l'angine de poitrine ou l'arythmie cardiaque (tels que le vérapamil, le diltiazem ou le bépridil) (voir rubrique « Prise d'autres médicaments »).

#### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVE**

Tenir hors de la portée et de la  
Ne pas utiliser Lodoz après la date  
la boîte après EXP. Cette date fait  
mois.



7862160243

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient Lodoz 2,5 mg/6,25 mg comprimé pelliculé ?**

Les substances actives sont :

Fumarate de bisoprolol ..... 2,5 mg

Hydrochlorothiazide ..... 6,25 mg

pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

*Noyau du comprimé* : crospovidone, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégélatinisé, amidon de maïs, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

*Pelliclage du comprimé* : hypromellose, polysorbate 80, macrogol 400, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172).

**Qu'est-ce que Lodoz 2,5 mg/6,25 mg comprimé pelliculé, et contenu de l'emballage extérieur ?**

Comprimé pelliculé jaune, rond, biconvexe, avec un cœur en relief sur une face et le chiffre « 2,5 » en relief sur l'autre face. Chaque boîte contient 30, 50, 60, 90 ou 100 comprimés. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Que contient Lodoz 5 mg/6,25 mg comprimé pelliculé ?**

- si vous allaitez ou si vous avez l'intention d'allaiter :
- si vous avez l'intention de vous exposer au soleil ou aux rayonnements UV artificiels, étant donné que certains patients ont présenté une éruption cutanée après exposition au soleil. Dans ce cas, vous devez protéger votre peau pendant le traitement par Lodoz.
- si vous constatez une baisse soudaine de votre acuité visuelle ou si vous ressentez une douleur oculaire dans les heures voire les semaines après l'initiation du traitement, vous devez en informer immédiatement votre médecin. Un glaucome aigu à angle fermé (trouble touchant les yeux) non traité peut conduire à une perte définitive de la vision.
- Si vous souffrez d'une maladie pulmonaire chronique ou d'asthme moins sévère, vous devez informer immédiatement votre médecin si vous commencez à éprouver de nouvelles difficultés respiratoires, une toux, une respiration sifflante après l'exercice, etc. pendant la prise de LODOZ.

#### Tests supplémentaires

L'hydrochlorothiazide agit en influençant l'équilibre sel-eau de l'organisme. Votre médecin le vérifiera régulièrement. Ces contrôles sont particulièrement importants si vous présentez d'autres affections susceptibles de s'aggraver si l'équilibre hydroélectrolytique est perturbé. Votre médecin voudra également vérifier de temps en temps les concentrations de lipides, d'acide urique ou de glucose dans votre sang.

Il n'est pas recommandé d'associer ce médicament avec du lithium utilisé dans le traitement de certains troubles psychiatriques, ou avec des médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension, l'angine de poitrine ou l'arythmie cardiaque (tels que le vérapamil, le diltiazem ou le bépridil) (voir rubrique « Prise d'autres médicaments »).

#### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVE**

Tenir hors de la portée et de la  
Ne pas utiliser Lodoz après la date  
la boîte après EXP. Cette date fait  
mois.



7862160243

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient Lodoz 2,5 mg/6,25 mg comprimé pelliculé ?**

Les substances actives sont :

Fumarate de bisoprolol ..... 2,5 mg

Hydrochlorothiazide ..... 6,25 mg

pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

*Noyau du comprimé* : crospovidone, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégélatinisé, amidon de maïs, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

*Pelliclage du comprimé* : hypromellose, polysorbate 80, macrogol 400, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172).

**Qu'est-ce que Lodoz 2,5 mg/6,25 mg comprimé pelliculé, et contenu de l'emballage extérieur ?**

Comprimé pelliculé jaune, rond, biconvexe, avec un cœur en relief sur une face et le chiffre « 2,5 » en relief sur l'autre face. Chaque boîte contient 30, 50, 60, 90 ou 100 comprimés. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Que contient Lodoz 5 mg/6,25 mg comprimé pelliculé ?**

- si vous allaitez ou si vous avez l'intention d'allaiter :
- si vous avez l'intention de vous exposer au soleil ou aux rayonnements UV artificiels, étant donné que certains patients ont présenté une éruption cutanée après exposition au soleil. Dans ce cas, vous devez protéger votre peau pendant le traitement par Lodoz.
- si vous constatez une baisse soudaine de votre acuité visuelle ou si vous ressentez une douleur oculaire dans les heures voire les semaines après l'initiation du traitement, vous devez en informer immédiatement votre médecin. Un glaucome aigu à angle fermé (trouble touchant les yeux) non traité peut conduire à une perte définitive de la vision.
- Si vous souffrez d'une maladie pulmonaire chronique ou d'asthme moins sévère, vous devez informer immédiatement votre médecin si vous commencez à éprouver de nouvelles difficultés respiratoires, une toux, une respiration sifflante après l'exercice, etc. pendant la prise de LODOZ.

#### Tests supplémentaires

L'hydrochlorothiazide agit en influençant l'équilibre sel-eau de l'organisme. Votre médecin le vérifiera régulièrement. Ces contrôles sont particulièrement importants si vous présentez d'autres affections susceptibles de s'aggraver si l'équilibre hydroélectrolytique est perturbé. Votre médecin voudra également vérifier de temps en temps les concentrations de lipides, d'acide urique ou de glucose dans votre sang.

Il n'est pas recommandé d'associer ce médicament avec du lithium utilisé dans le traitement de certains troubles psychiatriques, ou avec des médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension, l'angine de poitrine ou l'arythmie cardiaque (tels que le vérapamil, le diltiazem ou le bépridil) (voir rubrique « Prise d'autres médicaments »).

#### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVE**

Tenir hors de la portée et de la  
Ne pas utiliser Lodoz après la date  
la boîte après EXP. Cette date fait  
mois.



7862160243

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient Lodoz 2,5 mg/6,25 mg comprimé pelliculé ?**

Les substances actives sont :

Fumarate de bisoprolol ..... 2,5 mg

Hydrochlorothiazide ..... 6,25 mg

pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

*Noyau du comprimé* : crospovidone, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégélatinisé, amidon de maïs, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

*Pelliclage du comprimé* : hypromellose, polysorbate 80, macrogol 400, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172).

**Qu'est-ce que Lodoz 2,5 mg/6,25 mg comprimé pelliculé, et contenu de l'emballage extérieur ?**

Comprimé pelliculé jaune, rond, biconvexe, avec un cœur en relief sur une face et le chiffre « 2,5 » en relief sur l'autre face. Chaque boîte contient 30, 50, 60, 90 ou 100 comprimés. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Que contient Lodoz 5 mg/6,25 mg comprimé pelliculé ?**



023025527

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# HYPERIUM® 1 mg

Rilménidine  
comprimé

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**DANS CETTE NOTICE:**

1. Qu'est-ce que Hyperium 1 mg, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre

MFG003



6 118001 130023  
HYPERIUM 1 mg - O  
Boîte de 30 comprimés  
PPV .113,50 DH  
Servier Maroc - Casablanca

1 mg, comprimé ?

effets éventuels ?

1 mg, comprimé ?

autres informations.

**1 mg, COMPRIME ET DANS**

**Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin car leur association avec Hyperium 1 mg, comprimé est déconseillée :**

- bêtabloquants utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque,
- oxybate de sodium (utilisé dans le traitement de la narcolepsie).

**Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :**

- bêtabloquants sauf esmolol (utilisé pour traiter l'hypotension artérielle et l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- antidépresseurs tricycliques (utilisés pour traiter la dépression).



023025527

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# HYPERIUM® 1 mg

Rilménidine  
comprimé

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**DANS CETTE NOTICE:**

1. Qu'est-ce que Hyperium 1 mg, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre

MFGS003



6 118001 130023  
HYPERIUM 1 mg - O  
Boîte de 30 comprimés  
PPV .113,50 DH  
Servier Maroc - Casablanca

1 mg, comprimé ?

effets éventuels ?

1 mg, comprimé ?

autres informations.

**1 mg, COMPRIME ET DANS**

**Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin car leur association avec Hyperium 1 mg, comprimé est déconseillée :**

- bêtabloquants utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque,
- oxybate de sodium (utilisé dans le traitement de la narcolepsie).

**Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :**

- bêtabloquants sauf esmolol (utilisé pour traiter l'hypotension artérielle et l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- antidépresseurs tricycliques (utilisés pour traiter la dépression).



023025527

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# HYPERIUM® 1 mg

Rilménidine  
comprimé

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**DANS CETTE NOTICE:**

1. Qu'est-ce que Hyperium 1 mg, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre

MFG003



6 118001 130023  
HYPERIUM 1 mg - O  
Boîte de 30 comprimés  
PPV .113,50 DH  
Servier Maroc - Casablanca

1 mg, comprimé ?

effets éventuels ?

1 mg, comprimé ?

autres informations.

**1 mg, COMPRIME ET DANS**

**Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin car leur association avec Hyperium 1 mg, comprimé est déconseillée :**

- bêtabloquants utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque,
- oxybate de sodium (utilisé dans le traitement de la narcolepsie).

**Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :**

- bêtabloquants sauf esmolol (utilisé pour traiter l'hypotension artérielle et l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- antidépresseurs tricycliques (utilisés pour traiter la dépression).