

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS.

## tions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

■ L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

■ L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

■ Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

■ En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

■ La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

■ La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

■ La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion : adhesion@mupras.com

N° P19- 069351

ND=30319

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3103 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : HAMDOUN M'HAMMED


Date de naissance : 4/4/1956

Adresse : HABITUELLE

Tél. : 0664684943 Total des frais engagés : 1820,11 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 01/06/2011

Nom et prénom du malade : HAMDOUN M'HAMMED Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : TURB

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Sidi Benn Le : 10/07/2011

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/06/2020		3	30000	Dr. A. K. M. S. T. M. A. K. 0522 47 14 58 Chirurgien 43 AV. 2 Mars Casablanca و المسارك التوليدية Professeur A. K. M. S. T. M. A. K. 0522 47 14 58 Chirurgien urologue Dr. A. K. M. S. T. M. A. K. 0522 47 14 58 Casablanca
05/06/2020		3	~	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	5/5/2022	1108,80

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<p><i>Dr. Sara ELLAABI Médicin Biologiste Rue Ezzahra 1, n°7 RDC - Had Soualem Télé : 0323 96 26 60 - Fax : 0577 06 27 66</i></p>	21/06/20	B300	412,00 DH

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

## **[Création, remont, adjonction]**

CŒFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DEBUT D'EXECUTION	
FIN D'EXECUTION	
CŒFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DATE DU DEVIS	



ملاجئ أمراض  
المسالك البولية 2 مارس

### Docteur Hamid Fekak

Membre de l'European Association of Urology et de la Société Internationale d'Urologie

- Chirurgie et endoscopie des reins et des voies uro-génitales, Laser Prostate
- Cancérologie Uro-génitale
- Stomatique Pelvienne et incontinence urinaire
- Infertilité masculine et impuissance sexuelle
- Lithotripsie et laser des Calculs urinaires
- Circumcision
- Echographie et explorations Urodynamiques

### الدكتور حميد فكاك

- عضو الجمعية الأوروبية
- والعالمية لمراجعة الكلبي
- والمسالك البولية
- المراجعة والفحص بالمنظار
- للمسالك البولية والتباينية
- الأخصائي سرطان الكلبي
- والمتانة والبروستاتا
- المسالك البولية
- العقم والعنبر التناسو
- الخثار
- تقويم بدوره مراجعة لفحص
- الكلبي والمسالك البولية
- الفحص بالصدى

Professeur Hamid Fekak

الدكتور حميد فكاك

Chirurgie des reins et des voies uro-génitales

Ex. enseignant à la faculté de médecine de Casablanca

أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية

05/06/2020

Casablanca le .....

Mr HAMDOUNE M'hamed

15.3.30 6  
100.00  
PERMIXON 160 mg

1 gélule, matin et soir, pendant 3 mois

LOT: 601  
SER: 07/22  
P.P.V: 100,00 DA

Voie orale

LOT N°: 12804 89,00  
UT.AV: 09 21 P.P.V 00 00



ICE 00221339000050

43, Avenue 2 mars,  
1<sup>er</sup> étage, N°1  
Casablanca - 20490  
Tél : 05 22 47 14 57  
Fax : 05 22 47 14 58  
Gsm : 06 65 405 901  
hafekak@yahoo.fr

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

**Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :**

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

153,30

160 mg, gélule :

peut être la

doit pas  
rière de la  
RMIXON 160 mg,  
acte chirurgical  
able.



Permixon 160 mg  
30 GÉLULES



6 118001 181957

LA PORTEE DES ENFANTS.

Il est recommandé à jeun peut parfois être isées.

IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

**d'autres médicaments**  
vez pris récemment un autre  
pris un médicament obtenu  
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

153,30

160 mg, gélule :

peut être la

doit pas  
rière de la  
RMIXON 160 mg,  
acte chirurgical  
able.



Permixon 160 mg  
30 GÉLULES



6 118001 181957

LA PORTEE DES ENFANTS.

Il est recommandé à jeun peut parfois être isées.

IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

d'autres médicaments  
vez pris récemment un autre  
pris un médicament obtenu  
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

153,30

160 mg, gélule :

peut être la

doit pas  
rière de la  
RMIXON 160 mg,  
acte chirurgical  
able.



Permixon 160 mg  
30 GÉLULES



6 118001 181957

LA PORTEE DES ENFANTS.

Il est recommandé à jeun peut parfois être isées.

IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

d'autres médicaments  
vez pris récemment un autre  
pris un médicament obtenu  
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

153,30

160 mg, gélule :

peut être la

doit pas  
rière de la  
RMIXON 160 mg,  
acte chirurgical  
able.



Permixon 160 mg  
30 GÉLULES



6 118001 181957

LA PORTEE DES ENFANTS.

Il est recommandé à jeun peut parfois être isées.

IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

d'autres médicaments  
vez pris récemment un autre  
pris un médicament obtenu  
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

153,30

160 mg, gélule :

peut être la

doit pas  
rière de la  
RMIXON 160 mg,  
acte chirurgical  
able.



Permixon 160 mg  
30 GÉLULES



6 118001 181957

LA PORTEE DES ENFANTS.

Il est recommandé à jeun peut parfois être isées.

IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

d'autres médicaments  
vez pris récemment un autre  
pris un médicament obtenu  
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?**

**Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :**

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

153,30

160 mg, gélule :

peut être la

doit pas  
rière de la  
RMIXON 160 mg,  
acte chirurgical  
able.



Permixon 160 mg  
30 GÉLULES



6 118001 181957

LA PORTEE DES ENFANTS.

Il est recommandé à jeun peut parfois être isées.

IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

**d'autres médicaments**  
vez pris récemment un autre  
pris un médicament obtenu  
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

**Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre



Docteur Hamid Fekak

Membre de l'European Association of Urology et de la Société Internationale d'Urologie

- Chirurgie et endoscopie des reins et des voies uro-génitales, Laser Prostate
  - Cancérologie Uro-génitale
  - Statique Pelviennne et incontinence urinaire
  - Infertilité masculine et impuissance sexuelle
  - Lithotripsie et laser des Calculs urinaires
  - Circconcision
  - Echographie et explorations Urologiques

الدكتور جميد فكاك

عضو الجمعية الأوروبية  
والعالمية لجرحى الكلب  
والمسالك البولية

- ١٠. الراحة والفحص بالمنظار
  - ١١. للمسالك البولية والقناطرية
  - ١٢. اختناق سرطان الطبلو
  - ١٣. والمذابة والبروستاتا
  - ١٤. السلس البولي
  - ١٥. العقم والغير النسوي
  - ١٦. الخثار
  - ١٧. تقييد بمحاجر احمة لاحصى
  - ١٨. الطبلو والمسالك البولية
  - ١٩. الفحص بالصدى

Professeur Hamid Fekak  
الدكتور حميد فكاك

## Chirurgie des reins et des voies uro-génitales

Ex. enseignant à la faculté de médecine de Casablanca

### أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية

## Casablanca le

1612a

an HamAnne M)

PSA Test

ICE 00221339000050

43, Avenue 2 mars,  
1<sup>er</sup> étage, N°1  
Casablanca - 20490  
Tél. : 05 22 47 14 57  
Fax : 05 22 47 14 58  
Gsm : 06 65 405 901  
hafekak@yahoo.fr



# مختبر حد السوالم للتحاليل الطبية

LABORATOIRE HAD SOUALEM D'ANALYSES MÉDICALES

Dr Sara ELLAABI  
Médecin biologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca  
Ancien médecin interne du CHU IBN ROCHD de Casablanca

BIOCHIMIE • HEMATO-CYTOLOGIE • IMMUNOLOGIE • SEROLOGIE • HORMONOLOGIE • BACTERIOLOGIE • PARASITOLOGIE • MYCOLOGIE • VIROLOGIE • BILAN DE LA REPRODUCTION

Had Soualem le 1 juin 2020

Monsieur HAMDOUNE MOHAMED

FACTURE N°	14631
------------	-------

Analyses :	
PSA totale -----	B   300   Total : B 300
Prélèvements :	
Sang-----	Pc   1,5
	TOTAL DOSSIER   412,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Quatre Cent Douze Dirhams

LABORATOIRE HAD SOUALEM  
d'Analyses Médicales  
Dr. Sara ELLAABI  
Médecin Biologiste  
Lot. Ezzahra 1, n°7 RDC - Had Soualem  
Tél. 0522962660 - Fax : 0522962766 - E-mail : labohadsoualem@gmail.com



# مختبر حاد السوالم للتحليلات الطبية

## LABORATOIRE HAD SOUALEM D'ANALYSES MÉDICALES

Dr Sara ELLAABI  
Médecin biologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca  
Ancien médecin interne du CHU IBN ROCHD de Casablanca

BIOCHIMIE • HEMATO-CYTOLOGIE • IMMUNOLOGIE • SEROLOGIE • HORMONOLOGIE • BACTERIOLOGIE • PARASITOLOGIE • MYCOLOGIE • VIROLOGIE • BILAN DE LA REPRODUCTION

Dossier ouvert le : 01/06/20  
Prélèvement effectué à 14:10  
Edition du : 01/06/20

Monsieur HAMDOUNE MOHAMED

Né (e) le: 01/01/1956  
Docteur HAMID FEKAK  
Réf. : 20F57

### Compte Rendu d'Analyses

## MARQUEURS TUMORAUX

### ANTIGENE SPECIFIQUE DE LA PROSTATE (PSA TOTAL)

(Chimiluminescence, ARCHITECT i1000 SR)

RESULTAT : 0,700 ng/ml

#### Interprétation

Age	Valeurs usuelles
< 40 ans	<1,4
40 - 50 ans	<2,0
50 - 60 ans	<3,1
60 - 70 ans	<4,1
> 70 ans	<4,4

NOTE: Le toucher rectal, le massage prostatique, une cytoscopie, une échographie transrectale, une biopsie augmentent transitoirement le taux de PSA.

LABORATOIRE HAD SOUALEM  
d'Analyses Médicales  
Dr. Sara ELLAABI  
Médecin Biologiste  
Had Soualem  
Lot. Ezzahra 1, n°7 RDC - Tel: 0522 96 76 60 - Fax: 0522 96 27 66

Page : 1/1