

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothésiste :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

N° P19- 0045792
N.D. 30425

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 589 Société : RAM

Actif

Pensionné(e) *Retraité*

Autre :

Nom & Prénom :

BENCHAIB Elarbi

Date de naissance : 1943

Adresse : Espérance 2 Rue 19 n° 11 Ain Sebaa 2059 Casablanca

Tél. : 06 60 24 13 03

Total des frais engagés : 844,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DOCTEUR SAAD BEN MERZOUK
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
146 Bd Abi Dar El Ghanem Béni Mellal
Tél. 05.22.75.71.69 / 72 Casablanca

Date de consultation : 19/06/2020

Nom et prénom du malade : BENCHAIB Elarbi Age : 77

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Constipation

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *Centre Allal Ben Abdellah*

Le : 29/06/2020

Signature de l'adhérent(e) : *Elarbi*

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/6/12	2	1	200,00	
15/6/12	23	1	200,00	
26/6/12	Générale	1	500,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE KZ LAJAMAT SLOU D. A. M. K. O. U. A. R PIAH. A. M. E. R. C. A. B. L. A. N. C A. N. S. E. R. A. 0. 2. 2. 3. 5. 8. 5. 2. 0	26/06/2024	125,30
PHARMACIE KZ LAJAMAT SLOU D. A. M. K. O. U. A. R PIAH. A. M. E. R. C. A. B. L. A. N. C A. N. S. E. R. A. 0. 2. 2. 3. 5. 8. 5. 2. 0	10/06/2024	228,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Saâd Ben Merzouk

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
Echographie - Endoscopie - Proctologie

Diplômé de la Faculté de Médecine de Lyon - France
Ancien Hépato Gastro Entérologue
des Hôpitaux de France
Ancien Hépato Gastro Entérologue
des Forces Armées Royales

Sur Rendez-vous



الدكتور سعد ابن مرزوق

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي
الشخص بالصدى - الشخص بالمنظار الداخلي

علاج المخرج (البواصير والدم)

خريج كلية الطب بليون بفرنسا

طبيب اختصاصي سابق بمستشفيات فرنسا

طبيب اختصاصي سابق للقوات المسلحة الملكية

بالموعد

Casablanca, le LE 19 JUIN 2020 الدار البيضاء، في

MR BENCHAIB ELARBI 77 ANS

45,40

89,50

40,40

(S.V)

DUPHALAC : 1 CAS AVANT LES 3 REPAS

LIXIFOR : 1 CP LE MATIN

METEOSPASMYL : 1 CAPSULE EN DEBUT DES 3 REPAS

(S.V)

(S.V)

Y = 175130

PHARMACIE RIZK
Dr. LAALAMI SIDI BERNOUSSI
6 PI- H4
AIN SEBA
DÉPARTEMENT DE MÉKNA
Tél. 022.35.86.20
05 22 75 71 69 / 72 Casablanca

Duphalac

66,5% Lactulose

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
 - Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après plusieurs jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?
 3. Comment prendre DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE DUPHALAC 66,5 PO solution buvable en flacon ET DANS QUE UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC :

DUPHALAC contient un laxatif appelé lactulose. Cela aide à éliminer les selles molles et plus faciles à éliminer, en attirant l'eau dans l'intestin. Il n'est pas absorbé dans votre corps.

- DUPHALAC est utilisé pour traiter la constipation (selles peu fréquentes, dures et sèches) en rendant les selles molles.
 - DUPHALAC est utilisé dans le traitement de

l'encéphalopathie hépatique, provoquant une difficulté à parler, des tremblements, une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma).

2. QUELLES SONT LES INCONNAITRE AVANT DE 66,5 POUR CENT, solution

Si votre médecin vous a informé de votre diabète de type 2, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais DUPHALA
buvable en flacon :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à d'autres composants mentionnés dans la rubrique
 - en cas de maladies de l'intestin poussées, telles que rectocolite
 - en cas d'occlusion intestinale
 - en cas de perforation digestive
 - en cas de douleurs abdominales indéterminées.

Avertissements et précaution

Adressez-vous à votre médecin pour prendre DUPHALAC 66,5 mg par flacon.

DANS LE CADRE DE LA C

D'UTILISATION PROLONGÉE (plusieurs jours) SANS AVIS MÉDICAL

Constipation occasionnelle

Elle peut être liée à une modification (voyage par exemple). Le traitement est alors un traitement court. Toute constipation persistante ou accompagnée d'autres symptômes (changement du mode de vie, de douleurs, de fièvre, de gonflement) doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation syndrome (con)

D'UR CENT.
 DUPHALAC 66,5%
 SOL BUV 300 ML
 LOT 91MA066
 PER. 12/2021
 P.P.V : 45DH40

- origine végétale (légumes, fruits...);
- une augmentation de la consommation de fruits;
- une augmentation des activités physiques;
- une rééducation du réflexe de défécation;
- parfois, l'adjonction de son.

LIXIFOR

COMPOSITION : Dose par gélule

- Séné	140 mg
- Radis Noir	75 mg
- Anis Etoilé	75 mg
- Cascara	30 mg

PROPRIETES :

LIXIFOR Actif dès le premier jour spécialement formulé pour :

- Régulation du volume et de la fréquence des selles
- Réduction des gaz
- Ballonnement et pesanteur abdominale
- Active le péristaltisme
- Améliore le confort intestinal
- Stimule le transit intestinal
- Combat les fermentations intestinales
- Favorise un transit régulier

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 gélule par jour le soir au coucher avec un verre d'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent sans avis médical.
- A conserver dans un endroit sec et frais.
- Sa validité dépend de l'origine de la gélule.

PRES
Boîte

Lot/À consommer
de préférence avant

20014 1023

LOT

PER

Prix

89,50



3 700221 339503

tine.

Meteospasmyl®

Capsule molle - Boite de 20 Citrate d'alvérine et Siméticone

Précautions à prendre lors de l'administration

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

• Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

• Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Que est-ce que METEOSPASMYL®, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE METEOSPASMYL® CAPSULE MOLLE ET DANS QUELS CAS

Grossesse et allaitement
Il est préférable de ne pas utiliser pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes le traitement, consultez votre médecin. Il peut juger de la nécessité de le prendre. Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement
Vous devez éviter de prendre ce médicament pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

METEOSPASMYL® B 20 caps molles
Alvérine citrate 30 mg / Siméticone 300 mg
P.P.V. : 40,40 DH
Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 118001 100293

Conduite de véhicules et utilisation
Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL®, CAPSULE MOLLE ?

Posologie
RESERVE A L'ADULTE au maximum 250 mg (1 capsule) 1 capsule 2 à 3 fois par jour.

Docteur Saâd Ben Merzouk

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
Echographie - Endoscopie - Proctologie

Diplômé de la Faculté de Médecine de Lyon - France
Ancien Hépato Gastro Entérologue
des Hôpitaux de France
Ancien Hépato Gastro Entérologue
des Forces Armées Royales

Sur Rendez-vous



الدكتور سعد ابن مرزوق

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي
الفحص بالصدى - الفحص بالمنظار الداخلي

علاج المخرج (ال بواسير والدمى)
خريج كلية الطب بليون بفرنسا

طبيب إختصاصي سابقاً بمستشفيات فرنسا
طبيب إختصاصي سابقاً لقوى الملحمة الملكية

بالموعد

Casablanca, le LE 26 JUIN 2020 الدار البيضاء, في

MR BENCHAIB ELARBI

S.V. (Circular stamp)
S.V. (Circular stamp)
S.V. (Circular stamp)
S.V. (Circular stamp)

FLAGYL 500 : 1 CP AU MILIEU DES 3 REPAS

DUPHALAC : 1 CAS AVANT LES 3 REPAS

CARBOXANE : 1 CP AVANT LES REPAS MATIN ET SOIR

DUSPATALIN 200 : 1 CP EN DEBUT DES 3 REPAS

Docteur Saâd BEN MERZOUK
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
Ancien Hépato Gastro Entérologue
des Hôpitaux de France
Ancien Hépato Gastro Entérologue
des Forces Armées Royales

PHARMACIE RIZK
5 PI. DE LALANIT Salles
AIN SEBAA Casablanca
Tél: 022.35.86.20

FLAGYL® 500 mg

Métronidazole

Comprimé pelliculé.

SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination :

FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé.

b) Composition :

Métronidazole 500mg.
Excipients : amidon de blé, povidone K 30, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 20000, pour un comprimé pelliculé.

c) Forme pharmaceutique et présentation :

Comprimé pelliculé, boîte de 20.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTERIENS ANTI-PARASITAIRES de la famille des nitro-5- imidazolés.

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections à germes sensibles (bactéries, parasites).

3. ATTENTION !

a) Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament :

- Ce médicament ne doit jamais être utilisé dans les cas suivants :
- allergie aux médicaments de la famille des imidazolés (famille d'antibiotiques à laquelle appartient le métronidazole),
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).
- Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec le disulfirame ou l'alcool (boissons alcoolisées, médicaments contenant de l'alcool).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales :

- La prise de boissons alcoolisées durant ce traitement est déconseillée en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.
 - Il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin en cas d'apparition d'une mauvaise coordination des mouvements volontaires, apparition de vertiges ou de confusion.
 - Attention à la prise de ce médicament si vous souffrez de troubles nerveux sévères, chroniques ou qui évoluent.
 - La prise de ce comprimé est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer.
- c) Précautions d'emploi :**
- En cas d'antécédents de troubles sanguins, de traitement à forte dose et/ou de traitement prolongé, votre médecin peut être amené à contrôler régulièrement par des examens sanguins votre numération formule sanguine.

- En cas de traitement prolongé, il est important de prévenir votre médecin en cas de survenue de troubles nerveux (fourmillements, difficulté à coordonner des mouvements, vertiges, convulsions).

EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :**
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, et notamment avec le disulfirame et l'alcool, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
La prise de ce médicament peut perturber les résultats de certains examens de laboratoire (recherche de tréponème) : le méthronidazole peut en effet être Nelson.

e) Grossesse - Allaitement

En cas de besoin, et grossesse, il convient de consulter un médecin ou à vot médicament.

Eviter l'allaitement par D'UNE FAÇON GENÉRALE
CESSER OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

f) Conducteurs et utilisateurs de machines :

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de vertiges, de confusion, d'hallucinations ou de convulsions, attachés à l'emploi de ce médicament.

- **g) Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :**
Amidon de blé (gluten).

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

a) Posologie :

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de six ans. Chez l'enfant de moins de six ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.

La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique.

À titre indicatif, la posologie usuelle est :

- chez l'adulte : de 0,750 g/jour à 2 g/jour,
- chez l'enfant : 500 mg/jour à 20 - 40 mg/kg/jour.
Dans certains cas, votre partenaire doit être impérativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

b) Mode et voie d'administration :

Voie orale.

LOT : 19E015
PER. : 11.2024

FLAGYL 500 mg
CP PEL B20

P.P.V. : 49DH80



6 118000 060062

Carboxane®



Charbon végétal activé - Wakamé - Rhubarbe - Menthe poivrée et Fenouil

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé, boîte de 30.

COMPOSITION (Par comprimé) :

Charbon végétal activé 200 mg, Wakamé undaria (pinnatifida poudre) 100 mg, extrait sec de Rhubarbe (Rheum palmatum) 200 mg, Huile essentielle de Fenouil (Foeniculum vulgare) 24 mg, Huile essentielle de Menthe poivrée (Mentha piperita) 24 mg, Fructo-Oligosaccharides F.O.S 100 mg.

PROPRIETES :

Carboxane® à base d'actifs naturels, apaise les ~~congestions~~ flatulences et spasmes intestinaux, facilite la ~~digestion~~ intestinal.

Lot : 200030
A consommer de
préférence avant le : 02/2023

PPC : 79,50 DH

UTILISATION :

Carboxane® est recommandé en cas de :

- Ballonnements et Flatulences.
- Constipation, paresse intestinale.
- Colopathie fonctionnelle.
- Digestion difficile.
- Spasmes, Coliques.

CONSEILS D'UTILISATION :

A prendre de préférence après les repas :

- Ballonnements : 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.
- Constipation : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- A utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Respecter la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par Pharmalife Research s.r.l. - Lecco - Italie

Importé au Maroc par MEDIPRO Pharma

Autorisation du Ministère de la santé N° DA20161310001DMP/20UCAMAv2

Autorisation sanitaire ONSSA N° ES.5.229.16



DUSPATALIN®

200 mg Chlorhydrate de mébénédine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DUSPATALIN 200 mg, gélule et dans quels cas utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DUSPATALIN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC

DUSPATALIN 200 mg contient du chlorhydrate de mébénédine. Il appartient à un groupe de médicaments appelé antispasmodiques, qui agissent sur votre intestin.

DUSPATALIN 200 mg est utilisé pour soulager les symptômes des troubles fonctionnels intestinaux. Ces symptômes varient d'une personne à l'autre mais peuvent inclure :

- des douleurs et des crampes du ventre
- une sensation de ballonnements et des flatulences
- une diarrhée, une constipation ou une association des deux
- des petites selles (fèces) dures, en forme de granulés ou de ruban.

En l'absence d'amélioration ou si les symptômes s'aggravent, consultez votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSPATALIN 200 mg, gélule?

Ne prenez jamais DUSPATALIN 200 mg si :

• si vous êtes allergique au chlorhydrate de mébénédine ou à d'autres composants de DUSPATALIN 200 mg.

En cas de doute, il est indispensable de le faire savoir à votre pharmacien.

Autres médicaments et DUSPATALIN 200 mg

Informez votre médecin ou pharmacien de tout autre médicament pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous avez l'intention de l'être, ou que vous planifiez une grossesse, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

DUSPATALIN 200 mg n'est pas recommandé pendant la grossesse. DUSPATALIN 200 mg ne doit pas être pris pendant la grossesse.

Votre médecin pourrait vous conseiller d'arrêter de prendre ce médicament si vous êtes enceinte.

Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin si vous prévoyez d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse.

Conduite de véhicules et utilisation d'outils

DUSPATALIN 200 mg

GELU B20

P.P.V : 54DH00



6 118000 010531

Précautions d'utilisation

Adulte

La posologie usuelle est de 1 gélule, 2 fois par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

La gélule sera prise avant les repas, au petit déjeuner et au dîner.

Fréquence d'administration

Se conformer strictement à l'ordonnance.

Durée de traitement

Se conformer strictement à l'ordonnance.

Si vous avez pris plus de DUSPATALIN 200 mg

Consultez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous oubliez de prendre DUSPATALIN 200 mg

- Si vous oubliez une gélule, ne la prendre pas et prendre la suivante à l'heure habituelle.

- Ne prenez pas de dose double pour faire oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas toujours.