

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-523282

act = 30391

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)		Société :	
Matricule : 596		Nom & Prénom : ERMOUKH FATIMA LAADI MATI EP	
<input type="checkbox"/> Actif		<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	
<input type="checkbox"/> Autre :		<input checked="" type="checkbox"/>	
Date de naissance :		Adresse :	
Tél. : 0663-25-96-17		Total des frais engagés : 9119,60 Dhs	

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
DOCTEUR HAMID EOURDAK MEDECIN EN DIABETOLOGIE ASSOCIE AU DR MOHAMED FAKIR MOHAMMAD 15 ED AL YOUSSEF 20000 CASABLANCA TÉL: 0522 502 231 - 0661 463 480			
Date de consultation : 11/06/2010			
Nom et prénom du malade : LAADDAT SADRA Age: 26 JUN 1984			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : Diabète + HTA + affection digestive			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA

Le : 21/06/2010

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/06/22	C	150,00	150,00	INP : DOCTEUR RAOUF EL HADJ MEDECIN GENERAL 46 BD AL YASSI 10073 ALGER TELE: 022 503 2387 / 021 0361 203 430
16/06/22	C	150,00	150,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DU PARADIS	11/06/22	963,60
10/06/22	74,80	

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
ABOG	12/06/22	B 680	932,20 (U)

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel. Thérapeutique. nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

Dr. Hanane IOURDANE

*Médecine Générale
Diplômée de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de
Casablanca
Diagnostique - Échographie*



الكلية الجامعية لذوي الاحتياجات الخاصة

Casablanca, le : 11/06/22



~~HOTEL MOTEL
TEL: 0322.50.80~~

12000^{as3} - urban sun 150g.

Spring notes of polioptilas

123.60² S.N. Insein ho

1 min) towards $\frac{pdO_2}{2}$

75.00

- Mag

38.00



6900 Probiots gel

86.00 x 2 Igel of pvc 1m long

- A day of 13 hours would be

963,60

Tél : 06 61 46 34 80 - 05 22 60 32 31





Gélule
Voie orale

Probiotis

Saccharomyces boulardii

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITÉ

Saccharomyces boulardii (2.10^{10} CFU/g)..282.5 mg

Maltodextrine, Enveloppe : Hypromellos colorant : c

FORME ET PRÉSENTATIONS :

PROBIOTIS : Gélule végétale. Boîte de 10 et 20

PROPRIÉTÉS :

PROBIOTIS permet d'aider à renforcer la défense et le confort intestinal

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Adulte : 1 à 2 gélules 1 à 2 fois par jour.

Enfant : 1 gélule par jour.

A avaler avec un verre d'eau.

Enfants de moins de 6 ans : il est recommandé de ne pas avaler les gélules (risque de fausse route) mais de les ouvrir et d'en verser le contenu dans une

n° : F .

LOT: 200023
DUO: 01/2022
69,00 DH



Gélule
Voie orale

Probiotis

Saccharomyces boulardii

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Saccharomyces boulardii (2.10^{10} CFU/g) ..282.5 mg , Stéarate de magnésium.
Maltodextrine, Enveloppe : Hypromellos colorant : di-

FORME ET PRESENTATIONS :

PROBIOTIS : Gélule végétale. Boite de 10 et 20



PROPRIÉTÉS :

PROBIOTIS permet d'aider à renforcer la défense et le confort intestinal

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Adulte : 1 à 2 gélules 1 à 2 fois par jour.

Enfant : 1 gélule par jour.

A avaler avec un verre d'eau.

Enfants de moins de 6 ans : il est recommandé de ne pas avaler les gélules (risque de fausse route) mais de les ouvrir et d'en verser le contenu dans une

NAZAIR® 50µg /dose

Suspension pour pulvérisation nasale

Propionate de fluticasone

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

Dénomination

NAZAIR® 50µg/dose, suspension pour pulvérisation nasale.

Forme pharmaceutique et présentations

Suspension pour pulvérisation nasale, boîte de 1 flacon pulvérisateur avec pousseuse assurant 100 doses de 50 µg.

Composition

Propionate de fluticasone (DCI) 50,30 µg

Équivalent en fluticasone 50 µg

Excipients : Dextrose anhydre, cellulose microcristalline et carboxyméthylcellulose sodium, chlorure de benzalkonium, polysorbate 80, alcool phényléthylique, eau purifiée, q.s.p une pulvérisation.

Classe pharmaco-thérapeutique

Glucocorticoïde par voie locale.

2. DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Indications :

Ce médicament contient un corticoïde. Il s'administre par voie nasale.

C'est un médicament anti-inflammatoire indiqué:

- en traitement de la rhinite allergique chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans et uniquement en traitement de la rhinite allergique saisonnière (rhume des foins) chez l'enfant de 4 à 12 ans.
- pour soulager les symptômes liés à la présence de polypes dans les fosses nasales chez l'adulte.

3. DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Contre indications :

Ne prenez jamais NAZAIR® 50µg/dose, suspension pour pulvérisation nasale dans les cas suivants:

- allergie à l'un des composants,
- trouble de la coagulation sanguine avec en particulier saignements de nez,
- en cas d'infection herpétique nasale, buccale, orale ou oculaire.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec NAZAIR® 50µg/dose, suspension pour pulvérisation nasale.

Mises en garde spéciales :

En cas de surinfection (mouchage purulent), de fièvre ou d'infection broncho-pulmonaire concomitante, **prévenir votre médecin**.

Ce produit n'est pas recommandé chez les patients ayant subi récemment une intervention chirurgicale ou un traumatisme au niveau du nez, tant que la guérison n'est pas complète.

Précautions d'emploi :

Ce médicament est un traitement régulier et continu. Son efficacité sur les symptômes ne peut apparaître que plusieurs jours après le début du traitement.

Pour que ce médicament soit actif, les fosses nasales doivent être libres.

Il convient par conséquent de se moucher avant l'instillation du produit.

Si l'obstruction nasale (sensation de nez bouché) persiste malgré la mise en route du traitement, consultez votre médecin afin qu'il réévalue le traitement.

En cas de traitement prolongé, un examen détaillé de la muqueuse nasale doit être réalisé.

Excipients à effet notoire : En raison de la présence du chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une gêne respiratoire.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACEIN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sportifs

Attention cette spécialité contient un principe actif testé pratiqués lors des contrôles.

Grossesse-allaitement :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse.

Le médicament ne sera pas donné à l'allaitement.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte, informez immédiatement votre médecin ou à votre pharmacien.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Attention de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Attention

Dr. Hanane JOURDANE

Médecine Générale

Diplômée de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de
Casablanca
Diabétologie - Échographie



الدكتورة حنان جورдан

الطب العام

خريج كلية الطب والصيدلة
بالدار البيضاء

أمراض السكري - الفحص بالصدى

Casablanca, le :

16/06/2020

الدار البيضاء، في:


Dr HANANE JOURDANE

74.80

Nedap ⑧

1 g x 2 / pd 05

10



DOCTEUR HANANE JOURDANE
PHARMACIE DU PARADIS
Lot Smara - N° 46 - Casablanca
Tél: 0522.60.80.71
MEDECINE GENERALE ET DIABETOLOGIE
EL0522.603.231 - 0661.463.480

NEOCIP® 250 et 500 mg

Chlorhydrate de Ciprofloxacine

Veuillez lire l'attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou

LOT: 090

PER: MAI 2022

PPV: 74 DH 80



6 118000 050308

cool

1. Composition

Chaque comprimé contient :

Ciprofloxacine 250 ou 500 mg.

(Sous forme de Chlorhydrate de ciprofloxacine 291,08 ou 582,138 mg).

Excipients : Croscarmellose sodique ; Cellulose microcristalline ; Povidone ; Stéarate de magnésium ; Silice colloïdale ; HPMC E-15 ; Dioxyde de titane ; isoprénolique ; Eau purifiée.

2. Formes pharmaceutiques et présentations

NEOCIP comprimés pelliculés dosés à 250 mg. Boite de 10.

NEOCIP comprimés pelliculés dosés à 500 mg. Boite de 10.

3. Classe pharmaco thérapeutique

La ciprofloxacine est un antibiotique de synthèse à large spectre d'activité antibactérienne, appartenant à la famille des fluorquinolones. Son activité est fortement bactéricide par inhibition de l'ADN-gyrase bactérienne empêchant la synthèse de l'ADN chromosomique bactérien.

4. Indications

chez l'adulte

NEOCIP est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections suivantes:

- Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram négatif
 - Exacerbations de broncho-pneumopathie chronique obstructive
 - Infections broncho-pulmonaires en cas de mucoviscidose ou de bronchectasie
 - pneumonie
 - Otite moyenne chronique purulente
 - Exacerbation aigüe de sinusite chronique, en particulier due à des bactéries à Gram négatif
 - Infections urinaires
 - Urétrite et cervicite gonococciques
 - Orchit-épidymite y compris les infections dues à *Neisseria gonorrhoeae*
 - Infections gynécologiques huites y compris les infections dues à *Neisseria gonorrhoeae*
- Lorsque les infections de l'appareil génital citées ci-dessus sont suspectées ou confirmées à *Neisseria gonorrhoeae*, il est particulièrement important de disposer d'informations sur la prévalence de la résistance locale de cette bactérie à la ciprofloxacine et de confirmer sa sensibilité à l'antibiotique par des tests microbiologiques.
- Infections gastro-intestinales (par ex. diarrhée du voyageur)
 - Infections intra-abdominales
 - Infections de la peau et des parties molles dues à des bactéries à Gram négatif
 - Otite malgaine externe.
 - Infections ostéocartilagineuses
 - Traitement des infections chez les patients neutropéniques
 - Prophylaxie de l'urétrite chez les patients neutropéniques
 - Prophylaxie des infections invasives à *Neisseria meningitidis*
 - Maladie du charbon (prophylaxie après exposition et traitement curatif).

chez l'enfant et l'adolescent

- Infections broncho-pulmonaires en cas de mucoviscidose dues à *Pseudomonas aeruginosa*
 - Infections urinaires compliquées et pyélonéphrite
 - Maladie du charbon.
- La ciprofloxacine peut également être utilisée pour traiter des infections sévères de l'enfant et de l'adolescent, si nécessaire.

Le traitement devra être exclusivement instauré par des médecins expérimentés dans le traitement de la mucoviscidose et/ou des infections sévères de l'enfant et de l'adolescent.

5. Posologie et mode d'administration

Votre médecin vous expliquera précisément quelle quantité de NEOCIP vous devez prendre, à quelle fréquence et pendant combien de temps. Ceci dépendra du type d'infection et de sa sévérité. Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes rénaux car la dose de médicament à prendre devra éventuellement être adaptée.

Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours mais peut être plus long en cas d'infection sévère. Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des doutes sur le nombre de comprimés de NEOCIP à prendre ou la façon de les prendre.

- Avez les comprimés avec une grande quantité de boisson. Ne croquez pas les comprimés car ils ont mauvais goût.
 - Essayez de prendre les comprimés à peu près à la même heure chaque jour.
 - Vous pouvez prendre les comprimés au cours ou en dehors des repas. Le calcium présent dans un repas n'a pas d'incidence grave sur l'effet du médicament. Cependant, ne prenez pas les comprimés de NEOCIP avec des produits laitiers de type lait ou yaourt ou des jus de fruit enrichis (par ex. jus d'orange enrichi en calcium).
- Pensez à boire abondamment pendant le traitement par NEOCIP.

6. Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des excipients.

Administration concomitante de ciprofloxacine et de tizanidine.

7. Mises en garde et précautions d'emploi

Faites attention avec NEOCIP, comprimé pelliculé sécable:

Avant de prendre NEOCIP, comprimé pelliculé sécable:

Prévenez votre médecin si:

- Vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement;
- Vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique;
- Vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que NEOCIP;
- Vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire);
- Vous avez des antécédents de trouble du rythme cardiaque (arythmie).

Pendant la prise de NEOCIP, comprimé pelliculé sécable:

Prévenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles suivants se produit pendant le traitement par NEOCIP. Votre médecin déterminera si le traitement par NEOCIP doit être interrompu.

- Réaction allergique sévère et soudaine (réaction/choc anaphylactique, éclat de Quincke). Dès la première dose, il existe un faible risque de survenue de réaction allergique sévère, se manifestant par les symptômes suivants: oppression dans la poitrine, vertiges, nausées ou évacouements, ou vertiges lors du passage en position debout. Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre NEOCIP car votre vie pourrait être mise en danger, et contactez immédiatement votre médecin.

- Des douleurs et gonflements des articulations et des tendinites peuvent se produire occasionnellement, en particulier si vous êtes âgé(e) et si vous êtes régulièrement traité(e) par des corticostéroïdes. Au moindre signe de douleur ou d'inflammation des articulations ou des tendons, arrêtez de prendre NEOCIP et mettez le membre atteint au repos. Evitez tout effort intense car cela pourrait augmenter les risques de rupture des tendons.

- Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre maladie neurologique de type ischémie cérébrale ou accident vasculaire cérébral, des effets indésirables neurologiques (crises convulsives) pourraient se produire. S'ils surviennent, arrêtez NEOCIP et contactez immédiatement votre médecin.

- Des réactions psychiatriques peuvent survenir dès la première prise de NEOCIP. Si vous souffrez de dépression ou de psychose, vos symptômes pourraient s'aggraver lors du traitement par NEOCIP. Dans ces cas, arrêtez NEOCIP et contactez immédiatement votre médecin.

- Vous pouvez présenter des symptômes évocateurs d'une neuropathie, tels que douleurs, brûlures, picotements, engourdissement et/ou faiblesse musculaire. Si de tels symptômes surviennent, arrêtez NEOCIP et contactez immédiatement votre médecin.

Une diarrhée peut se produire lors de la prise d'antibiotiques, y compris avec NEOCIP, même plusieurs semaines après la fin du traitement. Si la diarrhée devient sévère ou persiste, ou si vous remarquez la présence de sang ou de mucus dans vos selles, arrêtez immédiatement de prendre NEOCIP, votre vie pourra être mise en danger. Ne prenez pas de médicaments destinés à bloquer ou ralentir le transit intestinal et contactez votre médecin.

Prévenez le médecin ou le laboratoire d'analyses que vous prenez NEOCIP si vous devez subir un prélèvement de sang ou d'urine.

- NEOCIP peut provoquer des troubles hystériques. Si vous remarquez le moindre symptôme de type perte d'appétit, ictere (jaunisse), urines foncées, démangeaisons ou sensibilité de l'estomac à la palpation, arrêtez de prendre NEOCIP et contactez immédiatement votre médecin.

- NEOCIP peut diminuer le taux de vos globules blancs dans le sang et réduire votre résistance aux infections. Si vous présentez une infection accompagnée de symptômes tels qu'une fièvre et une déterioration importante de votre état général, ou une fièvre accompagnée de symptômes d'infection locales tels que des douleurs dans la gorge/pharynx/bouche ou des problèmes urinaires, vous devez consulter immédiatement votre médecin. Une analyse de sang sera effectuée afin de rechercher une éventuelle diminution du taux de certains globules blancs (granulocytose). Il est important d'indiquer

INEXIUM® 40 mg, comprimé gastro-résistant

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un dou...
votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. N...
d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela po...
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous n...
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant ?
3. COMMENT PRENDRE INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant UTILISE ?

INEXIUM contient une substance appelée ésoméprazole. C'est un inhibiteur de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide de l'estomac.

INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

- Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.
- Poursuite du traitement après prévention avec INEXIUM par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastro-duodénal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant ?

Ne prenez jamais INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'ésoméprazole ou l'un des autres composants

FAB. APR-19
EXP. MAR-22
LOT ZLYL

Z PHALIAZPST-IL

SYNTHEMEDIC
22 rue soubise brou al aquam roches
noires cassabianca
INEXIUM

40 mg Cpr GP
Boîte 14 S
B41/15DMP/21NRC P.P.V : 123,50 DH
6 118001 020607 des
INEXIUM

118001 020607 des

INEXIUM® 40 mg, comprimé gastro-résistant

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un dou...
votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. N...
d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela po...
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous n...
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant ?
3. COMMENT PRENDRE INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant UTILISE ?

INEXIUM contient une substance appelée ésoméprazole. C'est un inhibiteur de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide de l'estomac.

INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

- Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.
- Poursuite du traitement après prévention avec INEXIUM par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastro-duodénal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant ?

Ne prenez jamais INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'ésoméprazole ou l'un des autres composants

FAB. APR-19

EXP. MAR-22

LOT ZLYL

Z PHALIAZPST-IL

SYNTHEMEDIC
22 rue soubise brou al aquam roches
noires cassabianca
INEXIUM

40 mg

Boîte 14

Cpr GP

E4115DMP/21NRC P.P.V: 123,50 DH

6 118001 020607 S des

INEXIUM

Irbesar® Sun

150mg et 300mg

Comprimés pelliculés en boîtes de 14 et 28 Irbésartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Irbesar® Sun 150mg

Principe actif: Irbésartan 150mg

Excipients: lactose monohydrate, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hydroxypropyl methyl cellulose, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, Opadry II blanc OY-LS-28900.

Excipient à effet notoire : Lactose

Irbesar® Sun 300mg

Principe actif: Irbésartan 300mg

Excipients: lactose monohydrate, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hydroxypropyl methyl cellulose, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, Opadry II blanc OY-LS-28900.

Excipient à effet notoire : Lactose

7. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Irbesar® Sun et si une des situations suivantes se présente :

- si vous souffrez de vomissements ou de diarrhée importante
- si vous souffrez de problèmes rénaux
- si vous ~~souffrez de~~ de problèmes cardiaques
- si vous ~~souffrez de~~ diabète
- si vous ~~souffrez de~~ sanglé dans les

• si vous ~~souffrez de~~ Lot n° :

• si vous ~~souffrez de~~ EXP:

• si vous ~~souffrez de~~ hyperthyroïdie

- un

épilepsie

rénales

- alcool

Votre médicament peut fonctionner mal avec certains électrolytes

Voir aussi

Vous devez envisager de ne pas prendre Irbesar® Sun.

PPV : 120SH80

N PHARMACEUTICALS MOROCCO Ce médicament ne doit pas être pris si vous êtes à plus de 3 mois. Il peut entraîner de graves problèmes de santé chez l'enfant à naître si il est utilisé au cours de cette période (voir la rubrique grossesse).

Enfants et adolescents

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents car l'efficacité et la tolérance n'a pas encore été établie.

Excipient à effet notoire : Lactose. Irbesar® Sun contient du lactose. Si votre docteur vous a déjà dit que vous présentiez une intolérance à certains sucre (ex lactose), vous devez contacter votre médecin avant de prendre ce médicament.

8. INTERACTIONS

Autres médicaments et Irbesar® Sun

Irbesar® Sun

150mg et 300mg

Comprimés pelliculés en boîtes de 14 et 28 Irbésartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Irbesar® Sun 150mg

Principe actif: Irbésartan 150mg

Excipients: lactose monohydrate, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hydroxypropyl methyl cellulose, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, Opadry II blanc OY-LS-28900.

Excipient à effet notoire : Lactose

Irbesar® Sun 300mg

Principe actif: Irbésartan 300mg

Excipients: lactose monohydrate, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hydroxypropyl methyl cellulose, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, Opadry II blanc OY-LS-28900.

Excipient à effet notoire : Lactose

7. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Irbesar® Sun et si une des situations suivantes se présente :

- si vous souffrez de vomissements ou de diarrhée importante
- si vous souffrez de problèmes rénaux
- si vous ~~souffrez de~~ de problèmes cardiaques
- si vous ~~souffrez de~~ diabète
- si vous ~~souffrez de~~ sanglé dans les

• si vous ~~souffrez de~~ Lot n° :

• si vous ~~souffrez de~~ EXP:

• si vous ~~souffrez de~~ hyperthyroïdie

- un ~~souffrez de~~ énali ~~souffrez de~~ réna ~~souffrez de~~ - alis

Votre ~~souffrez de~~ fonctionne ~~souffrez de~~ électrolyte tement le taux des

• Voir aussi ~~souffrez de~~ Vous deve ~~souffrez de~~ envisagez c ~~souffrez de~~ Irbesar® Su. Irbesar® Sun.

PPV : 120SH80 ~~souffrez de~~ ou si vous ~~souffrez de~~

N PHARMACEUTICALS MOROC ~~souffrez de~~ pas être pris si vous êtes à plus de 3 mois 20070 peut entraîner de graves

problèmes de santé chez l'enfant à naître si ~~souffrez de~~ est utilisé au cours de cette période (voir la rubrique grossesse).
Enfants et adolescents

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents car l'efficacité et la tolérance n'a pas encore été établie.

Excipient à effet notoire : Lactose. Irbesar® Sun contient du lactose. Si votre docteur vous a déjà dit que vous présentiez une intolérance à certains sucre (ex lactose), vous devez contacter votre médecin avant de prendre ce médicament.

8. INTERACTIONS

Autres médicaments et Irbesar® Sun

Dr. Hanane IOURDANE

Médecine Générale
Diplômée de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de
Casablanca
Diabétologie - Échographie



الدكتورة حنان اورдан

الطب العام

خريج كلية الطب والصيدلة

بالدار البيضاء

أمراض السكري - الفحص بالصدى

Casablanca, le : 11/06/2020 الدار البيضاء، في:

Dr HANANE IOURDANE

- NFSI - Py
- ECBV + DOPB
- uric.
- GGT GPT
- CO, VDL, LD2, TG
- GGT, ALB ALC
- c-reat.

LABOGAMMA
Dr T BENCHEROUNA Médicales
'84 Av C Hay Mohammadi BIOLOGISTE
Tel 05 22 61 85 39 Fax 05 22 62 15 21

DOCTEUR HANANE IOURDANE
MEDECINE GENERALE ET DIABETOLOGIE
46 BD ALI YAATA HAY MOHAMMADI CASABLANCA
TEL 0522 603 231 - 0661 463 480



LABO GAMMA



Laboratoire Général Analyses Médicales Médico-légales Alimentaires

Biologie moléculaire. Centre de fertilité. Marqueurs tumoraux. Hormonologie. Toxicologie

Casablanca le : 12/06/20

Dr T BENCHERKOUN.A

Madame ERROUKHE FATIMA EP LAADIMAT

Code patient : 243314 - Référence : 20F1052

Dr, HANANE IOURDANE

Page : 2/3

EXAMENS BIOCHIMIQUES DU SANG ARCHITECT Abbott ci 4100

	Résultats	Normales
Glycémie à jeun ----- :	1,37 * g/l	0,7 - 1,1
Créatinine ----- :	8,10 mg/l 71,6 µmol/l	6 - 13 53,04 - 114,92
Acide urique ----- :	67,00 * mg/l	26 - 60
Cholestérol Total ----- :	1,71 g/l	1,5 - 2,4
Cholestérol HDL ----- :	0,46 g/l	0,35 - 0,55
Cholestérol LDL ----- :	0,97 * g/l	1,5 - 1,9
Triglycérides ----- :	1,40 g/l	0,6 - 1,7
Transaminases - SGOT / ASAT ----- :	14,80 UI/l	5 - 37
Transaminases - SGPT / ALAT ----- :	17,10 UI/l	< 55

HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE

(Tech : HPLC METHODE DE REFERENCE)

Hémoglobine glycosylée ----- :	6,80	(Diabète stable < 7 %)
		(Diabète instable > 8 %)
		(Niveau non diabétique < 6 %)

LABOGAMMA
Analyses Médicales
Dr T BENCHERKOUN A BILOGISTE
18A Av C Hay Mohammadi Casablanca
Tél 05 22 61 85 39 Fax 05 22 62 15 94

* (résultat contrôlé)

De Garde 24h/24 - 7j/7 (Prélèvement à Domicile)

DIPLOME DE LA FACULTÉ DE MEDECINE DE LIEGE . BELGIQUE . ANCIEN ASSISTANT EN TOXICOLOGIE A L'HOPITAL UNIVERSITAIRE DE BAVIERE
C E S BIOCHIMIE - IMMUNO - TRANSFUSION - MICROBIOLOGIE - MARQUEURS TUMORAUX

ANCIEN RESPONSABLE DU SERVICE D'EPIDEMIOLOGIE A L'INSTITUT PASTEUR MAROC

CENTRE DE FERTILITE , BIOLOGIE DE REPRODUCTION : FIV - ICSI

E-mail : labogamma2010@gmail.com - Site web : www.labogamma.com

186, Avenue 'c' - Hay Mohammadi - Casablanca - Tél : 05 22 61 85 39 - Fax : 05 22 62 15 94

INPI : 003000610 - Patente : 32833616 - I.F : 46901880 - ICE : 001592244000006



LABOGAMMA

Laboratoire Général Analyses Médicales Médico-légales Alimentaires

Biologie moléculaire. Centre de fertilité. Marqueurs tumoraux. Hormonologie. Toxicologie



Casablanca le : 12/06/20

Dr T BENCHERKROUN.A

Madame ERROUKHE FATIMA EP LAADIMAT

Code patient : 243314 - Référence : 20F1052

Dr, HANANE IOURDANE

Page : 3/3

BACTERIOLOGIE

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

EXAMEN MACROSCOPIQUE

Aspect ----- :	LEGEREMENT TROUBLE
Couleur----- :	JAUNE
Culot ----- :	MOYEN

EXAMEN CHIMIQUE

Albumine ----- :	0
Sucre ----- :	0
Corps cétoniques ----- :	0
Sang ----- :	+
pH----- :	6,0

EXAMEN MICROSCOPIQUE

Leucocytes ----- :	10 mille/ml	(N : < 10 milles/ml)
Hématies----- :	8 mille/ml	(N : < 5 milles/ml)
Cellules épithéliales----- :	NOMBREUSES	
Cristaux ----- :	NEANT	
Cylindres ----- :	NEANT	
Trichomonas ----- :	NEANT	
Levures ----- :	NEANT	

CULTURE

Culture ----- :	NEGATIVE
-----------------	----------

LABOGAMMA
Analyses Médicales
Dr T BENCHERKROUN A. BIOLOGISTE
134 AV. C Hay Mohammadi Casablanca
Tél: 05 22 61 85 39 Fax: 05 22 62 15 94

* (résultat contrôlé)

De Garde 24h/24 - 7j/7 (Prélèvement à Domicile)

DIPLOME DE LA FACULTÉ DE MEDECINE DE LIEGE . BELGIQUE . ANCIEN ASSISTANT EN TOXICOLOGIE A L'HOPITAL UNIVERSITAIRE DE BAVIERE
C E S BIOCHIMIE - IMMUNO - TRANSFUSION - MICROBIOLOGIE - MARQUEURS TUMORAUX

ANCIEN RESPONSABLE DU SERVICE D'EPIDEMIOLOGIE A L'INSTITUT PASTEUR MAROC

CENTRE DE FERTILITE , BIOLOGIE DE REPRODUCTION : FIV - ICSI

E-mail : labogamma2010@gmail.com - Site web : www.labogamma.com

186, Avenue 'c' - Hay Mohammadi - Casablanca - Tél : 05 22 61 85 39 - Fax : 05 22 62 15 94

INPE: 093000610 - Patente : 32833616 - I.F : 46901880 - ICE : 001592244000006



LABOGAMMA

Laboratoire Général Analyses Médicales Médico-légales Alimentaires

Biologie moléculaire. Centre de fertilité. Marqueurs tumoraux. Hormonologie. Toxicologie



Casablanca le : 12/06/20

Dr T BENCHERKROUN.A

Madame ERROUKHE FATIMA EP LAADIMAT

Code patient : 243314 - Référence : 20F1052

Dr, HANANE IOURDANE

Page : 1/3

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE

Automate : CELL-DYN 3500R

	Résultats		Normales
			(Femme Adulte)
<u>GLOBULES ROUGES</u>			
Hématies -----:	4,67	M/mm ³	3,5 - 5
Hémoglobine -----:	13,60	g/100 ml	11 - 15
Hématocrite -----:	42,30	%	36 - 47
- V.G.M. -----:	90,60	μ ³	80 - 100
- T.C.M.H. -----:	29,10	pg	27 - 34
- C.C.M.H. -----:	32,20	g/100 ml	32 - 36
<u>GLOBULES BLANCS</u>			
Numération des leucocytes -----:	8 210,00	/mm ³	4000 - 10000
Formule leucocytaire			
Polynucléaires Neutrophiles -----:	55,90	%	
Soit :	4 589	/mm ³	2000 - 7500
Polynucléaires Eosinophiles -----:	3,60	%	
Soit :	296	/mm ³	20 - 500
Polynucléaires Basophiles -----:	0,40	%	
Soit :	33	/mm ³	< 100
Lymphocytes -----:	35,50	%	
Soit :	2 915	/mm ³	1000 - 4000
Monocytes -----:	4,60	%	
Soit :	378	/mm ³	200 - 1000
<u>PLAQUETTES</u>			
Résultat -----:	226 000	/mm ³	150000 - 450000

LABOGAMMA
Analyses Médicales
184 Av C Hay Mohammadi Casablanca
Tel 05 22 61 85 39 Fax 05 22 62 15 94

* (résultat contrôlé)

De Garde 24h/24 - 7j/7 (Prélèvement à Domicile)

DIPLOME DE LA FACULTÉ DE MEDECINE DE LIEGE . BELGIQUE . ANCIEN ASSISTANT EN TOXICOLOGIE A L'HOPITAL UNIVERSITAIRE DE BAVIERE
C E S BIOCHIMIE - IMMUNO - TRANSFUSION - MICROBIOLOGIE - MARQUEURS TUMORAUX

ANCIEN RESPONSABLE DU SERVICE D'EPIDEMIOLOGIE A L'INSTITUT PASTEUR MAROC

CENTRE DE FERTILITE , BIOLOGIE DE REPRODUCTION : FIV - ICSI

E-mail : labogamma2010@gmail.com - Site web : www.labogamma.com

186, Avenue 'c' - Hay Mohammadi - Casablanca - Tél : 05 22 61 85 39 - Fax : 05 22 62 15 94

INPE: 093000610 - Patente : 32833616 - I.F : 46901880 - ICE : 001592244000006



LABOGAMMA

Laboratoire Général Analyses Médicales Médico-légales Alimentaires

Biologie moléculaire. Centre de fertilité. Marqueurs tumoraux. Hormonologie. Toxicologie



Dr T BENCHERKOUNA

Casablanca le vendredi 12 juin 2020 Madame ERROUKHE FATIMA EP LAADIMAT

FACTURE N°	388596
------------	--------

Analyses :

Numération formule sanguine + PLQ -----	B	80	
Glycémie (à jeûn) -----	B	30	
Créatinine -----	B	30	
Acide urique -----	B	30	
Cholestérol total -----	B	30	
Cholestérol HDL -----	B	50	
Cholestérol LDL -----	B	50	
Triglycérides -----	B	60	
Transaminases OT -----	B	50	
Transaminases PT -----	B	50	
Hémoglobine glycosylée -----	B	100	
Cytobactériologie des urines -----	B	80	
Antibiogramme -----	B	40	Total : B 680

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5	
Flacon stérile-----	K	1	

TOTAL DOSSIER 931,20 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Neuf Cent Trente et Un Dirhams et Vingt Centimes

LA BOGAMMA
Analyses Médicales
Dr T BENCHERKOUNA BIOLOGISTE
194 Avenue 'C' - Hay Mohammadi Casablanca
TEL 05 22 61 85 39 Fax 05 22 62 15 94

De Garde 24h/24 - 7j/7 (Prélèvement à Domicile)

DIPLOME DE LA FACULTÉ DE MEDECINE DE LIEGE . BELGIQUE . ANCIEN ASSISTANT EN TOXICOLOGIE A L'HOPITAL UNIVERSITAIRE DE BAVIERE

C E S BIOCHIMIE - IMMUNO - TRANSFUSION - MICROBIOLOGIE - MARQUEURS TUMORAUX

ANCIEN RESPONSABLE DU SERVICE D'EPIDEMIOLOGIE A L'INSTITUT PASTEUR MAROC

CENTRE DE FERTILITE , BIOLOGIE DE REPRODUCTION : FIV - ICSI

E-mail : labogamma2010@gmail.com - Site web : www.labogamma.com

186, Avenue 'C' - Hay Mohammadi - Casablanca - Tél : 05 22 61 85 39 - Fax : 05 22 62 15 94

INPI: 093000610 - Patente : 32833616 - I.F : 46901880 - ICE : 001592244000006