

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° W19-537762

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

4244

Société :

500 - 30611

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

TAHRI Abdelkabir

Date de naissance :

19/07/56

Adresse :

0666708919

Total des frais engagés : 825,40 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR J. SELKAHIA  
Spécialiste O. R. L.  
4, Rue Mauritanie - Marrakech  
Téléphone : 43.66.92

Date de consultation :

TAHRI Abdelkabir

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

dyophasme

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :

Signature de l'adhérent(e) :

TAHRI Abdelkabir

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/01/2015	RS +		60000 Dhs	INP : 07/018301 Dr J. BELKAHIA Spécialiste O. R. L. 4, Rue Mauritanie - Marrakech Téléphone : 0524 692
21/01/2015	KM 15			

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. H. M. MACHET Rue Jamila Ben Youcef Bab El Oued - Marrakech Tunisie	20/8/2020	125,40

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

Dr. Jarnal Eddine BELKAHIA

SPECIALISTE O.R.L

Maladies et chirurgie de l'oreille  
du nez et de la gorge  
Pathologie Tumorale et carcinologie  
du Cou et de la face  
Diplômé de la Faculté de médecine  
de Montpellier

الدكتور جمال الدين بلakahia

أخصاصي في أمراض وجراحة

الأذن والأنف والحنجرة

أخصاصي في أورام العنق والوجه

خريج كلية الطب بمونبليي

20 05 2020

Mr Abdelkabir TAHRI

85,50

CLAZEN XL:



1 comprimé par jour, pendant 7 jours.

EXOMUC :



89,90 1 sachet, 3 fois/ jour pendant 10 jours.

125,10



Pharmacie ILLY  
Mme Moudaoui Darya  
Mme Youssef-Badil  
Rue Jarniati Ben Youssef 30 1497  
Marrakech  
Tél: 0524 43 66 92

Dr J. BELKAHIA  
Spécialiste O. R. L.  
4, Rue Mauritania - Marrakech  
Téléphone : 43.66.92

العنوان : زنقة موريطانيا عمارة المتوكل الطابق II مراكش - جليز - الهاتف : 0524 43 66 92

Adresse : Rue de Mauritanie Imm. Moutaouakkil 2ème Etage Marrakech - Guéliz - Tél. : 0524 43 66 92

# EXOMUC® 200 mg, granulés sans sucre pour solution buvable en sachet

## Acétylcystéine

**Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

*Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.*

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

#### Dénomination :

EXOMUC® 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet

#### Composition :

Acétylcystéine(DCl)..... 200 mg  
Pour un sachet.

**Excipients** : Arôme orange, aspartam, bêta-carotène (E 160), sorbitol.

Composition de l'arôme orange S 289 : arôme naturel obtenu par dispersion sur dextrose d'une base concentrée.

#### Forme pharmaceutique :

Ce médicament se présente sous forme de granulés pour solution buvable en sachet. Boîte de 30 sachets.

### 2. QU'EST-CE QUE EXOMUC® 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE?

#### Classe pharmaco thérapeutique :

MUCOLYTIQUE.

(R. Système Respiratoire).

#### Indications

Ce médicament est un fluidifiant des sécrétions bronchiques, il facilite ainsi leur évacuation par la toux.

Ce médicament est préconisé dans les états d'engorgement des bronches en particulier lors des épisodes aigus de bronchites.

### 3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE QUE EXOMUC® 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais EXOMUC® 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet :**

- en cas d'antécédent d'allergie à l'un des composants

- chez le nourrisson (moins de 2 ans) en raison d'aggravation de l'encombrement bronchique

- en cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire à la naissance), en raison de la présence d'acide phénylethanoïque dans ce médicament

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Faites attention avec EXOMUC® 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet :**

#### Mises en garde spéciales :

Il est conseillé de ne pas prendre de médicament ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

Le traitement ne devra pas être poursuivi en cas d'aggravation des symptômes. Dans ce cas, consultez votre médecin pour une réévaluation de votre traitement. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### Précautions d'emploi :

Ce médicament doit être utilisé avec prudence en cas d'ulcère de l'estomac ou duodénal.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Interaction avec les aliments et les boissons

Sans objet.

#### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

#### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

#### Grossesse et allaitement :

Prévenir votre médecin en cas de grossesse, en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Sportifs :

Sans objet.

# Clazen® XL 500 mg

Comprimé Pelliculé à libération prolongée

DCI: Clarithromycine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être très nocif.  
Si l'un des effets indésirables suivant grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 1. QU'EST-CE QUE CLAZEN XL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

### Classe pharmacothérapeutique:

Ce médicament est un ANTIOTIQUES de la famille des macrolides.

### Indications thérapeutiques:

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de la clarithromycine. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles à donné lieu ce médicament et des études évaluant l'efficacité des produits antibactériens actuellement disponibles.

Elles sont limitées, chez l'adulte, aux infections dues aux germes définis comme sensibles:

Angines documentées à streptocoque. A bêta-hémolytique, en alternatif au traitement par bêta-lactamines, particulièrement lorsque celle-ci peut être utilisée.

Symptômes associés à l'ensemble du profil microbiologique de ces infections, les macrolides sont indiqués lorsqu'un traitement par une bêta-lactamine est impossible.

Exacerbations des bronchites chroniques.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

## 2. QUELS SONT LES FORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CLAZEN XL?

### Contre-indications:

Ne prenez jamais CLAZEN XL dans les cas suivants:

Allergie aux antibiotiques de la famille des macrolides ou à l'un des autres composants.

Si vous prenez d'autres médicaments connus pour provoquer des troubles graves du rythme cardiaque.

En association avec:

la colchicine, l'alfuzosine, la dapoxétine, l'avanafil, la dronedarone, l'ergotamine, la dihydroergotamine, la méthylergométrine, le méthysergide, l'ibavabradine, l'éplerénone, la mizolastine, le pimozide, la quétapine, la ranolazine, la simvastatine, le cisapride, l'astémarizole, la terfenadine, la cyclosporine, le losartan.

Si vous avez un allongement de l'intervalle QT.

Si vous ou une personne de votre famille a déjà eu un allongement de l'intervalle QT ou des troubles du rythme cardiaque (torsades de pointe).

En cas de baisse du potassium dans le sang (hypokaliémie).

Si vous avez à la fois une insuffisance hépatique sévère et une insuffisance rénale.

En cas de douleur, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Mises en garde spéciales et précautions d'emploi:

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres antibiotiques, pour éviter une possible résistance.

Ce médicament ne doit pas être associé avec:

La colchicine, la simvastatine, la ranolazine, la cyclosporine, notamment de l'azotémie. Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres statines, une adaptation de la prescription pourrait être nécessaire.

Informez votre médecin en cas :

- de maladie du foie (insuffisance hépatique). Votre médecin réévaluera la prescription et adaptera éventuellement le traitement.

- d'allongement de l'intervalle QT, une maladie du cœur, d'une baisse du potassium dans le sang ou de prise d'autres médicaments induisant un allongement de l'intervalle QT.

- de diarrhée en cours ou après votre traitement par CLAZEN XL, en particulier si elle est sévère, persistante ou sanguinolente.

Si vous prenez en même temps CLAZEN XL et d'anticoagulants oraux (warfarine), une hémorragie grave (le contrôle de la coagulation (INR et taux de prothrombine) devra être fréquemment surveillé.

- de taux anormalement bas de magnésium dans le sang.

La prise concomitante de clarithromycine est déconseillée avec :

- la tamsulosine, la bromocriptine, la cabergoline, le lisuride et le pergolide, la disopyramide, l'ébastine, la fésotérodine, la halofépinide, les immunosuppresseurs (ciclosporine, éverolimus, sirolimus, tacrolimus), l'irinotecan, l'ertibulin, le bosutinib, le régoférénib, la luméfentanyl, l'oxycodone, le rivaroxaban, la toléterodine, la bêdaquiline, la fidaxomicine (antibiotique), le siméprevir, le ricocquat.

En cas de réactions cutanées ou allergiques, quelques sévères, le traitement par clarithromycine doit être immédiatement arrêté et un traitement approprié doit être instauré en urgence.

Il n'est pas nécessaire d'adapter la dose chez le sujet âgé.

Ce médicament contient du lactose. Si vous avez un problème héritardique rare d'intolérance au galactose, une galactosémie congénitale, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose vous ne devrez pas prendre ce médicament.

### Interactions avec d'autres médicaments:

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ en association avec:

- la tamsulosine, la bromocriptine, la cabergoline, le pergolide et le lisuride, la disopyramide, la quinidine, l'ébastine, la fésotérodine, la halofépinide, les immunosuppresseurs, l'irinotecan, l'ertibulin, le bosutinib, le régoférénib, la luméfentanyl, l'oxycodone, le rivaroxaban, la toléterodine, la bêdaquiline, le siméprevir, le

ricocquat.

- le midazolam administré par voie orale.  
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou pourriez prendre ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez pendant le traitement, consultez votre médecin ou la néonatalogie.  
Allaitement: l'allaitement est en général interrompu l'allaitement car présente des troubles digestifs.  
Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

### Conduite de véhicules et u

Le risque d'étourdissement et d'assoupissement, qui peuvent se dérouler en cours de traitement, doivent être pris en compte avant de prendre ce médicament.

### Liste des excipients à effet

Lactose.

### 3. COMMENT PRENDRE CLAZEN XL

Respectez toujours la posologie et l'incertitude, consultez votre pharmacien.

### Posologie:

La dose quotidienne est de 500 mg.

Elle dépend de l'indication, du germe en cause et du poids du patient.

En cas d'insuffisance rénale la posologie est à réduire.

Si vous avez l'impression que l'effet thérapeutique est trop faible, consultez votre médecin.

### Mode et voie d'administration:

Oral.

Tablette. Avoir une ou deux comprimés avec un verre d'eau.

### Durée du traitement:

Pour être efficace cet antibiotique doit être utilisé à doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin le conseille.

La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme que vous êtes complètement guéri, n'envie pas de faire de rémission, mais de traiter l'antibiotique.

Si vous avez l'impression que l'effet thérapeutique est trop faible, consultez votre médecin.

Ce médicament: la durée du traitement de certaines bronchites est de 5 jours.

### Problèmes particulières du déséquilibre de

de nombreux cas d'augmentation de l'acidité urinaire ou d'acidose, rares, chez des patients traités par antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire et l'état général du patient apparaissent comme risques.

Dans ces circonstances, il apparaît difficile d'établir entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la cause du déséquilibre de l'INR.

Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage responsables que d'autres.

Surdosage: Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, CLAZEN XL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

### Effets indésirables fréquents:

Insomnie, trouble du goût (dysgueuse), maux de tête, diarrhée, vomissements, digestion difficile (dyspepsie), nausées, douleurs à l'estomac, anomalies des tests fonctionnels hépatiques, éruption cutanée, transpiration excessive (hyperhidrose).

### Effets indésirables peu fréquents:

Affection due à un champignon microscopique (candidose), gastroentérite, infection vaginale,

quantité insuffisante de globules blancs dans le sang (leucopénie),

anémie, perte (anorexie) ou diminution de l'appétit, éruption cutanée, érosions, commode, embûlement, vertiges, altération de l'audition, brûlurements (acouphènes), allongement de l'intervalle QT à l'électrocardiogramme, palpitations, saignements de nez (épistaxis), remontée du liquide acide de l'estomac dans l'oesophage (reflux gastro-oesophagien), inflammation de l'estomac (gastrite), douleur anale (proctalgie), inflammation de la bouche (stomatite), inflammation de la langue (glossite), constipation, douleur de l'anus, rectum, rectum et rectum (rectal), démagéance, urticaire, douleurs musculaires (myalgie), fatigue.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER CLAZEN XL?

Ne pas la porter et de la vue des enfants.

Conserver à température ambiante (15-30°C).

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES:

La substance active est:

Clarithromycine.....

Les autres composants sont:

Lactose, hypromellose, stéarate de magnésium, talc, propylène glycol, huile de ricin, cellulose, dioxyde de titane et laque minérale de jaune de carbone.

Forme pharmaceutique et contenu : Clazen XL Comprimé pelliculé à libération prolongée Boîte de 7.

Conditions de prescription et délivrance: Tableau A (Liste I).

Date de la notice: Décembre 2017

7 Comprimés pelliculés à libération prolongée

Clazen® XL

500 mg

85,50

# Dr. Jamal Eddine BELKAHIA

SPECIALISTE O.R.L

Maladies et chirurgie de l'oreille  
du nez et de la gorge  
Pathologie Tumorale et carcinologie  
du Cou et de la face  
Diplômé de la Faculté de médecine  
de Montpellier

الدكتور جمال الدين بلكاھية

أخصاصي في أمراض وجراحة

الأذن والأذن والحنجرة

أخصاصي في أورام العنق والوجه

خريج كلية الطب بمونبليي

20 05 2020

Mr Abdelkabir TAHRI

## Note d'honoraires :

Cs :	:	250, 00	dh.
Acte k 15	:	350, 00	dh.
Total	:	600, 00	dh.

K15 : nasofibroscopie.

Dr. J. BELKAHIA  
Spécialiste O. R. L.  
4, Rue Mauritanie Marrakech  
Téléphone : 43.66.92

العنوان : زنقة موريطانيا عمارة المتكول الطابق II مراكش - جليز - الهاتف : 0524 43 66 92

Adresse : Rue de Mauritanie Imm. Moutaouakkil 2ème Etage Marrakech - Guéliz - Tél. : 0524 43 66 92

Dr. Jamal Eddine BELKAHIA

SPECIALISTE O.R.L

Maladies et chirurgie de l'oreille  
du nez et de la gorge  
Pathologie Tumorale et carcinologie  
du Cou et de la face  
Diplômé de la Faculté de médecine  
de Montpellier

الدكتور جمال الدين بلakahia

أخصاصي في أمراض وجراحة

الأذن والأذن والحنجرة

أخصاصي في أورام العنق والوجه

خريج كلية الطب بمونبليي

20 05 2020

Mr Abdelkabir TAHRI

### NASOFIBROSCOPIE :

Pour : dysphonie

Cloison en place  
Méats propres  
Muqueuse normale  
Cornets normaux  
cavum : libre  
discrète laryngite diffuse de type allergique  
larynx mobile, cordes vocales d'aspect normal.  
Sinus piriformes libres, pas de stase.

Dr. J. BELKAHIA  
Spécialiste O. R. L.  
4, Rue Mauritanie - Marrakech  
Téléphone : 43.66.92

العنوان : زنقة موريطانيا عمارة المتوكل الطابق II مراكش - جليز - الهاتف : 0524 43 66 92

Adresse : Rue de Mauritanie Imm. Moutaouakkil 2ème Etage Marrakech - Guéliz - Tél. : 0524 43 66 92