

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-523468

ND: 30835

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3099/02 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : Zein Hana

Date de naissance :

Adresse : 0614 25 13 20

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23.2.2020	0-2-		400.00	INP : 0000000000 Meriem HAROUCH Ophtalmologiste www.lasik.ma Hôpital - 3ème étage Cas Averoës

Meriem HAKO
Ophtalmologiste
www.lasik.ma
Hôpital - 3ème étage
des Urgences Averoës
INP : 091074039

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/02/20	1039.00

[illegible]

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins. Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.				
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION	
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D G 00000000 00000000 35533411 11433553 B			
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Meriem HAROUCH

Ophtalmologiste

Ex enseignante à la faculté de
médecine de Casablanca



الأستاذة مريم الهاروش
اختصاصية في أمراض
وجراحة العيون

Casablanca, le.....23/06/2020...

Mme ZEIFRI Maria

ا.ع.ع
NAVI BLEF DAILY CARE

chauffer les paupières pendant 10 min puis les masser.
essuie avec navi blef et les nettoyer avec sérum le soir
dans les deux yeux, pendant 1 mois
puis même opération 2 fois par semaine dans les deux yeux, pendant 3 mois,

ا.ع.ع
PHYLARM UNIDOSE (FROID À 4°)

1 lavage matin et soir, dans les deux yeux. 1 mois
1 lavage le soir 2 fois par semaine, dans les deux yeux. 3 mois

ا.ع.ع
THEALOSE

1 goutte 6 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 3 Mois

ا.ع.ع
VITAMINE A POS POMMADE

1 application le soir, dans les deux yeux, pendant 1 Mois

DOXYMYCINE 100 MG

1 comprimé par jour, pendant 3 Mois

Pr. A. Meriem HAROUCH
Ophtalmologiste
www.lasik.ma
44, Rue des Hôpitaux - 3ème étage
En face des Urgences Averoes
INP : 091074039

Chirurgie réfractive LASIK - Implants
Chirurgie Cornéenne - Kératocône - Lentilles
Centre d'exploration, Pentacam
Angiographie Numérisée - Laser - Echographie

navibler®

DAILY

EN EYE

For external use COMPOSITION

Melaleuca Alternifolia
D-Panthenol, Allantoin

DESCRIPTION

If you have dry, stinging eyes, but rather your eyelashes with NAVIBLER® reduction of these symptoms, excessive oil, pollen, dust, of irritation, blepharitis, bacterial infestations or dry eyes. NAVIBLER® DAILY CARE is recommended to be used as maintenance care, for patients that have followed the blepharitis treatment with NAVIBLER® INTENSIVE CARE.

PACKAGING

Bottle of 50 ml with a pump dispenser **REF F50ND063**

Bottle of 5 ml with a pump dispenser **REF F5ND064**

PROPERTIES

NAVIBLER® DAILY CARE is a non-greasy and non-irritant formulation, for topical use.

WHAT IS BLEPHARITIS?

It is a chronic inflammation of the eyelids and is one of the most common disorders of the eye. This is often the main cause of eye discomfort, redness and tearing. Other eye symptoms of blepharitis include burning, itching, light sensitivity and irritation, sandy and gritty sensation that is more accentuated upon awakening.

WHAT IS DRY EYE?

It is known as a disorder of the tear film due to tear deficiency or excessive tear evaporation, which can cause damage to the interpalpebral and ocular surface.

IN CASE OF EYE SURGERY

Before or after eye surgery, there is a risk of infections on the eyelids and eyelashes so it is important to follow the recommendations of your eye specialist with regard to the hygiene and care to follow.

Distributor:
GENOP HEALTHCARE (PTY) LTD
Capital Hill Commercial Estate
72 Markels Close
Corner K101 and Le Roux Road
Midrand, 1685, SOUTH AFRICA

PRESENTATIONS : NAVIBLER® is presented in two formulations:

- NAVIBLER® INTENSIVE CARE to eliminate severe ocular secretions and debris due to infections caused by bacteria and Demodex (Red box).

NOVAX®
PHARMA

OCULAR SECRETIONS

DIRECTIONS FOR USE



- 1 - Before the application of the foam, wash your hands and then clean the fingertips with NAVIBLER® DAILY CARE.
 - 2 - Press the delivery pump and place the foam on the clean fingertips. When used before or after surgery it is recommended to place the foam on sterile gauze.
 - 3 - Close the eye and massage the eyelid and eyelashes with NAVIBLER® DAILY CARE. Do not touch or open the eyes during the application. Leave the foam for approximately 60 to 80 seconds.
 - 4 - After each application rinse the eyelashes and eyelids with warm water.
- Note :** Repeat the same steps for the other eye.
Repeat this treatment 2 - 3 times a day for long-term maintenance and hygiene of eyelids and eyelashes.

PRECAUTIONS

- Always wash your hands before and after use.
- Remove contact lenses before the application of the foam. Ensure all foam residue is removed before re-inserting lenses.
- Keep your eyes closed during the application.
- The product is intended for the application on eyelids and eyelashes. Do not apply directly in the eyes.
- For external use only.
- Keep out of the sight and reach of children.
- Do not use for children under 3 years.
- Use hypoallergenic eye makeup and delicate skin lotions around your eyes during the use.
- Do not use in case of known hypersensitivity to one of the constituents of the product.
- If irritation occurs, stop use immediately, rinse your eyes with water and contact your eye specialist if the irritation continues.
- Discard remaining solution within 6 months after first opening.
- Do not use after the expiry date.

STORAGE

- Store the product in a dry place below 35°C.



NOVAX® PHARMA
Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com



V2 - Rev. 25-03-2016

- NAVIBLER® DAILY CARE for long term daily hygiene and prevention of ocular secretions and debris due to infections caused by bacteria and Demodex (Blue box).

دوكسيميسين[®]

(دوكسيسيكالين)

الشكل الصيدلي و التقديم

أقراص معبيرة ب 100 ملغ : علبة تحتوي على 10 أقراص.
أقراص معبيرة ب 200 ملغ : علبة تحتوي على 10 أقراص.
أقراص معبيرة ب 10 و 30 قرصا.
أقراص معبيرة ب 10 أقراص.



المغنزيوم، كروسبوفدون و اللاكتوز

المغنزيوم، كروسبوفدون و اللاكتوز

سيليس فلاني لاماني، كاربوكسيمثيل الن
ريستالين الكمية

أقراص معبيرة ب 100 ملغ : علبة تحتوي على 10 أقراص.
دوكسيميسين

(على شكل أحادي الهيدرات)

السواغات : كالسيوم فوسفات ثنائي الكالسيوم، سيليس فلاني لاماني، كاربوكسيمثيل الن
الساكرين صودي، عطر الحامض، سيللوز ميكروكريستالين الكمية

الصنف الصيدلي العلاجي

مضاد حيوي من مجموعة التيتراسيكلين

في أي حالات يستعمل هذا الدواء ؟

يوصف دوكسيميسين* في جميع الإصابات بالجراثيم الحساسة، وخصوصا في أعراضها :

- التنفسية و أمراض الأذن و الأنف و الحنجرة

- البولية-التهنسية

- الجلدية، وحب الشباب

- إصابة العينين

- جميع الجسم

وفي الزهري، في حالة الحساسية لبيتا لاكتامين.

موانع الإستعمال

يمنع استعمال دوكسيميسين* خصوصا لدى :

- المرأة الحامل أو المرضع

- الخديج و الرضيع و الطفل أقل من 8 سنوات

- في حالة الحساسية لتتراسيكلين

- في حالة تناول الريتنويد عن طريق المسلك العام

- ينبغي توخي الحذر من التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية أثناء العلاج بسبب خط

في حالة الشك، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذير

يجب احترام شروط تناول.

دوكسيميسين[®]

(دوكسيسيكالين)

الشكل الصيدلي و التقديم

أقراص معبيرة ب 100 ملغ : علبة تحتوي على 10 أقراص.
أقراص معبيرة ب 200 ملغ : علبة تحتوي على 10 أقراص.
أقراص معبيرة ب 10 و 30 قرصا.
أقراص معبيرة ب 10 أقراص.



مغنزيوم، كروسبوفدون و اللاكتوز

المغنزيوم، كروسبوفدون و اللاكتوز

سيليس فلاني لاماني، كاربوكسيمثيل الن
ريستالين الكمية

أقراص معبيرة ب 100 ملغ : علبة تحتوي على 10 أقراص.
دوكسيميسين

(على شكل أحادي الهيدرات)

السواغات : كالسيوم فوسفات ثنائي الكالسيوم، سيليس فلاني لاماني، كاربوكسيمثيل الن
الساكرين صودي، عطر الحامض، سيللوز ميكروكريستالين الكمية

الصنف الصيدلي العلاجي

مضاد حيوي من مجموعة التيتراسيكلين

في أي حالات يستعمل هذا الدواء ؟

يوصف دوكسيميسين* في جميع الإصابات بالجراثيم الحساسة، وخصوصا في أعراضها :

- التنفسية و أمراض الأذن و الأنف و الحنجرة

- البولية-التهنسية

- الجلدية، وحب الشباب

- إصابة العينين

- جميع الجسم

وفي الزهري، في حالة الحساسية لبيتا لاكتامين.

موانع الإستعمال

يمنع استعمال دوكسيميسين* خصوصا لدى :

- المرأة الحامل أو المرضع

- الخديج و الرضيع و الطفل أقل من 8 سنوات

- في حالة الحساسية لتتراسيكلين

- في حالة تناول الريتنويد عن طريق المسلك العام

- ينبغي توخي الحذر من التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية أثناء العلاج بسبب خط

في حالة الشك، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذير

يجب احترام شروط تناول.

دوكسيميسين[®]

(دوكسيسيكالين)

الشكل الصيدلي و التقديم

أقراص معبرة ب 100 ملغ : علبة تحتوي على 10 أقراص.
أقراص معبرة ب 200 ملغ : علبة تحتوي على 10 أقراص.
أقراص معبرة ب 10 و 30 قرصا.
أقراص معبرة ب 10 أقراص.



مغنيزيوم، كروسبوفدون و اللاكتوز

المغنيزيوم، كروسبوفدون و اللاكتوز

سيليس فلاني لاماني، كاربوكسيمثيل الن
ريستالين الكمية

أقراص معبرة ب 100 ملغ : علبة تحتوي على 10 أقراص.
دوكسيميسين

(على شكل أحادي الهيدرات)

السواغات : كالسيوم فوسفات ثنائي الكالسيوم، سيليس فلاني لاماني، كاربوكسيمثيل الن
الساكرين صودي، عطر الحامض، سيللوز ميكروكريستالين الكمية

الصنف الصيدلي العلاجي

مضاد حيوي من مجموعة التيتراسيكلين

في أي حالات يستعمل هذا الدواء ؟

يوصف دوكسيميسين* في جميع الإصابات بالجراثيم الحساسة، وخصوصا في أعراضها :

- التنفسية و أمراض الأذن و الأنف و الحنجرة

- البولية-التهنسية

- الجلدية، وحب الشباب

- إصابة العينين

- جميع الجسم

وفي الزهري، في حالة الحساسية لبيتا لاكتامين.

موانع الإستعمال

يمنع استعمال دوكسيميسين* خصوصا لدى :

- المرأة الحامل أو المرضع

- الخديج و الرضيع و الطفل أقل من 8 سنوات

- في حالة الحساسية لتتراسيكلين

- في حالة تناول الريتنويد عن طريق المسلك العام

- ينبغي توخي الحذر من التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية أثناء العلاج بسبب خط

في حالة الشك، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذير

يجب احترام شروط تناول.

HER MEDIC
PPC
99.00 DHS

le 10 ml

A chaque fois

et isotonique
et conservateur

PRODUIT

IDENTIFICATION ET DÉNOMINATION

PHYLARM

Solution ophtalmique stérile pour l'irrigation de la surface oculaire.

COMPOSITION

Chlorure de sodium.....0,090 g.
Borate de sodium.....0,002 g.
Acide borique.....0,027 g.
Eau purifiée q.s.p.....10 ml.

FORME ET CONTENU EN VOLUME

Il s'agit d'une solution ophtalmique stérile pour l'irrigation directe de la surface oculaire et des paupières.

La voie d'administration est oculaire externe.

PHYLARM est présenté en récipient unidose de 10 ml et de 2 ml.

MODE D'ACTION

PHYLARM est une solution ophtalmique stérile, isotonique et sans conservateur destinée au traitement symptomatique des irritations de la surface oculaire.

Les caractéristiques physico-chimiques de PHYLARM sont très proches de celles de la phase aqueuse du film lacrymal ce qui permet une très bonne efficacité et sécurité d'emploi :

- Le pH 7.4 physiologique de PHYLARM

et la lubrification de la surface oculaire sur une longue durée, avec un maximum de confort.

THEALOSE est une solution sans conservateur conditionnée en flacon multidose ABAK.

Ce dispositif innovant et breveté permet de délivrer des gouttes sans conservateur grâce à une membrane filtrante de porosité 0,2 µm, qui évite toute contamination bactérienne de la solution pendant son utilisation.

La solution ainsi protégée peut être utilisée pendant 3 mois après ouverture du flacon.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser en cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout du flacon.

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- En cas d'endommagement de la bague d'inviolabilité, ne pas utiliser le flacon.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

INTERACTIONS :

Il convient d'espacer d'au moins 10 minutes l'administration de deux produits oculaires.

COMMENT UTILISER THEALOSE :

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

INSTILLATION OCULAIRE.

- Se laver soigneusement les mains avant utilisation,
- Ne pas toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon, en particulier si vous pensez souffrir d'une infection oculaire,
- Instiller une goutte dans le cul-de-sac conjonctival inférieur (espace entre l'œil et la paupière), en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en regardant vers le haut.
- Reboucher le flacon après utilisation.

DOSAGE :

1 goutte dans chaque œil, 4 à 6 fois par jour.
THEALOSE peut être utilisé par les porteurs de lentilles de contact.

EFFETS SECONDAIRES :

Irritation oculaire modérée possible dans de rares cas.

CONSERVATION DE THEALOSE :

Ne pas conserver un flacon entamé au-delà de 3 mois.

À conserver à une température inférieure à 25°C.

NE PAS DÉPASSER LA
D'UTILISATION FIGURÉ
CONDITIONNEMENT
péréemption fait référer
emballage intact, stock
pas utiliser de flacon e

Date d'apposition du

DATE DE RÉVISION D

05/2015

PPC : 147.00 DH



STERILE A

CE 0459

Théa

et la lubrification de la surface oculaire sur une longue durée, avec un maximum de confort.

THEALOSE est une solution sans conservateur conditionnée en flacon multidose ABAK.

Ce dispositif innovant et breveté permet de délivrer des gouttes sans conservateur grâce à une membrane filtrante de porosité 0,2 µm, qui évite toute contamination bactérienne de la solution pendant son utilisation.

La solution ainsi protégée peut être utilisée pendant 3 mois après ouverture du flacon.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser en cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout du flacon.

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- En cas d'endommagement de la bague d'inviolabilité, ne pas utiliser le flacon.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

INTERACTIONS :

Il convient d'espacer d'au moins 10 minutes l'administration de deux produits oculaires.

COMMENT UTILISER THEALOSE :

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

INSTILLATION OCULAIRE.

- Se laver soigneusement les mains avant utilisation,
- Ne pas toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon, en particulier si vous pensez souffrir d'une infection oculaire,
- Instiller une goutte dans le cul-de-sac conjonctival inférieur (espace entre l'œil et la paupière), en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en regardant vers le haut.
- Reboucher le flacon après utilisation.

DOSAGE :

1 goutte dans chaque œil, 4 à 6 fois par jour.
THEALOSE peut être utilisé par les porteurs de lentilles de contact.

EFFETS SECONDAIRES :

Irritation oculaire modérée possible dans de rares cas.

CONSERVATION DE THEALOSE :

Ne pas conserver un flacon entamé au-delà de 3 mois.

À conserver à une température inférieure à 25°C.

NE PAS DÉPASSER LA
D'UTILISATION FIGURÉ
CONDITIONNEMENT
péréemption fait référer
emballage intact, stock
pas utiliser de flacon e

Date d'apposition du

DATE DE RÉVISION D

05/2015

PPC : 147.00 DH



STERILE A

CE 0459

Théa

et la lubrification de la surface oculaire sur une longue durée, avec un maximum de confort.

THEALOSE est une solution sans conservateur conditionnée en flacon multidose ABAK.

Ce dispositif innovant et breveté permet de délivrer des gouttes sans conservateur grâce à une membrane filtrante de porosité 0,2 µm, qui évite toute contamination bactérienne de la solution pendant son utilisation.

La solution ainsi protégée peut être utilisée pendant 3 mois après ouverture du flacon.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser en cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout du flacon.

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- En cas d'endommagement de la bague d'inviolabilité, ne pas utiliser le flacon.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

INTERACTIONS :

Il convient d'espacer d'au moins 10 minutes l'administration de deux produits oculaires.

COMMENT UTILISER THEALOSE :

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

INSTILLATION OCULAIRE.

- Se laver soigneusement les mains avant utilisation,
- Ne pas toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon, en particulier si vous pensez souffrir d'une infection oculaire,
- Instiller une goutte dans le cul-de-sac conjonctival inférieur (espace entre l'œil et la paupière), en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en regardant vers le haut.
- Reboucher le flacon après utilisation.

DOSAGE :

1 goutte dans chaque œil, 4 à 6 fois par jour.
THEALOSE peut être utilisé par les porteurs de lentilles de contact.

EFFETS SECONDAIRES :

Irritation oculaire modérée possible dans de rares cas.

CONSERVATION DE THEALOSE :

Ne pas conserver un flacon entamé au-delà de 3 mois.

À conserver à une température inférieure à 25°C.

NE PAS DÉPASSER LA
D'UTILISATION FIGURÉ
CONDITIONNEMENT
péréemption fait référer
emballage intact, stock
pas utiliser de flacon e

Date d'apposition du

DATE DE RÉVISION D

05/2015

PPC : 147.00 DH



STERILE A

CE 0459

Théa