

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractériel personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 671 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : KHALLAD ABDESLAM


Date de naissance : 01/01/1948

Adresse : Rue hadjel makhoul immeuble 5A maraif.
Casablanca

Tél. : 06 19 90 86 83 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation 11/01/2023

Nom et prénom du malade : KHALLAD ABDESLAM Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Hypertension

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : Abdellah

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
Aut.	C	A	400,00	<i>Docteur Abdellah TIZMOU Médecine Générale Echographie Afghanistan H.H Date: 05-22-90 33 qn</i>
05				
19				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	11/5/20	169,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	D 00000000 35533411	B 11433553 00000000
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. ABDELALI TLEMÇANI

MEDECINE GENERALE

Echographie

155, Avenue Afghanistan

Hay El Hassani - Casablanca

Tél. : 05.22.90.33.90

الدكتور عبد العالى التلمسانى

الطب العام

أمراض النساء والرجال والأطفال

الفحص بالتلفزة

155، شارع أفغانستان

حي الحسني - الدار البيضاء

الهاتف: 05.22.90.33.90

✓

11 MAI 2020

Casablanca, le

60.00

- Echographe 20
19.20.1



KHALAD

Bdessalam

27.50

- spray
14.30.1



82.00

- Vax ab 20
14.10.1



165.50



Docteur Abdelali TLEMÇANI
Médecine Générale
Echographie
155, AV Afghanistan H.H
Casablanca - tél. 05 22 90 33 90

الرجو إحضار الوصفة عند المراقبة

PPV 60DH00
EXP 06/21
LOT 186001

Megafox® Ciprofloxacin

prix: 60 DH

Megafox 250 mg

• Ciprofloxacin (DCI) chlorhydrate monohydraté par comprimé 250 mg

Excipients q.s

Megafox 500 mg

• Ciprofloxacin (DCI) chlorhydrate monohydraté par comprimé 500 mg

Excipients q.s

par étui
2,5 g

par étui
5,0 g

FORME ET PRÉSENTATION

Comprimés pelliculés : étui de 10 comprimés pelliculés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antibiotique de la famille des fluoroquinolones.

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires AFRIC-PHAR

Route Régionale Casablanca / Mohammedia n° 322, Km 12.400 - Ain Harrouda 28630 Casablanca - Maroc

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

MEGAFOX® est indiqué dans le traitement des infections provoquées par des micro-organismes sensibles à la Ciprofloxacine.

En ambulatoire

- Traitement de l'urétrite gonococcique chez l'homme,
- Infections urinaires basses et hautes compliquées (y compris prostatites) ou non compliquées,
- Infections intestinales,
- Traitement de relais des infections ostéoarticulaires,
- Suppurations bronchiques, notamment quand un bacille Gram - est suspecté (à l'exception des infections pneumococciques) :
 - chez le sujet à risque (éthylique et tabagique chronique, sujet de plus de 65 ans, immunodéprimé),
 - chez le bronchitique chronique lors de poussées itératives,
 - chez le patient atteint de mucoviscidose.

- Traitement des infections ORL : sinusites chroniques, poussées de surinfection des otites chroniques et des cavités d'évidement, préparations préopératoires d'otites chroniques ostéitiques ou cholestéatomateuses, traitement de relais des otites malignes externes.

En secteur hospitalier

Dans les infections sévères à bacilles Gram- et à staphylocoques sensibles dans les manifestations :

- Respiratoires,
- ORL,
- Rénales et urogénitales, y compris prostatiques, pelviennes et gynécologiques,
- Osseuses et articulaires,
- Intestinales et hépatobiliaires,
- Cutanées.

CONTRE - INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à la Ciprofloxacine ou à un produit de la famille des quinolones.
- Antécédents de tendinopathie avec une fluoroquinolone.
- Chez l'enfant jusqu'à la fin de la période de croissance.
- Chez la femme enceinte ou allaitante.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE

- Eviter l'exposition au soleil et aux rayonnements ultraviolets pendant le traitement en raison du risque de photosensibilisation.
- Les tendinites, rarement observées, peuvent parfois conduire à une rupture touchant plus particulièrement le tendon d'Achille, pour laquelle la corticothérapie au long cours semble être un facteur favorisant. L'apparition de signes de tendinite demande donc un arrêt du traitement.
- Risque de cristallurie en présence d'urine à pH neutre ou alcalin.
- Une émergence de résistance ou une sélection de souches résistantes est possible en particulier lors de traitements au long cours et/ou d'infections nosocomiales, notamment parmi les staphylocoques et les pseudomonas.
- L'activité de la Ciprofloxacine sur Mycobacterium tuberculosis pourrait entraîner la négativation des examens bactériologiques.

Spasfon® 80 mg

Comprimé enrobé

Phloroglucinol/Triméthylphloroglucinol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Phloroglucinol hydraté 80.000 mg
Quantité correspondant en Phloroglucinol anhydre 62,233 mg
Triméthylphloroglucinol 80 mg

Pour un comprimé enrobé

Les autres composants sont : lactose monohydraté, saccharose, acétate de polyvinyle, amidon de blé, acide stéarique, stéarate de magnésium, talc, gomme arabique, gélatine, dioxyde de titane (E 171), érythrosine (E127), cire de carnauba.

Excipients à effet notable : lactose, amidon de blé, saccharose

FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé enrobé Boîte de 30

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A: appareil digestif et métabolisme)
(G: système génito-urinaire)

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais Spasfon®, comprimé enrobé :

- en cas d'allergie à l'un des composants.
- en cas d'intolérance ou d'allergie au gluten, en raison de présence d'amidon de blé (gluten).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Mises en garde

En raison de présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares). L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTÉRAGISSEMENTS

Si vous prenez d'autres médicaments, consultez votre pharmacien.

GRANULES

L'utilisation de ce médicament sous forme granulée peut être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire. L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaita.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

VEUVEZ À TOUJOURS PRENDRE CE MÉDICAMENT EN SUivant EXACTEMENT LES INSTRUCTIONS DE CETTE NOTICE OU LES INDICATIONS DE VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN. VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN EN CAS DE DOUCE.

Spasfon® est un traitement symptomatique. La durée du traitement est variable en fonction de l'indication. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Posologie

chez l'adulte :

Prendre 2 comprimés par prise, trois fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 6 comprimés par 24 heures.

Les comprimés pourront prendre le relais d'un traitement d'attaque sous forme injectable, à la posologie maximale de 6 comprimés par 24 heures.

utilisation chez les enfants

Cette présentation n'est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans.

chez l'enfant de plus de 6 ans : 1 comprimé par prise, deux fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 2 comprimés par 24 heures.

chez l'enfant de plus de 6 ans, il conviendra de s'assurer que les comprimés peuvent être avalés sinon une autre forme sera préférée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Spasfon®, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

• Manifestations cutanées et allergiques: éruption, rarement urticaire, exceptionnellement œdème de Quincke, hypotension artérielle, choc anaphylactique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Aucune condition particulière de conservation

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser Spasfon®, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Date de la notice : Janvier 2018

Prix : 27.50

فوكسيب

سليكوكسيب

التركيب:

تحتوي كل كبسولة فوكسيب 100 على 100 ملجم من مادة سليكوكسيب.
تحتوي كل كبسولة فوكسيب 200 على 200 ملجم من مادة سليكوكسيب.

السوائل: صوديوم الكتروسكربولات، صوديوم الكتروسكربولون، بوليفينون وستارات المنيزيم.

سواغ ذو مفعول هام: الأكتوز.

الصنف العلاجي المبتدأ:

هذا الدواء مضاد لاسترداد الإنهاك من فصيلة الكوكسيب (مثبط لسيكلو-أوكسيجيناز).

الاستطبابيات:

يوصف هذا الدواء بالآتي:

يستخدم لتنقية الأنف والحلق من حدة الإنهاك التي تسبّبها أمراض إنهاك المفاصل المتعددة أو رثية المفاصل. بعد من البروستاجلدين التي يفرزها الجسم والتي تتسبّب في الآلام والالتهاب.

حالات عدم الاستعمال:

لا يجوز استعمال هذا الدواء في حالة الحساسية المفرطة إزاء السولفالاميدات أو أحد من المناصر التي تكون منها تركيبة فوكسيب وكذلك عند الأشخاص المصابة بأمراض القلب (كالنوبة المدبرة، سداد العضلة القلبية أو قصور القلب)، أمراض الأوعية المخية، مرض التهاب الأمعاء، الفرج، والبملل، فإنه لا ينبغي استعمال هذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة، قصور كبدى حاد.

في حالة الشك من الشورى استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذير:

لا يجوز تناول هذا الدواء إلا تحت المراقبة الطبية واتصلوا بطبيبكم في الحالات التالية:

- امرأة في سن الإنجاب في غياب وسائل منع الحمل الفعالة.

- في حالة ارتفاع ضغط الدم.

- في حالة قصور على مستوى القلب.

- في حالة ترافق السؤال في الجسم (وذمة).

احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي:

- في حالة أمراض الكبد أو الكلى الحاد.

- في حالة أمراض الذين يسبّب لهم أن يتعرضوا إلى حالات حساسية مثل المفعح الجلدي، وذمة، الحكة الجلدية، شعور بالإختناق أو بصعوبة في التنفس بعد تناول مادة الأسبرين أو مواد لاستروديدية مضادة للالتهاب.

- في حالة المرضى الذين يعانون الوارفرين أو أي مادة أخرى ضد تثبيط الدم.

- بالنسبة للصغار بارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوكسيبول في الدم، المصاصين بالسكن أو المدخنين.

تفاعلات دوائية:

تعتبر أي تفاعلات طبية ممكنة بين فوكسيب وعدد كبير من الأدوية مثل:

- الوارفرين.

- مضادات الالتهاب، مضادات الذهاب، مسادات اضطراب النظم.

- مضادات الالتهاب الأخرى الاستروبربية.

يجب عليك وصيانته ألا تأخذ الطبيب أو الصيدلي بذلك في حالة اتباعكم لنظام علاجي آخر.

المحمل والإرضاع:

الحمل:

يتعين على النساء الحوامل أو اللاتي يمكن حصول حالة حمل لديهن إعلام طبيبهن بذلك.

لا يجب استعمال فوكسيب لدى المرأة الحامل (تحت إشارة الطبيب).

الإرضاع:

لا يجب استعمال دواء فوكسيب أثناء فترة الإرضاع.

المقادير وطريقة الاستعمال:

يجب وفي كل الحالات احتلال تعليمات الطبيب في الوصفة الطبية.

يتم تناول دواء فوكسيب من قبل البالغين ولا يجب تقديمها للأطفال.

طريقة الاستعمال:

يمكن تناول فوكسيب أثناء، أو خارج أوقات الطعام، في كل الحالات يجب الامتنال تماماً لوصفة الطبيب.

سبل الاستعمال:

يتناول عن طريق الفم.

فرط الحرجة:

في حالة الأفرطاط غير مرغوب فيها.

تأثيرات جانبية:

كل دواء يتناوله يمكن لهذا الدواء أن يختلف تأثيرات متقدمة غير مرغوب فيها لدى بعض المرضى.

- التأثيرات الأكثر حرفاً:

ارتفاق ضغط الدم، سوء المهمة، آلام البطن، الإسهال، القيء، والدور.

- التأثيرات الأقل حرفاً:

صداع، في حالة التعرض لحالة الحساسية يجب إعلام طبيبك بذلك لأن تناول فوكسيب يمكن أن يسبب مزيداً من المضاعفات (المفعح الجلدي و الحكة الجلدية)، سداد العضلة القلبية.

تم تشخيص أمراض مشابهة للأفلانز: أنسداد الأنف، سعال، التهاب القصبات...

يمكن في كل الحالات إعلام طبيبك.

الاسيفاك و استعمال الآلات:

نظراً لأن هذه الدواء يمكن أن يؤثر على الانتهاء وعلى قدرات التفاعل يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الخاصية بالنسبة للمرضى الذين يقومون بقيادة السيارات أو تشغيل الآلات.

احتياطات خاصة بالحقن:

يلاحظ في المرضى الذين يتناولونه تغيرات في المقدار.

لا يجب استعمال الدواء بعد انقضاء المدة المشار إليها على العلبة.

الalconte:

فوكسيب 100: على ذات 20 كبسولة.

فوكسيب 200: على ذات 10 كبسولات.

مدة الصلاحية: عامين.

قائمة I

صنع بالختير الصيدلي ذهونهارما

م - ص 1/2 - نيط ميل - البيضاء

بترخيص الشركة الأردنية لصناعة الأدوية