

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-

051238

ND. 314 11

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0750

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés :

434,60

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

29/06/2020

Nom et prénom du malade :

IBRAHIMI MOHAMED

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Polyarthralgie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 01/07/2020

Signature de l'adhérent(e) :



MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractéristiques personnelles.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/06/2020	1		300DH	Dr. EL BERHOUMI A. RHUMATOLOGUE GOS Rd Mohamed V Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ROUDANI Mme LEBBAR Khadija Ep MIKOU Bd Brahim Roudani Vers Mly Youssef Maârif - Casablanca Tél. : 05 22 27 23 86 / 05 22 87 12 00	29/06/2020	159,20
PHARMACIE ROUDANI Mme LEBBAR Khadija Ep MIKOU Bd Brahim Roudani Vers Mly Youssef Maârif - Casablanca Tél. : 05 22 27 23 86 / 05 22 87 12 00	21/07/2020	275,10

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Dr Mly Youssef Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				CÉEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXÉCUTION
				FIN D'EXÉCUTION
				CÉEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS

O.D.F PROTHÈSES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		
G		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

الدكتور عبد الله البرهومي

Docteur Abdelillah EL BERHOUMI
RHUMATOLOGUE

Diplômé de la Faculté de Médecine René Descartes (Paris)
Ancien Médecin des Hôpitaux de Paris

Spécialiste des :

- ◊ Maladies Rhumatismales
- ◊ Maladies des Os & Articulations
- ◊ Maladies des Muscles
- ◊ Maladies de la Colonne Vertébrale

اختصاصي في أمراض الرئبة (الروماتيزم)

خريج كلية الطب بباريس (فرنسا)

طبيب سابق بمستشفى باريس

اختصاص في:

- ◊ أمراض الروماتيزم
- ◊ العظام والمناظر
- ◊ الجهاز العضلي
- ◊ العمود الفقري



29/06/2020

Casablanca, le

Ibrahim

Mohamed

2 x

D. cure forte

① 1 amp / 15 Jours x 3 mois


② Noflaeene eau de

2 APP /
Dr. EL BERHOUMI A.
RHUMATOLOGUE
605 Bd Mohamed V
Casablanca

T = 159,20

صيدلية الرودانى
PHARMACIE ROUDANI
Mme IFFRAR Khadija Ep MIKOU
26, Bd Brahim Roudani Vers Mly Youssef
Maârif - Casablanca
TÉL : 05 22 27 23 86 / 05 22 27 12 24

• la dose administrée à chaque application est de l'ordre de 4 g de gel. Ceci correspond à un ruban de 10 cm environ (voir schéma à l'échelle).



Durée de traitement

En l'absence de prescription médicale, 10 jours.

PPV: 49,00 DH

LOT: 20D06

EXP: 04/2023

Mode d'administration

Voie locale.

Faire pénétrer le gel par un massage dououreux ou inflammatoire.

PPV: 49,00 DH

Bien se laver les mains après chaque application par vous-même dans le cadre des doigts.

LOT: 20D06

EXP: 04/2023

Symptômes et instructions en cas d'effets indésirables

Si vous avez utilisé plus de Voltarène Emulgel Topique 1%, vous n'auriez dû:

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, Voltarène Emulgel Topique 1%, gel est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

Exceptionnellement peuvent survenir des réactions pouvant être sévères:

- réactions allergiques cutanées: éruption (boutons), urticaire, bulles,
- problèmes respiratoires de type crise d'asthme (souffle bruyant et court, impression de capacité respiratoire diminuée),
- manifestations générales de type anaphylaxie (gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la gorge).

Il faut immédiatement interrompre le traitement et avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Plus fréquemment, peuvent survenir des effets indésirables, généralement légers et passagers:

- des effets locaux cutanés de type rougeur, démangeaisons, irritation cutanée, érosion ou ulcération locales,
- très exceptionnellement, une augmentation de la sensibilité au soleil,
- d'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

Il faut en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables persistent ou s'aggravent, informez votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1% GEL?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

LOT: M0383

EXP: SEP 2022

PPV: 60,00 DH

Date de péremption

Ne pas utiliser VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1% GEL après la date de péremption mentionnée sur l'emballage.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés du tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel ?

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CARDENSIEL®, comprimé pell

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable n'ayant pas été mentionné dans cette notice, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe des bêta-bloquants.

Indications thérapeutiques

Les bêta-bloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions du système nerveux. Ils ralentissent le rythme cardiaque et permettent au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment le sang dans l'ensemble du corps. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique ou aiguë, ou pour empêcher l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Il peut également être utilisé pour traiter les patients présentant une hypertension artérielle élevée ou pour empêcher l'aggravation de l'hypertension artérielle.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique "Ingrédients" pour plus d'informations).
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), qui peuvent faire que les doigts ou les orteils deviennent pâles ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines d'un médicament pour améliorer la circulation sanguine,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques entraînant un rythme cardiaque lent ou irrégulier, qui peuvent entraîner une chute de la tension artérielle,
- choc cardiogénique, grave trouble de la circulation sanguine.

Faites attention avec CARDENSIEL

Si vous présentez l'une des affections suivantes (par exemple, vous prenez :

- diabète,
- jeûne strict,
- certaines maladies du cœur, comme l'infarctus du myocarde,
- problèmes rénaux ou hépatiques,
- troubles moins sévères de la circulation sanguine,
- maladies respiratoires chroniques ou asthme moins sévère,
- antécédents d'affection cutanée squameuse (psoriasis),
- tumeur de la glande surrénale (phéochromocytome),
- troubles thyroïdiens,

Par ailleurs, prévenez votre médecin si vous devez subir :

- un traitement de désensibilisation (en prévention du rhume des foins, par exemple) qui peut amplifier la sévérité de ces réactions ;
- une anesthésie (dans le cadre d'une intervention chirurgicale, par exemple) car CARDENSIEL peut empêcher la réaction normale de l'organisme face à l'anesthésie.



6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg

Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 54,10 DH

7862160238
zin avait
réalisero

u les do

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CARDENSIEL®, comprimé pel

Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable n'ayant pas été mentionné dans cette notice, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisc

Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme au rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque ne peut plus pomper suffisamment. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique et/ou une hypertension artérielle. Il peut également être utilisé avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique "Ingrédients")
- asthme sévère.

Ain Sel à Casablanca
APROVASC 300mg/5mg B28

Cp Pel

PPV : 185,60 DH



6 118001 082049

- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques entraînant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble

Faites attention avec CARDENSIEL

Si vous présentez l'une des affections suivantes (par exemple, vous présentez :

- diabète,
- jeûne strict,
- certaines maladies du cœur, comme l'insuffisance cardiaque chronique,
- problèmes rénaux ou hépatiques,
- troubles moins sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud),
- maladies respiratoires chroniques ou asthme moins sévère,
- antécédents d'affection cutanée squameuse (psoriasis),
- tumeur de la glande surrénale (phéochromocytome),
- troubles thyroïdiens,

Par ailleurs, prévenez votre médecin si vous devez subir :

- un traitement de désensibilisation (en prévention du rhume des foins, par exemple) qui peut amplifier la sévérité de ces réactions ;
- une anesthésie (dans le cadre d'une intervention chirurgicale, par exemple) car CARDENSIEL peut empêcher la réaction normale de l'organisme face à une stimulation moins importante qu'il y a.

KARDEGIC 100MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



6 118001 000000



6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 54,10 DH

766216028

u les do



PHARMACIE ROUDANI
Mme Mikou Lebbar Khadija

Page 1

FACTURE

MKD

N° FACTURE : 763983
Date : 01/07/2020

Client :
MR IBRAHIMI MOHAMED

Désignation Produits	Quantité	P.V	Total
KARDEGIC 160 MG / 30 SACHETS	1	35.70	35.70
CARDENSIEL 2.5 MG / 30 CPS	1	54.10	54.10
APROVASC 300 MG / 5 MG BTE 28 CPS	1	185.60	185.60

صيدلية الروداني
PHARMACIE ROUDANI
Mme LEBBAR Khadija Ep MIKOU
26, Bd Brahim Roudani Vers Mly Youssef
Maârif - Casablanca
Tél : 05 22 27 23 86 / 05 22 27 12 24

T = 275,40