

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothésaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/04/20	9	1	250,00	Dr. Jalal El Ouardi 17 Avenue 2 Mars 55, Avenue 2 Mars Casablanca - Maroc

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Aloropital Dr. Asmae Guedira B24, Centre Commercial Marjeh, Sidi Othmane Bd. 10 Mai BP 10000 Casablanca - Maroc	28/04/20	814,00 176,20

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A	M	P	C	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
<img alt="Diagram of a dental arch with numbered teeth from 1 to 8 on both upper and lower arches. A coordinate system is overlaid with H at				

DOCTEUR JALAL EL OUDGHIRI

PEDIATRE

Pédiatrie Générale - Néonatalogie - Urgence

Endocrinologie Pédiatrique

Diplômé de la Faculté de Dijon

Ancien Médecin des hôpitaux de France



الدكتور جلال الودغيري

إخلاصي في أمراض الأطفال والرضع

إنعاش الرضيع - المستعجلات

مختص في أمراض الغدد عند الطفل

خريج كلية الطب ديجون

طبيب سابق بالمستشفيات الفرنسية

Re: 28.04.20

Rmail Sophie



70.60 x✓

Augmenter suspension enfant

dose 11 3x/j 18j

spectrum 0,3%

2 gouttes 7 et 8 17j

33.0



174.20



PHARMACIE IBN NAFIS

29, Avenue du 2 Mars

Casablanca - Tél: 05 22 27 51 00

Dr. Jalal EL OUDGHIRI

Pediatre

35, Avenue du 2 Mars
Casablanca 20130

DOCTEUR JALAL EL OUDGHERI

PEDIATRE

Pédiatrie Générale - Néonatalogie - Urgence

Endocrinologie Pédiatrique

Diplômé de la Faculté de Dijon

Ancien Médecin des hôpitaux de France



الدكتور جلال الودغري

اختصاصي في أمراض الأطفال والرضع

إنعاش الرضيع - المستعجلات

مختص في أمراض الغدد عند الطفل

خريج كلية الطب دijon

طبيب سابق بالمستشفيات الفرنسية

Re. 28.04.20.

Rmaïl Sophie

81410

Revenac



~~pharmacie Chlrophytum
Dr. Asmaa Quédira
B24, Centre Commercial
Mariane Sidi Othmane
Bd. 10 Mars Casablanca
Tel : 05 22 57 28 31~~

35, Avenue 2 Mars, Résidence Lalla Habiba - 1^{ère} Etage - Casablanca. Tél. : 05 22 26 52 35 - GSM : 06 61 21 70 23

Fax : 05 22 29 39 73 - E-mail : drjalalelougħrī@gmail.com

Urgence : Clinique Les Crêtes. 528 Bd Panoramique - Tél. : 05 22 21 20 40

Prevenar 13®

suspension injectable

Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé)

Suspension injectable
1 seringue préremplie unidose (0,5 ml) avec aiguille séparée

Voie intramusculaire.
Bien agiter avant emploi.

1 dose (0,5 ml) contient 2,2 µg de polysaccharides des sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F et 4,4 µg du sérotype 6B.

Chlourure de sodium, acide succinique, polysorbate 80 et eau pour préparations injectables

PREVENAR 13 SUSP INJ
P.P.V : 814DH00



6118001171057

Laboratoires
Pfizer S.A.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Liste I - Uniquement sur ordonnance



Lot/EXP:

PAA119019

CL5118
04/2022

SPECTRUM® 0,3%
Solution pour instillation auriculaire
Ciprofloxacine

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Il est important de comprendre les informations importantes sur votre traitement et votre état de santé.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien. Il peut vous aider à comprendre ce que vous avez lu.

IT :
ation auriculaire
: 15.0 mg
rate).....
te de disodium, Solution de chlorure de
que, Eau pour préparations injectables
REPRÉSENTATIONS :
site de un flacon de 5 ml

CE MEDICAMENT :

Le médicament est destiné au traitement local de certaines otites chez l'adulte et l'enfant à partir de 1 an.

5- DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

CONTRE INDICATIONS :

N'utilisez jamais SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire:

- si vous êtes allergique à la ciprofloxacine, aux autres médicaments de la famille des quinolones ou à l'un des autres composants de ce médicament,
- si vous avez une otite moyenne aiguë.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

6- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire:

Faites attention avec SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire:
Mises en garde spéciales

Ne pas injecter, ne pas avaler.

Si vous avez avalé SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire d'une manière accidentelle, contactez votre médecin. Néanmoins, aucune complication sérieuse n'est attendue.

Des réactions allergiques à type d'urticaire, démangeaisons, fourmillements, et des chocs d'origine allergique généralisés (brusque gonflement du visage et du cou, gêne respiratoire, chute de la tension artérielle) pouvant mettre en jeu la vie, ont été observés, parfois dès la première prise, chez des patients traités par des médicaments de la famille des quinolones administrés par voie orale ou par injection.

Si vous remarquez les premiers signes d'une éruption cutanée ou de toute autre réaction d'hypersensibilité, y compris une urticaire, des démangeaisons ou des problèmes respiratoires, arrêtez le traitement et contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez une réaction allergique grave, alors vous avez besoin d'un traitement en urgence.

Si vos symptômes s'aggravent ou reviennent soudainement, consultez votre médecin. Vous pouvez devenir plus sensibles à d'autres infections avec l'utilisation de ce médicament, surtout après une utilisation prolongée.

Si vous êtes âgé ou si vous prenez des médicaments appelés corticostéroïdes utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation, l'asthme ou les problèmes dermatologiques, vous avez un risque plus élevé d'avoir des problèmes de tendon pendant le traitement par SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire. Si vous rencontrez une inflammation ou un état inflammatoire, arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou une inflammation des tendons, pendant ou peu de temps après la prise de ce médicament, arrêtez le traitement et contactez votre médecin.

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer des réactions cutanées. Un suivi médical méticuleux est nécessaire. N'utilisez SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire chez les enfants de moins d'un an que s'il est explicitement prescrit par votre médecin.

Au moment de l'emploi, évitez la mise en contact de l'embout avec l'oreille ou les

doigts afin de limiter les risques de contamination. Si au bout de 10 jours les symptômes persistent, il est recommandé de consulter un médecin.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez pris récemment un autre médicament, même si c'était sans ordonnance.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Ne pas utiliser SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire pendant la grossesse ou l'allaitement, sauf si votre médecin vous en a prescrit l'utilisation.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à marcher

Conduite de véhicules et utilisation d'outils.

L'utilisation de SPECTRUM 0,3%, solution pour instillation auriculaire peut réduire l'aptitude à conduire des véhicules et à marcher.

Liste des excipients à effet notable:

Chlorure de benzalkonium.

7- EFFETS NON SOUHAITES OU GÉNÉRAUX

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, SPECTRUM 0,3% peut être susceptible d'avoir des effets indésirables.

La fréquence des effets indésirables peut varier en fonction de la dose et de la façon suivante :

Très fréquents (survient chez plus de 1 personne sur 10).

Fréquents (survient chez 1 à 10 personnes sur 100).

Peu fréquents (survient chez 1 à 10 personnes sur 1 000).

Rares (survient chez 1 à 10 personnes sur 10 000).

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée avec précision).

Fréquents :

maux de tête, douleurs auriculaires, coryza, rhinopharyngite.

dermatite, pyrexie.

Fréquence indéterminée :

acouphènes.

Chez l'enfant

Dans les études cliniques, aucun réaction importante n'a été observée chez les enfants âgés de 1 à 12 ans.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout autre médicament mentionné dans cette notice.

8- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

Cette solution pour instillation auriculaire est destinée aux enfants de l'âge de 1 an.

À titre indicatif, la posologie usuelle est la suivante :

Adultes: 4 gouttes dans l'oreille atteinte, 2 gouttes dans l'oreille non atteinte.

Enfants: 3 gouttes dans l'oreille atteinte, 2 gouttes dans l'oreille non atteinte.

En cas d'utilisation de mèche dans l'oreille, la posologie est de 1 goutte par mèche.

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Voie d'administration

Voie locale. Instillation auriculaire.

Mode d'administration

Tièdir le flacon au moment de l'emploi en le tenant par la paume de la main, afin d'éviter le contact avec l'oreille.

Pour mettre les gouttes dans une oreille

Il faut d'abord pencher la tête du côté opposé. La tête doit être penchée de manière à ce que l'oreille atteinte soit en haut.

Mettre les gouttes dans l'oreille atteinte.

Tirer à plusieurs reprises sur le pavillon de l'oreille pour assurer que les gouttes sont bien dans le fond de l'oreille.

AUGMENTIN 100mg/12,50mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon de 30ml

AUGMENTIN 100mg/12,50mg par ml ENFANT

Suppression

25 Kg
30 Kg

PPV: 70,60 DH

LOT: 623781

PER: 06/2021

Liste I. Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

SmithKline Maroc, Ain El Aouda, Région de Rabat.

Information médicale : GlaxoSmithKline Maroc, 42-44 Angle Bd Rachid

Abou Hamed Al Ghazali, Casablanca 20.000

Indications thérapeutiques

AUGMENTIN est utilisé chez les nourrissons et les enfants pour traiter les infections suivantes:

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne donnez jamais AUGMENTIN à votre enfant:

- S'il est allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans AUGMENTIN.
- S'il a déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique.

Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.

- S'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.
- Ne donnez pas AUGMENTIN à votre enfant s'il est dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à son médecin ou au pharmacien avant d'administrer AUGMENTIN.

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

Fautes attention avec AUGMENTIN:

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant de lui administrer ce médicament s'il:

- souffre de mononucléose infectieuse,
- est traité pour des problèmes au foie ou aux reins,
- l'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'administrer AUGMENTIN à votre enfant.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection.

Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dosage différent d'AUGMENTIN ou un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque votre enfant prend AUGMENTIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière(e) qu'il prend AUGMENTIN. En effet, AUGMENTIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si votre enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance, et aussi les produits à base de plantes.

Si votre enfant prend de l'allopurinol (en traitement de la goutte), votre médecin peut évaluer d'ajuster la dose d'AUGMENTIN.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

AUGMENTIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales).

AUGMENTIN peut influer sur l'action du mycophénolate mofté (traitement pour prévenir une greffe d'organes).

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans effet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans effet.

Précautions pendant la grossesse et l'allaitement

Votre enfant, devant recevoir ce médicament, est enceinte ou allait, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un quelconque médicament.

Ortifs

Sans effet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

AUGMENTIN peut provoquer des effets indésirables dont les symptômes peuvent diminuer la capacité à conduire. Ne pas conduire de véhicules et ne pas manipuler de machines à moins de se sentir parfaitement bien.

Liste des excipients à effet notable:

Informations importantes concernant certains composants d'AUGMENTIN:

- AUGMENTIN contient de l'Aspartam (E951), qui est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive chez les enfants nés avec une maladie appelée « phénylketoacétate ».
- AUGMENTIN contient de la maltodextrose (glucose). Si votre médecin vous a dit que votre enfant a une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- AUGMENTIN contient de potassium : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en potassium.
- AUGMENTIN contient de sodium : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel, strict.

3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN?

Instructions pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Adultes et enfants de 40 kg ou plus

• Ces formes (sachets et suspension) ne sont généralement pas recommandées pour les adultes et les enfants pesant 40 kg ou plus. Demandez conseil à votre médecin ou au pharmacien.

Enfants pesant moins de 40 kg

Toutes les doses sont établies en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

• Votre médecin vous indiquera la quantité d'AUGMENTIN à administrer à votre bébé ou enfant.

• Une seringue graduée en plastique est fournie (pour la forme suspension). Vous devez l'utiliser pour administrer la dose correcte à votre bébé ou enfant.

• Dose habituelle: 40 mg/5 mg à 80 mg/10 mg par kg de poids corporel et par jour, en trois fois.

Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

• Si votre enfant a des problèmes rénaux, une réduction de la dose peut être nécessaire. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.

• Si votre enfant a des problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de son foie.

Comment administrer AUGMENTIN

• Pour la suspension: Agitez toujours le flacon avant chaque utilisation.

• Pour le sachet: Juste avant la prise d'AUGMENTIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un verre d'eau.

• Donnez ce médicament à votre enfant au début d'un repas ou un peu avant. Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures. N'administrez pas 2 doses en 1 heure.

• Ne donnez pas AUGMENTIN à votre enfant pendant plus de 2 semaines. Si les symptômes de votre enfant persistent, consultez de nouveau un médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez administré plus d'AUGMENTIN que vous n'auriez dû

La prise d'une quantité excessive d'AUGMENTIN par votre enfant peut entraîner des maux

AUGMENTIN 100mg/12,50mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon de 30ml

AUGMENTIN 100mg/12,50mg par ml ENFANT

Suppression

25 Kg
30 Kg

PPV: 70,60 DH

LOT: 623781

PER: 06/2021

Liste I. Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

SmithKline Maroc, Ain El Aouda, Région de Rabat.

Information médicale : GlaxoSmithKline Maroc, 42-44 Angle Bd Rachid

Abou Hamed Al Ghazali, Casablanca 20.000

Indications thérapeutiques

AUGMENTIN est utilisé chez les nourrissons et les enfants pour traiter les infections suivantes:

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne donnez jamais AUGMENTIN à votre enfant:

- S'il est allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans AUGMENTIN.
- S'il a déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique.

Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.

- S'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.
- Ne donnez pas AUGMENTIN à votre enfant s'il est dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à son médecin ou au pharmacien avant d'administrer AUGMENTIN.

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

Fautes attention avec AUGMENTIN:

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant de lui administrer ce médicament s'il:

- souffre de mononucléose infectieuse,
- est traité pour des problèmes au foie ou aux reins,
- l'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'administrer AUGMENTIN à votre enfant.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection.

Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dosage différent d'AUGMENTIN ou un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque votre enfant prend AUGMENTIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière(e) qu'il prend AUGMENTIN. En effet, AUGMENTIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si votre enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance, et aussi les produits à base de plantes.

Si votre enfant prend de l'allopurinol (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'ajuster la dose d'AUGMENTIN.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

AUGMENTIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales).

AUGMENTIN peut influer sur l'action du mycophénolate mofté (traitement pour prévenir une greffe d'organes).

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Précautions pendant la grossesse et l'allaitement

Votre enfant, devant recevoir ce médicament, est enceinte ou allait, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un quelconque médicament.

Portifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

AUGMENTIN peut provoquer des effets indésirables dont les symptômes peuvent diminuer la capacité à conduire. Ne pas conduire de véhicules et ne pas manipuler de machines à moins de se sentir parfaitement bien.

Liste des excipients à effet notable:

Informations importantes concernant certains composants d'AUGMENTIN:

- AUGMENTIN contient de l'Aspartam (E951), qui est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive chez les enfants nés avec une maladie appelée « phénylkétoneurie ».
- AUGMENTIN contient de la maltodextrose (glucose). Si votre médecin vous a dit que votre enfant a une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- AUGMENTIN contient de potassium : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en potassium.
- AUGMENTIN contient de sodium : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel, strict.

3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN?

Instructions pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Adultes et enfants de 40 kg ou plus

* Ces formes (sachets et suspension) ne sont généralement pas recommandées pour les adultes et les enfants pesant 40 kg ou plus. Demandez conseil à votre médecin ou au pharmacien.

Enfants pesant moins de 40 kg

Toutes les doses sont établies en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

* Votre médecin vous indiquera la quantité d'AUGMENTIN à administrer à votre bébé ou enfant.

* Une seringue graduée en plastique est fournie (pour la forme suspension). Vous devez l'utiliser pour administrer la dose correcte à votre bébé ou enfant.

* Dose habituelle: 40 mg/5 mg à 80 mg/10 mg par kg de poids corporel et par jour, en trois fois.

Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

* Si votre enfant a des problèmes rénaux, une réduction de la dose peut être nécessaire. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.

* Si votre enfant a des problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de son foie.

Comment administrer AUGMENTIN

* Pour la suspension: Agitez toujours le flacon avant chaque utilisation.

* Pour le sachet: Juste avant la prise d'AUGMENTIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un verre d'eau.

* Donnez ce médicament à votre enfant au début d'un repas ou un peu avant. Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures. N'administrez pas 2 doses en 1 heure.

* Ne donnez pas AUGMENTIN à votre enfant pendant plus de 2 semaines. Si les symptômes de votre enfant persistent, consultez de nouveau un médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez administré plus d'AUGMENTIN que vous n'auriez dû:

La prise d'une quantité excessive d'AUGMENTIN par votre enfant peut entraîner des maux