

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W19-528037

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input checked="" type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Matricule : 10646	Cadre réservé à l'adhérent(e)	Société : BOUCHRA	
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : NASRES BOUCHRA		Date de naissance : 13-03-1974	
Adresse : HOT HAJ FATEH N°19		CE 10000 Casablanca	
Tél. : 0664 171988		Total des frais engagés : 975 / 9 Dhs	
Cadre réservé au Médecin			
BENTOUSSA Khadija Opticien - Opto-Homéopathie Lotissement Haj Fateh N°19 ADD 10000 Casablanca Date de consultation : 28/02/2020 Nom et prénom du malade : Nesres Bouchra Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant Nature de la maladie : Affection Oculaire En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle. 11 JUN 2020			
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles. Fait à : acc Le : 11/06/2020 Signature de l'adhérent(e) : 11/06/2020			



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/02/20	Cst. 5		300.00	INP : 05M42585  Dr. BENMIRA Khatun Homeopath Fateh N.

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
CH PHARMACIE 16 Rue de la République 67000 STRASBOURG	28/02/20	135,00 x 05 90 AL 675

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		
						1900000	
	03/03/19.20					OPTIQUE EL FA Moukhtar ABOUKALIA	

VOLET ADHÉRÉ

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODDF.


O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

optionnel Thérapeutique nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr BENMOUSSA Khadija

Chirurgie et Maladies des Yeux

- Cataracte par phacoémulsification
 - Strabisme - Glaucome - voies lacrymales
 - Contactologie - Angiographie - Laser

Homeopathie

*Diplômée de la faculté de médecine
et de pharmacie - Casablanca*



Sur rendez-vous

الزيارة بالموعد

الدكتورة بنموسى، خديج

حرافة و طب العيون

- العجلة - الحول - المياه الزرقاء

- مسالحة الدموع - العدسات اللاصقة

- الليزر - تصوير الشبكية

الطب المثا

خريجة كلية الطب والصيدلة
الدار البيضاء

28 février 2020

Casablanca, le :

Mme NASRES BOUCHRA

Monture pour vision de près + verres correcteurs

Antireflets, Filtre anti-lumière bleue

VP : ODG = + 1.25

45

FOLE DUAL

1 goutte 4 fois / jour, dans les deux yeux, pendant 6 Mois

OPTIQUE EL FATH
Bd. Moudiboukita Bloc 'J' N° 83
Palcne : 36616616

**STE PHARMACEUTIQUE
Lotte CASAINE
Gaspard HÉBERT
et FILS
PARIS -
14, Rue de la Chaussée-d'Antin
Télé. 0522 31 02 28**

OPTIQUE EL FATH

Bd. Moudibokeita, Bloc «J» N° 83
 Casa - GSM : 0661 97 79 82
 Patente : 36616616



نظارات الفت

شارع موديبوكينا بلوك "ج" رقم 83
 الدار البيضاء - المحمول: 06 61 97 79 82
 البليانت: 36616616

FACTURE

N° 0014790

Casablanca, le : 03/03/2020

M: NASRES BOUCHRA

N° de Nomenclature :

Docteur :

Monture:	optique	Socios	1
Verres:	1, SF bleu antilumière		
VL:	UV et lumière bleu		
OD:			
OG:			
VP:			
OD:	+1,25	350	
OG:	+1,25	350	
		Total :	1200.00

Arrêtée la Présente Facture à la Somme de:

IF : 40178251

RC : 377480

ICE: 0008056000089

mille deux cent dirhams

OPTIQUE EL FATH

Bd. Moudiboukina Bloc "J" N° 83

Patente 36616616

PPC. 135,00
E01 19
07/2022

Eole dual

on stérile)Hyaluronate de sodium 0,2%; Hypromellose 0,2%; Eaux distillées; Vaccinium myrtillus(myrtille), Rosa canina (églantier)- Excipients: Acide sodium décahydraté, Chlorure de sodium, Eau Préparation pour Injectables

rate de sodium est une substance bio-compatible présente naturellement grâce à ses propriétés hydratantes et lubrifiantes, il crée un film sur la surface des agents extérieurs et les dommages causés par les radicaux libres. La stabilité du film lacrymal sur la surface de l'oeil en créant un écran de protection élastique. EOOLE dual contient également un mélange d'ingrédients naturels qui ont une action apaisante, rafraîchissante et protectrice. EOOLE dual se caractérise par une viscosité optimale qui facilite la pose et le retrait des lentilles de contact, en évitant le déséquilibre du film lacrymal et les phénomènes de rougeur oculaire.

INDICATIONS: Sécheresse oculaire modérée à sévère - Syndrome de l'oeil sec - Rougeur, fatigue et irritation des yeux et des muqueuses oculaires par des facteurs environnementaux (pollution, vent, fumée, soleil, sel de mer) - Utilisation prolongée de l'ordinateur - Stress oculaire lié au port des lentilles de contact- Altération des structures du film lacrymal suite à la chirurgie de la surface oculaire.

MODE D'UTILISATION:


Notez la date d'ouverture sur la boîte.

1- Déachez le sceau d'inviolabilité.

2- Retirez le capuchon de protection.

3- Instiller 1 à 2 gouttes dans chaque œil en appuyant légèrement sur le flacon (*parfois il est nécessaire d'exercer une pression plus élevée sur le flacon* en raison du mécanisme spécial de fermeture qui préserve la stérilité et la stabilité du produit).

4- Après utilisation, fermer le flacon et l'utiliser dans les 3 mois qui suivent la première ouverture.



POSOLOGIE: 1 à 2 gouttes par œil 3 à 4 fois par jour. Cette posologie peut être adaptée par votre médecin ou pharmacien selon la sévérité du cas.

EFFETS INDESIRABLES: Lors de la première utilisation la vision peut être temporairement floue mais elle se normalise très rapidement. Brûlure, picotement ou irritation mineurs peuvent survenir temporairement en raison de l'irritation oculaire pré-existante. Si l'un de ces effets persiste ou s'aggrave, informez votre médecin ou pharmacien sans tarder.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:

Le produit est à usage unique du patient.

Le produit est destiné uniquement à usage ophtalmique.

Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez, au moment de la première ouverture, que le flacon ou le bouchon sont endommagés ou non parfaitement étanches.

Lors de l'application ne touchez pas vos yeux ou toute autre surface avec le bout du flacon.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des constituants.

En cas de problème durant le traitement interrompre l'utilisation et consulter votre médecin.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette.

Éliminer correctement le flacon après utilisation.

Garder hors de portée des enfants.

Ne pas stocker au-dessus de 25° C.

PRÉSENTATION:

Flacon de 10 ml de doses multiples.

Sans conservateur - Sans phosphates

Date de dernière révision: 02.02 du 05/2018

CE STERILE A 0373 Dispositif Médical

Fabriqué par : C.O.C. Farmaceutici S.R.L.

Via Modena, 15-40019 - Bolognese -Italie

Distribué par : E-PROM Pharma

Rue Amyot - Oualili 3 - Q.H. 20360 - Casablanca- Maroc

PPC. 135,00
E01 19
07/2022

Eole dual

on stérile)Hyaluronate de sodium 0,2%; Hypromellose 0,2%; Eaux distillées; Vaccinium myrtillus(myrtille), Rosa canina (églantier)- Excipients: Acide sodium décahydraté, Chlorure de sodium, Eau Préparation pour Injectables

rate de sodium est une substance bio-compatible présente naturellement grâce à ses propriétés hydratantes et lubrifiantes, il crée un film sur la surface des agents extérieurs et les dommages causés par les radicaux libres. La stabilité du film lacrymal sur la surface de l'oeil en créant un écran de protection élastique. EOOLE dual contient également un mélange d'ingrédients naturels qui ont une action apaisante, rafraîchissante et protectrice. EOOLE dual se caractérise par une viscosité optimale qui facilite la pose et le retrait des lentilles de contact, en évitant le déséquilibre du film lacrymal et les phénomènes de rougeur oculaire.

INDICATIONS: Sécheresse oculaire modérée à sévère - Syndrome de l'oeil sec - Rougeur, fatigue et irritation des yeux et des muqueuses oculaires par des facteurs environnementaux (pollution, vent, fumée, soleil, sel de mer) - Utilisation prolongée de l'ordinateur - Stress oculaire lié au port des lentilles de contact- Altération des structures du film lacrymal suite à la chirurgie de la surface oculaire.

MODE D'UTILISATION:


Notez la date d'ouverture sur la boîte.

1- Déachez le sceau d'inviolabilité.

2- Retirez le capuchon de protection.

3- Instiller 1 à 2 gouttes dans chaque œil en appuyant légèrement sur le flacon (*parfois il est nécessaire d'exercer une pression plus élevée sur le flacon* en raison du mécanisme spécial de fermeture qui préserve la stérilité et la stabilité du produit).

4- Après utilisation, fermer le flacon et l'utiliser dans les 3 mois qui suivent la première ouverture.



POSOLOGIE: 1 à 2 gouttes par œil 3 à 4 fois par jour. Cette posologie peut être adaptée par votre médecin ou pharmacien selon la sévérité du cas.

EFFETS INDESIRABLES: Lors de la première utilisation la vision peut être temporairement floue mais elle se normalise très rapidement. Brûlure, picotement ou irritation mineurs peuvent survenir temporairement en raison de l'irritation oculaire pré-existante. Si l'un de ces effets persiste ou s'aggrave, informez votre médecin ou pharmacien sans tarder.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:

Le produit est à usage unique du patient.

Le produit est destiné uniquement à usage ophtalmique.

Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez, au moment de la première ouverture, que le flacon ou le bouchon sont endommagés ou non parfaitement étanches.

Lors de l'application ne touchez pas vos yeux ou toute autre surface avec le bout du flacon.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des constituants.

En cas de problème durant le traitement interrompre l'utilisation et consulter votre médecin.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette.

Éliminer correctement le flacon après utilisation.

Garder hors de portée des enfants.

Ne pas stocker au-dessus de 25° C.

PRÉSENTATION:

Flacon de 10 ml de doses multiples.

Sans conservateur - Sans phosphates

Date de dernière révision: 02.02 du 05/2018

CE STERILE A 0373 Dispositif Médical

Fabriqué par : C.O.C. Farmaceutici S.R.L.

Via Modena, 15-40019 - Bolognese -Italie

Distribué par : E-PROM Pharma

Rue Amyot - Oualili 3 - Q.H. 20360 - Casablanca- Maroc

PPC. 135,00
E01 19
07/2022

Eole dual

on stérile)Hyaluronate de sodium 0,2%; Hypromellose 0,2%; Eaux distillées; Vaccinium myrtillus(myrtille), Rosa canina (églantier)- Excipients: Acide sodium décahydraté, Chlorure de sodium, Eau Préparation pour Injectables

rate de sodium est une substance bio-compatible présente naturellement grâce à ses propriétés hydratantes et lubrifiantes, il crée un film sur la surface des agents extérieurs et les dommages causés par les radicaux libres. La stabilité du film lacrymal sur la surface de l'oeil en créant un écran de protection élastique. EOOLE dual contient également un mélange d'ingrédients naturels qui ont une action apaisante, rafraîchissante et protectrice. EOOLE dual se caractérise par une viscosité optimale qui facilite la pose et le retrait des lentilles de contact, en évitant le déséquilibre du film lacrymal et les phénomènes de rougeur oculaire.

INDICATIONS: Sécheresse oculaire modérée à sévère - Syndrome de l'oeil sec - Rougeur, fatigue et irritation des yeux et des muqueuses oculaires par des facteurs environnementaux (pollution, vent, fumée, soleil, sel de mer) - Utilisation prolongée de l'ordinateur - Stress oculaire lié au port des lentilles de contact- Altération des structures du film lacrymal suite à la chirurgie de la surface oculaire.

MODE D'UTILISATION:


Notez la date d'ouverture sur la boîte.

1- Déachez le sceau d'inviolabilité.

2- Retirez le capuchon de protection.

3- Instiller 1 à 2 gouttes dans chaque œil en appuyant légèrement sur le flacon (*parfois il est nécessaire d'exercer une pression plus élevée sur le flacon* en raison du mécanisme spécial de fermeture qui préserve la stérilité et la stabilité du produit).

4- Après utilisation, fermer le flacon et l'utiliser dans les 3 mois qui suivent la première ouverture.



POSOLOGIE: 1 à 2 gouttes par œil 3 à 4 fois par jour. Cette posologie peut être adaptée par votre médecin ou pharmacien selon la sévérité du cas.

EFFETS INDESIRABLES: Lors de la première utilisation la vision peut être temporairement floue mais elle se normalise très rapidement. Brûlure, picotement ou irritation mineurs peuvent survenir temporairement en raison de l'irritation oculaire pré-existante. Si l'un de ces effets persiste ou s'aggrave, informez votre médecin ou pharmacien sans tarder.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:

Le produit est à usage unique du patient.

Le produit est destiné uniquement à usage ophtalmique.

Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez, au moment de la première ouverture, que le flacon ou le bouchon sont endommagés ou non parfaitement étanches.

Lors de l'application ne touchez pas vos yeux ou toute autre surface avec le bout du flacon.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des constituants.

En cas de problème durant le traitement interrompre l'utilisation et consulter votre médecin.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette.

Éliminer correctement le flacon après utilisation.

Garder hors de portée des enfants.

Ne pas stocker au-dessus de 25° C.

PRÉSENTATION:

Flacon de 10 ml de doses multiples.

Sans conservateur - Sans phosphates

Date de dernière révision: 02.02 du 05/2018

CE STERILE A 0373 Dispositif Médical

Fabriqué par : C.O.C. Farmaceutici S.R.L.

Via Modena, 15-40019 - Bolognese -Italie

Distribué par : E-PROM Pharma

Rue Amyot - Oualili 3 - Q.H. 20360 - Casablanca- Maroc

PPC. 135,00
E01 19
07/2022

Eole dual

on stérile)Hyaluronate de sodium 0,2%; Hypromellose 0,2%; Eaux distillées; Vaccinium myrtillus(myrtille), Rosa canina (églantier)- Excipients: Acide sodium décahydraté, Chlorure de sodium, Eau Préparation pour Injectables

rate de sodium est une substance bio-compatible présente naturellement grâce à ses propriétés hydratantes et lubrifiantes, il crée un film sur la surface des agents extérieurs et les dommages causés par les radicaux libres. La stabilité du film lacrymal sur la surface de l'oeil en créant un écran de protection élastique. EOOLE dual contient également un mélange d'ingrédients naturels qui ont une action apaisante, rafraîchissante et protectrice. EOOLE dual se caractérise par une viscosité optimale qui facilite la pose et le retrait des lentilles de contact, en évitant le déséquilibre du film lacrymal et les phénomènes de rougeur oculaire.

INDICATIONS: Sécheresse oculaire modérée à sévère - Syndrome de l'oeil sec - Rougeur, fatigue et irritation des yeux et des muqueuses oculaires par des facteurs environnementaux (pollution, vent, fumée, soleil, sel de mer) - Utilisation prolongée de l'ordinateur - Stress oculaire lié au port des lentilles de contact- Altération des structures du film lacrymal suite à la chirurgie de la surface oculaire.

MODE D'UTILISATION:


Notez la date d'ouverture sur la boîte.

1- Déachez le sceau d'inviolabilité.

2- Retirez le capuchon de protection.

3- Instiller 1 à 2 gouttes dans chaque œil en appuyant légèrement sur le flacon (*parfois il est nécessaire d'exercer une pression plus élevée sur le flacon* en raison du mécanisme spécial de fermeture qui préserve la stérilité et la stabilité du produit).

4- Après utilisation, fermer le flacon et l'utiliser dans les 3 mois qui suivent la première ouverture.



POSOLOGIE: 1 à 2 gouttes par œil 3 à 4 fois par jour. Cette posologie peut être adaptée par votre médecin ou pharmacien selon la sévérité du cas.

EFFETS INDESIRABLES: Lors de la première utilisation la vision peut être temporairement floue mais elle se normalise très rapidement. Brûlure, picotement ou irritation mineurs peuvent survenir temporairement en raison de l'irritation oculaire pré-existante. Si l'un de ces effets persiste ou s'aggrave, informez votre médecin ou pharmacien sans tarder.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:

Le produit est à usage unique du patient.

Le produit est destiné uniquement à usage ophtalmique.

Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez, au moment de la première ouverture, que le flacon ou le bouchon sont endommagés ou non parfaitement étanches.

Lors de l'application ne touchez pas vos yeux ou toute autre surface avec le bout du flacon.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des constituants.

En cas de problème durant le traitement interrompre l'utilisation et consulter votre médecin.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette.

Éliminer correctement le flacon après utilisation.

Garder hors de portée des enfants.

Ne pas stocker au-dessus de 25° C.

PRÉSENTATION:

Flacon de 10 ml de doses multiples.

Sans conservateur - Sans phosphates

Date de dernière révision: 02.02 du 05/2018

CE STERILE A 0373 Dispositif Médical

Fabriqué par : C.O.C. Farmaceutici S.R.L.

Via Modena, 15-40019 - Bolognese -Italie

Distribué par : E-PROM Pharma

Rue Amyot - Oualili 3 - Q.H. 20360 - Casablanca- Maroc

PPC. 135,00
E01 19
07/2022

Eole dual

on stérile)Hyaluronate de sodium 0,2%; Hypromellose 0,2%; Eaux distillées; Vaccinium myrtillus(myrtille), Rosa canina (églantier)- Excipients: Acide sodium décahydraté, Chlorure de sodium, Eau Préparation pour Injectables

rate de sodium est une substance bio-compatible présente naturellement grâce à ses propriétés hydratantes et lubrifiantes, il crée un film sur la surface des agents extérieurs et les dommages causés par les radicaux libres. La stabilité du film lacrymal sur la surface de l'oeil en créant un écran de protection élastique. EOOLE dual contient également un mélange d'ingrédients naturels qui ont une action apaisante, rafraîchissante et protectrice. EOOLE dual se caractérise par une viscosité optimale qui facilite la pose et le retrait des lentilles de contact, en évitant le déséquilibre du film lacrymal et les phénomènes de rougeur oculaire.

INDICATIONS: Sécheresse oculaire modérée à sévère - Syndrome de l'oeil sec - Rougeur, fatigue et irritation des yeux et des muqueuses oculaires par des facteurs environnementaux (pollution, vent, fumée, soleil, sel de mer) - Utilisation prolongée de l'ordinateur - Stress oculaire lié au port des lentilles de contact- Altération des structures du film lacrymal suite à la chirurgie de la surface oculaire.

MODE D'UTILISATION:


Notez la date d'ouverture sur la boîte.

1- Déachez le sceau d'inviolabilité.

2- Retirez le capuchon de protection.

3- Instiller 1 à 2 gouttes dans chaque œil en appuyant légèrement sur le flacon (*parfois il est nécessaire d'exercer une pression plus élevée sur le flacon* en raison du mécanisme spécial de fermeture qui préserve la stérilité et la stabilité du produit).

4- Après utilisation, fermer le flacon et l'utiliser dans les 3 mois qui suivent la première ouverture.



POSOLOGIE: 1 à 2 gouttes par œil 3 à 4 fois par jour. Cette posologie peut être adaptée par votre médecin ou pharmacien selon la sévérité du cas.

EFFETS INDESIRABLES: Lors de la première utilisation la vision peut être temporairement floue mais elle se normalise très rapidement. Brûlure, picotement ou irritation mineurs peuvent survenir temporairement en raison de l'irritation oculaire pré-existante. Si l'un de ces effets persiste ou s'aggrave, informez votre médecin ou pharmacien sans tarder.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:

Le produit est à usage unique du patient.

Le produit est destiné uniquement à usage ophtalmique.

Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez, au moment de la première ouverture, que le flacon ou le bouchon sont endommagés ou non parfaitement étanches.

Lors de l'application ne touchez pas vos yeux ou toute autre surface avec le bout du flacon.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des constituants.

En cas de problème durant le traitement interrompre l'utilisation et consulter votre médecin.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette.

Éliminer correctement le flacon après utilisation.

Garder hors de portée des enfants.

Ne pas stocker au-dessus de 25° C.

PRÉSENTATION:

Flacon de 10 ml de doses multiples.

Sans conservateur - Sans phosphates

Date de dernière révision: 02.02 du 05/2018

CE STERILE A 0373 Dispositif Médical

Fabriqué par : C.O.C. Farmaceutici S.R.L.

Via Modena, 15-40019 - Bolognese -Italie

Distribué par : E-PROM Pharma

Rue Amyot - Oualili 3 - Q.H. 20360 - Casablanca- Maroc